



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.







PA  
A









Annalen  
der Physik

PAH  
644/6





**ANNALEN**  
**DER**  
**PHYSIK UND CHEMIE.**

---

**BAND XXXII**



**ANNALEN**  
DER  
**PHYSIK**  
UND  
**CHEMIE.**

---

ZWEITE REIHE.

---

HERAUSGEGEBEN ZU BERLIN

VON

**J. C. POGGENDORFF.**

---

ZWÖLFTER BAND.

---

NEBST FÜNF KUPFERTAFELN.

---

LEIPZIG, 1837.

VERLAG VON JOHANN AMBROSIVS BARTH.



AN

H

C



**ANNALEN**  
DER  
**PHYSIK**  
UND  
**CHEMIE.**



HERAUSGEGEBEN ZU BERLIN

VON

**J. C. POGGENDORFF.**

ZWEI UND VIERZIGSTER BAND.  
DER GANZEN FOLGE HUNDERT UND ACHTZEHNTER.

---

NEBST VON KUPFERTAFELN.

---

LEIPZIG, 1837.

VERLAG VON JOHANN AMBROSIOUS BARTH.



# **I n h a l t .**

des Bandes XXXXII der Annalen der Physik und Chemie.

---

## **Erstes Stück.**

	Seite
I. Beobachtungen über den Einfluss der Krystallflächen auf das reflectirte Licht, und über die Intensität des ordentlichen und außerordentlichen Strahls; von F. E. Neumann. . . .	1
II. Ueber die circuläre Doppelbrechung; von Babinet. . .	30
III. Ueber die Richtungslinien des Schrens; von J. Mile. . .	37
IV. Einige nachträgliche Bemerkungen zu meinem Aufsatz über Ergänzungsfarben; von G. Osann. . . . .	72
V. Ueber Becquerel's einfache Kette, deren Strom aus der Verbindung von Säure und Alkali entstehen soll; von F. Mohr. . . . .	78
VI. Ueber Electricitäts-Erregung bei chemischen Verbindungen; von F. P. Dulk. . . . .	91
VII. Ueber den Einfluss der Wärme auf die Leichtigkeit des Durchgangs elektrischer Ströme durch Flüssigkeiten und Metalle; von De la Rive. . . . .	99

# VI

	Seite
VIII. Ueber eine Methode, das Kobaltoxyd, so wie das Nikeloxyd und Manganoxydul, vom Eisenoxyd, von der Arsenik- und arsenigen Säure zu trennen; von Th. Scheerer.	104
IX. Ueber die einfachen und doppelten Cyanmetalle; von C. Rammelsberg. . . . .	111
X. Darstellung reiner schwefliger Säure; von R. F. Marchand.	144
XI. Ueber eine Reihe organischer Verbindungen, welche Arsenik als Bestandtheile enthalten; von G. R. Bunsen. . .	145
XII. Paton's, Marsh's und Simon's Methoden, Arsenik zu entdecken, nebst Bemerkungen von Berzelius. . . .	159
XIII. Reduction des Schwefelarseniks durch Silberkohle; von F. F. Ronge. . . . .	163
XIV. Notiz über die Verbindung des Stickstoffs mit den Metallen, namentlich mit dem Kupfer, im Glühzustande; von C. H. Pfaff. . . . .	164
XV. Beschreibung zweier Apparate zur Bestimmung der Dämpfe der Fumarolen und der in Mineralwässern enthaltenen Kohlensäure; von H. Abich. . . . .	167
XVI. Künstlicher Rubin. . . . .	172
XVII. Nephelin in Sachsen; von T. E. Gumprecht. . . .	174
XVIII. Ueber die Ausdehnbarkeit der Luft; von F. Streblke.	175
XIX. Darstellung des Aconitin; von T. Morson. . . . .	175
XX. Vorrichtung zur Darstellung Newton'scher Ringe. . . .	176

## Zweites Stück

I. Ueber den bei manchen Personen vorkommenden Mangel an Farbensinn; von A. Seebeck. . . . .	177
II. Neuer Interferenzversuch; von Talbot. . . . .	234
III. Ueber die Richtungslinien des Sehens; von J. Mile. (Schluß.)	235
IV. Volta'sche Combinationen; von J. F. Daniell. . . . .	263
1) Zergliederungsbatterie, S. 264. — 2) Constante Batterie, S. 272.	
V. Nachträgliche Beobachtungen über Volta'sche Combinationen; von Demselben. . . . .	277

# VII

Seite

- VI. Ueber die Volta'sche Säule und über das allgemeine Gesetz für die Intensität der Ströme einer einfachen Kette und einer Säule von großer oder kleiner Spannung; von R. Pouillet. . . . . 281
- VII. Ueber die relative Messung thermo-elektrischer und hydro-elektrischer Quellen und über die Elektricitätsmengen, welche zur Zersetzung von einem Gramm Wasser, so wie zur Hervorbringung von mehr oder weniger starken Erschütterungen unter festgesetzten Umständen erforderlich sind; von Demselben. . . . . 297
- VIII. Beschreibung und Gebrauch der elektro-magnetischen Waga und der Säule von constanten Strömen; von Becquerel. 307
- IX. Bemerkung über die Theorie der Winde; von J. Dalton. 315
- X. Ueber die verschiedenen Theorien des Windes als Erwiderung auf vorstehende Bemerkung; von H. W. Dove. 316
- XI. Ueber die Oxydation der Metalle in der atmosphärischen Luft; von P. A. v. Bunsdorff. . . . . 325
- XII. Ueber Antimon-Wasserstoffgas und die davon abhängige Unsicherheit des neuerlich von James Marsh aufgefundenen Verfahrens zur Entdeckung von Arsenik in mehreren wichtigen Fällen; von C. M. Pfaff. . . . . 339
- XIII. Ueber die Zusammensetzung der Zuckersäure; von H. Hesa. . . . . 347
- XIV. Bemerkungen zu dem Aufsatz des Hrn. Prof. Fechner über die Kniepresse; von E. L. Schubarth. . . . . 350

## Drittes Stück.

- I. Ueber die Bildung des Kalkpaths und Arragonits; von Gustav Rose. . . . . 353
- II. Untersuchung über die Einwirkung des Ammoniaks auf die Chloride und Oxyde des Quecksilbers; von Robert Kane. 367
- III. Beitrag zur näheren Kenntniss der Zusammensetzung des weißen Präcipitats und einiger anderen analogen Quecksilberverbindungen; von C. Ullgren. . . . . 385



# VIII

	Seite
IV. Beiträge zur organischen Chemie; von C. Löwig. . . . .	399
Einwirkung des Kaliums auf Weingeist, S. 399. —	
Zusammensetzung und Natur der Kali-Verbindung,	
S. 400. — Verhalten der zusammengesetzten Aether-	
arten zum Kalium, S. 404. — Einwirkung des Kaliums	
auf Holzgeist, S. 404. — Verhalten des schwefelsau-	
ren und klee-sauren Holzäthers zu wässrigen Alkalien,	
S. 409. — Verhalten des Kaliums zum Aceton, S. 411.	
— Ueber das Valeron, S. 412. — Verhalten des Ka-	
liums zum Valeron, S. 414.	
V. Ueber das wasserfreie schweflige-säure Ammoniak; von H.	
Rose. . . . .	415
VI. Einige Untersuchungen über die Farbe, welche das Laub	
verschiedener Bäume im Herbste vor dem Abfallen annimmt;	
von J. J. Berzelius. . . . .	422
VII. Verschiedene Folgerungen aus dem specifischen Gewichte	
der Gase organischer Verbindungen; von J. J. Berzelius. . . . .	434
VIII. Ueber die Zusammensetzung einiger organischen Säuren;	
von Demas und Liebig. . . . .	445
IX. Ueber die Naphthalinschwefelsäure; von J. J. Berzelius. . . . .	449
X. Ueber die Schwefelblumen; von J. Fritzsche. . . . .	453
XI. Untersuchung eines nach einem Anfall von Magenkrampf	
gelassenen Harns; von Leopold Gmelin. . . . .	458
XII. Auflöslichkeit des Quecksilberoxyds in Wasser; von R. F.	
Marchand. . . . .	459
XIII. Ueber die Bestimmung der Güte des Mostes; von G.	
Osann. . . . .	460
XIV. Ueber den Serpentin von Snarum in Norwegen; von	
Tamnau. . . . .	462
XV. Beschreibung des Brochantits; von G. Rose. . . . .	468
XVI. Ueber ein am südlichen Rande der Lüneburger Heide ent-	
decktes, mehr als 28 Fuß mächtiges Infusorien-Lager; von	
C. G. Ehrenberg. . . . .	470
XVII. Beobachtungen über das Sinken der schwedischen Kiste	
an gewissen Orten; von Nilson. . . . .	472

XVIII. Ueber einige innerhalb geschichtlicher Zeiten stattgefundene Niveau-Veränderungen in Dänemark; von G. Forchhammer. . . . .	476
XIX. Ueber den mittleren Luftdruck am Meeresspiegel. . . . .	479

### Viertes Stück.

I. Rechtfertigung der Contacttheorie des Galvanismus; von G. Th. Fechner. . . . .	481
1) Thatsachen, welche die ungeschlossene Kette betreffen, S. 482. — 2) Thatsachen, welche die geschlossene Kette betreffen, S. 499. — 3) Ueber die Elektricitätsentwicklung bei Berührung von Metallen mit Flüssigkeiten, S. 512.	
II. Interferenzphänomen. . . . .	516
III. Ueber das Verhalten des Chlors zu Schwefelmetallen und über eine der schwefligen Säure entsprechende Chlorverbindung des Schwefels; von Heinrich Rose. . . . .	517
IV. Ueber zwei norwegische Kobalterze von den Skutteroder Gruben; von Th. Scherer. . . . .	546
V. Verhalten des Glases zum schwefelsauren Ammoniak und im Vacuum; von R. F. Marchand. . . . .	558
VI. Beschreibung einiger chemischer Apparate; von Leopold Gmelin. . . . .	567
VII. Vergleichende Untersuchung über das Verhalten des Antimon- und des Arsenikwasserstoffgases, und über die neuesten Methoden, Schwefelarsenik zu reduciren; von J. F. Simon. . . . .	563
VIII. Ueber die chemische Zusammensetzung des Periklin; von M. C. J. Thaulow. . . . .	571
Nachtrag von G. Rose. . . . .	575
IX. Ueber eine neue Verbindung der schwefelsauren Talkerde mit Wasser; von J. Fritzsche. . . . .	577
X. Bemerkungen über den schwarzen Turmalin vom Sonnenberg bei Andrasberg; von G. Rose. . . . .	590

	Seite
XI. Mineralogische Notizen; von J. Brooke. . . . .	582
XII. Auffindung von Steinsalz in den Preussischen Staaten. .	583
XIII. Kalte Höhlen von Rocqufort. . . . .	585
XIV. Ueber eine Verfälschung des Carmins, welche auch für Malerei beachtungswerth; von C. G. Ehrenberg. . . .	587
XV. Vermischte Notizen. . . . .	588
1) Umwandlung der Traubensäure in Weinsäure, S. 588. — 2) Säure des Sauerkohls, S. 588. — 3) Heiße- halten durch kalte Luft, S. 589. — 4) Thermoelek- trischer Funken mittelst einfacher Kette, S. 589. — 5) Elektrische Strömung in Eisenbahnen, S. 590. — 6) Licht für Taucherglocken, S. 590. — 7) Fraunho- fersche Linien, S. 590. — 8) Algierische Bomben, S. 591. — 9) Sandsteinkrystalle, S. 591. — 10) Höhe des Aconcagua und des Deniavend, S. 591. — 11) Höhe der Meereswogen, S. 592. — 12) Meteorsteinfall in Brasilien, S. 592.	

### Fünftes Stück.

I. Ueber die Bildung der Versteinerungen auf nassem Wege; von H. R. Göppert. . . . .	593
II. Versuche über das dritte Gesetz Kepler's; von W. Ei- senlohr. . . . .	607
III. Ueber eine neue Art von Ton-Erzeugung; von A. Pi- naud. . . . .	610
IV. Versuch zur Aufstellung einer Theorie der Dispersion des Lichts; von B. Powell. . . . .	618
V. Bestimmung der Axen des elliptischen Rotationssphäroids, welches den vorhandenen Messungen von Meridianbögen der Erde am besten entspricht; von J. F. W. Bessel. .	622
VI. Ueber Thermo-Elektricität überhaupt, über den thermo- elektrischen Funken und einen Thermo-Elektromagnet; von H. Alexander. . . . .	624
VII. Resultate stündlicher Thermometerbeobachtungen zu Padua, <i>Leith, Salz-Ufen und Plymouth.</i> . . . .	630

VIII. Ueber den Gang der Temperatur zu Kasan während des Jahres 1833, nebst einem Zusatz, enthaltend: den mittleren Stand des Barometers und Thermometers in den Jahren 1834 und 1835, und den des Psychrometers im Jahr 1835; von E. Knorr. . . . .	647
IX. Beobachtung eines ausgezeichnet hohen Barometerstandes zu Braunsberg in Ost-Preußen, von L. Feldt. . . . .	668
X. Ausgezeichnet tiefer Barometerstand, beobachtet während eines Orkans auf St. Thomas von Hoskiser . . . . .	670
XI. Beschreibung des Kosmoglobus; von C. Garthe. . . . .	672
XII. Beobachtung eines ungewöhnlichen Hagelfalls; vom Apoth. Müller. . . . .	684
XIII. Bericht über die Erderschütterung vom 14. März 1837; von Werdmüller von Elgg. . . . .	695
Berichtigungen:	
1) Zu Cauchy's Aufsatz, von E. Plutziar, S. 601. —	
2) Zu A. Löwe's Aufsatz, von N. Granger, S. 692. —	
Fernere Berichtigungen, S. 693.	
Register über die Bände XXXI bis XXXXII. . . . .	697
Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin, Januar bis December 1837.	

### Nachweis zu den Kupfertafeln.

Taf. I. Neumann, Fig 1, S. 3; Fig. 2, S. 4. — Mohr, Fig 3 und 4, S. 79, Fig 5 und 6, S. 82 — Scheerer, Fig 7, S. 109. — Bunsen, Fig 8, S. 149 — Abich, Fig 9, S. 164; Fig. 10, S. 171. — Scheerer, Fig 11, S. 530; Fig. 12, S. 651. — Gäppert, Fig 13 bis 18, S. 606.
Taf. II. Milc. Fig 1, S. 36; Fig. 2 und 3, S. 43, Fig. 4, S. 44, Fig. 5, S. 47; Fig 6, S. 49, Fig. 7, S. 50; Fig. 8, S. 51, Fig. 9 und 10, S. 52, Fig 11 bis 13, S. 54; Fig. 14, S. 55; Fig. 15,

## XII

S. 57; Fig. 16, S. 59; Fig. 17, S. 62; Fig. 18, S. 64; Fig. 19, S. 65; Fig. 20 und 21, S. 66; Fig. 22 und 23, S. 67; Fig. 24, S. 233.

Taf. III. Daniell, Fig. 1 und 2, S. 264; Fig. 3, S. 272; Fig. 4, S. 274. — Eisenlohr, Fig. 5, S. 608. — Fechner, Fig. 6, S. 468; Fig. 7, S. 504; Fig. 8, S. 509; Fig. 9, S. 514. — Brooke, Fig. 10, S. 583. — G. Rose, Fig. 11, S. 580. — Brooks, Fig. 12, S. 583.

Taf. IV. L. Gmelin, Fig. 1 und 2, S. 557; Fig. 3, S. 558; Fig. 4, S. 559; Fig. 5, S. 560; Fig. 6, S. 562. — G. Rose, Fig. 7, S. 468. — Becquerel, Fig. 8, S. 315.

Taf. V. Garthe, Fig. 1, S. 674; Fig. 2, S. 677.



- 
- I. *Beobachtungen über den Einfluss der Krystallflächen auf das reflectirte Licht, und über die Intensität des ordentlichen und außerordentlichen Strahls; von F. E. Neumann.*
- 

Die bisherigen Untersuchungen über die Einwirkung der Krystallflächen auf das reflectirte Licht beschränkten sich auf den Einfluss, den dieselben bei der vollständigen Polarisation des Lichts durch Reflexion ausüben. Schou Malus richtete hierauf seine Aufmerksamkeit, aber Brewster erst entdeckte denselben. Er fand, dass der Winkel der vollständigen Polarisation beim Kalkspath abhängig sey von der Lage der reflectirenden Ebene in Beziehung auf die Axe, und von der Lage ihres Hauptschnittes in Beziehung auf die Reflexionsebene: er fand ferner, dass, wenn die reflectirende Oberfläche mit einer Flüssigkeit bedeckt ist, die Polarisationsebene des vollständig polarisirten Strahls nicht mit der Reflexionsebene zusammenfalle, sondern gegen diese unter einem kleineren oder grösseren Winkel geneigt sey, der, bei einer Bedeckung der natürlichen Bruchfläche des Kalkspathes mit Cassiöl, bis  $90^\circ$  steigen kann (*Ph. Transact.* 1819). Weiter geführt ist die Kenntniss dieser Phänomene erst in der neueren Zeit. Hr. Dr. Seebeck hat den Einfluss der optisch einaxigen Krystalle auf die vollständige Polarisation durch sehr genaue Beobachtungen so weit verfolgt, dass der Einfallswinkel, unter welchem derselbe stattfindet, hier eben so sicher im Voraus bestimmt werden kann, wie bei unkrySTALLINISCHEN Körpern diess durch das Brewster'sche Gesetz geschieht (*Pogg. Annal.* Bd. XXI S. 290 und Bd. XXII S. 126). Zugleich

entdeckte Seebeck, daß die von Brewster aufgefundenene Abweichung der Polarisationssebene von der Reflexionsebene auch dann schon stattfindet, wenn der Lichtstrahl unmittelbar aus der Luft auf die Krystallfläche fällt (Pogg. Annal. Bd. XXI S. 290 und Bd. XXVIII S. 276).

Durch Fresnel's Untersuchungen über die Modificationen, welche das Licht durch Zurückwerfung und Brechung an *unkrystallinischen* Körpern erfährt, wurde zugleich ein allgemeinerer Gesichtspunkt für die Erscheinungen der vollständigen Polarisation durch Reflexion an krystallinischen Körpern eröffnet, nämlich diese als einen besonderen Fall abzuleiten aus der Lösung folgenden Problems: *Wenn ein polarisirter Lichtstrahl auf die Oberfläche eines Krystalls fällt, die Intensität des reflectirten Strahls, die Lage seiner Polarisationssebene und die Intensitäten der beiden gebrochenen Strahlen zu bestimmen.* In diesen Annalen, Bd. XXXX S. 497, habe ich ein Verfahren angegeben, diese Forderung in jedem einzelnen Fall durch Beobachtung zu lösen, und dieses Verfahren durch eine kleine Reihe von Beobachtungen erläutert. Eine theoretische Lösung des Problems in seiner ganzen Ausdehnung habe ich in einer der Berliner Academie vorgelegten Abhandlung <sup>1)</sup> gegeben.

Die Principien, von denen ich dabei ausgegangen bin, unterscheiden sich von denjenigen, welche Fresnel in seiner erwähnten Abhandlung zum Grund gelegt hat, vorzüglich darin: 1) daß ich annehme, die Richtung der Oscillation liege in der Polarisationssebene, 2) daß ich in allen brechenden Medien eine gleiche Dichtigkeit des Lichtäthers voraussetze, die Brechung also allein durch die Verschiedenheit der Elasticität hervorgebracht ausche. Die numerischen Resultate, welche

1) Ueber den Einfluß der Krystallflächen bei der Reflexion des Lichtes, und über die Intensität des gewöhnlichen und ungewöhnlichen Strahls. Besonders abgedruckt aus den Abhandlungen der Academie zu Berlin. In Commission bei Dümmler.

ich aus meinen Formeln abgeleitet habe, stimmten so vollkommen mit den Beobachtungen von Seebeck über die vollständige Polarisation, daß ich an der Zulässigkeit der zum Grunde gelegten Principien nicht zweifelte. Da indess der Fall der vollständigen Polarisation ein zu besonderer der Reflexion ist, und aus ihm sich auch Nichts in Beziehung auf die Intensitäten der gebrochenen Strahlen schliessen liefs, glaubte ich die Richtigkeit der Resultate, zu welchen ich gekommen war, durch die Uebereinstimmung derselben mit Beobachtungen, die sich über andere Fälle, als die der vollständigen Polarisation erstreckten, noch beweisen zu müssen. Diefs ist die Absicht der Beobachtungen, welche ich hier mittheilen will.

Zuerst werde ich das Instrument beschreiben, mit dem die Beobachtungen angestellt sind.

*HH*, Fig. 1 Taf. I, ist ein horizontaler Kreis, der sich um seine verticale Axe *AA* dreht. Auf diesem Kreis ist ein verticaler Kreis *VV* befestigt; er besteht aus zwei concentrischen Scheiben, deren innere sich in der äusseren dreht; die innere trägt eine kleine Vorrichtung mit zwei rechtwinklich drehbaren Bewegungen, die bestimmt ist, den Krystall *K* zu tragen und eine seiner Ebenen parallel mit der Ebene des verticalen Kreises *VV* zu stellen. Auf den Krystall *K* fällt ein dünnes Lichtbündel, welches durch die beiden kleinen centralen Oeffnungen *oo'* des horizontal liegenden Rohres *RR* gegangen ist, und herrührt von der dahinter stehenden Lampe *L*. Dieses Lichtbündel wird durch eine von der Oeffnung *o* befestigte Turmalinplatte polarisirt. Das Rohr *RR* kann in seiner Hülse *II* gedreht werden, und die Drehung wird gemessen durch den am Rohr befestigten Kreis *TT*. — Der Zweck dieses Instruments ist leicht ersichtlich. Es sey eine Ebene *E* des Krystalls *K* parallel mit der Ebene des verticalen Kreises *VV* gestellt, es sey ferner durch Drehung seines inneren Ringes der Hauptschnitt der Ebene *E* in eine horizontale Lage ge-

bracht, ferner der horizontale Kreis  $HH$  so gedreht, daß die Ebene des Kreises  $VV$  rechtwinklich stehe gegen die Axe  $oo$  des Rohrs  $RR$ , und endlich sey das Rohr  $RR$  in seiner Hülse so gedreht, daß die Turmalinaxe vertical stehe. Diefs ist die normale Stellung des Instruments; das Lichtbündel  $oo$  ist jetzt horizontal polarisirt, und fällt senkrecht auf die Krystallebene  $E$ . Wird nun der horizontale Kreis  $HH$  um den Winkel  $\varphi$  gedreht, der innere Ring des verticalen Kreises  $VV$  um den Winkel  $\omega$ , endlich der Turmalinkreis um den Winkel  $\alpha$ , so fällt jetzt ein im Azimuth  $\alpha$  polarisirter Lichtstrahl  $oo$  unter dem Einfallswinkel  $\varphi$  auf die Krystallebene, und das Azimuth der Einfallsebene ist  $\omega$ . Diefs zu erreichen, ist der Zweck des Instruments. Die normale Stellung desselben erfordert also 1) daß der Kreis  $VV$  parallel mit der Axe  $AA$  ist; diess wurde in hinlänglicher Schärfe erreicht durch Spiegelung an einem kleinen Parallelspiegel, der statt des Krystalls  $K$  an den Halter befestigt worden; 2) daß die Krystallebene  $E$  parallel mit der Ebene des Kreises  $VV$  sey, wovon man sich überzeugt, indem gegen die Krystallebene ein kleines Fernrohr gerichtet wird, und man ein von ihr reflectirtes Bild sich nicht verrücken sieht, wenn der innere Kreis um  $180^\circ$  gedreht wird. 3) Um den Hauptschnitt der Ebene  $E$  in eine Lage, die senkrecht auf die Axe  $AA$  ist, zu bringen, stelle ich zuerst eine natürliche Kante des Krystalls parallel mit der Axe  $AA$ , welches, wie an einem Goniometer, mittelst des eben erwähnten kleinen Fernrohrs geschieht, und drehe dann den inneren Kreis von  $VV$ , um den Winkel, den diese Kante mit dem Hauptschnitt bildet. 4) Um die Ebene des Kreises  $VV$  senkrecht gegen das Rohr zu stellen, bringe ich an den Kreis  $TT$ , nachdem die Linie  $oo$  als Drehungsaxe des Rohrs berichtigt ist, einen Arm  $AB$ , Fig. 2 Taf. I, der in seinem Ende eine kleine Oeffnung  $B$  trägt; die Kreise  $HH$  und  $TT$  drehe ich so

lange, bis ich durch die Oeffnung  $B$  den vom einfallenden Lichtbündel  $oo$  herrührenden, durch die Ebene  $E$  des Krystalls reflectirten Lichtbündel  $BC$  sehe: alsdann drehe ich den Kreis  $TT$  etwa um  $180^\circ$ , so daß  $B$  in  $B'$  fällt, drehe den Kreis  $HH$ , so weit bis ich in  $B'$  wiederum den reflectirten Strahl  $B'C$  sehe. Die mittlere zwischen diesen beiden Stellungen des Kreises  $HH$  ist diejenige, bei welcher eine durch die Axe des Rohrs  $oo$  mit  $AA'$  parallele Ebene senkrecht steht auf der Ebene des Kreises  $VV$ . Wenn bei diesen beiden Stellungen des Kreises  $HH$  der Kreis  $TT$  sich gerade um  $180^\circ$  gedreht erweist, so steht  $oo$  senkrecht auf der Axe  $AA$ , und also senkrecht auf der Ebene des Kreises  $VV$  in seiner mittleren Stellung. Die Richtung des Rohrs muß also so lange verändert werden, bis die erforderliche Drehung desselben aus  $AB$  in  $A'B'$   $180^\circ$  beträgt. Wenn  $2h$  die Drehung des Kreises  $HH$ , und  $2D$  die Drehung des Kreises  $TT$  bezeichnet, und man  $\alpha$  die Abweichung der Neigung des Rohrs  $oo$  gegen die Axe  $AA$  von der rechtwinklichen nennt, so findet zwischen diesen Größen die Relation statt,  $\operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{tg} h \cos D$ .

5) Was endlich die Einastellung des Turmalins betrifft, so wird diese dadurch erreicht, daß man diejenige Stellung beobachtet, bei welcher der ungewöhnliche Strahl verschwindet in dem in  $K$  befestigten Krystalle, wenn dessen Hauptschnitt in der Einfallsebene liegt.

Das auf die Krystallebene fallende Licht erleidet gewisse Modificationen, welche Functionen sind von seinem Polarisations-Azinuth, seinem Einfallswinkel, und vom Azinuth der Einfallsebene. Für diese Functionen, z. B. Intensität der gebrochenen Strahlen, oder Polarisations-Azinuth des reflectirten Strahls etc., sollen gewisse Werthe beobachtet werden. Ich werde die zu beobachtende Function mit  $F(\varphi, \omega, \alpha)$  bezeichnen, wo  $\varphi$  den Einfallswinkel,  $\alpha$  das Azinuth der Einfallsebene,  $\omega$  das Azinuth der Polarisationssebene bedeuten. Es sey

für diese Function bei den am Instrument abgelesenen Gröſſen  $\varphi$ ,  $\omega$ ,  $\alpha$  der Werth  $B$  beobachtet; diese abgelesenen Werthe von  $\varphi$ ,  $\omega$ ,  $\alpha$  sind aber noch mit den nach der Berichtigung des Instruments übriggebliebenen Fehlern behaftet, und es seyen ihre wahren Werthe  $\varphi + \Delta\varphi$ ,  $\omega + \Delta\omega$ ,  $\alpha + \Delta\alpha$ , alsdann hat man:

$$B = F + \frac{dF}{d\varphi} \Delta\varphi + \frac{dF}{d\omega} \Delta\omega + \frac{dF}{d\alpha} \Delta\alpha.$$

Es handelt sich nun darum, durch eine schickliche Combination der Beobachtungen die Glieder, welche  $\Delta\varphi$ ,  $\Delta\omega$ ,  $\Delta\alpha$  enthalten, zu eliminiren.

Bei einaxigen Krystallen, auf welche sich die folgenden Beobachtungen bis jetzt allein beziehen, verändert  $F$  seinen Werth nicht, wenn man  $\omega$  und  $\alpha$  verwandelt in  $-\omega$  und  $-\alpha$ ; nimmt man nun an, daß die Ebene des Krystalls wirklich mit der Ebene des Kreises  $VV$  parallel gestellt sey, und daß das Lichtbündel  $oo$  durch Drehung des Rohrs  $RR$  seine Richtung nicht verändert, so verwandelt sich  $\Delta\omega$  und  $\Delta\alpha$  in  $-\Delta\omega$   $-\Delta\alpha$  für eine Beobachtung  $B'$ , welche durch Drehung der Kreise  $VV$  und  $TT'$  in entgegengesetzter Richtung bei  $-\omega$  und  $-\alpha$  angestellt wird; die vorhergehende Gleichung wird also in diesem Falle seyn  $\varphi$ ,  $-\omega$ ,  $-\alpha$ :

$$B' = F + \frac{dF}{d\varphi} \Delta\varphi - \frac{dF}{d\omega} \Delta\omega - \frac{dF}{d\alpha} \Delta\alpha.$$

Nun kann man eine dritte und vierte Beobachtung anstellen, für welche  $F$  unverändert bleibt, nämlich bei  $\omega + 180$  und  $-\varphi$ , und bei  $180 - \omega$  und  $-\varphi$ . Diese beiden Beobachtungen, die ich mit  $B''$  und  $B'''$  bezeichnen will, geben:

$$B'' = F - \frac{dF}{d\varphi} \Delta\varphi + \frac{dF}{d\omega} \Delta\omega + \frac{dF}{d\alpha} \Delta\alpha$$

$$B''' = F - \frac{dF}{d\varphi} \Delta\varphi - \frac{dF}{d\omega} \Delta\omega - \frac{dF}{d\alpha} \Delta\alpha$$

woraus erhellt, daß der wahre Werth von  $F$  ist:

$$F = \frac{1}{4}(B + B' + B'' + B''') \quad (1)$$



Hierbei ist angenommen, daß  $oo$  parallel sey mit der Axc, um welche sich das Rohr  $RR$  dreht, und daß die Krystallebene parallel mit dem Kreis  $VV$ ; die erste Annahme ist aber überflüssig, denn der daraus entstehende Fehler hat in den beiden letzteren Beobachtungen das entgegengesetzte Zeichen, als in den beiden ersteren. Der Fehler aber, welcher aus der zweiten Annahme entspringt, ist durch keine Art von Combination herauszuschaffen; glücklicherweise aber trifft es sich, daß die Einstellung der Krystallebene parallel mit dem Kreise  $VV$  mit aller erforderlichen Schärfe geschehen kann.

Die folgenden Beobachtungen sind sämmtlich an der natürlichen Bruchfläche des Kalkspaths angestellt; wegen der Veränderung, welche bei künstlich geschliffenen Flächen Hr. Dr. Seebeck beobachtet hat, habe ich angestanden solche anzuwenden.

Da es die Absicht ist, die folgenden Beobachtungen mit den Formeln zu vergleichen, zu welchen mich theoretische Betrachtungen geführt haben, so muß ich deren Resultate, so weit sie hier zur Anwendung kommen, im Allgemeinen angeben. Eine Lichtwelle falle unter dem Winkel  $\varphi$  auf eine Ebene eines einaxigen Krystalls, deren Neigung gegen die Axc den Cosinus  $A$  und den Sinus  $C$  habe; der Winkel  $\varphi$  ist von der brechenden Ebene an gerechnet;  $\varphi'$  und  $\varphi''$  seyen die Winkel, welche die gebrochenen Wellenebenen, die ordentliche und außerordentliche, mit der brechenden Ebene bilden. Das Azimuth der Einfallsebene, vom Hauptschnitt an gerechnet, sey  $\omega$ . Die einfallende Wellenebene ist polarisirt, und man denke sich dieselbe zerlegt in zwei andere, von denen die erste parallel mit der Einfallsebene polarisirt ist, und die zweite senkrecht darauf. Die Amplitude in der ersten sey  $S$ , in der zweiten  $P$ . Die reflectirte Wellenebene, auf eine gleiche Weise zerlegt, habe ich zu Amplituden  $R_1$  und  $R_2$ ; endlich seyen die Amplituden in der gebrochenen ordentlichen Wel-

lebene  $D'$  und in der außerordentlichen  $D''$ . Die Relationen zwischen den Gröſſen  $P$ ,  $S$ ,  $R_p$ ,  $R_o$ ,  $D'$ ,  $D''$ , zu welchen ich a. a. O. gekommen bin, sind folgende:

$$\begin{aligned}
 P + R_p &= D' \frac{A \sin \omega}{\sqrt{1 - \gamma'^2}} \\
 &\quad + D'' \frac{C \sin \varphi'' - A \cos \varphi'' \cos \omega}{\sqrt{1 - \gamma''^2}} \\
 (P - R_p) \sin \varphi \cos \varphi &= D' \cdot \frac{A \sin \omega}{\sqrt{1 - \gamma'^2}} \sin \varphi' \cos \varphi' \\
 &\quad + D'' \left( \frac{C \cos \varphi'' \sin^2 \varphi' - A \sin \varphi'' \cos^2 \varphi' \cos \omega}{\sqrt{1 - \gamma''^2}} \right) \\
 (S + R_o) \sin \varphi &= -D \sin \varphi' \left( \frac{C \sin \varphi' - A \cos \varphi' \cos \omega}{\sqrt{1 - \gamma'^2}} \right) \dots (2) \\
 &\quad + D' \frac{A \sin \omega \sin \varphi''}{\sqrt{1 - \gamma''^2}} \\
 (S - R_o) \cos \varphi &= -D \cos \varphi' \left( \frac{C \sin \varphi' - A \cos \varphi' \cos \omega}{\sqrt{1 - \gamma'^2}} \right) \\
 &\quad + D'' \frac{A \sin \omega \cos \varphi''}{\sqrt{1 - \gamma''^2}},
 \end{aligned}$$

wo  $\gamma'$  und  $\gamma''$  die Sinusſe der Winkel bezeichnen, welche die ordentliche und außerordentliche Wellenebene mit der Axe bilden. Was die Vorzeichen der Azimuthe betrifft, ſo liegt dieſen Formeln folgende Beſtimmung darüber zum Grunde. Die Einfallſ-Azimuthe  $\omega$  ſind vom Hauptschnitt an gerechnet, und zwar ſo, daſs, wenn man auf der reflectirenden Fläche ſich ſtehend denkt, das Geſicht nach dem Durchſchnittspunkt derſelben mit der Axe gekehrt, auf der rechten Seite des Hauptschnitts die poſitiven  $\omega$  liegen, auf der linken die negativen und jener Durchſchnittspunkt oder die Axe im Azimuth 0 liegt. Um die Vorzeichen der Polarisations-Azimuthe der einfallenden Wellenebene richtig zu verſtehen, denke man ſich in der einfallenden Ebene liegend, mit ihr ſich vorwärts bewegend, die Füſſe dem Kryſtall



zugekehrt; liegt jetzt die Polarisationssebene auf der linken Seite, so ist sie durch  $+$ , liegt sie auf der rechten Seite, ist sie durch  $-$  bezeichnet. Dasselbe gilt für den reflectirten Strahl; man denke ihn sich in seiner Wellenebene liegend, mit ihr sich vorwärts bewegend, die Füße dem Krystall zugekehrt; die jetzt auf der linken Seite liegende Polarisationssebene ist durch Plus, die auf der rechten Seite liegende durch Minus bezeichnet.

**Erste Reihe Beobachtungen.** Bestimmung desjenigen Polarisations-Azimuths des einfallenden Strahls, bei welchem der außerordentliche Strahl verschwindet.

Es wurde an einem kleinen natürlichen Kalkspathbruchstück eine Ebene geschliffen, die etwa  $20^\circ$  mit demjenigen Blätterdurchgang bildete, durch welchen der Lichtstrahl eintreten sollte, so daß ein kleines Prisma entstand, welches möglichst achromatisirt wurde, durch ein kleines Glasprisma. Dieses Doppelprisma wurde an den verticalen Kreis  $VV$  befestigt, die natürliche Bruchfläche dem Rohre  $RR$  zugekehrt. Die Kreise  $HH$  und  $VV$  wurden auf ein bestimmtes  $\varphi$  und  $\omega$  gestellt, und der Kreis  $TT$  nun so lange gedreht, bis für das hinter dem Doppelprisma befindliche Auge der außerordentliche Strahl, herrührend von dem einfallenden Lichtbündel  $oo$ , verschwand. Da der einfallende Lichtbündel sehr dünn ist, muß die Bruchfläche, an welcher beobachtet werden soll, keine Unebenheiten, Streifungen und dergleichen zeigen; was nicht leicht zu erhalten ist. Auch muß bei der Anfertigung und Befestigung des Prismas mit großer Vorsicht zu Werke gegangen werden, daß die Bruchfläche vollkommen rein erhalten wird. — Jedes beobachtete Azimuth ist das Mittel aus den vier beobachteten Werthen  $B, B', B'', B'''$  in (1), jedes  $B$  ist das Mittel aus zehn Beobachtungen, so daß jedem beobachteten Azimuth vierzig Beobachtungen zum Grunde liegen; in je zwei auf einander folgenden Einstellungen des

Turmalinkreises geschah die letzte Drehung, mit welcher der Kreis eingestellt wurde, in entgegengesetzter Richtung.

Die Endresultate sind in folgender Tafel zusammengestellt, worin zugleich die aus (2) berechneten Werthe aufgenommen sind. Man sieht nämlich aus (2), wenn  $D''=0$  gesetzt wird, daß dann eine Relation zwischen  $P$  und  $S$  stattfinden muß, und diese ergibt sich durch Elimination von  $R_p$ ,  $R_s$ ,  $D'$ . Man findet:

$$\frac{P}{S} = -\cos(q-q') \cdot \frac{A \sin \omega}{C \sin q' - A \cos \omega \cos q'} = \operatorname{tg} \alpha' \quad (3)$$

wo  $\alpha'$  das Polarisations-Azimuth des einfallenden Strahles bezeichnet, bei welchem die Intensität des außerordentlichen Strahls  $=0$  ist. Dieses Azimuth hat eine sehr einfache Beziehung zu der Drehung, welche die Polarisations-Ebene durch Brechung bei einem unkrystallinischen Medium erfährt. Es sei bei einem solchen Medium das Polarisations-Azimuth des einfallenden Strahls  $a$ , und dasjenige des ge-

brochenen  $b$ , so hat man bekanntlich  $\operatorname{tg} b = \frac{\operatorname{tg} a}{\cos(q-q')}$

oder  $\operatorname{tg} b \cos(q-q') = \operatorname{tg} a$ . Nun ist, wenn die Brechung durch ein krystallinisches Medium geschieht, das Polarisations-Azimuth des gebrochenen Strahls ein durch die Lage des gebrochenen Strahls in Beziehung auf die Axe bestimmtes, und zwar ist bei einaxigen Medien für

den ordentlichen Strahl  $\operatorname{tg} b = \frac{A \sin \omega}{C \sin q' - A \cos \omega \cos q'}$

woraus also folgt, daß der ungewöhnliche Strahl verschwindet in allen den Fällen, in welchen zwischen den Polarisations-Azimuthen des einfallenden und des ordentlichen gebrochenen Strahls dieselbe Relation stattfindet, wie bei unkrystallinischen Medien. — Bei Einfall-Azimuthen, die zwischen  $0^\circ$  und  $\pm 90^\circ$  liegen, ändert das erforderliche Polarisations-Azimuth  $\alpha$  sein Vorzeichen, nämlich wenn:

$$C \sin q' - A \cos \omega \cos q' = 0 \dots \dots (4)$$

d. h. wenn in dem gebrochenen ordentlichen Strahl die Polarisationsebene senkrecht auf der Brechungsebene steht; in diesem Falle muß auch der einfallende Strahl senkrecht auf der Einfallsebene polarisirt seyn, d. h. zwischen dem zu (4) gehörigen Einfallswinkel und  $\varphi = 0$ , ist, das erforderliche Polarisations-Azimuth  $\alpha$  immer positiv, jenseits negativ. Dieser Wechsel des Vorzeichens im Polarisations-Azimuth  $\alpha'$  findet nur bei  $\omega$ 's statt, welche zwischen  $0^\circ$  und  $\pm 90^\circ$  liegen, außerhalb dieser Einfalls-Azimuths ist  $\alpha'$  immer negativ. Eine sehr einfache Construction des Kegels (4) habe ich in meiner Abhandlung angegeben.

$\omega$	$\varphi$	Beobachtet $\alpha'$	Berechnet $\alpha'$	$\delta$
45°	45°	+72° 38'	+72° 36'	-2'
60	50	-88 20 ,5	-88 16 ,0	-4,5
90	45	-65 25	-65 20 ,5	-4,5
90	53	-61 55	-61 51	-4
135	45	-31 53	-31 52	-1
135	45	-31 48	-31 52	+4
140 57'	40	-26 50	-26 42	-8
141	50	-28 30	-28 27 ,5	-2,5

wo  $\delta$  die Abweichung der Beobachtung von dem aus (3) berechneten Azimuth bezeichnet.

Zweite Reihe Beobachtungen. Bestimmung desjenigen Polarisations-Azimuths des einfallenden Strahls, bei welchem der ordentliche Strahl verschwindet.

Setzt man in den Formeln (2)  $D' = 0$ , so findet man:

$$\frac{P}{S} = \cos(\varphi - \varphi'') \frac{C \sin \varphi'' - A \cos \omega \cos \varphi''}{A \sin \omega} + \frac{\gamma'' \sin(\varphi' + \varphi'') \sin(\varphi' - \varphi'')}{A \sin \omega \sin(\varphi + \varphi'')} = \tan \alpha'' \quad \dots (5)$$

wo  $\alpha''$  das Azimuth der Polarisations-Ebene des einfallenden Strahls bezeichnet, bei welchem der gewöhnliche

Strahl verschwindet. Dieses Azimuth steht ungefähr senkrecht auf dem Azimuth  $\alpha'$ , welches durch (3) bestimmt wurde.

In folgender Tafel sind die beobachteten und berechneten Werthe von  $\alpha''$  zusammengestellt:

$\omega$ .	$\varphi$ .	Beobachtung $\alpha''$ .	Berechnung $\alpha''$ .	$\delta$ .
45°	45°	-15° 27,8	-15° 26'	-1,8
60°	50	+ 1 39	+ 1 30	-9
■	45	+22 28	+22 33	+5
90	■	+24 27,5	+24 29	+1,5
135	45	+55 27,5	+55 31	+3,5
135	45	+55 28,5	+55 31	+2,5
141	■	+59 44	+59 39	+5

Dritte Reihe. Bestimmung des Azimuths, nach welchem der reflectirte Strahl polarisirt ist, wenn der einfallende Strahl senkrecht auf der Einfallsebene polarisirt ist.

Die Tangente des Polarisations-Azimuths im reflectirten Strahl ist allgemein  $\frac{R_p}{R_s}$ . Aus (2) sieht man, daß sowohl  $R_p$  als  $R_s$  eine lineare Function von  $P$  und  $S$  ist. Ich setze also <sup>1)</sup>:

$$R_p = pP + s'S$$

$$R_s = p'P + sS.$$

- 1) Es läßt sich beweisen, unabhängig von einer Theorie, daß diese die allgemeine Form für  $R_p$  und  $R_s$  ist. Daraus folgen, wenn man eine Reihe Beobachtungen bei demselben  $\varphi$  und  $\omega$  über die zusammengehörigen Werthe von  $\frac{p}{S}$  und  $\frac{R_p}{R_s}$  angestellt hat, Relationen,

die zwischen diesen Größen stattfinden müssen, welche unabhängig von der Theorie sind, und durch welche man diese Beobachtungen durch sich selbst prüfen und verbessern kann; diese Relationen erhält man durch Elimination der Unbekannten  $\frac{s'}{p}$ ,  $\frac{p'}{p}$ ,  $\frac{s}{p}$ .

Die Auflösung der Gleichungen (2) giebt für  $p, p', s, s'$  Werthe, die, um sie bequemer berechnen zu können, ich unter folgende Form bringe. Ich setze:

$$\frac{A \cos \omega}{C} = \tan \xi \dots \dots \dots (a)$$

$$\gamma'' = \frac{C}{\cos \xi} \cos(\varphi'' - \xi) \dots \dots \dots (b)$$

so ist:

$$\sin(\varphi'' - \varphi') = \frac{(\pi^2 - \mu^2) \sin^2 \varphi (1 - \gamma'^2)}{\sin(\varphi' + \varphi'')} \dots (c)$$

wo  $\mu$  und  $\pi$  die Geschwindigkeiten des ordentlichen und außerordentlichen Strahls bezeichnen, wenn sie sich senkrecht auf der Axe im Krystall fortpflanzen, die Geschwindigkeit des Lichtes in dem umgebenden Medium als Einheit genommen. Die Gleichungen (b) und (c) berechne ich durch Annäherung, indem ich zuerst setze:

$$\gamma'' = \frac{C}{\cos \xi} \cos(\varphi' - \xi),$$

diesen Werth in (c) substituirt und dann zugleich statt  $\varphi' + \varphi''$  schreibe  $2\varphi'$ . Zu dem auf diese Weise gefundenen Werth von  $\varphi'' - \varphi'$  den Werth von  $\varphi'$  addirt, erhalte ich einen angenäherten Werth von  $\varphi''$ ; diesen nun in (b) gesetzt, giebt für  $\gamma''$  einen so genäherten Werth, daß wenn man denselben in (c) eingeführt, und in  $\sin(\varphi' + \varphi'')$  den vorher gefundenen Werth für  $\varphi''$  setzt, man  $\sin(\varphi'' - \varphi')$  mit einer, beinahe für alle Fälle ausreichenden Genauigkeit erhält, und also auch  $\varphi''$ . Ich setze ferner:

$$\tan \xi \cot \tan^2 \varphi' = \tan \psi \dots \dots \dots (d)$$

$$\frac{\mu^2 \cos \xi}{\cos \psi} \frac{\cos(\varphi'' + \psi)}{\sin(\varphi'' - \xi)} = \tan \zeta \dots \dots \dots (e)$$

$$\frac{C^2 \sin \varphi \sin(\varphi' - \xi) \sin(\varphi'' - \zeta)}{\cos^2 \xi \cos \zeta} = L \dots \dots \dots (f)$$

$$\frac{A^2 \sin^2 \omega}{L} \frac{\sin(\varphi - \varphi') \sin(\varphi + \varphi'')}{\cos(\varphi + \zeta)} = \tan k \dots (g)$$

$$\frac{A^2 \sin^2 \omega}{L} \frac{\sin(\varphi + \varphi') \sin(\varphi - \varphi'')}{\cos(\varphi - \zeta)} = \tan k' \dots (h)$$

Alsdann ist:

$$\begin{aligned}
 p &= \frac{L}{N} \frac{\cos(\varphi + \zeta) \sin(\varphi + \varphi' + k)}{\cos k} \\
 s &= -\frac{L}{N} \frac{\cos(\varphi - \zeta) \sin(\varphi - \varphi' + k')}{\cos k'} \\
 p' &= \frac{1}{N} AC \sin \omega \frac{\sin 2\varphi \sin(\varphi' - \xi) \sin(\varphi'' - \varphi')}{\cos \xi} \quad (6) \\
 s' &= \frac{1}{N} AC \sin \omega \frac{[\sin 2\varphi \sin(\varphi' + \xi) \sin(\varphi'' - \varphi')]}{\cos \xi}
 \end{aligned}$$

$$\text{wo } N = C^2 \sin \varphi \sin(\varphi + \varphi') \frac{\sin(\varphi' - \xi) \sin(\varphi'' - \xi) \cos(\varphi - \zeta)}{\cos^2 \xi \cos \zeta} + A^2 \sin^2 \omega \sin(\varphi + \varphi') \cos(\varphi - \varphi') \sin(\varphi + \varphi'')$$

Da nun der einfallende Strahl senkrecht auf der Einfallsebene polarisirt war, so ist  $S=0$ , und in diesem

Falle also  $\frac{R_p}{R_s} = \frac{p}{p'} = \tan b$ , wo  $b$  das Polarisations-Azimuth des reflectirten Strahls bezeichnet. Für  $p$  und  $p'$  ihre Werthe gesetzt, hat man also:

$$\tan b = \frac{L \cos(\varphi + \zeta) \sin(\varphi + \varphi' + k) \cos \xi}{AC \sin \omega \sin 2\varphi \sin(\varphi' - \xi) \sin(\varphi'' - \varphi') \cos k} \quad (7)$$

Für Einfall-Azimuth  $\omega$ , welche zwischen  $0^\circ$  und  $90^\circ$  liegen, ändert das Polarisations-Azimuth  $b$  im Allgemeinen zwei Mal sein Vorzeichen. Für  $\varphi=0$  ist hier dieses Azimuth immer negativ, d. i. die Polarisations-Ebene der reflectirten Welle entfernt sich von dem Hauptschnitt der reflectirenden Ebene. Diefes findet für jeden Werth von  $\omega$  bei  $\varphi=0$  statt. In den Azimuthen  $\omega$  aber, zwischen  $0^\circ$  und  $90^\circ$ , nimmt der negative Werth von  $b$  zu, bis er bei einem gewissen Einfallswinkel zu einem Rechten wird; dieser Einfallswinkel gehört zu dem

1) Wenn es scheinen möchte, daß bei  $\varphi=0$  das Einfall-Azimuth  $\omega$  unbestimmt bleibt, muß man berücksichtigen, daß im gegenwärtigen Falle das  $\omega$  durch die Richtung der Polarisations-Ebene der einfallenden Strahlen bestimmt ist, da die Einfallsebene immer senkrecht auf der Polarisations-Ebene stehen soll.

ordentlichen Brechungswinkel  $\varphi'$ , der bestimmt wird durch:

$$C \sin \varphi' - A \cos \omega \cos \varphi' = 0.$$

Es ist dies dieselbe Relation zwischen  $\omega$  und  $\varphi'$ , wodurch die Lage der einfallenden Strahlen bestimmt wurde, welche, wenn sie senkrecht auf der Einfallsebene polarisirt sind, keinen ungewöhnlichen Strahl erzeugen; unter denselben Umständen bleibt auch, wie bei einem unkrystallinischen Medium, die Lage der Polarisationssebene im reflectirten Strahl unverändert. — Dafs der Nenner von  $\tan b'$  wirklich den Factor  $C \sin \varphi' - A \cos \omega \cos \varphi'$  habe, davon überzeugt man sich, wenn man in  $\sin(\varphi' - \xi)$  statt  $\xi$  seinen Werth aus (a) setzt. Von dem Einfallswinkel an, wo  $b = 90^\circ$  ist, wird sein Werth positiv, nimmt ab, wird  $= 0$ , und geht nun wieder auf die negative Seite, auf der er nun bleibt, und mit  $\varphi = 90$  wird  $b$  zugleich zum zweiten Mal gleich einem Rechten. Das Azimuth wird  $= 0$ , wenn  $p = 0$  ist. Diese Gleichung  $p = 0$  führt auf eine Gleichung für  $\varphi$  vom vierten Grade, die immer nur einen brauchbaren Werth von  $\varphi$  giebt; dieser Werth von  $\varphi$  fällt nahe zusammen mit dem Winkel der vollständigen Polarisation. Der doppelte Wechsel der Vorzeichen von  $b$  findet auf die eben beschriebene Art statt, in der Voraussetzung, dafs der durch  $p = 0$  bestimmte Einfallswinkel gröfser als der durch  $C \sin \varphi' - A \cos \omega \cos \varphi' = 0$  bestimmte sey; es findet aber auch der umgekehrte Fall statt, alsdann geht  $b$ , wenn  $\varphi$  von 0 an wächst, von der negativen Seite durch 0 auf die positive, und von dieser durch einen Rechten wiederum auf die negative. Ob diese Uebergänge, wenn der Strahl aus der Luft auf den Krystall fällt, jedesmal möglich sind, hängt von der Lage der brechenden Ebene in Beziehung auf die Axe ab. Auf einer mit der Axe parallelen Fläche fällt der Uebergang des Vorzeichens durch  $C \sin \varphi' - A \cos \omega \cos \varphi' = 0$  gänzlich fort. Auf der natürlichen Bruchfläche des Kalkspaths, wenn der



Strahl aus der Luft auf dieselbe fällt, muß  $\omega$  größer als  $40^\circ$  seyn, wenn  $C \sin \varphi' - A \cos \omega \cos \varphi'$  einem möglichen  $\varphi$  entsprechen soll. Hier findet also von  $\omega = 0^\circ$  bis  $\omega = 40^\circ$  nur ein Vorzeichenwechsel für  $b$ , nämlich durch  $p = 0$ , statt; von  $\omega = 40^\circ$  bis  $\omega = \text{etwa } 52^\circ,3$ , ist der durch  $p = 0$  bestimmte Einfallswinkel kleiner als der durch  $C \sin \varphi - A \cos \omega \cos \varphi'$  bestimmte. Von  $\omega = 52,3$  bis  $\omega = 90^\circ$  verhält es sich umgekehrt; da ist der durch  $p = 0$  bestimmte Einfallswinkel der größere. — Positiv ist also  $b$  nur zwischen den  $\varphi'$ , welche durch  $p = 0$  und  $C \sin \varphi' - A \cos \omega \cos \varphi' = 0$  bestimmt, werden; wird durch beide Gleichungen dasselbe  $\varphi$  bestimmt, so fällt der Vorzeichenwechsel gänzlich fort,  $b$  bleibt immer negativ. Der Einfallswinkel, welcher diesen Gleichungen gemeinschaftlich genügt, ist zugleich der der vollständigen Polarisation durch Reflexion, wo also gar kein Licht reflectirt wird. — Ueberhaupt ist der Uebergang von  $b$  aus  $-$  in  $+$  durch  $p = 0$  schwer oder gar nicht durch die Beobachtung zu verfolgen, weil die Intensität des reflectirten Lichts in der Nähe des dazu gehörigen Einfallswinkels äußerst gering ist; unter dem durch  $p = 0$  bestimmten Einfallswinkel ist diese Intensität  $= p'^2 P^2$ , d. i. proportional mit dem Quadrat von  $\sin(\varphi'' - \varphi')$ . — Für Einfall-Azimuth  $\omega$ , die zwischen  $90^\circ$  und  $180^\circ$  liegen, ist  $b$  von  $\varphi = 0$  an bis zu der Wurzel  $\varphi$  der Gleichung  $p = 0$  positiv, und bei dieser Wurzel geht das Azimuth  $b$  durch 0 in's Negative, wo es bleibt, bis es mit  $\varphi$  zugleich  $90^\circ$  wird, so daß bei diesen Einfall-Azimuthen nur ein einmaliger Wechsel des Vorzeichens von  $b$  stattfindet. Wenn  $\omega = 90^\circ$  ist, so ist  $b = 90^\circ$  für  $\varphi = 0^\circ$ ;  $b$  ist hier positiv von  $\varphi = 0$  bis zu dem durch  $p = 0$  bestimmten  $\varphi$ , von diesem ab ist  $b$  negativ.

Die Beobachtung des Azimuths, in welchem der reflectirte Strahl polarisirt ist, geschah mittelst eines Kalkspatprismas, dessen eine Seite eine natürliche Bruchfläche, die andere aber so geschliffen war, daß dieses Prisma,



verbunden mit einem Glaspisma, dem austretenden ordentlichen Strahl die Richtung des eintretenden Strahls gab. Dieses Prisma war an einem getheilten Ringe so befestigt, daß die natürliche Fläche senkrecht stand auf der Axe, um welche der Ring sich drehte. Auf die natürliche Fläche fiel der zu untersuchende Strahl nahe senkrecht, welche Stellung des Ringes dadurch erhalten wurde, daß ein hinter dem reflectirenden Krystall *K*, Fig. 1 Taf. I, befindliches Auge den vom Beobachtungs-Prisma zum zweiten Mal reflectirten Strahl erhielt. Nachdem das Beobachtungsprisma auf diese Weise gestellt war, beobachtete man durch dasselbe den vom Krystall *K* reflectirten Strahl, und drehte dasselbe in seinem Ringe so lange, bis der ordentliche Strahl verschwand. Da diese Beobachtung sowohl bei dem im Azimuth  $\omega$ , als bei dem im Azimuth  $-\omega$  reflectirten Strahl angestellt wurde, war die Kenntniß der Lage des Hauptschnitts des Beobachtungsprismas nicht weiter erforderlich, aber sie ergab sich für die folgenden Beobachtungsreihen, als die mittlere Lage zwischen zweien solchen Beobachtungen.

Die beobachteten Werthe und die aus (6) berechneten finden sich in der folgenden Tafel <sup>1)</sup>.

$\omega$ .	$\varphi$ .	Beobacht. $\delta$ .	Berechn. $\delta$ .	$\delta$ .
45°	45°	-87° 37'	-87° 42'	- 5'
45	33 52'	-87 41,4	-87 43,5	+ 0 9'
61 28'	45	-89 57	0 0	+ 3
67 30	45	+88 47	+88 42	+ 5
90	15	+83 59	+83 55	+ 4
90	45	+84 3	+83 55	+ 8
90	33 52'	+86 55	86 51,4	+ 3 6"
135	45	+78 37	78 19	+18
	33 52	+82 55 3	82 0,5	- 5 2
157 30	45	+91 58	81 51	+ 7

1) Die folgenden Beobachtungen sind, mit einzelnen Ausnahmen, nur das Mittel aus zwanzig Einstellungen, die bei demselben  $\varphi$  und  $\omega$  und  $-\omega$  gemacht wurden.

Vierte Reihe Beobachtungen. Bestimmung des Azimuths, nach welchem der reflectirte Strahl polarisirt ist, wenn der einfallende Strahl parallel mit der Einfallsebene polarisirt ist

Hier ist  $P=0$ , man hat also  $\frac{R_r}{R_i} = \frac{s'}{s} = \tan b'$  d. i.

$$\tan b' = \frac{-AC \sin \omega \sin 2\varphi \sin(\varphi' + \xi) \sin(\varphi - \varphi') \cos k'}{L \cos(\varphi - \xi) \sin(\varphi - \varphi' + k) \cos \xi} \quad (8)$$

wo  $b'$  das Polarisations-Azimuth des reflectirten Strahls, wenn der einfallende parallel mit der Einfallsebene polarisirt ist.

Dieses Azimuth ist für alle  $\omega$ 's, die kleiner als  $90^\circ$ , negativ, für  $\omega$ 's aber zwischen  $90^\circ$  und  $180^\circ$  ist dasselbe bei Einfallswinkeln, die zwischen 0 und einem durch

$$C \sin \varphi' + A \cos \omega \cos \varphi' = 0$$

bestimmten Einfallswinkel liegen, positiv, bei diesem Einfallswinkel selbst ist  $b'=0$ , und für größere Einfallswinkel ist  $b'$  negativ. Beim senkrechten Einfall entfernt sich immer die Polarisationssebene des reflectirten Strahls von dem Hauptschnitt.

$\omega$	$\varphi$	Beobacht $b'$	Berechn $b'$	$\delta'$
$22^\circ \frac{1}{2}$	57° 47'	-2° 18'	-2° 12'	-6'
45	33 52	-1 8,3	-1 16,6	+8,3
45	57 47	-3 45,7	-3 41,5	-4,2
$67 \frac{1}{2}$	57 47	-3 44,5	-3 46,5	+2,0
90	57 47	-2 31	-2 32,5	+1,5
90	33 52	-2 14,6	-2 11	-3,6
135	57 47	+0 16,6	+0 13,7	-2,9
$157 \frac{1}{2}$	57 47	+0 28,3	+0 28,5	+0,2

Fünfte Reihe Beobachtungen. Bestimmung des Azimuths, in welchem der einfallende Strahl polarisirt seyn muß, damit der reflectirte Strahl senkrecht auf der Einfallsebene polarisirt sey

Da hier  $R_i=0$  ist, so muß  $p'P + sS = 0$  seyn,

woraus man  $\frac{P}{S} = -\frac{s}{p'} = \tan b''$  erhält, wo  $b''$  das er-

erforderliche Polarisations-Azimuth des einfallenden Strahls bezeichnet. Man hat also:

$$\tan b'' = \frac{L \cos(\varphi - \xi) \sin(\varphi - \varphi' + k') \cos \xi}{AC \sin \omega \sin 2\varphi \sin(\varphi' - \xi) \sin(\varphi'' - \varphi') \cos k'} \quad (8)$$

Diese Azimuth ist, wenn  $\omega$  zwischen  $0^\circ$  und  $90^\circ$  liegt, negativ in den Fällen, wo der zu dem einfallenden Strahl gehörige ordentliche gebrochene Strahl innerhalb des Kegels (4) liegt, in diesem Kegel selbst ist  $b'' = 90^\circ$ , außerhalb positiv. Für  $\omega$ 's zwischen  $90^\circ$  und  $180^\circ$  ist  $b''$  immer positiv.

Die Tafel enthält die beobachteten und berechneten  $b''$ :

$\omega$ .	$\varphi$ .	Beobacht. $b''$ .	Berechn. $b''$	$\delta$ .
$45^\circ$	$45^\circ$	$-89^\circ 10,5$	$-89^\circ 11,5$	$-1'$
15	$33 \ 52'$	$-88 \ 38,4$	$-88 \ 37,1$	$+1 \ 4'$
90	45	$+87 \ 23$	$+87 \ 28$	$-5$
$112 \ \frac{1}{2}$	45	$+85 \ 47,5$	$+85 \ 52$	$-4 \ 5$
135	45	$+85 \ 47,5$	$+85 \ 50$	$-2 \ 5$
$157 \ \frac{1}{2}$	45	$+87 \ 27$	$+87 \ 26$	$+1$

Sechste Reihe Beobachtungen. Bestimmung des Azimuths, nach welchem der einfallende Strahl polarisirt seyn muß, damit der reflectirte Strahl parallel mit der Einfallsebene polarisirt sey.

Aus  $R_r = p P + s' S = 0$  ergibt sich  $\frac{P}{S} = -\frac{s'}{p} = \tan b''$ , wo  $b''$  das erforderliche Polarisations-Azimuth vom einfallenden Strahl bezeichnet. Es ist also:

$$\tan b'' = -\frac{AC \sin \omega \sin 2\varphi \sin(\varphi' + \xi) \sin(\varphi'' - \varphi') \cos k}{L \cos(\varphi + \xi) \sin(\varphi + \varphi' + k) \cos \xi} \quad (9)$$

Diese Azimuth ist negativ für alle  $\omega$  zwischen  $0^\circ$  und  $90^\circ$  von  $\varphi = 0$  bis in die Nähe der Polarisationswinkel; nämlich bis zu dem durch  $p = 0$  bestimmten Einfallswinkel; hier ist  $b'' = 90^\circ$ , jenseits dieser Winkel ist  $b''$  positiv. Wenn aber das Einfalls-Azimuth  $\omega$  zwischen  $90$  und  $180^\circ$  liegt, so hat der Winkel  $b''$  im Allgemeinen

einen doppelten Wechsel des Vorzeichens; er ist für alle Einfallswinkel, die zwischen den beiden durch

$$C \sin \varphi' + A \cos \omega \cos \varphi' = 0$$

und  $p=0$  bestimmte  $\varphi$ 's liegen, negativ, außerhalb dieser Gränzen ist er positiv; in dem Azimuth  $\omega$ , wo die beiden Gränzen zusammenfallen, was bei einem Winkel der vollständigen Polarisation geschieht, findet gar kein Wechsel des Vorzeichens von  $b'''$  statt; in den Azimuthen, wo der Gleichung  $C \sin \varphi + A \cos \omega \cos \varphi = 0$  durch kein  $\varphi$  genügt werden kann, findet nur ein einmaliger Wechsel des Vorzeichens von  $b'''$  statt, bestimmt durch  $p=0$ , welcher Gleichung immer genügt werden kann.

$\omega$ .	$\varphi$ .	Beobacht. $\delta'''$ .	Berechn. $\delta'''$ .	■
45°	45°	—11° 5' 5"	—11° 40'	+34' 5"
61 28'	45	—11 4	—11 16	+12
90	45	— 6 19	— 6 5	—14
135	45	+ 2 17	+ 2 17 5	+ 0 5

Siebente Reihe. Beobachtung des Azimuths, in welchem der einfallende Strahl polarisirt seyn muß, wenn der reflectirte in einem gegebenen Azimuth polarisirt seyn soll.

Es sey  $a$  das Polarisations-Azimuth des einfallenden Strahls,  $b$  dasjenige des reflectirten, so daß also  $\frac{P}{S} = \tan a$  und  $\frac{R_p}{R_s} = \tan b$ ; dann findet zwischen  $a$  und  $b$  die Relation statt, daß:

$$\tan b = \frac{p \tan a + s'}{p' \tan a + s}$$

und hieraus:

$$\tan a = \frac{s \tan b - s'}{p - p' \tan b}$$

worin statt  $p, p', s, s'$  ihre Werthe aus (5) zu setzen

sind. Man kann diese Formel unter folgende Form bringen.

gen. Es sey  $\frac{p'}{p} = \tan \pi$  und  $\frac{s'}{s} = \tan \sigma$ , so ist:

$$\tan a = \frac{p \cos \pi \sin (b - \sigma)}{s \cos \sigma \sin (b + \pi)} \dots \dots (10)$$

$\omega$ .	$\varphi$ .	$b$ .	Beobacht $\sigma$ .	Berechn $\sigma$ .	$\delta$ .
45°	45°	+15°	-71° 0'	-71° 5' + 5'	
45	45	-45	+69 40	+69 52 +12	
90	45	+20 29'	-46 30	-46 8 +22	
90	45	-32 39	+53 33	+53 27 - 6	
90	45	+15	-64 19	-64 24 + 5	
90	15	-15	+70 23	+70 29 + 6	
90	45	6 5	0 2,7	0 0 - 2,7	
135	45	+15	-74 15	-74 10 + 5	
135	45	-45	+67 11	+67 15 - 4	
135	45	78 16	89 53,3	89 59 + 5,5	
157 $\frac{1}{2}$	45	+15	-71 39,3	-74 46 + 6,5	
157 $\frac{1}{4}$	45	-45	+70 25	+70 33 + 8	

Diese, mit großer Sorgfalt angestellten vorstehenden Beobachtungsreihen haben wir hinlänglich geschieden, um die Richtigkeit der aus (2) sich ergebenden Relationen nachzuweisen. Eine anderweitige Bestätigung erhalten dieselben durch Beobachtungen, welche Hr. Dr. Seebeck schon vor längerer Zeit über den Einfluss von Krystallflächen auf die vollständige Polarisation des Lichts durch Reflexion angestellt hat (Poggendorff's Annal. Bd. XXI S. 290, Bd. XXII S. 126 und Bd. XXXVIII S. 276), bei denen er den Grad von Schärfe der bei dieser Art von Beobachtungen zu erlangen ist, zuerst kennen lehrte. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich eine um so schätzenswerthere Bestätigung der Gleichung (2), da sie sich nicht auf die natürliche Bruchfläche des Kalkspaths allein beschränken. Ich werde daher ihre Vergleichung mit den aus (2) berechneten Werthen hier folgen lassen, zuvörderst aber die Grundsätze angeben, worauf letztere beruht. Jene Beobachtungen bestimmen

1) den Winkel, unter welchem natürliches Licht auf eine Krystallfläche fallen muß, damit das reflectirte Licht vollständig polarisirt ist, und 2) bestimmen sie das Azimuth, nach welchem diese unter dem Polarisationswinkel reflectirte Licht polarisirt ist. Das natürliche Licht ist eine so rasche Folge von Schwingungen in verschiedenen Richtungen, daß man annehmen kann, daß während der Zeit, welche zur Wahrnehmung desselben nötig, in allen Richtungen gleich viel Schwingungen stattfinden, d. h. daß seine Polarisationssebene alle Azimuthe durchläuft. Wenn es nun unter gewissen Einfallswinkeln für den reflectirten Strahl ein Polarisations-Azimuth giebt, das unabhängig ist vom Polarisations-Azimuth des einfallenden Strahls, d. h. in welchem Azimuth der einfallende Strahl auch polarisirt seyn mag, das Polarisations-Azimuth des reflectirten Strahls immer unverändert bleibt, so muß auch das natürliche Licht nach diesem Azimuth vollständig polarisirt seyn. Wenn polarisirtes Licht auf die Oberfläche eines unkrystallinischen Mediums unter einem gewissen Winkel (dem Polarisationswinkel) fällt, so ist das reflectirte Licht immer nach der Reflexionssebene polarisirt, folglich wird hier, wenn natürliches Licht einfällt, dasselbe durch die Reflexion vollständig nach der Einfallsebene polarisirt seyn. Daß es auch nicht auf dieselbe Weise bei krystallinischen Oberflächen im Allgemeinen verhalten kann, erhellt daraus, daß  $R$ , nicht unabhängig vom Polarisations-Azimuth des einfallenden Strahls, d. i. unabhängig von  $P$  und  $S$  verschwinden kann, es sey denn, daß zu gleicher Zeit den Gleichungen  $p=0$  und  $s=0$  Genüge geschehe, welches nur in besondern Fällen der Fall seyn kann. Aber, wie bereits bemerkt, ist nur erforderlich, damit natürliches Licht vollständig polarisirt werde, daß  $\frac{R_p}{R_s}$  eine GröÙe sey, d. h. unabhängig von  $P$  und  $S$ .

Ich werde diese Größe durch  $\tan \alpha$  bezeichnen. Damit aber

$$\frac{R_r}{R_s} = \frac{p}{p'} \frac{P+s'S}{P+s'S} = \tan \alpha$$

unabhängig von  $P$  und  $S$  sey, muß offenbar

$$\begin{aligned} p &= p' \tan \alpha \\ s &= s' \tan \alpha \end{aligned} \quad \dots \quad (11)$$

seyn, woraus durch Elimination von  $\tan \alpha$  sich ergibt.

$$ps - p's' = 0. \quad \dots \quad (12)$$

Unter dem dieser Gleichung (12) Genüge leistenden Einfallswinkel  $q$  wird das natürliche einfallende Licht vollständig polarisirt, und zwar nach dem Azimuth  $\alpha$ , wo  $\alpha$  durch eine der Gleichungen (11) bestimmt ist, hierin das aus (12) sich ergebende  $q$  substituirt. Durch (12) wird also der Winkel der vollständigen Polarisation und durch (11) die Abweichung der Polarisationssebene, d. h. der Winkel, den sie mit der Reflexionsebene bildet, bestimmt.

Wenn die Reflexionsebene parallel mit dem Hauptschnitt ist, d. i. wenn  $\omega = 0$  oder  $= 180^\circ$ , dann ist  $p' = 0$ ,  $s' = 0$ , woraus folgt, daß hier der reflectirte Strahl parallel mit der Einfallsebene polarisirt ist; die Gleichung (12) reducirt sich in diesem Falle auf  $ps = 0$ , oder da  $s$  nicht  $= 0$  werden kann durch ein bestimmtes  $q$ , so reducirt sie sich auf  $p = 0$ .

Setzt man für  $p$  seinen Werth aus (2) eliminirt  $q'$  und  $q''$  mittelst

$$\sin^2 q' = \mu^2 \sin^2 q$$

$$\tan^2 q'' = \sin^2 q [\mu^2 (C + A \tan^2 q)^2 + \pi^2 (A - C \tan^2 q)^2]$$

so findet man nach einigen Reductionen für den Winkel der vollständigen Polarisation:

$$\sin^2 q = \frac{(1 - \pi^2) A^2 + (1 - \mu^2) C^2}{1 - \pi^2 \mu^2} \quad \dots \quad (13)$$

Dies ist dieselbe Formel, zu welcher bereits Hr. Seebeck durch theoretische Betrachtungen gekommen ist,



und von der er die genügende Uebereinstimmung mit seinen Beobachtungen nachgewiesen hat (Ann. Bd. XXII S. 126).

In meiner Abhandlung „*Ueber den Einfluss etc.*“ habe ich nachgewiesen, daß die Gleichung (11) im Allgemeinen auf eine Gleichung vom vierten Grade führt, und sie kann daher nur durch Annäherungen berechnet werden. Für  $\omega = 90^\circ$  ist eine für diese Berechnung bequeme Formel diese:

$$\cos(\varphi + \varphi') = \frac{\left[ (A^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi')^2 + A^2 \cos^2(\varphi + \varphi') \sin^2(\varphi - \varphi') \right] \frac{\pi^2 + \mu^2}{1 - \mu^2}}{A^2 \cos(\varphi + \varphi') - C^2 \sin^2 \varphi' \cos(\varphi - \varphi')} \quad (14)$$

Die nach dieser Gleichung berechneten Winkel der vollständigen Polarisation sind in folgender Tafel mit den von Seebeck beobachteten zusammengestellt, in welcher die erste, mit  $\lambda$  überschriebene Spalte die Neigung der reflectirenden Flächen gegen die Axe enthält.

$\lambda$	Beobacht. Pol. Winkel	Berechn. Pol. Winkel	Unterschied.
$0^\circ 12'$	$58^\circ 56'$	$58^\circ 54.9$	+ 1.1
$0 \quad 23$	$58 \quad 56.1$	$58 \quad 54.9$	+ 1.2
$27 \quad 2$	$59 \quad 3.9$	$59 \quad 19.1$	- 15.2
$45 \quad 23.2$	$59 \quad 50.9$	$59 \quad 53.4$	- 2.5
$45 \quad 29$	$59 \quad 47.7$	$59 \quad 53.5$	- 5.8
$45 \quad 43.5$	$59 \quad 46.7$	$59 \quad 54.1$	- 7.4
$64 \quad 1.5$	$60 \quad 14.8$	$60 \quad 26.3$	- 11.7
$89 \quad 47.5$	$60 \quad 33.4$	$60 \quad 47$	- 13.6

Im allgemeinen Fall reducirt sich die Gleichung (11) durch Elimination von  $\varphi''$  nach ziemlich complicirten Reductionen endlich auf folgende Form:

$$\cos(\varphi + \varphi') = \frac{\pi^2 - \mu^2}{1 - \mu^2} \times \left\{ \frac{A^2 \sin^2 \omega \cos(\varphi + \varphi') \cos(\varphi - \varphi' + P)^2 + A^2 \sin^2 \omega \cos^2(\varphi + \varphi') \sin^2(\varphi - \varphi')}{A^2 \sin^2 \omega \cos(\varphi + \varphi') + P \cos(\varphi - \varphi')} \right\}$$



wo:

$$P = A^2 \cos^2 \omega \cos^2 \varphi' - C^2 \sin^2 \varphi',$$

woraus sich sogleich der von Seebeck entdeckte sehr merkwürdige Umstand ergibt, dass der Polarisationswinkel im Azimuth  $\omega$  und  $180 - \omega$  derselbe ist.

Die auf der natürlichen Bruchfläche des Kalks in den verschiedenen Azimuthen von Hrn. Seebeck beobachteten Polarisationswinkel sind mit den aus (14) berechneten in folgender Tafel zusammengestellt:

$\omega$	Beobacht. Pol. Winkel.	Berechn. Pol. Winkel.	Unterschied.
0° 0'	57° 19,7	57° 20,1	+0,4
22 30	57 45,9	57 42,9	-3,0
45 0	58 33,9	58 34,9	+1,0
67 30	59 29,1	59 30,1	+1,0
90 0	59 50,9	59 53,4	+2,5

Was nun die *Abweichung der Polarisationsebene*  $\alpha$  betrifft, so hat man dafür aus (11)  $\tan \alpha = \frac{s'}{s}$ . Man findet aber aus (2):

$$s' = \frac{A \sin \omega \sin 2\varphi}{N} (C \sin \varphi' + A \cos \omega \cos \varphi') \sin(\varphi'' - \varphi'),$$

wo  $N$  dieselbe Bedeutung als in (6) hat. Hierin ist für  $\varphi$  der aus (14) sich ergebende Werth zu setzen. Der Werth von  $s$  reducirt sich für diesen Fall der vollständigen Polarisation auf:

$$s = \frac{\sin^2 \varphi}{N} \left( \frac{C^2 \sin^2 \varphi - A^2 \cos^2 \omega \cos^2 \varphi'}{\cos(\varphi + \varphi')} \right) \sin(\varphi'' - \varphi').$$

Man hat also:

$$\tan \alpha = \frac{A \sin \omega \cos(\varphi + \varphi')}{C \sin \varphi' - A \cos \omega \cos \varphi'} \dots (15)$$

d. h. die Tangente der Abweichung der Polarisations-ebene ist gleich der Tangente des Winkels, welchen die Polarisationsebene der ordentlichen Wellenebene, die im Innern des Krystalls bei der vollständigen Polari-

sation erzeugt ist, mit der Einfallsebene bildet, multiplicirt mit dem Cosinus der Summe des Polarisationswinkels und des ihm entsprechenden ordentlichen Brechungswinkels.

In diesen Annalen, Bd. XXXVIII S. 281, theilt Hr. Seebeck zwei Beobachtungsreihen über den Winkel  $\alpha$  mit; die eine ist auf der natürlichen Bruchfläche des Kalks angestellt, die andere auf einer mit der Axe parallelen Fläche.

1) Auf der natürlichen Bruchfläche des Kalkpaths.

$\omega$ .	Beobacht. $\alpha$ .	Berechn. $\alpha$ .	Unterschied.
$0^\circ$	$0^\circ$	$0^\circ 0'$	$0'$
$22 \frac{1}{2}$	$-2 \ 9'$	$-2 \ 16$	$+ \ 7$
45	$-3 \ 38$	$-3 \ 38,3$	$+ \ 0,3$
$67 \frac{1}{4}$	$-3 \ 31$	$-3 \ 42,3$	$+ \ 8,3$
90	$-2 \ 30$	$-2 \ 26,3$	$- \ 3,7$
$112 \frac{1}{2}$	$-0 \ 48$	$-0 \ 52$	$+ \ 4$
135	$+0 \ 23$	$+0 \ 16,3$	$- \ 6,7$
$157 \frac{1}{4}$	$+0 \ 18$	$+0 \ 28,7$	$+10,7$
180	$0 \ 0$	$0 \ 0$	$0,0$

2) Auf einer mit der Axe parallelen Fläche.

$\omega$ .	Beobacht. $\alpha$ .	Berechn. $\alpha$ .	Unterschied.
$0^\circ$	$0^\circ$	$0^\circ 0'$	$0'$
$22 \frac{1}{2}$	$-2 \ 43'$	$-2 \ 45,5$	$- \ 2,5$
45	$-3 \ 57$	$-4 \ 7,5$	$-10,5$
$67 \frac{1}{2}$	$-2 \ 46$	$-3 \ 2,5$	$-16,5$
90	$0$	$0 \ 0$	$0,0$

Ich habe oben in (5) die Amplituden in dem reflectirten Licht  $R_p$  und  $R_s$  ausgedrückt durch:

$$R_p = p P + s' S$$

$$R_s = p' P + s S$$

ich will jetzt eben so die Amplituden in beiden gebrochenen Wellen  $D'$  und  $D''$  bezeichnen durch:

$$D' = \pi P + \sigma' S$$

$$D'' = \pi'' P + \sigma'' S.$$

Die vorübergehenden Beobachtungen können ihrer Natur nach nicht die absoluten Werthe von  $p, p'$  etc.  $\pi, \sigma'$  ... lehren; es können durch Beobachtungen dieser Art nur bestimmt werden:

- 1) Die Verhältnisse  $p : p' : s : s'$
- 2) Das Verhältniß  $\pi : \sigma'$
- 3) Das Verhältniß  $\pi : \sigma''$ .

Somit kann die Richtigkeit der Gleichungen (2) in ihrer ganzen Ausdehnung nicht aus den mitgetheilten Beobachtungen gefolgert werden, nur ihre Angaben in Hinsicht auf das Verhältniß je zwei von den Strahlen, aus denen man das reflectirte Licht zusammengesetzt betrachten kann, deren Amplituden  $pP, p'P' \dots$  sind, und in Hinsicht auf das Verhältniß von den zwei Strahlen, aus welchen der ordentliche Strahl, und in Hinsicht auf das Verhältniß der zwei Strahlen, aus welchen der außerordentliche Strahl zusammengesetzt ist; nur diese Angaben der Gleichungen (2) können durch die mitgetheilten Beobachtungen als erwiesen angesehen werden. Ich habe aber an einem andern Ort (diese Annalen Bd. XXXX S. 502) bereits gezeigt, daß die Kenntniß der Verhältnisse jener Strahlen, sey es, daß sie durch directe Beobachtungen oder durch theoretische Betrachtungen erhalten ist, hinreicht in dem Falle, daß das brechende Medium ein vollkommen durchsichtiges ist, um die Intensitäten zu bestimmen, mit welchen das Licht reflectirt wird, und sich unter den beiden gebrochenen Strahlen vertheilt. Unter einem vollkommen durchsichtigen Medium ist hier aber ein solches verstanden, bei welchem, unmittelbar nach der Brechung, die Summe des reflectirten und gebrochenen Lichts gleich ist dem einfallenden Licht, so daß die Absorption des Lichtes, welches im Innern des Mediums von einer merklichen Dicke etwa eintritt, hier ohne Einfluß ist.

Die Intensität des einfallenden Lichtes ist  $P^2 + S^2$ , und eben so ist die des reflectirten Lichts  $R_1^2 + R_2^2$ ,

die Intensitäten des ordentlichen und außerordentlichen Strahls sind proportional mit den Quadraten ihrer Amplituden; ich bezeichne sie mit  $\alpha' D'^2$  und  $\alpha'' D''^2$ . Setzen wir nun:

$$R_p^2 = p^2 \left( P + \frac{s'}{s} S \right)^2$$

$$R_s^2 = p^2 \left( \frac{p'}{p} P + \frac{s}{p} S \right)^2$$

$$\alpha' D'^2 = \alpha' \pi'^2 \left( P + \frac{\sigma'}{\pi'} S \right)^2 \dots (17)$$

$$\alpha'' D''^2 = \alpha'' \pi''^2 \left( P + \frac{\sigma''}{\pi''} S \right)^2$$

in die Gleichung, welche die vollkommene Durchsichtigkeit ausdrückt, nämlich in:

$$P^2 + S^2 = R_p^2 + R_s^2 + \alpha' D'^2 + \alpha'' D''^2,$$

so erhalten wir, da diese Gleichung für jeden Werth von  $P$  und  $S$  stattfinden muß, die drei folgenden Relationen:

$$1 = p^2 \left( 1 + \left( \frac{p'}{p} \right)^2 \right) + \alpha' \pi'^2 + \alpha'' \pi''^2$$

$$1 = p^2 \left( \left( \frac{s'}{s} \right)^2 + \left( \frac{s}{p} \right)^2 \right) + \alpha' \pi'^2 \left( \frac{\sigma'}{\pi'} \right)^2 + \alpha'' \pi''^2 \left( \frac{\sigma''}{\pi''} \right)^2 \quad (18)$$

$$0 = p^2 \left( \frac{s'}{s} + \frac{p's}{p^2} \right) + \alpha' \pi'^2 \left( \frac{\sigma'}{\pi'} \right) + \alpha'' \pi''^2 \left( \frac{\sigma''}{\pi''} \right)$$

In diesen drei Gleichungen sind  $p^2$ ,  $\alpha' \pi'^2$ ,  $\alpha'' \pi''^2$  Unbekannte, während die Quotienten  $\frac{p'}{p}$ ,  $\frac{s'}{p}$ ,  $\frac{\sigma'}{\pi'}$  . . .

bekannt sind, nämlich die durch die Beobachtungen bestätigten Werthe dieser Quotienten, welche sich aus (2) ergeben. Substituiert man diese Werthe, und löst die Gleichungen in Beziehung auf  $p^2$ ,  $\alpha' \pi'^2$ ,  $\alpha'' \pi''^2$  auf, so findet man:

1) Dafs  $p$  denselben Werth hat, als der aus (2) sich ergebende.

2) Dafs man auch für  $\pi'$  und  $\pi''$  die aus (2) sich

ergebenden Werthe setzen kann, wenn man annimmt, dass:

$$\alpha' = \frac{\sin q' \cos q'}{\sin q \cos q}$$

$$\alpha'' = \frac{\sin q'' \cos q''}{\sin q \cos q} \left\{ 1 - \frac{(\pi^2 - \mu^2) \gamma'' (C - \gamma'' \cos q'')}{(\pi^2 - (\pi^2 - \mu^2) \gamma''^2) \cos q''} \right\} \quad (19)$$

Die Bedeutung dieser Annahme ergibt sich aus folgender Betrachtung. Die Gleichung der vollkommenen Durchsichtigkeit ist keine andere, als die der Erhaltung der lebendigen Kräfte; hieraus erhellt die Bedeutung von  $\alpha'$  und  $\alpha''$ . Wenn  $a$  die Masse bedeutet, welche von einem einzelnen Impuls der einfallenden Welle bewegt wird, und  $b'$  die Masse, welche in der ordentlich gebrochenen Welle von demselben Impuls in Bewegung gesetzt wird, so ist  $\alpha' = \frac{b'}{a}$ , und wenn  $b''$  dasselbe für

die außerordentliche gebrochene Welle bedeutet, so ist  $\frac{b''}{a} = \alpha''$ . Statt dieser Massen  $a$ ,  $b'$ ,  $b''$  kann man auch diejenigen setzen, welche von einer ganzen Undulation in der einfallenden und in den beiden gebrochenen Wellen in Bewegung gesetzt wird. Diese Massen verhalten sich wie die in Bewegung gesetzten Volumina multiplicirt mit den Dichtigkeiten; nennt man die Dichtigkeit in dem brechenden Medium  $\delta$  und in dem umgebenden  $d$ , so findet man (siehe meine Abhandlung über den Einfluss etc.):

$$\frac{b}{a} = \frac{\delta \sin q' \cos q'}{d \sin q \cos q}$$

$$\frac{b''}{b} = \frac{\delta \sin q'' \cos q''}{d \sin q \cos q} \left\{ 1 - \frac{(\pi^2 - \mu^2) (C - \gamma'' \cos q'')}{(\pi^2 - (\pi^2 - \mu^2) \gamma''^2) \cos q''} \right\}.$$

Die Vergleichung dieser Werthe mit denjenigen, die in (19) für  $\alpha'$  und  $\alpha''$  angenommen worden sind, lehrt, dass die Gleichungen (2) nur in der Voraussetzung als erwiesen angesehen werden können, dass  $d = \delta$ , d. h. dass in allen Medien der Aether dieselbe Dichtigkeit

habe. Es ist kein Phänomen des Lichts bekannt, welches hienit in Widerspruch steht. Sollte indess es sich wirklich anders verhalten, so wäre die einzige Abänderung, welche die Gleichungen (2) trüfe, die, daß statt

$D'$  und  $D''$  in ihnen gesetzt werden müßte  $D' \sqrt{\frac{d}{\delta}}$

und  $D'' \sqrt{\frac{d}{\delta}}$ . Ich glaube aber, es giebt kein beobachtbares Phänomen, wodurch entschieden werden kann,

ob dieser Factor  $\sqrt{\frac{d}{\delta}}$  einen von 1 verschiedenen

Werth habe oder nicht. Auf jeden Fall ist dieser Factor ohne Einfluß auf die Modificationen, welche das zurückgeworfene Licht durch die Reflexion erhält, und ohne Einfluß auf die Intensität der beiden gebrochenen Lichtstrahlen; beides, jene Modificationen und diese Intensitäten, werden innerhalb der Beobachtungsgränzen durch die Gleichungen (2) richtig dargestellt.

## II. Ueber die circulare Doppelbrechung: von Hrn. Babinet.

(Annot. Compt. rend. 1837, I, p. 900.)

Die circulare Doppelbrechung, welche man längs der Axe des Bergkrystalls wahrnimmt, ist eben so an die circulare Polarisation gebunden, wie die gewöhnliche Doppelbrechung an die lineare Polarisation. Sie erzeugt auch bei einem gewöhnlich polarisirten Strahl, der durch eine gewisse Dicke von Bergkrystall, unkrystallisirtem Zucker, Kampher, Terpenthinöl oder Zuckerwasser geht, das sonderbare Phänomen der Drehung der Polarisations-ebene. Diese zuerst von Arago entdeckte und darauf von Biot sorgfältig untersuchte Drehung beobachtet man

auch in verschiedenem Sinn und mit verschiedener Intensität bei einer großen Anzahl organischer Substanzen. Durch die Annahme, daß zwei circular polarisirte Strahlen, ein rechts und ein links gewandter, die mit der mit der Drehkraft begabten Substanzen mit etwas verschiedener Geschwindigkeit durchlaufen <sup>1)</sup>, hat Fresnel gezeigt, wie diese neue Art von Doppelbrechung entstehen könne. Der Zweck der gegenwärtigen Abhandlung ist die Aufstellung der Formel für das Gesetz der circularen Doppelbrechung, die mathematische Festsetzung ihres Zusammenhanges mit den Drehungs-Erscheinungen, und endlich die Darlegung von Interferenz-Erscheinungen, welche, unabhängig von jedem andern Mittel, das Maass dieser sonderbaren Doppelbrechung, selbst für Flüssigkeiten, bei denen sie nur schwach ist, geben können.

1) Wenn zwei Strahlen von gleichem Ursprung rechtwinklich gegen einander polarisirt sind, und einer von ihnen um ein Viertel einer Wellenlänge (*intervalle fondamentale des interferences*) die ich zur Kürze mit  $\lambda$  bezeichne, verzögert worden ist, so stellt dies System der beiden Strahlen das dar, was Fresnel, Arago,

1) Der Begriff von optischen Aequivalenten, welchen wir Hrn. Arago verdanken, erlaubt das Wort *Geschwindigkeit* zu entfernen aus der Klasse der theoretischen Begriffe, deren Gebrauch man immer bei Angabe wissenschaftlicher Resultate vermeiden muß. In der That folgt aus den Interferenzversuchen, daß der Weg, welcher von einem Strahl in einer brechenden Platte durchlaufen wird, vollkommen äquivalent ist diesem namlichen Weg, multiplicirt mit dem Brechungsverhältniß und durchlaufen im Vacuum. Wenn demnach die Geschwindigkeit des Lichts im Vacuum eine Einheit angenommen wird, so ist die Geschwindigkeit in jedem andern Mittel, experimentell definiert, die *Reziproke des Brechungsverhältnisses*. (Wenn man indess noch vom Durchlaufen eines Weges sprechen muß, wobei doch die Länge dieses Weges und die Zeit zum Durchlaufen in Betracht kommen, so ist nicht füglich einzusehen, was mit der Vermeidung des Wortes *Geschwindigkeit* eigentlich gewonnen sey P.).



Airy u. s. w. einen *circular polarisirten Strahl* nennen. Er giebt beim Durchgang durch einen Kalkspath keine ungleichen Bilder; allein er färbt Krystallblättchen, mit Ausnahme der senkrecht gegen die Axe geschnittenen Bergkrystallblättchen und des Terpenthinöls, welche er farblos läßt; endlich zertheilt er sich, längs der Axe des Bergkrystalls fortgehend, nicht in zwei Bündel. Ich setze hier voraus, daß der circular polarisirte Strahl erzeugt sey durch den Durchgang eines linear (*homogene*) polarisirten Strahls durch ein Glimmerblättchen von solcher Stellung und Dünne, daß die beiden resultirenden Strahlen einerseits gleiche Intensität haben und andererseits in ihrem Gange um ein Viertel von  $\lambda$  verschieden sind. Ohne hier alles Bekannte über diesen Gegenstand wiederholen zu wollen, bemerke ich nur, daß wenn, bei einem gegebenen Glimmerblättchen, die Polarisationsebene des einfallenden Strahls ihr Azimuth um  $90^\circ$  ändert, der resultirende Strahl, wenn er anfangs z. B. von der Linken zur Rechten polarisirt war, nach dieser Veränderung von der Rechten zur Linken polarisirt ist. Ist  $m$  das Brechungsverhältniß eines dieser Strahlen parallel der Axe des Krystalls, so wird das Brechungsverhältniß des andern  $m(1+\varphi)$  seyn;  $\varphi$  ist eine sehr kleine Größe, die ich zu bestimmen suchen werde. Was  $m$  betrifft, so hat man parallel der Axe des Bergkrystalls  $m=1,5484$ .

2) Bekanntlich kann man immer einen gewöhnlich polarisirten Strahl als bestehend aus zwei circular polarisirten Strahlen ansehen, und daraus folgere ich, daß wenn einer dieser Strahlen längs der Axe des Bergkrystalls um das Intervall von  $\frac{1}{4}\lambda$  im Vacuo verzögert worden ist, die Polarisationsebene des aus beiden Strahlen hervorgehenden Strahls alsdann um  $90^\circ$  gedreht sey. Nun ist das Intervall, das im Vacuo  $\frac{1}{4}\lambda$  beträgt, kleiner im Bergkrystall und bloß  $\frac{1}{4}\frac{\lambda}{m}$ , und dies ist also

der



der Weg, welchen der eine circular polarisirte Strahl vor dem andern gewinnt, wenn die Polarisationsebene sich um  $90^\circ$  dreht. Es sey  $\alpha$  der Drehungswinkel der Polarisationsebene für eine Bergkrystallplatte von einem Millimeter Dicke und für eine gegebene homogene Farbe, so hat man eine Drehung von  $90^\circ$  für eine Dicke von  $\frac{90}{\alpha}$  Millimeter. Die von den beiden Strahlen durchlaufenen äquivalenten Werthe sind also, für den einen  $\frac{90}{\alpha}$  und für den andern  $\frac{90}{\alpha} + \frac{1}{2} \frac{\lambda}{m}$ , und das Verhältniß der beiden zuvor erwähnten Grössen  $m$  und  $m(1+\varphi)$  wird also das von  $\frac{90}{\alpha}$  zu  $\frac{90}{\alpha} + \frac{1}{2} \frac{\lambda}{m}$ , so daß  $1+\varphi$  ausgedrückt wird durch  $1 + \frac{1}{2} \frac{\lambda}{m} \cdot \frac{\alpha}{90}$ , und man hat also:

$$\varphi = \frac{1}{2} \frac{\lambda}{m} \cdot \frac{\alpha}{90}.$$

Um sich eine Idee von diesen Zahlen zu machen, wollen wir setzen:  $m = \frac{2}{3}$ ,  $\lambda = 0,0003$  Millm.,  $\alpha = 20^\circ$ ;  $m$  und  $m(1+\varphi)$  werden dann  $\frac{2}{3}$  und  $\frac{2}{3}(1 + \frac{1}{47000})$ . Dieser Bruch  $\frac{1}{47000}$  ist kleiner als die kleinste der gewöhnlichen Doppelbrechungen, die man beobachtet hat.

3) Legt man zwei Bergkrystall-Prismen an einander, so daß sie ein Parallelepiped bilden, läuft das Licht in diesen Prismen parallel der Axe, und haben dieselben entgegengesetzte Drehkräfte, so weiß man, daß dasjenige der beiden Prismen, welches einem der circular polarisirten Strahlen die grössere Geschwindigkeit giebt, dem andern die kleinere giebt, und umgekehrt, so daß wenn der erstere Strahl von der Geschwindigkeit  $m$  zur Geschwindigkeit  $m(1+\varphi)$  übergeht, der andere von  $m(1+\varphi)$  zu  $m$  übergeht. Für diesen Fall finde ich nun, daß, wenn  $i$  den brechenden Winkel eines jeden

der zusammengeklebten Prismen bezeichnet, die Winkel-trennung  $\delta$  der beiden Bündel ist:

$$\delta = 2m q \tan i.$$

Dies ist der Werth der circularen Doppelbrechung. Ist z. B.  $i = 50^\circ$ , so hat man nahe:

$$\delta = \tau_{100}.$$

Dieser Winkel beträgt ungefähr zwei Minuten, und da die Doppelbrechung ungefähr  $\tau_{100}$  von der Entfernung des Gegenstandes ist, so sieht man einen Gegenstand, der ein Millimeter im Durchmesser hält, in der Entfernung von  $\tau_{100}$  Millimeter doppelt.

Durch eine ähnliche Rechnung findet man, daß man, um mit Terpenthinöl oder Zuckerlösung eine circular Doppelbrechung zu erhalten, die Zahl der Prismen oder die brechenden Winkel  $i$  so vergrößern müßte, daß der Versuch unmöglich würde.

4) Man muß also Interferenzen zu Hülfe nehmen, um diese so schwachen circularen Doppelbrechungen zu messen, wenn man nicht die Drehungen anwenden will, oder vielmehr, man muß durch die Interferenzen die obigen theoretischen Inductionen bestätigen, welche von einer besonderen Natur sind, und welche uns gegeben haben:

$$\delta = 2m q \tan i.$$

Dies habe ich anfangs durch mühsame und verwinkelte Verfahrensarten bewerkstelligt, allein zuletzt durch einen sehr einfachen Versuch, den ich jetzt beschreiben will.

Ich stelle ein homogenes Licht von gegebener Farbe hinter eine kleine verticale Oeffnung, und polarisire das durchgegangene Licht mittelst einer Turmalinplatte. Ein Meter von der kleinen Oeffnung stelle ich eine prismatische Glasplatte (*plaque-prisme*) auf, welche ein Meter hinter sich schöne Interferenzfransen erzeugt. Mittelst zweier kleinen Glimmerblättchen erhält jeder der beiden interferirenden Strahlen dicht hinter der prismati-

sehen Platte die Circularpolarisation, was (abgesehen von der Bemerkung unter No. 5) die Interferenzen nicht stört, obgleich die beiden Circularpolarisationen, wohl verstanden, von entgegengesetzter Natur sind.

Dieses gesetzt, stellte man hinter den beiden Glimmerblättchen einen dicken Bergkrystall so auf, daß die interferirenden Strahlen ihn längs der Axe durchlaufen. Nach dem zuvor Gesagten, gewinnt einer der Strahlen den Vorsprung vor dem andern, und die Dazwischensetzung des Krystalls verschiebt also die Fransen. Die Größe dieser Verschiebung ist leicht zu berechnen, wenn man sich erinnert, daß bei einer Krystalldicke von  $\frac{90}{\alpha}$

(etwa 4,5 Millimeter) der eine Strahl eine halbe Wellenlänge vor dem andern gewinnt. Bei einem der von mir angewandten Krystalle entspricht die Verschiebung neun Fransen, d. h. bei Fransen von 0,5 Millim. Breite, 4 bis 5 Millim. Weges. Nimmt man statt des Bergkrystalls eine mit Drehkraft begabte Flüssigkeit, so erhält man eben so die Messung ihrer circularen Doppelbrechung, die direct durch die Bestimmung von  $\delta$  unmeßbar seyn würde.

Da bei vorstehendem Versuch die Dazwischensetzung des Bergkrystalls oder der Flüssigkeit, schon vermöge der gewöhnlichen Brechung, die Fransen etwas verschieben muß, weil es unmöglich ist, die Ein- und Austrittsfläche vollkommen parallel zu machen, so ist es begreiflicherweise unumgänglich, diese Fehlerquelle zu entfernen. Bei meinen ersten Versuchen vertauschte ich die Glimmerblättchen gegen einander, und bewirkte dadurch eine Veränderung in der Natur der Strahlen und eine Verschiebung der Fransen um's Doppelte des Effects der Blättchen für jeden gegebenen Fall von Circularpolarisation. Allein man kann noch einfacher verfahren, wenn man den Krystall und die Glimmerblättchen unverändert läßt, und bloß die Polarisationsebene des

durch die schmale Oeffnung eindringenden Lichts um  $90^\circ$  dreht, wozu man offenbar nur die Turmalinplatte um  $90^\circ$  zu drehen braucht. Alsdann vertauschen die beiden Strahlen, bei Ankunft auf den Glimmerblättchen, gegenseitig die Natur ihrer Circularpolarisation. Auch die circulars Doppelbrechung ändert ihre Natur. Der Strahl, der im ersten Fall am meisten verzögert wurde, wird es im zweiten am wenigsten. Endlich werden die Fransen, ohne irgend eine Störung in dem System der Glimmerblättchen und dem doppelt circular brechenden Körper, verschoben um eine Gröfse, deren Hälfte die Wirkung dieses Körpers ist.

Sey nun diese Wirkung vorgestellt durch die Zahl  $n$  von Fransenbreiten, welche den Werth der Hälfte der gesammten Verschiebung für eine Plattendicke  $e$  ausdrückt. Die Dicke, welche einer Verschiebung von einer halben Fransenbreite entspricht, wird offenbar  $\frac{1}{2} \frac{e}{n}$  und nach dem oben Gesagten würde man haben:

$$q = \frac{\lambda n}{m e},$$

wenn man  $\frac{90}{\alpha}$  durch  $\frac{1}{2} \cdot \frac{e}{n}$  ersetzt.

5) Die circular polarisirten Strahlen bieten bei ihrer Interferenz eben so viele Eigenthümlichkeiten dar, wie bei ihren übrigen optischen Eigenschaften. So geben, genau genommen, zwei im entgegengesetzten Sinn circular polarisirte Strahlen bei ihrer Vereinigung immer eine constante Helligkeit, was für einen Gangunterschied sie auch besitzen mögen. Wenn aber einer von ihnen eine Verzögerung von einer halben Welle erlitten hat, so vereinigen sich beide zu einem gewöhnlich polarisirten Strahl, dessen Polarisationsebene rechtwinklich steht auf der des ursprünglichen Strahls, von welchem die beiden circular polarisirten Strahlen abstammen. Wenn man dann das Licht bei seinem Austritt analysirt, durch

eine Turmalinplatte, die der, welche die ursprüngliche Polarisation erzeugt, parallel ist, so hat man Dunkelheit dort, wo die Polarisationsebene um  $90^\circ$  gedreht ist, d. h. nach dem Obigen, wenn der Gangunterschied  $\frac{1}{2}\lambda$  beträgt, ganz wie bei den gewöhnlichen Interferenzen. Die Gesetze der circularen Doppelbrechung, der Drehung der Polarisationsebene, und der Interferenzen circular polarisirter Strahlen sind also experimentell und theoretisch enthalten in den Formeln und in dem Versuch, welche ich so eben anführte, eben so wie die Aenderungen in der Geschwindigkeit circular polarisirter Strahlen in Substanzen, die diese Drehung erzeugen. Schließlich bemerke ich noch, dass dasselbe experimentelle Verfahren durch Geschwindigkeitsmessungen, welche kein anderes zu liefern vermag, auszumitteln erlaubt, wie die längs der Axe des Bergkrystalls stattfindende circular Doppelbrechung des Bergkrystalls in die gewöhnliche Doppelbrechung übergeht, so wie man die Strahlen gegen die Axe neigt, worüber, selbst nach den wichtigen Untersuchungen von Airy <sup>1)</sup>, sowohl die Theorie als die Beobachtung noch eine große Dunkelheit übrig lässt.

### III. Ueber die Richtungslinien des Sehens;

von Joh. Mile,

Professor an der ehemaligen Universität zu Warschau.

Die aus einem Punkte eines Gegenstandes divergirenden Strahlen werden, wenn sie die Hornhaut des Auges treffen, so gebrochen, dass sie sich convergirend weiter in's Auge fortpflanzen, und bei einer gewissen Entfernung des Gegenstandes, wo er am deutlichsten erscheint, sich in einem einzigen Punkt auf der Netzhaut vereinigen. Die auf diese Art aus vielen leuchtenden

1) Annalen, Bd. XXIII S. 259 und 264.

Punkten entstandenen Lichtbüschel treten aber convergirend in's Auge, kreuzen sich in demselben und divergiren alsdann. Ihre besonderen Vereinigungspunkte fallen also ausgebreitet auf die Netzhaut, und geben hier ein, in Hinsicht der GröÙe des Gegenstandes, verschiedenes, aber der Entfernung proportionales, in Hinsicht der Gestalt und Farbe aber ganz gleiches Bild.

Ob zwar nun jeder Lichtpunkt des Gegenstandes einen kegelförmigen Büschel Lichtstrahlen in's Auge schickt, die sich alsdann von verschiedenen Punkten der Hornhaut  $xx$  (Fig. 1 Taf. II) auf der Netzhaut in einem Punkt  $c$  vereinigen, also das Sehen des Lichtpunktes  $b$  durch alle Strahlen geschieht, so versetzt das Gefühl den Lichtpunkt  $b$  doch nur in die Richtung eines einzigen constanten Strahls  $cdb$ ; denn geschähe dieses in der Richtung aller Strahlen  $cxb$ ,  $cdb$ ,  $cxb$ , so würde uns der gesehene Lichtpunkt  $b$  nicht an einem einzigen Punkt  $o$  erscheinen, sondern ausgebreitet in eine Fläche  $rs$ . Auch würden in solchem Falle die Objecte, welche sich auf dem Wege aller Strahlen befinden, z. B. die Stifte  $mna$  den Punkt  $b$  decken, während dieß nur einer in  $a$ , auf dem Wege  $db$ , thut. Man scheint also den Punkt  $b$  nur in der Richtung eines einzigen Strahls, wie durch ihn zu sehen, und deswegen hat man ihn *Richtungsstrahl* genannt.

Obgleich das Erblicken eines Lichtpunktes an einem gewissen Ort, außerhalb des Auges in der Richtung eines einzigen Strahls geschieht, so kann es doch nicht von einer besonderen Wirkung dieses einzigen Lichtstrahls abhängen. Denn aus physikalischen Gründen läßt sich's gar nicht einschen, warum nicht alle Strahlen desselben Kegels, die doch nur einen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt  $b$  haben, und in einem einzigen Punkt  $c$  zusammenkommen, gleichen Antheil daran haben, und nur einer unter ihnen den Vorzug, die Richtung des Sehens anzugeben, besitzen sollte. Daß dieß wirklich



nicht der Fall sey, zeigt der folgende Versuch. Sieht man durch eine ganz kleine Oeffnung  $d'$  (Fig. 1 Taf. II) in ein ungefähr 10 Zoll langes Röhrchen hinein, so erblickt man die zweite Oeffnung  $b'$ , die sich in der Entfernung des deutlichen Sehens befinden muß, als einen rein begränzten Lichtpunkt. Bleibt dieser Punkt und das Auge fixirt, und bewegt man das vordere Ende nach der einen und der andern Seite (doch nicht mehr als etwa  $1\frac{1}{2}$  Linien, weil diese der Durchmesser des Schloches ist), so sieht man  $b'$  fortwährend und unverrückt an demselben Ort <sup>1)</sup>. Betrachtet man einen Lichtpunkt in der deutlichen Sehweite durch ein kleines Kartenloch, so kann man dieses auch von einem zum andern Rande des Schloches hinbringen, und doch sieht man den Lichtpunkt an derselben Stelle unverrückt. Wenn aber das Loch am Rande des Schloches gestellt ist, so kommt in der sogenannte Richtungsstrahl  $b'd'$  gar nicht in das Auge, sondern nur der seitliche Kegelstrahl  $b'z'$ . Man sieht hier also den Punkt  $b$  unbeweglich an denselben Ort, wie in der Richtung des Richtungsstrahls  $d'b'$ , aber ohne diesen, und doch eben so, als vermittelt desselben. Es giebt auch Augenlagen, wie wir später (Fig. 24 Taf. II) sehen werden, wo der sogenannte Richtungsstrahl, selbst beim gewöhnlichen Sehen, nicht in's Auge gelangen kann, und wo doch in seiner Richtung das Sehen geschieht, wo es also auch durch andere Strahlen, aber desselben Kegels und desselben Ausgangspunktes, die also auch auf dieselbe Stelle der Retina das Bild des Lichtpunktes werfen, vermittelt wird.

1) Nur eine Veränderung wird hier fühlbar; nämlich der Lichtpunkt  $b'$  erscheint etwas gesackt am Rande. Dies kommt aber davon her, daß die seitlichen, schief in die Cornea eintretenden Strahlen  $bx$ ,  $bz$  mehr gebrochen werden, also auch ihre Farbenzerstreuung, da sie hier durch das kleine Loch allein in's Auge kommen und durch die mittleren Strahlen nicht verwischt werden, fühlbar wird.

Auch das Decken des Lichtpunktes  $b$  geschieht in diesen Fällen, wo man es durch ein kleines Loch sieht, in anderen Richtungen, als wie dann, wenn man es mit offenem Auge betrachtet. Bringt man im Rohre  $b'd'$  (Fig. 1. Taf. II) auf dem geraden Wege von einem zum andern Loche einen Stift an, so muß dieser den Durchgang der Strahlen versperren, und da er sich mit dem Rohre bewegt, es in jeder Lage  $bm$ ,  $ba$ ,  $bn$  thun. Wird aber ein Stift vor einem offenen Auge, eben so wie der im Rohre, von  $m$  nach  $n$  bewegt, so wird er den Lichtpunkt  $b$  nur in der Lage  $ba$  decken, nicht aber wenn er, seitwärts von  $a$ , in  $m$  oder  $n$  sich befindet. Im ersten Falle geschieht also die Deckung in der Richtung aller Strahlen des Lichtkegels, im zweiten, nur in der Richtung eines einzigen, nämlich des Richtungsstrahles. Das Decken im ersten Falle kommt aber augenscheinlich vom Abhalten des Lichtes von der Retinastelle  $c$ , also durch Schattenbildung, welches beim offenen Auge deswegen nicht stattfinden kann, weil die Nebenstrahlen desselben Kegels, die den Stift umgehen und im Rohre, von der vorderen das Loch umgebenden Wand abgehalten werden, hier in's Auge gelangen, auf dieselbe Retinastelle  $c$  fallen, also den Schatten verwischen.

Sind zwei Stifte hinter einander fixirt, und wird ein Kartenloch vor dem auch fixirten Auge bewegt, so wird man nur in der Mittellage den Stift  $b$  durch  $a$  (Fig. 1 Taf. II) bedeckt sehen; in den Seitenlagen werden aber die Stifte aus einander zu gehen scheinen. Fällt der hintere Stift in die deutliche Schweite, so erscheint er unverrückbar, und nur der vordere bewegt sich nach der entgegengesetzten Seite der Kartenbewegung; fällt aber der vordere in die deutliche Schweite, so scheint dieser still zu stehen, und der entfernte bewegt sich nach der andern Seite, nämlich jetzt nach derselben Richtung wie die Karte bewegt wird, also, wie früher von



$a$  gegen  $m$ , jetzt von  $o$  gegen  $s$ , wenn wir die Bewegung des Kartenloches von  $d$  nach  $z$  annehmen. Wenn man den Versuch nur mit der Hälfte des Schloches wiederholt, indem man das Loch nur eine halbe Linie vom Karteurande anbringt, so sieht man mit der offenen Hälfte des Auges über den Kartenrand hinweg, daß die Objecte  $ab$  unverrückt bleiben, mit der andern Hälfte durch's Loch, daß sie auseinandergehen und zusammenkommen. Also auch hier findet das Gedecktseyn des Lichtpunktes  $b$  durch  $a$  in der Richtung des Richtungsstrahls nur alsdann statt, wenn viele Strahlen desselben Kegels das Sehen zu Stande bringen, und nicht dann, wenn nur ein kleiner Theil dazu verwendet wird.

Aus dem Obigen folgt also: 1) daß ein jeder Strahl des gemeinschaftlichen Kegels, der nur in's Auge gelangen kann, ein Sehstrahl ist, weil er, sowohl mit andern zusammen, als auch abgesondert, das Sehen des Lichtpunktes, von welchem er ausstrahlt, vermitteln kann; 2) daß nicht vorzugsweise ein einziger Strahl, sondern alle desselben Kegels den Lichtpunkt als fixirt an einem Ort außerhalb des Auges, also in einer und derselben Richtung, sehen lassen; 3) daß das Decken des Lichtpunktes durch Stifte auf dem Wege aller Strahlen, oder auf keinem geschehen kann, was nur davon abhängt, ob man auch die übrigen Kegelstrahlen in's Auge hineinläßt oder nicht; 4) daß es nicht der Richtungsstrahl ist, der die Richtung nach dem Lichtpunkte fühlen läßt, weil er fehlen kann, ohne das Sehen des Lichtpunktes, als feststehenden, an einem bestimmten Ort, aufzuheben. Das Sehen des Lichtpunktes in einer bestimmten Richtung, an einen unverrückbaren Ort, muß also nicht von einem besonderen Einwirken des Richtungsstrahls, sondern von anderen Umständen abhängen.

Wenn wir den Punkt  $b$  nur durch  $a$ , und nicht durch  $m$  oder  $n$  gedeckt sehen, so muß das Abhalten des Lichtes durch die Stifte nicht die Ursache davon

seyn; denn die Stifte *mn* verwehren eben so wie *a* einem Theile der Strahlen den Eintritt in's Auge, und die übrigen Strahlen desselben Kegels umgehen eben so den Stift *a* als die Stifte *m* und *n*, und löschen den Schatten aus. Dieses Auslöschen ist vielmehr ein Grund dafür, daß auch der Stift *a* den Lichtpunkt *b* nicht decken sollte, was er doch thut. Die Ursache dieses Deckens muß also eine andere seyn. Sie liegt darin, daß die der Lichteinwirkung offen stehenden Stifte nicht nur Lichtabhaltend, schattenwerfend, sondern auch lichtzerstreuend wirken, indem sie selbst zu Lichtpunkten werden, die ihre besonderen Bilder auf die Retina werfen. Schattenwerfen geschieht nur in einer Linie, in derselben wie der Gang der einzelnen Strahlen, also im Lichtkegel nach unendlich vielen Richtungen der besonderen Strahlen, und kann aufgehoben werden durch andere Strahlen, die auf die Stelle des Schattens fallen, also durch andere Strahlen desselben Kegels, die zu derselben Stelle auf der Retina gelangen. Wehrt man solchen Zutritt durch kleine Schlächer ab, so wird der Schatten auch sichtbar. Lichtzerstreuen hingegen geschieht in unendlich vielen Linien ringsherum, die gegen das Auge zu einen Kegel bilden und auf der Retina in einer bestimmten Stelle sich versammeln, wo sie ein Bild des Lichtpunktes geben. Die Lichtpunkte *a* und *b* (Fig. 1 Taf. II) haben aber eine solche Lage, daß ihre Bilder auf dieselbe Stelle im Augengrunde fallen müssen, also einen und denselben Punkt der Retina afficiren, dem Gefühle also auch als eins, als an demselben Ort außerhalb des Auges vorhanden, als sich deckend, erscheinen. Die Lichtpunkte *m* und *n* werfen aber ihre Bilder auf besondere Stellen der Retina, und müssen also als an andern Orten vorhanden, also als den Punkt *b* nicht deckend, gefühlt werden. Wir müssen also zweierlei Art des sich Deckens der Objecte unterscheiden: 1) durch Verschattung, welche in allen Richtungen der Kegelstrah-

len geschehen kann, und 2) durch das zusammenfallende Bilderwerfen, welches nur in der Richtung einer einzigen Linie stattfindet. Ein bekannter Versuch zeigt diesen Unterschied auffallend. Bewegt man eine Stecknadel nahe vor dem Auge, so erkennt man, obgleich sie wegen der Nähe ein undeutliches Bild giebt, doch ihre wahre Lage und Bewegung. Schiebt man aber ein Kartenloch vor die Nadel, so erscheint sie umgekehrt gestellt und bewegt. Im ersten Falle ist die Nadel *a* (Fig. 2 Taf. II) als ein von *b* nach *c* sich bewegendes Lichtpunkt zu betrachten, dessen Richtungsstrahlen im Auge sich kreuzen, also ein umgekehrt gestelltes und bewegtes Bild geben, welches aber dem Gefühle wie alle übrigen aufrecht erscheint. Im zweiten Falle aber wirft das Loch *i* als Lichtpunkt einen Lichtkegel, welcher aber wegen der Nähe nicht in einem Punkt sich vereinigt, sich auch nicht kreuzt, sondern vielmehr gerade in einer Lichtscheibe *mn* sich ausbreitet. Die in diesem Lichtkegel versenkte Nadel muß also ihren Schatten auf diese Lichtscheibe aufrecht werfen, welches aber als umgekehrt gefühlt wird. Dafs es Schatten sey, zeigt die schwarze Farbe des Nadelbildes. Bewegt man einen weissen Zwirnfaden vor dem Kartenloch, den man von der Seite beleuchtet, so sieht man zwei sich nach entgegengesetzten Seiten bewegendes Streifen, aber nur der eine direct erhaltene ist weifs, der andere bleibt dunkel.

Die wesentliche Ursache, die eigentliche physiologische Bedingung des sich Deckens der Lichtpunkte ist also das Zusammenfallen ihrer Bilder auf der Retina; die physische oder äufsere Bedingung kann aber keine andere seyn, als das Zusammenfallen der Richtungsstrahlen dieser Lichtpunkte; denn nur zusammen fortgehende Strahlen können zusammen an einer einzigen Stelle der Retina anlangen. Von zweien Lichtkegeln kann aber ein jeder nur einen einzigen Strahl dazu hingeben; denn nur die einzigen Strahlen *ad* und *bd* (Fig. 3 Taf. II)

fallen zusammen, alle übrigen kreuzen sich. Die unmittelbare Folge davon ist aber diese, daß alsdann auch die Scheitel dieser Lichtkegel  $b$ ,  $a$  (Fig. 3 Taf. II) oder die Lichtpunkte selbst auf derselben geraden, von den beiden zusammengefallenen Strahlen gebildeten Linie  $bd$  sich befinden müssen. Dies erklärt, warum nur die, auf einer geraden, die beiden Punkte  $a$ ,  $b$  (Fig. 1 Taf. II) verbindenden Linie  $do$  sich befindenden Objecte sich decken, und nicht  $mn$ , und warum diese Richtungslinie constant und nur eine einzige für jede Lage der Lichtpunkte ist.

Selbst durch Veränderungen des geraden Weges in oder außerhalb des Auges können die einmal zusammengefallenen Lichtstrahlen nicht mehr aus einander kommen, also keine Auseinanderschicbung ihrer Bilder zur Folge haben, und auch keine Veränderung im Gefühle selbst hervorbringen. Wären z. B.  $ab$  (Fig. 4 Taf. II) die zwei Lichtpunkte, die eine solche Lage hätten, daß ihre zwei Strahlen  $ad$  und  $bd$  mit der Richtungslinie zusammenfielen und in ein dichteres, schief gestelltes Mittel  $ef$  eintreten würden, so müßten sie auch auf dem ganzen übrigen Wege zusammen bleiben, alle möglichen, auch die größten durch Refraction hervorgebrachten Veränderungen der Richtung zusammen erleiden, und doch am Ende auf einen einzigen Punkt  $c$  fallen, also sich deckende Bilder geben, so daß die Empfindung eines solchen gemeinschaftlichen Eindrucks nicht anders ausfallen könnte, als wenn dieser in der geraden Linie  $badc$  entstanden wäre. Das Decken der Objecte ist also nicht nur auf einer geraden Linie möglich, und viele Punkte auf dem sehr krummen Lichtwege, wie  $dhiklm$ , werden ihre Bilder nur auf einen Punkt  $c$  werfen können, und also, wenn auch hin und her zerstreut, auf der Netzhaut als an einem Ort vorhanden gefühlt. Dasselbe gilt ja auch für die Lichtpunkte, die in verschiedenen Orten vor dem Auge zerstreut sind. Wenn man ihnen

nur eine solche Richtung giebt, daß sie in's Auge auf demselben Wege *ba* eintreten, so erscheinen sie auch dem Gefühle nur an einem Ort. Die zerstreuten herumgeworfenen Lichtpunkte *nopqr* durch die Spiegel *st* und *uv* in die Richtung *ab* gebracht, würden ja auch im Punkte *c* sich deckende Bilder geben, woher man sie auch nur an einem Ort sieht. Man empfindet also nicht den Weg des Lichtes, nicht seinen Gang, sondern nur seine Ankunft an irgend einer Stelle der Netzhaut; das unmittelbare Gefühle sind hier nur die zusammenfallenden Bilder einzig und allein, die Richtungen der sie vermittelnden Strahlen sind hier nur das Hinzuge dachte. Der Richtungsstrahl kann also auch fehlen, ohne daß wir es gewahr werden.

Aus dem oben Auseinandergesetzten, folgt also, daß man zwei sich deckende Lichtpunkte unverrückt an einem und demselben Ort nur deswegen sieht, weil man ihre Bilder unverrückt an einer einzigen Stelle der Netzhaut fühlt. Das Vermittelnde, der Gang der Strahlen vom Lichtpunkte zum Bildpunkte, ist freilich hier wesentlich, ohne welchen kein Sehen möglich ist; da es aber so viele zu einem Kegel ausgebreitete Strahlen giebt, so kann dieser oder jener Strahl vom Auge abgehalten werden, ohne das Sehen aufzuheben, und ohne daß dadurch die Endpunkte der zwei, in der Cornea mit ihren Basen zusammenstoßenden Lichtkegel, nämlich der Ausgangs- oder Licht-, und der Vereinigungs- oder Bildpunkt, sich verrücken sollten. Alle Lichtstrahlen der beiden Kegel wirken also hier zusammen, um die Bilder an einer gewissen constanten Stelle der Netzhaut, die nur einem einzigen Ort außerhalb des Auges entspricht, hervorzubringen, und nicht nur die Richtungsstrahlen allein. Und da man selbst dem mittleren Theil des Lichtkegels, wo auch der Richtungsstrahl sich befindet, den Eintritt in's Auge, durch das Vorhalten eines ungefähr eine halbe Linie breiten Streifens vor die

Mitte des Schloches, verwehren kann, ohne das Sehen der Objecte an demselben Ort zu verhindern, so folgt daraus, daß der Richtungsstrahl zum Sehen gar nicht nothwendig, gar nicht wesentlich ist. Um also einer möglichen Verwirrung der Gedanken, als wären in den Lichtbüscheln noch besondere, die Richtung angegebende Strahlen, zu entgehen, schien es mir nöthig in der Benennung das Wort Strahl ganz auszulassen; also werde ich statt Richtungsstrahl, Gesichtsstrahl, Sehstrahl, die bald etwas besonderes, bald dasselbe ausdrücken sollen, mich des Ausdruckes *Richtungslinien des Sehens* oder *Directionslinien* bedienen. Sie sind nichts Wirkliches, und nur fingirt, sind aber nöthig, um die außerhalb des Auges und in demselben stattfindenden Lichtrichtungen graphisch anzugeben und ihr Erkennen zu erleichtern. Richtungslinie des Sehens ist also eine gerade Linie, die nicht gefühlt wird, die man sich nur denkt als gezogen durch die Mitte der sich deckenden Gegenstände, und die, im Auge gebeugt oder ungebeugt, je nachdem der auf sie fallende Strahl gebrochen oder ungebrochen im Auge fortgeht, zuletzt auf die Mitte der sich deckenden Bilder dieser Gegenstände fällt, auf die übrigens außerhalb des Auges immer wirklich einzelne Strahlen von jedem besonderen Lichtkegel fallen, im Auge aber dieß nicht immer, und nur alsdann, wenn diesen Strahlen der Eintritt in das Auge nicht versperrt ist, was aber, wenn es stattfindet, nicht verhindert, daß auf das Ende der fingirten Linie das Bild vom Lichtpunkte durch Nebenstrahlen doch hinfällt.

Alle in verschiedener Entfernung auf dieselbe Richtungslinie fallenden Lichtpunkte geben also an derselben Stelle der Netzhaut ihre Bilder. Aber in der Gröfse solcher concentrischen Bilder muß ein Unterschied stattfinden, denn es giebt nur eine Entfernung, nämlich die des deutlichen Sehens, von wo aus ein Lichtpunkt ein auch in einem Punkt zusammengezogenes Bild giebt. Nur



bei dieser Entfernung der Lichtpunkte, und wenn die Basis ihrer Lichtkegel, im Verhältniß zur Länge, wegen der Enge des Schloches, sehr klein ist, wodurch die seitlichen Strahlen des entfernteren Objects, welche den näheren deckenden umgehen, vom Eintritte in's Auge abgehalten werden, kann ein wirkliches Decken stattfinden, das heist, der nähere Gegenstand die Strahlen des entfernten ganz aufhalten, und sie nicht bis zu der Stelle, wo sein Bild ist, gelangen lassen. Die beiden Deckungsarten wirken hier zusammen, aber nicht vollständig: der nähere Gegenstand hält freilich das Licht des entfernten vom Auge ab, aber er kann doch keinen Schatten werfen, weil er, selbst beleuchtet, einen Lichtpunkt abgibt, also sein eigenes Bild auf die Retina wirft. Das Schloch im Menschenauge hält im Durchmesser wenig mehr als eine Linie, und die deutliche Sehweite, auch bei dem kurzzeitigen, mehr als 100 Mal so viel. Die Strahlen, die sie also durchläßt, bilden einen Kegel, dessen Scheitelwinkel nur ungefähr einen halben Grad hält; die entfernten werden von der Iris aufgehalten. Wenn man also in dieser Entfernung zwei Stifte, etwa zwischen 8 und 12 Zoll vom Auge, in einer Richtungslinie betrachtet, so sieht man den Stift *b* (Fig. 1 Taf. II) gar nicht, nur den *a*. Dies ist ein Beweis, daß nur ein Bild von *a* auf der Netzhaut vorhanden ist, welches nur von den mittelsten Strahlen gebildet wird, die peripherischen aber *bx*, *bz*, die das Object *a* umgehen, von der Irisbaut aufgehalten werden. Nähert man aber dem Auge beide Stifte oder entfernt sie, oder nähert man *a* und entfernt *b* (Fig. 5 Taf. II), so kann auch die Enge des Schloches nicht mehr verhindern, daß die vom entfernten Object herkommenden und den näheren umgehenden Strahlen nicht in's Auge gelangen, wodurch zwei concentrische und erweiterte Bilder an derselben Stelle der Netzhaut entstehen. Die Strahlen aus dem zu nahen Object *a* werden von der Retina, noch ehe sie in

o zusammenkommen, aufgehalten, und ihr Bild breitet sich auf *rs* aus; die aus dem zu entfernten *b* kreuzen sich aber früher ehe sie die Retina berühren, und fallen alsdann auch auf die ausgebreitete Stelle *rs*. Daraus aber kann kein reines Bild entstehen, denn wir sehen beide auf einander, wie Scheiben ausgebreitet, blafs, undeutlich, wechselweise durchscheinend, und sind die Farben der Objecte verschieden, so vermischen sie sich. Sind beide Objecte zu entfernt oder zu nahe, so fallen ihre beiden Bilderscheiben gerade auf einander; ist aber nur eins sehr entfernt und das andere zu nahe, so wirft der Stift *a* (Fig. 5 Taf. II) ein gerades, und *b* ein umgekehrtes Bild an derselben Stelle *rs*, wodurch die Undeutlichkeit sich noch vermehrt.

Das Punkt- oder Scheibenbilden auf der Retina ist Ursache, daß wenn man ganze Reihen gleich entfernter Lichtpunkte, wie es die Körperflächen sind, betrachtet, man sie nur in der deutlichen Schweite, als mit einer scharfen Linie begränzt, und ihre kleinsten Theile als besondere, z. B. verschiedenfarbig punktirt, gestreift u. s. w. sieht. Die zu nahen oder sehr entfernten Objecte erscheinen aber undeutlich in ihren Umrissen und gemischt in ihren Farben, z. B. Bäume mit verschiedenfarbigen Blättern, abgerundet und in einer gemischten Farbe, weil ihre Lichtpunkte übereinanderreichende, und also sich deckende und vermischende Scheiben bilden. Gränzen verschiedenfarbige Flächen an einander, so scheinen ihre Ränder durch eine blasse Mittelfarbe in einander überzugehen; sie erscheinen wie mit Bändern umgeben, die desto breiter ausfallen, je entfernter die Gegenstände sind, die aber, weil ihre Breite nicht mit der Größe der Gegenstände, sondern nur mit ihrer Entfernung gleich zunimmt, an großen nicht so leicht bemerkt werden, als an kleinen, z. B. Blitzableitern, Kreuzen, Mondshörnern u. dergl.

Die aus einem einzigen Lichtpunkte kommenden  
Strah-



Strahlen können also, wenn er sich nicht in der deutlichen Schweite befindet, die Retina in sehr vielen Punkten rings um den Richtungslinien-Punkt afficiren. Wenn aber zwei Lichtpunkte eine sehr verschiedene Lichtintensität besitzen, so wird immer noch ein jeder von ihnen seine eigene Scheibe in der zugehörigen Richtungslinie werfen, aber nur die hellere wird gefühlt, die andere wird gar nicht gesehen. Zwei Lichtflammen, jede in einem besondern Fenster eines entfernten Hauses, erscheinen dem Kurzsichtigen als zwei über einander reichende Lichtscheiben; die ganze Zwischenwand wird im Gefühle vermisst. Aus demselben Grunde muß auch eine dunkle, zwischen zwei hellen sich befindende Fläche, schmaler erscheinen, als sie wirklich ist, z. B. ein Fensterrahmen. Wenn man an irgend einer solchen Granzlinie das Licht vom Auge abhält, so verschwindet die Lichtscheibe und der dunkle Körper wird jetzt hier gefühlt; er scheint auf die ihm gebührende Stelle einzuschreiten. Da solche Bewegungen, die bei fixirtem Auge und Lichtpunkte sich zeigen, vielleicht einen Einwurf gegen die Stabilität der Richtungslinien abzugeben scheinen könnten, so müssen wir hier einige besprechen, um das Gegentheil zu beweisen.

Die Richtungslinie des Lichtpunktes  $f$  (Fig. 6 Taf. II) am Rande eines entfernten Fensterrahmens  $f$  fällt auf  $c$  als Mittelpunkt der Scheibe  $do$ , und das Bild des inneren Rahmens  $gc$  scheint sich schon bei  $o$  zu endigen. Schiebt man nun den Finger  $h$  vor's Auge, so scheint der Rand  $f$  in derselben Richtung, als wenn ihn der Finger fortziehe, sich zu bewegen, und er wird convex. Dies kommt aber augenscheinlich davon, daß der Finger  $h$  den Theil  $csio$  des Lichtkegels, welcher den Theil  $co$  der Lichtscheibe bildete, abschneidet, also das dunkle Bild des Rahmens  $f$  nicht von  $g$  bis  $o$ , sondern bis  $c$ , nämlich so weit wie es sich wirklich erstreckt, jetzt gesehen wird. Auch erscheint es jetzt, da es von seiner Licht-

scheibe entblößt ist, viel deutlicher: deswegen bringen auch die Kurzsichtigen ihre Augenlieder an einander, wenn sie deutlicher sehen wollen. Bringt man zwei sehr entfernte oder dicht vor dem Auge gegen eine helle Wand gehaltene Fingerspitzen leicht gegen einander, so sieht man in dem Augenblicke, als man ihre Berührung fühlt, daß sie durch einen von beiden Seiten hervorschießenden schmalen dunkeln Streifen sich verbinden, und durch ihn abgesondert zu seyn scheinen. Solche Gestalt müssen aber auch die Bilder der Finger auf der Retina haben, weil nämlich die Lichtpunkte an den Rändern der Finger als eine Reihe lichter Scheiben über diese Ränder im Bilde, mit Ausnahme der Berührungspunkte *rs* (Fig. 7 Taf. II), hinwegreichen, also auch mit Ausnahme dieser Stellen die Fingerspitzen verkleinern, was nur wegen der zu großen Nähe am Auge, wodurch sich der Gesichtswinkel vergrößert, nicht bemerkt wird. Bringen wir die Finger aus einander, so zieht sich *rs* in die Finger zurück, weil jetzt auch zu dieser Stelle das Licht einen Zutritt bekommt, hier auch Lichtscheiben, welche *rs* decken, bildet, und also diese Stelle abrundet. Entfernt man die leise an einander gebrachten Finger langsam bis zur deutlichen Schweite, so verkürzt sich der Streifen *rs* stufenweise, bis man die Finger am Ende als einander berührende Halbkugeln sieht. Die Richtungslinien verändern hier also gar nicht ihre Lage. In der deutlichen Schweite fallen diejenigen Richtungslinien, die uns die Gränze des Fingers sehen lassen, auf diese Gränze des Retinabildes als Punkte; aus der undeutlichen Schweite fallen sie auch auf dieselben Stellen, aber als Mittelpunkte von lichten und dunkeln Scheiben, wovon aber nur die lichten gefühlt werden, so daß das Gefühl die Gränze des gesehenen Körpers nicht dort ansetzt, wo die Richtungslinien sie bestimmen, sondern dort, wo auf der Retina das Licht endet, und das Dunkle anfängt.

Wenn man nur zu einzelnen Punkten einer Scheibe auf der Retina, durch kleine Kartenlöcher Licht zulässt, wird sie augenscheinlich nur an dieser Stelle es fühlen; durch Verschiebung des Loches werden aber andere Stellen beleuchtet, und durch mehrere Löcher mehrere Stellen. Man bekommt dadurch Erscheinungen von Vielfältigungen und Bewegungen der Objecte bei fixirtem Auge und Gegenstände, die auch gegen die Unität und Stabilität der Richtungslinien sprechen würden, wenn das Gegentheil sich nicht nachweisen liesse. Sieht man durch ein bis an den Rand des Schlochs vorgeschobenes Kartenloch, so decken sich die auf derselben Richtungslinie befindenden Punkte *abo* (Fig. 1 Taf. II) nicht mehr (wie wir schon im fünften Absatze dieser Abhandlung sahen); das Object *a* scheint nach der entgegengesetzten, *o* aber nach derselben Seite wie die Kartenbewegung sich zu wenden, *b* steht stille, wenn es in der deutlichen Sehweite sich befindet. Die Ursache davon ist aber, dass jetzt die Retina von diesen Objecten in besonderen drei Stellen *rs* (Fig. 8 Taf. II) afficirt wird. Der Lichtpunkt *b* wirft nämlich seine Strahlen in der deutlichen Sehweite auf einen Punkt *c* durch oder ohne vorgehaltenes Kartenloch, weil alle Kegelstrahlen, sowohl insgesamt als einzeln, nach diesem Punkt trachten. Der Lichtpunkt *a* auf derselben Richtungslinie würde ohne Kartenloch die Scheibe *rs* mit ihrem Mittelpunkt auf *c* werfen; aber die Karte hält dieses Licht auf, und nur ein kleiner Theil durch das Loch, nicht in der Richtung der Richtungslinie, sondern in der des Kegelstrahls *azz*, in welcher auch der Schatten fallen würde, bekommt Zugang zu einem einzigen Punkte *r* der Scheibe *rs*, und hier, in der Entfernung von *c*, wird *rs* als besonderes Bild gefühlt. Zuletzt würde noch der auf derselben Richtungslinie sich befindende Punkt *o*, wegen der zu grossen Entfernung, auch eine Scheibe *rs* werfen ohne vorgehaltene Karte; durch das

Loch gelangen aber doch Strahlen, nicht in der Richtung der zugehörigen Richtungslinie, sondern in der der zugehörigen Kegelstrahls, nach den Punkt *s*, die auch als besonderes Bild gefühlt werden. Sieht man die Objecte durch zwei Löcher in der Karte, so erscheinen (wie es aus dem Scheiner'schen Versuch bekannt ist) die Objecte doppelt, ausgenommen das in deutlicher Schweife sich befindende, was man aus der Fig. 9 Taf. II, die nur eine Verdoppelung der Fig. 8 Taf. II ist, ersieht. Werden mehr Löcher angebracht, so vervielfältigen sich die Bilder. Alle diese Vervielfältigungen, Verschiebungen und Bewegungen der Bilder auf der Retina, die also als solche auch gefühlt werden, hängen gar nicht von irgend einer Veränderung in der Lage der zugehörigen Richtungslinie ab. Diese bleibt hier unverrückt zwischen dem fixen Lichtpunkte und dem Mittelpunkt der entsprechenden Lichtscheibe auf der Retina, der hier auch fix bleibt, weil alle beschriebenen Veränderungen nur um ihn herum stattfinden. Sie geschehen also in der Richtung der ändern, aber zu demselben Kegel gehörenden Strahlen, befolgen also die Richtung der Schattenbildung.

Bis jetzt haben wir nur im Gesichtsfelde die mittlere, mit der Augenaxe, also auch mit der Corneanormale zusammenfallende Richtungslinie betrachtet, die auch deswegen, weil der auf sie fallende Strahl ungebrochen in's Auge vordringen kann, gerade fortgeht. Welche Lage werden aber die seitlichen, die von der Augenaxe abweichenden Richtungslinien haben? Keine andere ist hier möglich, als auch eine auf die Corneanormale fallende, so daß also alle Richtungsstrahlen ungebrochen, also gerade in die Cornea eintreten. Denn wollten wir auf einen Augenblick zugeben, daß eine Linie *bn* (Fig. 10 Taf. II), welche ihre Richtung gegen einen tiefer im Auge liegenden Punkt, als es der Cornea-Mittelpunkt *z* ist, nimmt, und welche alsdann, gegen die Normale *dx* sich

befindende Punkt  $a$  den Punkt  $b$  nicht deckt. Unter übrigen zu demselben Ausgangspunkt  $b$  (Fig. 10 II) gehörenden Strahlen muß aber einer wie  $bc$  vorfinden, welcher gerade auf die Corneanormale fällt; dieser wird also der Richtungsstrahl des Lichtes  $b$  seyn, weil er die nämliche Lage wie  $bc$  (Fig. I H) hat, also auch wie dieser den Charakter, sich endo Bilder zu geben, besitzt. Wenn wir umgekehrt mit den meisten Schriftstellern zugeben wollten, die Richtungslinie  $as$  (Fig. 10 Taf. II) diessseits der Corneanormale  $mx$  fallen soll, so würde sie, gegen diese Normale sich beugend, den Weg  $st$  nehmen müssen; auch dann würde irgend ein Strahl  $at$  auf die Normale  $mx$  fallen, und kein anderer als dieser würde, aus auseinandergesetzten Gründen, die Richtungslinie Lichtpunktes  $a$  seyn.

Wenn aber die Richtungslinien nur auf die Corneanormalen fallen können, so muß ihr Kreuzungspunkt dem Mittelpunkt der Corneakrümmung liegen. Der Radius der Cornea im menschlichen Auge beträgt, aber, nach Sömmering, 3,3 Par. Linien in einem Auge, dessen Längsaxe 10 Linien hat. Dieser Kreuzungspunkt liegt also 3,3 Linien hinter dem vordersten Punkt der

Punkt  $a''$  noch weiter, ja bis in's Unendliche entfernen, und dann wird der Strahl, den wir von ihm durch  $x$  führen, auch zu gleicher Zeit die gerade den Lichtpunkt mit dem Bildpunkte verbindende Richtungslinie seyn. Bei stufenweiser, immer größerer Entfernung des Lichtpunktes  $a''$  würde aber der Bildpunkt auf der Linie  $oz$  gegen  $z$  fortücken, und bei unendlicher Entfernung des Lichtpunktes, wo er dann auf die Linie  $a'''zd$  fallen müßte, würde auch der Bildpunkt auf den Punkt  $z$  selbst fallen. Weiter könnte er schon nicht fortücken. Was hier aber in einer gewöhnlichen einflächigen Linse vorgeht, muß stattfinden in der natürlichen einflächigen Augenlinse; denn diese sind mathematisch-physische Verhältnisse von der Art, die kein Organismus, keine Lebenskraft abzuändern vermag.

Der Umstand, daß im Auge von einem bestimmten Punkte der Cornea nach einem besonderen Punkte der Retina, nur ein einziger Weg für die Richtungslinien, nämlich durch einen einzigen Punkt, durch den Mittelpunkt der Cornea, vorhanden ist; und der andere Umstand, daß auf die äußere gerade Verlängerung einer solchen Richtungslinie die Lichtpunkte selbst fallen müssen, wenn sie zusammenfallende Bilder hervorbringen sollen, und daß dazu ein jeder Lichtpunkt nur einen einzigen Strahl hergeben kann, die übrigen Strahlen desselben Kegels aber nur im Focus in die Richtungslinie schief eintreten, indem sie hier dieselbe schneiden, giebt dem ganzen Vorgange des Sehens Stabilität. Dadurch nur wird es möglich, daß einem jeden besonderen Punkt der Retina eine besondere Linie im Auge nach einem einzigen besonderen Punkt der Cornea entspricht, die man die fixe innere Augenrichtungslinie nennen könnte, und welcher wiederum während der Augenbewegung bald diese, bald jene Reihe von Lichtpunkten, aber auf einmal immer nur eine und diejenige entspricht, die mit der



geraden, in's Unendliche gehenden Verlängerung irgend einer inneren Augenrichtungslinie zusammentrifft.

Da die Richtungslinie eine gerade, durch den Mittelpunkt der Corneakrümmung gehende, den Lichtpunkt mit dem Bildpunkte verbindende Linie ist, so folgt daraus, daß man durch's Visiren nach einem lichten Object, z. B. nach einer Lichtflamme, vom Bilde auf dem Augengrunde ihre Lage auch im todtten Auge auffinden kann. Prof. Volkmann hat dergleichen Versuche am Kaninchenauge angestellt <sup>1)</sup>, und diese sind als Bestätigung des Obigen zu betrachten; denn die Visirlinien fallen wirklich auf die Corneanormalen, gehen also gerade durch den Mittelpunkt ihrer Krümmung. Volkmann berücksichtigt dies aber gar nicht, indem er in seinem Werke die Dimensionen des Kaninchenauges oft, aber nirgends die Corneakrümmung, angiebt, sie in den Zeichnungen, aber von weit kleinerem Radius macht, vielleicht damit das Kaninchenauge dem menschlichen ähnlicher werde; auch, S. 27 der Beiträge, und S. 345 Poggend. Annalen, ausdrücklich sagt: *„Es bedarf kaum der Erwähnung, daß es einen Lichtstrahl, der in dieser Richtung durch's Auge ginge, in der Wirklichkeit nicht giebt,“* was wohl nicht anders zu verstehen ist, als daß der Lichtstrahl nicht auf die Normalen der Cornea fällt, sich also in ihr brechen muß. Ich habe wirklich so wie Volkmann die Dimensionen des Kaninchenauges, welches ich hier in der wahren GröÙe und Gestalt abgebildet (Fig. 15 Taf. II) gebe, gefunden; nämlich Längendurchmesser  $7\frac{1}{4}$  Par. Lin., Querdurchmesser 8 Lin. Außerdem aber habe ich die Corneakrümmung berücksichtigt, und den Radius  $3\frac{1}{2}$  Lin. gefunden, wodurch

1) Neue Beiträge zur Physiologie des Gesichtsinnes, 1836, wovon das vierte Kapitel, welches eben diese Versuche enthält, in Poggendorff's Annalen, Bd XXXVII S. 342, abgedruckt worden ist.

also der Kreuzungspunkt der Richtungslinien wirklich so weit hinter die Cornea, also  $\frac{1}{2}$  Linie vor dem Mittelpunkt des Auges, wie es Volkmann gefunden hat, fallen muß.

Ich habe dergleichen Versuche auch mit Menschenaugen auf folgende Weise angestellt. Es wurde ein Auge auf einem Brette in der natürlichen Größe im Durchschnitte aufgezeichnet, und drei Linien durch den Mittelpunkt der Corneakrümmung, die mittlere in der Augenaxe, die anderen unter einem Winkel von 15 Graden mit der Axe, gezogen. Die zwei äußeren Linien fielen auf dem Augengrunde in einem Abstände von fast 4 Lin. von einander. Dieser Abstand wurde auf die Sclerotica übertragen, und hier zwei Spalten gemacht, in welchen die Choroiden mit ihrem Pigmente so leise als möglich, damit der Glaskörper nicht vordränge, an die Seite geschoben wurde. Auf diese Art bekam ich auf der nicht so durchsichtigen Sclerotica, wie sie im Kaninchenauge ist, doch zwei durchsichtige Stellen. Wird jetzt das Auge gerade über der Figur auf einen Ring von Wachs gesetzt und ein Wachstocklicht vor dem Auge bewegt, so sieht man die Spalte nur dann erhellt, wenn die Flamme auf der ihr entsprechenden, durch den Mittelpunkt der Cornea gehenden Linie sich befindet. An manchen, mit einer dünnen Sclerotica begabten Augen kann man auch den Versuch, ohne sie zu spalten, wiederholen; man bekommt hier freilich keine Bilder, aber doch dunkelrothe Lichtflecke, die, wie das Licht, sich hin und her bewegen, und wenn das Licht auf der nach vorn verlängerten Linie sich befindet, gerade über derselben nach rückwärts schweben.

Ich habe auch auf eine gleiche Art Versuche mit künstlichen Augen angestellt. Ich ließ mir nämlich viele Kugeln an den Enden von Glasröhren anblasen, alle ungefähr 10 Linien im Durchmesser. An einer Seite



aber wurde eine Stelle erwärmt und zu einem kleinen Kugelabschnitt ausgeblasen, der die Cornea nachahmte. Die entgegengesetzte Seite wurde matt gemacht und um die Cornea auf der Sclerotica ein Ring mit Oelfarbe aufgetragen. Diese mit Wasser angefüllten Augen hatten Corneakrümmungen von 2 bis 4 Lin. Radius, und aufgesetzt auf den Wachtring, gaben sie, wenn man vor ihnen Lichtflammen bewegte und die Stellungen ihrer Bilder oder Lichtflecke auf dem Augenrunde berücksichtigte, immer dasselbe Resultat; man konnte nämlich sich überzeugen, dass die gerade, Licht und Bild verbindende, Linie durch den Mittelpunkt der Corneakrümmung hindurchging.

Die Corneakrümmung ist also allein das, die Lage der Kreuzungspunkte der Richtungslinien bestimmende Moment in den Augen verschiedener Thiergattungen, welche sehr verschiedene Größen der Cornea im Verhältniss zur Sclerotica, wie wir das schon am Kaninchen (Fig. 15 Taf. II) und Menschenauge (Fig. 16 Taf. II) sehen, darstellen. Man kann also von der Lage des Kreuzungspunktes im einem auf die Lage desselben im andern nicht anders schließen, als bei Berücksichtigung des Radius der Cornea, und dann fällt der Kreuzungspunkt sehr verschieden gegen den Mittelpunkt des Auges aus. Wenn er im Menschenauge um  $\frac{1}{4}$  der ganzen Augenaxe vor diesen Mittelpunkt gerückt ist, so finden wir ihn im Kaninchenauge nur um  $\frac{1}{17}$  vor dem Mittelpunkt, und wir sehen, wenn wir einen Blick auf die Sömmerring'schen Tafeln werfen, dass er beim Wolf ganz in die Mitte, und beim Elephanten selbst hinter den Mittelpunkt des Auges fällt. Freilich könnte so ein Auge, mit den menschlichen Augenfeuchtigkeiten angefüllt, die Lichtkugelbüschel, selbst wenn die Strahlen parallel auffielen, in einem Punkt auf der Retina nicht mehr vereinigen; es muss hier also vielleicht ein anderes Verhält-

niss der Brechbarkeit der Augenmedia zur Luft vorhanden seyn, oder vielleicht die Linse nachhelfen, die wirklich in solchen Augen der Kugelgestalt näher kommt.

Wir haben gesehen, dafs, da die Richtungslinien auf die Corneanormale fallen, ihre Strahlen ungebrochen in's Auge eintreten; aber nur diejenige Richtungslinie, welche mit dem Augenaxenstrahl zusammenfällt, fällt auch auf die Normale der beiden Linsenflächen, und verändert ihren geraden Weg bis an die Retina nicht. Die von der Augenaxe abweichenden Richtungslinien aber, obgleich sie perpendicular durch die Cornea durchgehen, fallen doch weiterhin schief auf die Normalen der beiden Linsenflächen, werden also gebrochen, und weichen von den anfänglich eingeschlagenen geraden Weg ab. Da aber die Cornea oder eigentlich die durch die dünne Cornea eingeschlossene, und durch dieselbe gekrümmte wässrige Feuchtigkeit der hauptlichtbrechende Körper im Auge ist, und nicht die Linse, weil nämlich die Cornea aus dem dünnen Medium der Luft die Lichtstrahlen empfängt, die Linse aber mit einem viel dichteren umgeben ist, so mufs diese Abweichung der Strahlen in der Linse nur sehr klein seyn. Ausserdem hat die Linse eine solche Lage, dafs die Richtungsstrahlen im Zickzack durch sie gehen, und da die hintere Fläche stärker gekrümmt ist, so kann sie auch die von der vorderen Fläche wenig verrückten Strahlen fast in dieselbe Lage zurückbringen, als wenn sie vom geraden Wege gar nicht abgewichen wären. Wir wollen dies an einem Beispiele zeigen.

Die Refractionskraft ist, nach Brewster, wenn wir sie in der Luft mit 1,000 bezeichnen, in den wässrigen und gläsernen Feuchtigkeiten = 1,336, also fast so wie im Wasser nahe wie 3 : 4. In der Augenlinse aber ist sie 1,353, also gegen die andern Feuchtigkeiten, mit denen sie umgeben ist, nur wie 21 : 20. Nach Sömmering sind die Lage- und Gröfsenmaafse, wie wir das

an der Durchschnittsfläche eines Menschenauges (Fig. 16 Taf. II), die eine Copie der Sömmerring'schen (*de oculorum hominis animaliumque sectione horizontali commentatio*) ist, zeigen wollen, folgende: Der Augapfel-durchmesser in der Axe  $ab = 10$  Par. Lin. Cornearadius  $rd$ , der gleich hinter der Linse endet, 3,3 Lin. Abstand der vorderen Fläche der Linse von der Cornea 1,3 Lin. Axe der Linse 1,6 Lin. Radius der vorderen Linsenfläche  $hg$ , der schon hinter dem Augenmittelpunkt  $o$  endet, 4,2 Lin. Radius der hinteren Linsenfläche  $as$  2,4 Lin. <sup>1)</sup> Aus der Berücksichtigung dieser Data folgt, daß der mit der Richtungslinie auf die Corneanormale  $dc$  fallende Strahl beim Eintritte in die Linse gegen die Normale  $hg$  um  $\frac{1}{6}$  des Brechungswinkels, beim Austritt aus der Linse aber nach der andern Seite von der Normale  $as$  ab, um eben einen solchen Bruchtheil seines Brechungswinkels gebrochen wird. Da aber der Austrittswinkel wegen der größeren Krümmung der hinteren Linsenfläche größer ist als der Einfallswinkel in die

- 1) Die Bestimmungen der Größe des Augapfels und der Linse im todten Auge können als richtig betrachtet werden, weil es sich nicht einsehen läßt, daß diese zwar mit Flüssigkeiten angefüllten, aber rings herum verschlossenen und gleich ausgedehnten Organe große Formveränderungen durch den Tod erleiden könnten. Auf die Cornea drückt aber die Flüssigkeit nur einseitig, und ihre Krümmung könnte wohl im todten Auge, wo die durch Erhaltung und Verdunstung zusammengesogenen und verminderten Flüssigkeiten sie nicht so stark herausdrücken, flacher werden. Dies muß wirklich der Fall seyn; denn bei der Annahme der von Sömmerring angegebenen Ausmessungen und der Refraktionsgrößen würden nicht einmal parallele Strahlen auf der Retina sich vereinigen. Von einem 10 Zoll vom Auge entfernten Punkt könnten sie sich schon vereinigen, wenn wir die Corneakrümmung statt 3,3 nur 3 ansetzen. Ein, vor den Augen lebender Menschen gehaltener Kartenausschnitt von 3 Lin. Radius, von der Seite angeschaut und mit der Corneakrümmung verglichen, scheint auf die meisten Augen zu passen; einer von 3,3 scheint zu groß zu seyn.

vordere Fläche, so kann der austretende Strahl nicht parallel mit dem Eintretenden gehen, sondern muß mehr abweichen, so daß er ungefähr an dieselbe Retinastelle  $c$ , wo er, ohne Brechung in der Linse, hinlangen würde, ankommen muß.

Dieses Beugen auf entgegengesetzte Seiten der Lichtstrahlen könnte aber hier einen besonderen Nutzen haben, nämlich das Auge zu achromatisiren, indem dadurch die Dispersionsgrößen, wegen Abweichung von der Normale und wegen Natur der Farbe, sich ausgleichen könnten. Wir haben bis jetzt die Farbenzerstreuung, um die Erklärung nicht zu verdunkeln, gar nicht berücksichtigt; aber sie muß auch im Auge stattfinden, weil sie nur eine nothwendige Folge der Refraction ist. Wird der Strahl  $dx$  (Fig. 17 Taf. II) in der vorderen Linsenfläche  $fl$  gebrochen, so muß er sich gleichzeitig in seine sieben Farben zerlegen. Der äußerste und brechbarste violette Strahl  $v$  wird näher an die Normale  $hg$  rücken als die anderen; am wenigsten aber wird es der rothe Strahl  $r$  thun. Dadurch aber könnten sie sich nicht mehr in einem Punkt auf die Retina vereinigen, sondern würden das Farbenspectrum  $mn$  hervorbringen, wenn sie weiter so fortgingen. Sie werden aber von der hinteren Linsenwand  $kl$  auf die andere Seite gebrochen, und dadurch müssen sich die zerstreuten farbigen Strahlen einander wieder nähern; denn wenn der jetzt weniger brechbare rothe Strahl  $r$  nach  $z$  gebogen wird, so muß der brechbare violette Strahl  $v$  von der Normale  $as$  mehr abweichen, und er wird dadurch den ersten irgend wo schneiden können, etwa in  $z$ , wo sich also die farbigen Strahlen in einem weißen zurück vereinigen würden. Es kommt hier also alles darauf an, daß durch die erste Beugung der violette Strahl von der Augenaxe mehr als der rothe abweicht, durch die zweite Beugung aber der rothe weniger als der violette sich dieser Axe nähert, zuletzt aber in  $z$  beide sich von der Axe gleich

entfernt befinden. Augenscheinlich könnte kein solcher Erfolg eintreten, wenn die Brechungen nur nach einer Seite geschähen, denn alsdann müßten die farbigen Strahlen in den nachfolgenden Brechungen immer mehr auseinandergehen. Wenn aber in den künstlichen achromatischen Linsen, die nur nach einer Seite die Strahlen brechen, doch der Achromatismus zu Stande kommt, so liegt es, wie bekannt, nur daran, daß im Kron- und Flintglase die Größen der Dispersionskraft und Refraktionskraft nicht in demselben Verhältnisse zu einander stehen.

Freilich findet das Gesagte nur für die auf die Richtungslinien fallenden und nicht weit davon entfernten Strahlen desselben Kegels statt, weil nur diese im Zickzack durch die Augenmedia gehen, aber diese eben sind die wichtigsten für's Sehen. Daß die von der Richtungslinie sehr entfernten Strahlen wirklich farbig erscheinen, haben wir schon oben im dritten Absatze gesehen. Es kann also auch nicht stattfinden bei den Strahlen, die in das seitliche Gesichtsfeld fallen, weil diese eben von der Richtungslinie  $z$  (Fig. 24 Taf. II) entfernt sind und wie  $bc$  nur auf eine Seite aller Normalen fallen, also auch nicht im Zickzack, sondern, bei jeder neuen Brechung, fortwährend mehr und mehr auf eine und dieselbe Seite gegen die Augenaxe beugen. Aber das seitliche Gesichtsfeld des undeutlichen Sehens ist einmal ein Zusammenfluß aller Unvollkommenheiten, es mag also dazu noch die des Nicht-Achromatismus kommen. Selbst nahe dem deutlichen Gesichtsfelde könnte wohl schwerlich ein vollkommenes Zusammentreffen aller Farbenstrahlen auf der Netzhaut stattfinden. Aber dies ist auch keine nothwendige Bedingung dazu, denn es ist ja selbst in dem künstlichen Achromatismus unserer Fernröhre nicht der Fall; ein nur vermindertes Auseinandergehen der farbigen Strahlen ist schon hier eine Abhülfe. Wenn also auch im Auge, auf die hier nachgewiesene Art, das Uebel

der Farbenzerstreuung nicht aufgehoben ist, so könnte es vielleicht doch bis zu einem nicht leicht sichtbaren Grade vermindert seyn.

Dieses wäre also ein Achromatismus durch identische Mittel, nämlich von gleicher proportionalen Refraktions- und Dispersionskraft hervorgebracht, also kein Dollond'scher, sondern ein Euler'scher; und die Augenlinse hätte also, neben anderen freilich nicht erwiesenen, auch noch diesen Nutzen, daß sie das achromatisirende Organ des Auges wäre. Ihre schichtartige Bauart könnte auch, nicht nur um den Fehler der Abweichung der Strahlen wegen der Kugelgestalt, sondern auch den wegen der Brechbarkeit zu beseitigen oder wenigstens zu vermindern, nöthig seyn. Wohl eher möchte sie diesen Nutzen leisten können, als eine Rolle beim Accomodationsvermögen des Auges spielen; weil sie (wegen des kleinen Grades ihrer brechenden Kraft im Allgemeinen, sowohl durch ihre Form- als Lageveränderung, die, weil sie rings herum befestigt ist, nur in sehr kleinem Grade und Gränze, stattfinden könnte), die Richtung der Strahlen nur sehr wenig abzuändern im Stande wäre. Dagegen würden auch Beobachtungen sprechen, wo das Accomodationsvermögen auch bei Staaroperirten, also in Augen ohne Linsen, noch zurückblieb.

Aus dem Umstande, daß die Richtungslinien sich fast 2" vor dem Mittelpunkt des Augapfels auf dem Augenaxenstrahl vereinigen, folgt, daß, wenn das Auge sich um seinen Mittelpunkt dreht, keine fortwährende Deckung derselben Objecte stattfinden kann. Denn, da der Vereinigungspunkt in  $z$  (Fig. 18 Taf. II) liegt, so wird man, in der Richtung der Augenaxe  $zd$  nach  $b$  blickend, den verdeckten Gegenstand  $a$  nicht sehen,  $c$  und  $d$  aber würden sichtbar im rechten Gesichtsfelde. Würde man aber das Auge nach  $d$  richten, so müßte  $c$  sich hinter  $d$  verstecken, und also aus dem Gesichtsfelde verschwinden,  $a$  aber neben  $b$  im linken Gesichtsfelde



felde auftauchen. Es scheint, daß dies während der Bewegung des Auges ein fortwährendes Wirren der Gegenstände hervorbringen müßte. Es ist dies aber nicht der Fall, wie uns die tägliche Erfahrung zeigt. Wir sehen vielmehr alle Gegenstände still neben einander stehen, wenn wir von dem einen zu dem andern die Augen wenden. Wenn man zwei Lichte hinter einander so stellt, daß sich die Flammen decken, so kann man das Auge hin und her bewegen, und doch, wenn die Lage des Kopfs sich nicht verändert, bleiben sie bedeckt, obgleich sie an verschiedenen Stellen des Gesichtsfeldes erscheinen. Die Gegenstände scheinen sich also in jeder Lage des bewegten Auges zu decken.

Dieser Widerspruch ließe sich aber anders nicht heben, als durch die Annahme, daß das Auge nicht um seinen Mittelpunkt, sondern um den Kreuzungspunkt der Richtungslinien  $z$  (Fig. 19 Taf. II) sich drehe, was auch Volkmann annimmt. In diesem Falle aber müßte sich der Augenmittelpunkt von  $x$  nach  $x'$  verrücken, und das Auge, den Axenstrahl von  $a$  nach  $b$  wendend, müßte sich nach der entgegengesetzten Seite zurückziehen, also nach dem entgegengesetzten Augenwinkel, wo es hinzieht. Während einer starken Augendrehung aus dem einen in den andern Augenwinkel fühlen wir aber gar kein Augenverrücken, wenn wir unsere Finger in die Augenwinkel leise einsetzen. Bei zu starker Bewegung scheint es zwar, als wenn die Finger einen Druck, ein Vorrücken des Augapfels fühlten, aber nach derselben Seite, wohin das Auge bewegt wird, nämlich in demselben Augenwinkel wo es hinsieht, also umgekehrt wie in der Fig. 19 Taf. II. Es ist auch anders nicht möglich. Der Muskel, der den Augapfel nach seiner Seite zieht, um ihn zu bewegen, könnte ihn wohl anziehen, aber nicht abstoßen. Daß aber die Augenkugel sich wirklich nur um ihren Mittelpunkt dreht, und daß dieser Punkt unverrückt den relativen Ort in der Augen-

höhle in jeder Lage des Sehlochs behält, zeigt der folgende Versuch, den ich schon im Jahre 1822 in einem Programme der Warschauer Universität (welches ich mit diesem Aufsatz der Redaction übersandt habe) in polnischer Sprache beschrieb.

Auf einem mit Papier überzogenen Brette, in der Form eines Quadranten (Fig. 20 Taf. II) von ungefähr 12 Zoll Radius, zieht man in gleichen Abständen Linien vom Umfange gegen den Mittelpunkt *a*, auf welchen 1 Zoll breite und 6 Zoll lange, aber dünne Metallblättchen *ab* (Fig. 21 Taf. II) perpendicular besetzt werden. Sie reichen vom Umfange bis zur Hälfte, befinden sich also in der Gränze des deutlichen Sehens für mittelmässige Myopen; für Weitsichtige müßte der Quadrant grösser seyn. Alle von der Mittellinie *da* abgewandten Seiten der Blättchen werden mit einer andern Farbe, als die ihr zugewandten, etwa roth und blau, und die vorderen Ränder schwarz angestrichen. Die vordere Ecke des Brettes *c* (Fig. 21 Taf. II) wird abgenommen, damit nach dem Abbeugen des Papierwinkels, wo sich der Kreuzungspunkt *a* befindet, das Auge näher an die Blättchen gerückt werden könne. Ein 1 Zoll breiter und  $1\frac{1}{2}$  Zoll im Durchmesser haltender Ring (Fig. 22 Taf. II) wird vorn so zugeschnitten, daß er an den Orbitalrand angesetzt, denselben in einigen entgegengesetzten Punkten berührt, dadurch fixirt wird, und das Auge, ohne es zu drücken, frei hindurchschauen läßt. In den Einschnitt *m* wird das Brett (Fig. 21 Taf. II) mit dem abgestumpften Ende *e* so fest eingeschoben, daß das Verschieben nur durch Kraftanwendung geschehen kann. Der Ring wird alsdann vor's Auge angelegt und gerade durchgeschaut. Wenn man jetzt das mittelste, in der Augenaxe sich befindende Blättchen betrachtet, so wird man nichts von seinen Seiten sehen können, der vordere Rand wird hier das ganze Blättchen decken, ein *Deutlich*, daß sich das mittelste Blättchen auf der Augen-



aren-Richtungslinie befindet. Wendet man jetzt das Auge nach der Seite, so wird man diese oder jene Farbe an den Blättchen sehen. Verschiebt man aber das Brett in der Spalte *m* (Fig. 22 Taf. II) etwas hin und her, so bekommt es am Ende eine solche Lage gegen das Auge, daß dieses, nach allen Seiten gewendet, nur die vorderen Ränder der Blättchen, und keine Farben sehen wird. Jetzt treffen also alle Augenaxen-Richtungslinien mit den Linien *bc* (Fig. 20 Taf. II) zusammen, und ihr Vereinigungspunkt muß also auch auf den Mittelpunkt *a* an der Papierecke fallen. Dieser Punkt ist auch der, während der Augenbewegung, fixe, oder der Drehpunkt des Auges.

Um jetzt die Tiefe dieses Punktes hinter der Cornea zu bestimmen, ist nöthig eine Veränderung an dem Ringe anzubringen. Ueber dem Einschnitt *m* (Fig. 22 Taf. II) wird ein zweiter *n*, aber nur an einer Seite, angebracht, ungefähr in der Mitte des Ringes, in der Höhe der Augenaxe, auf welchem einige Rosthaare angebracht werden, und geradüber macht man den Strich *s*. Während der Experimentirende den Quadranten vor's Auge bringt, bemerkt ein Assistent von der Seite durch den Spalt *n*, wie tief die Cornea in den Ring eindringt. Er stellt sich nämlich so, daß sein Augenaxenstrahl *ks* (Fig. 23 Taf. II) gerade die Cornea streift, und bemerkt dasjenige Haar, durch welches der Strich *s* gedeckt wird, ohne es von der Cornea zu seyn, der aber an sie streift, so daß sein Axenstrahl die Tangente der Cornea am vordersten Punkte wird. Nach dem Absetzen des Quadranten vom Auge wird neben demselben Haare ein feiner Stift nach der Linie *s* eingeschoben, der also in die Lage des früheren Tangentenstrahls kommt. Die nach unten gebeugte Ecke des Papiers wird ausgestreckt, und der Punkt *x*, wo der Stift *ks* (Fig. 20 Taf. II) die Linien *da* durchschneidet, angemerkt. Die Entfernung des Punktes *a* vom Punkte *x* giebt uns also den Abstand

des Kreuzungspunktes der Augenaxen - Richtungslinien von dem vordersten Punkte der Cornea im Auge.

Aus vielen, sowohl an meinen eigenen, als auch an den Augen anderer erwachsenen Individuen angestellten Versuchen ergab es sich, daß, obgleich man, wegen der mehr oder weniger tiefen Lage der Augen das Brett in dem Ausschnitt *m* verrücken mußte, wodurch auch die Corneatangente auf andere Haare fiel, der Stift *ks* doch fast immer auf den Punkt *x* (Fig. 20 Taf. II) kam, und die größte Differenz kaum einen Millimeter betrug. Der Abstand aber des Punktes *a* von *x* war 5 Par. Linien. Dies ist aber auch die Entfernung des Mittelpunktes des Auges vom vordersten Punkte der Cornea, nach Sömmerring. Die Augenaxen - Richtungslinien kreuzen sich also, während der Augenbewegung, im Mittelpunkte des Augapfels, und dieser ist also der Drehpunkt oder der relative Ruhepunkt des sich bewegenden Auges, welches als Kugel sich so bewegt, daß es seinen Fettpolster nirgends aus der Stelle drängt.

Wenn aber das Auge während seiner Bewegung um den eigenen Mittelpunkt sich dreht, und in diesem dann die Augenaxen, aber nicht die übrigen Richtungsstrahlen sich kreuzen (weil letztere es zwei Linien vor dem Mittelpunkt thun), so folgt daraus, daß die in dem Augenaxenstrahle sich deckenden Objecte während des Wendens des Auges sich wirklich aufdecken müssen, wie wir das an (Fig. 18) zeigten, dies aber zwar nicht wegen der kleinen Differenz, als vielmehr wegen anderer Umstände, nicht sichtbar wird. Das Verschieben des Kreuzungspunktes der Richtungslinien *z* (Fig. 18 Taf. II) würde nämlich, wenn das Auge, aus der Axe nach dem Augenliedwinkel zu, um 90 Grade sich drehte, fast zwei Linien betragen, und eine solche große Differenz müßte also sichtbar werden, wenn nicht andere Umstände es verhinderten. Diese aber sind: 1) die Beschränktheit der deutlichen Schweite, und 2) die Be-

beschränktheit des deutlichen Gesichtsfeldes, die beide das deutliche Sehen auf einer kleinen Strecke, die erste auf der Linie der Augenaxe und die zweite auf einer den Augenaxenstrahl perpendicular durchschneidenden Fläche, reduciren. Die daraus entspringende Undeutlichkeit läßt also die Verschiebung der Objecte nicht fühlen. Denn, um sich von ihrem Daseyn zu überzeugen, wäre es erstens nöthig, zwei sich deckende Lichtpunkte, einen dicht am Auge und den andern weit entfernt, zu betrachten. Aber aus solchen Entfernungen werfen ja die Lichtpunkte keine Bildpunkte auf die Retina, sondern nur undeutliche Lichtscheiben, und es ist schwer zu fühlen, ob solche gerade übereinanderfallen oder nicht. Beim gewöhnlichen Dioptrivisiren fühlt man auch den Lichtpunkt der Oeffnung als eine lichte Scheibe, und das in deutlicher Schweite ausgespannte Haar als eine schwarze Linie, die man auf die Mitte der lichten Scheibe zu bekommen sucht. Dies würde übrigens auch für unseren Zweck hinreichend seyn, aber hier kommt der zweite Umstand, der dies nicht zuläßt. Man soll nämlich den in der Augenaxe angestellten Versuch, ohne das Auge zu verrücken, von der Augenaxe so viel als möglich entfernt, in dem seitlichen Gesichtsfelde wiederholen. Aber hier sehen wir, selbst in der Entfernung des deutlichen Sehens, undeutlich, können also unmöglich bestimmen, ob sich das Haar und die Mitte der Visirscheibe über einander befinden oder nicht. An diesen beiden Umständen scheitert die Sicherheit aller dergleichen Bestimmungen, und an ein sicheres Ausmessen des Richtungslinienwinkels ist gar nicht zu denken.

Doch zeigt der folgende Versuch, daß, während des Augenwendens, die in der Augenaxe früher gedeckten Objecte wirklich auseinandergehen, wenn man sie in das seitliche Gesichtsfeld bekommt. Richtet man nämlich das Auge auf eine Lichtflamme und schiebt vor's Auge ein Karteublatt, so, daß dadurch eben die Flamme un-

sichtbar wird, so erscheint sie doch, wenn man das Auge von der Karte etwas abwendet. Wenn in dieser Augenlage die Bilder der Flamme und des Kartentandes sich noch wie früher decken sollten, so müßte die Flamme nicht erscheinen. Man könnte aber vermuthen, daß die zwei Scheiben von den Objecten auch noch jetzt gerade auf einander fallen, die lichte aber nur gefühlt werde. Daß diese Vermuthung aber nicht begründet sey, zeigt der Versuch mit umgekehrt beleuchteten Objecten; wenn man z. B. ein Licht neben dem Auge so stellt, daß die vordere Kartentfläche beleuchtet wird, und man sie vor einem dunkeln Streifen verschiebt, so kommt er doch zum Vorschein, wenn man das Auge abwendet. Auch gleich beleuchtete oder verschiedenfarbige Flächen geben dasselbe Resultat, nur ist die Verschiebung schwieriger zu sehen. Die in der Augenaxe sich deckenden Objecte hören also wirklich auf sich zu decken, wenn sie bei fixirtem Kopfe mit abgewendetem Auge betrachtet werden.

Wir haben eben gesagt, daß, da man nur in der Richtung der Augenaxenlinie und nicht weit davon deutlich sieht, an ein Ausmessen durch's Visiren des Winkels der Richtungslinien, die in das undeutliche Gesichtsfeld schon fallen, gar nicht zu denken sey. Dieser, der sogenannte Gesichtswinkel kann, obgleich durch stabile Richtungslinien gemessen, doch selbst nicht stabil seyn; denn beim ruhenden Auge würde sein Scheitel durch die seitlichen Richtungslinien in den Mittelpunkt der Cornea, bei bewegtem Auge aber durch die immer eine andere Lage annehmenden mittleren Augenaxen-Richtungslinien in den Mittelpunkt des Auges selbst versetzt seyn. Bei kleinen Winkeln kann aber dieser Unterschied, weil er selbst zu klein ausfällt, gar nicht gefühlt werden, bei größeren, wo er es seyn könnte, sieht man aber diesen Unterschied sammt den Objecten nicht mehr deutlich, wie schon oben gesagt worden ist. Wie kommt es aber, daß Physiker und Astronomen sich gar nicht

daran kehrend, was Physiologen über den Gesichtswinkel sagten, in der Praxis so sicher die optischen Winkel bestimmen? Weil sie diesen Winkel nicht in ihrem Auge, sondern außerhalb desselben mit Instrumenten messen, ihr Auge aber nur dazu brauchen, um eine gerade Linie durch die sich deckenden Objecte zu ziehen, mit einem Worte, um nur zu visiren. Denn, um im Auge einen Winkel zu messen, muß man ja gleichzeitig zwei Reihen sich deckender Lichtpunkte betrachten, hier aber geschieht dies mit verschiedenen einzelnen nach einander, wozu nur die auf den Augenaxen-Richtungsstrahl fallende einzig und allein benutzt wird. Indem man dies zuerst mit einem Lichtpunkt und zwei Dioptrerpunkten, nämlich Loch und Haar, wo sich alle decken, versucht, und dann dasselbe an einem anderen Lichtpunkt mit anders gestellten Dioptrerpunkten wiederholt, bekommt man zwei vor dem Auge sich kreuzende Linien, deren Winkel der gesuchte ist. Dieser Winkel kann aber nur mit dem, welcher seinen Scheitel im Mittelpunkt des Auges hatte, zusammenfallen. Wenn man aber auch in den Fernröhren mit ruhendem Auge und gleichzeitig mittelst zweier durch zwei gespannte Fäden gehende Richtungslinien den Winkel sicher abnehmen kann, so geschieht dies aus dem Grunde, daß hier künstlich zwei deutliche Schweiten hervorgebracht werden; die eine entfernt im Focus des Objectivs, in welcher wir den Gegenstand deutlich sehen, die zweite im Focus des Oculars, in welcher wiederum die Fäden deutlich gesehen werden. Hier findet also nicht, wie beim Dioptr, ein Decken von Punkt und Schreiben statt, sondern eins von Punkt und Punkt, und noch dazu eines sehr entfernten und eines fast dicht vor das Auge gebrachten.

(Schluß im nächsten Heft)

IV. *Einige nachträgliche Bemerkungen zu meinem Aufsatz über Ergänzungsfarben;*  
*von G. Osann.*

Eine Note des Hrn. Plateau, so wie ein Paar neue Beobachtungen über Ergänzungsfarben haben mich veranlaßt folgende Zeilen niederzuschreiben. Hr. Plateau hat sich (dies. Ann. Bd. XXXVIII S. 626) beschwert, daß ich in einem, vor einiger Zeit in diesen Annalen veröffentlichten Aufsatz über diesen Gegenstand, seiner Ansicht hierüber auf eine irrthümliche Weise gedacht, und ihm grobe Irrthümer begangen zu haben vorgeworfen habe. Ich habe seine Abhandlung (dies. Ann. Bd. XXXII S. 543) nochmals durchgelesen, finde mich aber nicht veranlaßt meine im obigen Aufsatz ausgesprochene Ansicht zurückzunehmen. Ich sprach mich dahin aus, daß das Verhältniß der Ergänzungsfarben zu einander dasselbe seyn müsse, wie das der anderen, d. h. daß, wo diese zusammengebracht, weiß, grün, violett etc. geben, auch jene ein Gleiches thun müssen. Dagegen nimmt Herr Plateau (dies. Ann. Bd. XXXII S. 544 Z. 26) von diesen gerade das Gegentheil an. Er sagt daselbst: »In dem Falle, wo die Verbindung der wirklichen Farben Weiß erzeugt, bringt die Verbindung der zufälligen den Gegensatz des Weiß, d. h. Schwarz, hervor.« Ich glaube ferner in demselben Aufsatz gezeigt zu haben, daß die Thatsachen, von welchen Plateau glaubt, daß sie diese Ansicht begründen, sich nicht gut nach der gangbaren Farbentheorie erklären lassen. Ebendasselbst habe ich die Ergänzungsfarben in drei Klassen eingetheilt, nämlich: in zufällig complementäre oder subjective Farben, in farbige Schatten, und diejenigen, welche beim Durchgang des Lichtes durch durchsichtige Mittel ent-



stehen. Von letzteren habe ich im angeführten Aufsatz durch Versuche gezeigt, daß sie durch Zersetzung des Tageslichtes entstehen, also objectiver Natur sind.

In Betreff der farbigen Schatten hatte ich einen Versuch beschrieben, welcher als ein indirecter Beweis für die Objectivität derselben angesehen werden kann. Des Zusammenhangs mit dem Nachfolgenden wegen will ich ihn kürzlich wiederholen. Man erzeugt auf die bekannte Weise, indem man zwischen zwei Lichtflammen, vor deren einer ein farbiges Glas gehalten wird, einen Stab aufsteckt, zwei complementär gefärbte Schatten. Betrachtet man nun den von der ungefärbten Lichtflamme beschienenen Schatten durch eine Pappröhre, deren Durchmesser die Breite des Schattens hat, so sieht man ihn eben so gefärbt, als wenn man ihn ohne dieselbe betrachtete. Da nun bei diesem Versuch das farbige Licht, welches von der Seite kommen könnte, ausgeschlossen ist, so ist klar, daß die complementäre Färbung des Schattens objectiv ist.

Ich will jetzt einen directen Beweis für diesen Satz geben. Man wende anstatt der zweiten Lichtflamme, welche mit ungefärbten Strahlen den Schatten bescheint, eine monochromatische Lampe an. Die Strahlen der Flamme dieser Lampe werden nun mit einfachem, nicht zersetzbarem Lichte den Schatten erleuchten, und man wird, — vorausgesetzt, daß auch diese Erscheinung objectiver Natur ist — den Schatten mit der Farbe der Lichtflamme gefärbt erblicken. Das Ergebnis des Versuchs entspricht vollkommen dieser Voraussetzung. Dieser Versuch gelingt besonders gut bei Anwendung von grünem Glas und einer, gelbes Licht verbreitenden monochromatischen Lampe, wie man sie mit Weingeist und Chlornatrium erhält. Die rothe Färbung des Schattens, welche man, bei Anwendung von gewöhnlichem Kerzenlicht, erhält, verschwindet ganz, und man sieht ihn nur noch gelb gefärbt. Weniger gut gelingt dieser Versuch mit anderen



farbigen Gläsern, weil die Flamme ausserhalb auch noch etwas Blau enthält.

Ich komme nun zur dritten Klasse dieser Erscheinungen. Bei der wissenschaftlichen Auffassung derselben entsteht zuvörderst die Frage: giebt es Erscheinungen, welche es wahrscheinlich machen, daß im Auge, ohne daß Licht von aussen in dasselbe dringt, Licht- und Farbenerscheinungen entstehen? Für die Bejahung dieser Frage sprechen die Erscheinungen, daß man im Dunkeln, namentlich des Nachts durch Reiben des Auges eine Lichterscheinung hervorbringen kann; eben so sind die blauen und purpurnen Scheinbilder bekannt, welche man in kranken fieberhaften Zuständen im Dunkeln im Auge gewahrt. Dagegen spricht der Umstand, daß Phosphore durch Insolation, welche man geraume Zeit (ich habe noch keine Gränze beobachtet, ich meine hiermit nicht Tage, sondern Wochen) im Dunkeln aufbewahrt hat, und welche unter den gewöhnlichen Umständen durchaus nicht mehr leuchten, wieder leuchtend werden, sobald man sie erwärmt, entweder auf eine warme Platte wirft oder in warmes Wasser, nach diesem Leuchten aber nicht wieder durch Erwärmen dazu gebracht werden können, es müßte denn seyn, daß man sie zuvor wieder der Insolation ausgesetzt hätte. Verhindert uns nun anzunehmen, daß das Auge sich auf gleiche Weise verhält, um so mehr, da die Art des Leuchtens im Auge hervorzubringen ganz dem Verfahren, Phosphorescenz zu erregen, entspricht, nämlich durch Reiben und in fieberhaften Zuständen durch Erwärmen.

Zu diesen zufälligen Beobachtungen will ich noch zwei hinzufügen, welche mit grosser Wahrscheinlichkeit für die Subjectivität dieser Farbenerscheinungen sprechen.

1) Wenn man das Auge eine Zeit lang auf eine farbige Fläche richtet, so entsteht nicht augenblicklich in demselben der Zustand, welcher in ihm die complementäre Farbe erregen läßt, sobald es, von der farbi-

gen Fläche hinweggezogen, auf eine weiße oder schwarze Fläche gerichtet wird. Es ist nöthig, daß man das Auge erst eine gewisse Zeit lang auf die farbige Fläche fixirt, und es schien mir, als wenn diese Zeitdauer gerade so viel betrüge, als sie beträgt, während die complementäre Farbe sich im Auge hält. Dieser Umstand scheint mir für die Subjectivität dieser Erscheinungen zu sprechen; denn wäre, wenn dieser Zustand eintritt, bereits die complementäre Farbe im Auge, so müßte die farbige Fläche matter erscheinen, indem ein Theil des farbigen Lichts zu Weiß ausgeglichen würde.

2) Die Beobachtung, daß complementäre Farben auch erhalten werden, wenn das Auge, nach Betrachtung eines farbigen Gegenstandes, sich auf eine schwarze Fläche richtet, würde ganz entscheidend für die Subjectivität dieser Farben sprechen, wenn sie mit ganz reinem, vollkommen schwarzem Grund angestellt werden könnte. Um einen Versuch anzustellen, der diesen Anforderungen sich möglichst nähert, traf ich folgende Einrichtung. In einem dunkeln, von Innen schwarz angestrichenen Cabinet wurde in einem, an einer Seite offenen Kasten eine monochromatische, gelbes Licht ausgebende, Lampe gestellt, und vor der Oeffnung des Kastens eine Pappscheibe, in deren Mitte ein dreieckiger Einschnitt sich befand, hinter welchem ein gelbes Glas angebracht war. Es geschah dieß, um das gelbe Licht der Flamme durch das Hindurchgehen durch das gelbe Glas nochmals zu läutern. Nachdem ich ein Auge geschlossen und das andere eine Zeit lang auf das gelb erscheinende Dreieck gerichtet hatte, schloß ich es. Bei dem ersten Wiederholen des Versuches erschien keine complementäre Farbe, später aber, als ich den Versuch mehrmals wiederholt hatte, erhielt ich deutlich ein bläuliches Scheinbild im Auge. Ich habe diesen Versuch mit demselben Erfolg wiederholt, kann daher an der Richtigkeit der Beobachtung nicht zweifeln. Man sollte meinen, die geringe

Menge der blauen Lichtstrahlen, welche die Flamme noch enthält, wäre von der Oberfläche des gelben Glases vollkommen reflectirt worden. Sollte dieß wirklich der Fall seyn, so wäre hiermit die Subjectivität dieser Klasse von complementären Farben nachgewiesen. Begreiflicherweise würde man dann eine Erklärung nur vermittelt der Undulationstheorie zu geben im Stande seyn. Die Schwierigkeiten, welche bei Gründung einer solchen zu überwinden wären, sind groß, und dürfte wohl, wenn man nicht zur näheren Kenntniß der physischen Eigenschaften der Netzhaut gelangt ist, aufgegeben werden können.

---

V. *Ueber Becquerel's einfache Kette, deren Strom aus der Verbindung von Säure und Alkali entstehen soll; von Dr. Mohr.*

---

Der Becquerel'sche Apparat (diese Ann. Bd. XXXVII S. 429), worin aus der Verbindung von einer Säure mit einem Alkali ein starker elektrischer Strom entstehen soll, welcher seinerseits wieder zur Zersetzung anderer Körper benutzt werden könne, hat nun schon zu mehreren Discussionen Veranlassung gegeben, ohne daß man dieselben als geschlossen ansehen kann. Im 39sten Bande dieser Annalen habe ich durch eine Reihe von Versuchen nachgewiesen, daß aus der Verbindung von Säuren und Alkalien kein Strom entstehe; daß das Wasser die Stelle des Alkalis ohne Veränderung der Erscheinung übernehmen könne; und habe die Vermuthung geäußert, daß der wirklich beobachtete Strom von einer Nebenwirkung auf die salpetrige Säure herrühre.

Von diesem Apparate ist in dem sehr geschätzten Repertorium der Physik, von Dove und Moser, Bd. I S. 191, Bericht gegeben. Aus der Vergleichung des Da-

tums meines Aufsatzes (vom July 1836) geht hervor, daß mir das Repertorium, welches erst im Herbste 1836 hier in den Buchhandel kam, damals noch unbekannt war, und ich las mit Vergnügen die Worte des Berichterstatters (Hr. Prof. Moser), welche mit meinen Ansichten so vollkommen übereinstimmten. „Auf welche Weise, äußert Prof. Moser an jener Stelle, diese zum Theil sonderbaren Erscheinungen zu erklären sind, ist nicht leicht zu sagen. Becquerel giebt an, daß bei Verbindung von Säure und Alkali ein Strom entstehe, in Folge dessen das Alkali negative Elektricität, die Säure positive annimmt<sup>1)</sup>, und daß dieser Strom das Wasser zersetze. *Es muß jedoch bemerkt werden, daß es noch ein sehr zweifelhafter Punkt ist, ob die Verbindung einer Säure mit einem Alkali überhaupt einen Strom erzeuge; auf galvanischem Wege erzeugt sich ein solcher nur, wenn außer der Verbindung auch eine Zersetzung stattfindet, und diese letztere ist hier nicht erfüllt<sup>2)</sup>.*“ So weit die Worte des Hrn. Prof. Moser. Es wird nun in demselben Berichte einer Reihe von Versuchen Erwähnung gethan, welche Hr. Prof. Jacobi in Dorpat angestellt hat, und wornach derselbe den Becquerel'schen Versuch vollkommen bestätigt findet. Wäre mir dieser Bericht bekannt gewesen, so würde ich meinen obigen Aufsatz unterdrückt und ihn in eine Privatmittheilung an die geehrten Herausgeber des Repertoriums verwandelt haben, sowohl weil alsdann meine

1) D. h. gerade/ umgekehrt, da der elektronegative Sauerstoff am positiven Pole auftritt, so muß auch hier das Alkali, in welchem derselbe erscheint, als  $+$  elektrisch betrachtet werden.

2) Beiläufig bemerke ich, daß der im Repertorium, S. 195, beschriebene Apparat, wie auch Hr. Prof. Jacobi (Annal. XXX S. 73) ganz richtig bemerkt, durchaus nicht an diese Stelle gehört. Der Apparat befindet sich abgebildet auf der ersten Tafel zum Bd. XXXV dieser Annalen, Taf. I Fig. 12, und seine Wirkungsweise auf S. 222 und 223 desselben Bandes ausführlich von Faraday beschrieben.

Meinung schon von Hrn. Prof. Moser geäußert war, als auch, weil sich die bestehenden Differenzen brieflich hätten besprechen lassen, ehe sie veröffentlicht worden wären.

Natürlich fand sich Hr. Prof. Jacobi zur Widerlegung meiner Ansichten berufen, da sie mit seinen, mir freilich damals noch ganz unbekannten Versuchen im Widerspruche standen. Ich werde mich bei der Discussion dieser Entgegnung (diese *Annal.* Bd. XXXX S. 67) lediglich an die Sache selbst halten, und nicht das Urtheil des Lesers dadurch zu befangen suchen, daß ich den Leistungen eines Andern von vorn herein allen wissenschaftlichen Werth abspreche.

Das Erste, was ich bei der Wiederaufnahme dieser Versuche zu thun hatte, war, die Empfindlichkeit meines Galvanometers zu erhöhen. An die Stelle der einen dicken Nadel, welche ich bei den früheren Versuchen anwendete, nahm ich ein aus vier Nadeln bestehendes, beinahe astatisches System, welches in der Axe des Nervander'schen Galvanometers an Coconfäden aufgehängt wurde. Zwei gleichgerichtete Nadeln schwebten in der Dose, zwei entgegengesetzt gerichtete darüber und darunter; die oberste Nadel war etwas größer als die drei übrigen, und gab den Ausschlag in der Richtung des Erdmagnetismus. Von fünf Combinationen, worunter die feinsten Nähnadeln, war dieses System das empfindlichste. Die Nadeln waren, nach Nobili's Art, in einem Strohhalm befestigt.

Bei allen Versuchen blieb ein kleiner Gyrotrop eingeschaltet; er wirkt wie ein Condensator oder Schwungrad, indem durch das Umlegen des Bügels bei weitem größere Schwankungen erhalten werden, als der stetige Strom giebt.

Man bedürfte überhaupt keines sehr empfindlichen Instrumentes, wenn der Strom von den Ursachen herührte, denen er zugeschrieben wird, in Betracht der

großen Menge thätiger Substanzen. Nur zur Wahrnehmung solcher Ströme, die von unbedeutenden Nebenursachen herrühren, bedarf man empfindlicher Instrumente.

Um die Versuche, wobei zwei flüssige Körper auf einander wirken sollen, leichter ausführen zu können, stelle ich mir den von Faraday beschriebene Apparat mit der Scheidewand aus Papier (Ann. Bd. XXXV Taf. I Fig. 9 und 10) dar.

In den Glasbuden findet man lange, flache, viereckige Schlüsselchen von dickem Glase, welche zum Aufbewahren von Zahnbürsten dienen, und sich zum vorliegenden Zwecke vorzüglich eignen (Fig. 3 Taf. I). Ein solches Schlüsselchen wurde in der Mitte mit einem Löthkolben quer durchgesprengt, und die Kanten, die früher oben waren, auf Glas eben geschliffen, zwischen beide Halften ein Blatt Filtrirpapier eingeklemmt, und dieselben durch eine Schraubenzwinge sachte vereinigt; die durchlassende Papierfläche betrug 5 Quadratzoll. In die dadurch entstehenden, durch Papier getrennten Zellen wurden Platinelectroden (2 Zoll lang,  $\frac{1}{4}$  Zoll breit, mit Ducatengold an Platindrähte gelöthet) eingesetzt, und das Ganze mit Gyrotrop und Galvanometer leitend verbunden (Fig. 4 Taf. I).

Es wurden nun folgende Versuche angestellt:

1) In die beiden Zellen des Apparates wurden zu gleicher Zeit Aetzkali und verdünnte Schwefelsäure ( $\frac{1}{2}$  concentrirte enthaltend) eingegossen. Die Nadel wurde augenblicklich etwas beunruhigt, stellte sich aber bald wieder auf 0 ein. Wurde nun concentrirte Schwefelsäure zu der verdünnten gegossen, so trat dennoch nicht die geringste Bewegung mehr ein. Die Verbindung der Säure mit dem Kali ging heftig von Statten. Wurde eine Collectorplatte in der Flüssigkeit mit Zink berührt, so zeigte die heftige Bewegung der Nadel das Vorhandenseyn guter Leitung an.

2) Es wurde nun in eine Zelle Aetzkali, in die an-



'dere reines Wasser gegossen, wobei sich kein Strom manifestirte. Nun wurde Salzsäure in's Wasser gegossen, wobei sich ebenfalls keine Spur von Strom zeigte. Die verdünnte Salzsäure wurde mit einer Pipette aus der Zelle herausgezogen und concentrirte hineingegossen. Man bemerkte etwas kohlensaures Gas sich entwickeln, die Nadel zuckte unbedeutend, stellte sich aber schnell unbeweglich auf 0, wovon sie durch kein Umlegen des Gyrotropenbügels mehr abwich. An den sich herabsenkenden Streifen von gebildetem Chlorkalium, welche man bei der Durchsichtigkeit des Apparats sehr gut beobachten konnte, sah man, daß die Verbindung in Masse vor sich ging; allein die Nadel blieb unbeweglich. Vorhandene gute Leitung wurde durch Zink jedesmal am Ende des Versuchs, ohne etwas an den Drähten zu ändern, nachgewiesen.

3) Ammoniak und Salzsäure wurden in die beiden Zellen gegossen: es entstand eine Bewegung der Nadel in dem Sinne, als wenn im Ammoniak Oxydation stattfände; die Nadel kam aber schnell auf 0 zurück, und liefs sich nicht durch Stromwechsel davon bewegen.

Nach diesen Versuchen kann ich nicht mit Hrn. Jacobi übereinstimmen, wenn er sagt (Annal. Bd. XXXX S. 71): »Im Grunde läfst sich gegen einen, bei Verbindung von Säure und Alkali entstehenden elektrischen Strom nichts einwenden, als die Faraday'schen Gegenbehauptungen, die allerdings von sehr grossem Gewichte sind.«

Nicht die Faraday'schen Behauptungen sind von Gewicht, sondern die Faraday'schen Versuche, die jeder wiederholen kann, und die Entscheidung letzter Instanz, nämlich der Ausspruch der Natur. Es läfst sich aber auch im *Grunde* gegen einen solchen Strom das einwenden, daß bei der bloßen Verbindung von Alkali und Säure keine Zersetzung stattfindet, und also deswegen kein galvanischer Strom entstehen kann.



4) Es wurde nun in eine Zelle Aetzkali und in die andere Wasser gegossen, und dem Wasser rauchende Salpetersäure zugefügt. Es entstand sogleich ein starker Strom im Sinne, als wenn im Alkali Oxydation stattfände. Die Nadel fuhr auf  $60^{\circ}$ , und blieb nachher ruhig auf  $25^{\circ}$  stehen. Durch Umlegen des Gyrotrops wurden die Schwankungen, trotz des Hemmschwimmers der Nadeln, bis auf  $60^{\circ}$  gesteigert.

5) Es wurde nun in beide Zellen destillirtes Wasser gegeben, und in eine Zelle Salpetersäure gegossen; es entstand ein Strom in demselben Sinne, wie bei Versuch 4, nämlich, er deutete Oxydation im Wasser an. Wurde nun reines Kali in die andere Zelle zum Wasser gegossen, so schlug die Nadel im selben Sinne weit aus, und blieb auf einem höheren Grade stehen.

6) Es wurde nun in eine Zelle destillirtes Wasser, und in die andere die stärkste rauchende, hochrothe, ganz chlorfreie Salpetersäure gegossen. Die Nadel wich auf 20 Grade ab, und zeigte, wie oben, einen Strom vom Wasser zur Säure, d. h. Oxydation im Wasser. Ein Stückchen Zink in die Wasserzelle getaucht und den Collector berührend, vermehrte die Ablenkung, in die Salpetersäure getaucht, kehrte es sie um.

Das Filtrirpapier widerstand jedoch nicht lange der Wirkung der Säure; die Scheidewand platzte unten, und die Säure ergoss sich in einem Strome in's Wasser. In demselben Augenblicke schlug die Nadel über  $90^{\circ}$  aus und blieb constant auf  $55^{\circ}$  stehen. Wurde mit einem Glasstabe die Säure aufgeführt, so stellte sich die Nadel ruhig auf  $75^{\circ}$ .

7) Wurde sehr verdünntes Kali und oben solche Salpetersäure gleichzeitig in die beiden Zellen gegossen, so entstand ein sehr kräftiger Strom, welcher die Nadel lange auf  $36^{\circ}$  hielt.

8) Eben so sehr verdünnte Salpetersäure und rei-

nes Wasser brachten einen schwachen, aber deutlichen Strom im selben Sinne wie oben hervor.

9) Concentrirte Salzsäure und Schwefelsäure, jede für sich, mit Wasser in die Zellen gegossen, brachten hingegen keinen Strom hervor, eben so wenig, wie wenn man, statt Wasser, Kali genommen hätte.

10) Kochsalzlösung und verdünnte Schwefelsäure in beiden Zellen (Aimé's Apparat, dies. Ann., Bd. XXXVII S. 432) brachten anfangs die Nadel zum Schwanken, wie dies fast immer, sogar bei warmem und kaltem Wasser beobachtet wurde; die Nadel stellte sich aber rasch auf 0 ein, und zeigte dadurch die Anwesenheit jedes Stromes an.

11) Es wurde nun dem Versuche eine andere Form gegeben, um die Dazwischenkunft jedes fremdartigen Körpers zu vermeiden. Eine, in einen Winkel gebogene Glasröhre wurde halb mit Salpetersäure gefüllt und darauf reines Wasser gegossen (Fig. 5 Taf. II). Die Collectorplatte im Wasser zeigte, wie immer, Oxydation (+E) an.

12) Es wurde nun auf die Salpetersäure in beiden Schenkeln Wasser gegossen; man konnte nun willkürlich die eine oder die andere Collectorplatte in die Säure oder das Wasser bringen. Bei jedem Wechsel trat eine Aenderung des Stromes ein, so daß das Factum über jedem Zweifel steht.

Noch einfacher läßt es sich in jedem Glase darstellen, wo man über starke Salpetersäure eine Schicht reines Wasser gießt, ohne sie zu vermischen (Fig. 6 Taf. II). Die Platte im Wasser ist jedesmal + elektrisch.

13) Mit der Knieröhre wurden alle oben beschriebenen Versuche noch einmal wiederholt mit ganz gleichem Erfolge.

Betrachtet man nun die Quantitäten der hier wirkenden Stoffe, so geht aus dem Gesetze der festen Elektrolyse hervor, daß der überall, bei Gegenwart von

Salpetersäure beobachtete Strom nicht von der Hauptaction (der Verbindung der Säure mit Alkali) hervorgerufen seyn konnte. In der Glaszelle wirkten in wenigen Minuten mehrere Unzen Salpetersäure auf eben so viel Kali, auf einer Fläche von 5 Quadratzollen. Der Strom, der durch die Menge dieser Stoffe hervorgebracht wäre, hätte auf der anderen Seite eine gleiche Quantität Salpeter, oder ein elektrochemisches Aequivalent eines anderen Elektrolyten zersetzen müssen, oder gar nicht übergehen. Hätte man dem Strome durch Wiederholung des Apparates im Sinne einer Säule größere Intensität verschafft, so hätte er Elektrolyten zersetzen müssen; in unserem Apparate, wo ununterbrochene Metallleitung war, hätte er wenigstens übergehen und auf die Nadel eine entsprechende Wirkung äußern müssen. Nun aber bietet uns eine gleiche Ablenkung der Nadel, abweichlich mit einem kleinen Zinkplatinpaare hervorgebracht, ein vergleichbares Maass für die Summe der circulirenden Elektricität dar.

Ein Streifen Zink, 1 Linie breit,  $\frac{1}{2}$  Linie dick, mit einem der beiden Platincollectoren in destillirtes Wasser,  $\frac{3}{4}$  Zoll tief und  $\frac{1}{2}$  Zoll von einander entfernt, eingetaucht, lenkte die Nadel stetig auf 10 Grade ab, und durch Umlegen des Gyrotrops bis auf 20.

Zu 4 Unzen Wasser 4 Tropfen Schwefelsäure gesetzt und dasselbe Zinkstreifen hineingesenkt, lenkte stetig um 80 Grade ab.

Man vergleiche nun den Effect dieser kleinen Ketten, wo nach mehreren Stunden kaum ein Gasbläschen sich auf dem Platin zeigt, mit der geringen Wirkung so großer Quantitäten von thätigen Stoffen, als oben angewendet wurden, so fällt es in die Augen, daß von der Hauptaction entweder ein reichlicherer Strom oder gar keiner entwickelt werden muß. Hr. Prof. Jacobi protestirt zwar gegen die Auflegung des Faraday'schen Maßstabes der festen Elektrolyse; allein dies zeigt schon

deutlich, daß seine Beweisführung nicht Stich hält. Ströme, die nicht Intensität genug besitzen, um zu zersetzen, können unter Umständen geleitet werden, ohne zu zersetzen; allein Ströme, die, wie Hr. Prof. Jacobi zeigt, Jodkalium zersetzen, fallen unter das Gesetz. Hr. Prof. Jacobi hat bewiesen, daß in seinem Apparate an der Elektrode im Alkali innerhalb 5 Stunden 0,6 Kubikzoll Sauerstoffgas entwickelt worden sind, und postulirt nun mit einigem Triumphe, daß ihm jede fernere Widerlegung meines Aufsatzes erlassen werde. Es kommt jedoch hier durchaus nicht darauf an, ob das ausgeschiedene Gas Sauerstoff oder ein anderes ist; es muß bewiesen werden, daß es elektrolytisch ausgeschieden ist, und in diesem Sinne fordere ich mit Recht den ferneren Beweis: *daß ein einfaches Zinkplatinpaar, welches in 5 Stunden 1,2 Kubikzoll Wasserstoffgas am Platin ausscheidet, dieselbe Galvanometernadel ebenfalls nicht mehr als 36° ablenke.*

Es sind jedoch Gründe vorhanden, welche diese Voraussetzung nicht wahrscheinlich machen. Da bei Anstellung des reinen Becquerel'schen Versuches eine Ablenkung von 36° erhalten wurde, so schliesse ich mit Recht, daß Hr. Prof. Jacobi sich eines sehr empfindlichen Galvanometers bedient hat. Nun ist 1,2 Kubikzoll eine Menge Gas, welche die meisten unserer Zersetzungsröhren gar nicht fassen, und ein Versuch an meinem Galvanometer hat mir gezeigt, daß ich die Nadel 5 Stunden lang auf 36° halten kann, ohne den zwanzigsten Theil der genannten Gasmenge an dem Platin zu erhalten.

Sobald die Nadel um mehr als 36° bei einer so reichen Gasentwicklung abgelenkt wird, ist ein Theil des Gases nicht elektrolytisch ausgeschieden; dieser Hinweis ist durch die Versuche gar nicht beseitigt. Sollte jedoch das Resultat hervorgehen, daß der Sauerstoff elektrolytisch aufgetreten, so ist noch immer nicht der

Ursprung des Stroms in der Verbindung des Alkalis mit der Säure zu suchen. Sehr auffallend war in dieser Beobachtung, dass Salpetersäure auch mit Schwefelsäure einen Strom hervorbringt, jedoch von ganz verschiedener Richtung wie der vorherige.

14) Concentrirte Schwefelsäure wurde mit gleich viel Wasser verdünnt und erkalten gelassen, und darauf gleichzeitig mit einer ziemlich starken Salpetersäure in die beiden Zellen des oben beschriebenen Apparates eingegeben. Ich führe hierbei die specifischen Gewichte nicht an, weil ich gefunden habe, dass bei einem empfindlichen Galvanometer hierauf nicht viel ankommt, indem der Versuch unter den vielfachsten Abänderungen gelingt.

Es entstand sogleich ein Strom, welcher die Nadel um  $10^{\circ}$  ablenkte; allein in dem Sinne, als wenn nur in der Salpetersäure Oxydation stattfände. Wurde ein Zinkplättchen in die Schwefelsäure gebracht, so schlug die Nadel um; in die Salpetersäure getaucht, vermehrte es die Ablenkung.

Es wurde nun concentrirte Schwefelsäure in die verdünnte gegossen; die Nadel, die auf  $10^{\circ}$  stand, wurde heftig auf  $90^{\circ}$  geworfen und blieb nachher lange auf  $30^{\circ}$  stehen. Durch ferneren Zusatz von Schwefelsäure erhielt ich constante Ablenkung von  $40^{\circ}$ , also einen so starken Strom, als ihn Salpetersäure und Kali gegeben, jedoch von umgekehrter Richtung in Beziehung auf die Salpetersäure.

Die Entstehung des Stroms ist lediglich an die Gegenwart von Salpetersäure gebunden, und da zwei Säuren von der stärksten Art mit einander einen kräftigen Strom erregen, so muss der Antagonismus von Alkali und Säure durchaus als unwesentlich erscheinen, wie er sich denn auch bei allen anderen Versuchen, wobei Salpetersäure nicht vorhanden war, als solchen gezeigt hat.

Beim letztgenannten Versuche wurde zuletzt die Papierwand eingerissen, wobei sich die Schwefelsäure zu

unterst und die Salpetersäure darüber lagerte. Man konnte nun, wie oben, durch Heben und Senken der Collectoren den Strom umkehren; immer zeigte die Salpetersäure Oxydation an.

15) Endlich wurde der Becquerel'sche Versuch noch einmal in seiner ursprünglichen Form wiederholt, mit Anwendung des Thonpfropfens, und unter der Vorsicht, eine Gasentwicklungsröhre anzubringen; eine Vorsicht, die sich jedoch als überflüssig zeigte. Offenbar wirkt der Becquerel'sche Apparat unter weit ungünstigeren Verhältnissen, als die von mir oben angewendeten, indem die Thätigkeit der dabei concurrircnden Salpetersäure auf einer viel schmäleren Fläche, und durch das Hinderniß einer dichten, für Flüssigkeiten sehr impermeablen Substanz stattfindet. Es war deshalb im Voraus schon zu erschen, daß aus dieser Wiederholung des Versuchs kein neues Resultat sich ergeben würde.

Es wurde eine noch gelbliche Salpetersäure und ein sehr concentrirtes Actzkali angewendet, obgleich diese Bedingungen, die Hr. Prof. Jacobi empfiehlt, wie ich oben gezeigt habe, nicht durchaus nothwendig sind. Beim Schließen der Kette zeigte die Nadel sogleich eine starke Ablenkung in dem bekannten Sinne, und blieb auf  $20^{\circ}$  länger als 24 Stunden stehen. Der Strom war continuirlich im Gange; ich bemerkte jedoch weder an der Platinplatte im Alkali ein Bläschen, noch hatte sich ein solches während der ganzen Zeit des Versuches im Apparat angesammelt. Ich würde gegen die bestimmte Behauptung des Hrn. Prof. Jacobi diesen Fall vor der Hand nicht behaupten, weil es möglich wäre, daß dabei Verhältnisse stattfänden, die von mir übersehen wären. Nun aber habe ich den Versuch auf die mannigfaltigste Weise variirt, und immer dasselbe Resultat erhalten. Besonders aber muß ich das Factische jener Behauptung durch die Erfolge des Hrn. Prof. Pfaff in Kiel in Frage stellen. In seinem Werkchen: "Revision der Lehre



des Galvo-Voltaismus, aus dem im 40sten Bande dieser Annalen, S. 443, eine besondere Mittheilung sich befindet, liest man folgende Stelle:

„Ich stimme ganz mit Hrn. Mohr überein, daß Becquerel's Apparat durchaus keine Verschiedenheit von jedem anderen schwach wirkenden galvanischen Apparate hat. Der von ihm beobachtete Strom ist nur ein sehr schwacher etc. Damit stimmt die schwache Zersetzung, die der Strom giebt, überein, da ich an der Platinplatte in der Kalilauge nach mehreren Stunden erst einige Bläschen wahrnahm. Man ist also beinahe mit Hrn. Mohr gezwungen anzunehmen, daß sich Herr Becquerel habe täuschen lassen. In seinen übrigen Behauptungen kann ich aber nicht mit Hrn. Mohr übereinstimmen.“

Diese letztere ist mir sehr erklärlich, und betrifft, ausser einem einzigen Factum, nur Meinungsverschiedenheit und Ansichten. Hr. Pfaff bekennt sich unumwunden zur conservativen Parthei im Felde des Galvanismus, welches ihm, bei seinen bekannten grossen Leistungen unter der Aegide der Volta'schen Ansicht, nicht zu verargen ist. Da ich nun aus innerer Ueberzeugung dieser Ansicht nicht beipflichte, so werde ich hier keine dieser Differenzen berühren, die zu einem bloßen Meinungsstreite führen würden.

Hr. Prof. Pfaff erhielt mit Wasser und Salpetersäure keine Spur von Ablenkung der Magnetnadel; dies kann nur der Anwendung eines unempfindlichen Multiplikators zugeschrieben werden; denn ich erhielt in einem Falle sogar eine Ablenkung von  $75^{\circ}$ , die gewiss keinem Beobachtungsfehler zugeschrieben werden kann. Da ich jedoch mit meinem Zellenapparate mit sehr verdünnter Salpetersäure und Kali Ablenkungen von  $36^{\circ}$ , und in dem minder günstigen Becquerel'schen Apparate solche von  $20^{\circ}$  erhielt, Hr. Prof. Pfaff aber zwischen starker Salpetersäure und Kali nur einen Strom



von 10 bis 15° Ablenkung beobachtete, so ist klar, daß er ein viel unempfindlicheres Galvanometer anwandte. Wenn er eben so zwischen Salz- und Schwefelsäure auf der einen Seite, und Kali auf der anderen Seite einen Strom erhielt, so streitet dieß so sehr mit meinen mehr als zwanzig Mal wiederholten Versuchen, daß ich darauf aufmerksam machen muß, die anfangs jedesmal eintretende Bewegung der Nadel, die von, bis jetzt, unbekannten Einflüssen herrührt, nicht mit dem constanten Strom zu verwechseln. Während die Bewegung der Nadel zwischen Salzsäure und Kali schon nach wenigen Secunden aufhört, dauert jene mit Salpetersäure und Kali mehrere Tage lang ununterbrochen fort.

Wenn nun endlich Hr. Prof. Pfaff behauptet, daß man durch Eintröpfeln von Salpetersäure in Wasser, in welches zwei Platinplatten tauchen, keinen Strom erhalte, so ist dieß lediglich einem Fehler des Versuches zuzuschreiben, oder der Unempfindlichkeit des Meßinstrumentes. Sind beide Platten in ganz gleichmäßiger Art in der nun verdünnt werdenden Säure, so kann natürlich kein Strom entstehen, weil er in jeder Platte dieselbe, also in dem Drahte sich entgegenlaufende Richtung annehmen müßte. Gießt man aber die Säure näher an die eine Platte als an die andere, so entsteht in jedem Falle ein Strom, der sich durch Heben und Senken der Platten unbestimmte Male umkehren läßt. Dasselbe Resultat wurde im Zellenapparat in der geknieten Röhre und im gewöhnlichen Trinkglase erhalten; es kann also über dessen Existenz kein Zweifel mehr bestehen.

Es wurde nun noch die behauptete Zersetzung des Jodkaliums geprüft. Ohne den Multiplicator auszulösen, wurden zwei Drähte, mit Platinspitzen versehen, eingeschaltet, und dieselbe 1 Linie weit von einander entfernt, auf ein mit Jodkalium angefeuchtetes Papierstreichen aufgesetzt. Die Nadel blieb auf 0 stehen, und es zeigte sich kein brauner Jodfleck. Berührte man plötz-

lich die beiden Platinspitzen, so ging die Nadel auf  $20^\circ$  und blieb ruhig darauf stehen. Diese Trennung und Schließung mehr als zwanzig Mal wiederholt, gab immer genau dasselbe Resultat, und es war bei dem Strome, der nur um  $20^\circ$  ablenkte, durchaus unmöglich, die Zersetzung des Jodkaliums zu beobachten. Es beweist dies, daß der Strom nicht nur an Menge sehr gering, sondern auch an Intensität sehr schwach war.

Es wurde derselbe Versuch mit dem Zellenapparat und starker Säure und Alkali wiederholt. Der Strom lenkte constant um  $60^\circ$  ab; wurden die Platinspitzen um eine Papierdicke von einander entfernt, so ging der Strom nicht mehr über, indem die Nadel auf 0 zurückkam. Dieser Strom hat also eine so geringe Intensität, daß er nicht einmal, ohne Zersetzung zu veranlassen, durch die Jodkaliumlösung hindurch kann. Bei mehr als zehnmaliger Wiederholung zeigte sich immer dasselbe Resultat.

Die aus allen diesen Versuchen genommenen Facta lassen sich demnach in Folgendem zusammenfassen:

- 1) Aus der Verbindung von einer Säure mit einem Alkali entsteht kein elektrischer Strom.
- 2) Bei der Verbindung von Salpetersäure mit Kali entsteht ein elektrischer Strom von dem Kali zur Salpetersäure, und von dieser durch die Metallleitung in's Kali zurück. Er entspricht also einer Oxydation an der Platte im Alkali.
- 3) Bei der Vermischung der Salpetersäure mit Wasser entsteht ebenfalls ein Strom vom Wasser nach der Säure. Zusatz vom Kali zum Wasser vermehrt den Strom, ohne seine Richtung zu ändern.
- 4) Die Gegenwart von salpetriger Säure in der Salpetersäure ist nicht nothwendig zur Erzeugung dieses Stroms.
- 5) Beim Vermischen von concentrirter Salzsäure, Schwefelsäure und Aetzkalkilauge entsteht kein elektrischer

Strom: eben so wenig, wenn man dem Wasser noch Kali zusetzt.

- 6) Beim Zersetzen von Kochsalz mit Schwefelsäure entsteht kein Strom.
- 7) Beim Vermischen von Schwefelsäure mit Salpetersäure entsteht ein Strom von der entgegengesetzten Richtung in Bezug auf die Salpetersäure. Der Strom geht von der Salpetersäure zur Schwefelsäure und durch den Draht zurück; er entspricht also einer Oxydation in der Salpetersäure.
- 8) Bei der Verbindung von Salpetersäure mit Kali scheidet sich im Alkali kein Sauerstoffgas ab, welches mit dem circulirenden Strome in Verbindung stände.
- 9) Der Strom, bei Verbindung von Salpetersäure und Alkali, wird von keiner Flüssigkeit geleitet, und zersetzt keine Elektrolyten, namentlich kein Jodkalium.

Ueber die Natur des räthselhaften, beim Auftreten von Salpetersäure immer erscheinenden elektrischen Stromes, sind wir darum immer noch nicht im Klaren. Die Schlüsse, die sich aus den oben mitgetheilten Versuchen ziehen lassen, sind leider alle negativer Art; allein, da sie bei der ferneren Aufsuchung des eigentlichen Verhaltens wenigstens die nicht zum Ziele führenden Wege absperren, so will ich diese negativen Resultate aufzählen.

- 1) Der in Rede stehende Strom (von Salpetersäure und Kali erzeugt) entspringt nicht aus der Verbindung von Säure und Alkali; und zwar:
  - a) weil andere Säuren und Alkalien keinen Strom erzeugen;
  - b) weil Salpetersäure mit Wasser denselben Strom erzeugt;
  - c) weil auch zwei Säuren, von denen eine Salpetersäure ist, einen Strom erzeugen;

- d) weil die Masse des Stroms nicht mit den Quantitäten der dabei thätigen Stoffe nach dem Gesetze der festen Elektrolysirung übereinstimmt.
- 2) Der Strom entsteht nicht aus einer ungleichen Anziehung zum Wasser, wornach das Wasser, als Bestandtheil eines Hydrates, den Strom selbst überführen könnte:
- a) weil concentrirte Schwefelsäure und verdünntes Kali keinen Strom erzeugen;
  - b) weil Salpetersäure und Wasser einen Strom erzeugt. Das Wasser ist hier nicht auf der einen Seite allein, also kein Theil eines elektrolytischen Hydrats, und doch entsteht der Strom;
  - c) weil der Strom immer dieselbe Richtung hat, das Kali oder die Salpetersäure mag concentrirt seyn, und also eine größere Anziehung zum Wasser haben oder nicht.
- 3) Der Strom entsteht nicht aus einer ungleichen chemischen Action auf die beiden Platinplatten, weil er eine solche Richtung hat, daß die Oxydation im Wasser vorgehen müßte, während die Platte in der concentrirten Salpetersäure der Wasserstoffseite entspricht.

VI. *Ueber Electricitäts-Erregung bei chemischen Verbindungen. Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Dulk an den Herausgeber.*

Königsberg, d. 28. Sept. 1837.

— Zugleich erlaube ich mir, Ihnen eine kurze Nachricht über einige elektro-chemische Versuche mitzutheilen, zu deren Anstellung Hr. Prof. Moser sich mit mir vereinigt hatte.

Dafs wir die Angaben Becquerel's über die von ihm aus Kali und Salpetersäure construirte einfache Kette bestätigt gefunden hatten, war schon früher in dem ersten Bande des Repertoriums der Physik, S. 195, von Hrn. Prof. Moser beschrieben worden. Die zum Theil widersprechenden, anderentheils aber auch auffallenden Angaben über das ganz abweichende Verhalten dieses elektrischen Apparats, dafs er keine Wärme entwickle, dafs seine Wirkung durch einen eingeschobenen langen, dünnen Schliessungsdraht gegen einen kurzen und dicken Draht etc. gar nicht verändert werden sollte, forderten uns zunächst auf, eine Becquerel'sche Kette in einem grösseren Maafsstabe herzustellen, um alle Erscheinungen an derselben deutlicher hervortreten zu lassen. In eine umgekehrte Glasglocke von 12" Höhe und  $4\frac{1}{2}$ " Durchmesser wurde eine Lage angefeuchteten Thons gegeben, und in diese eine andere, unten mit Rindsblase verschlossene Glasglocke von 8" Höhe und  $3\frac{1}{2}$ " Durchmesser, deren obere engere Oeffnung mit einem Korkstopf selbstdicht verschlossen worden war, durch welchen ein Gasleitungsrohr, ein Platindraht, eine Platinplatte von 6" Oberfläche tragend, und ein Trichter zum Einfüllen der Flüssigkeit geführt worden waren, hineingedrückt. Das Einfüllen der Aetzkalilauge von 1,280 spec. Gew. in die innere kleinere Glasglocke, und der Salpetersäure von 1,300 spec. Gew. in die umschliessende grössere Glocke, in welche eine ganz ähnliche Platinplatte gestellt wurde, geschah gleichzeitig, so dafs beide Flüssigkeiten in einer möglichst gleichen Höhe blieben, bis die innere Glocke ganz angefüllt war, und die Flüssigkeit durch die aufserhalb des Apparats ausmündende Gasleitungsrohre abflofs. Als nun die Kette geschlossen wurde, trat sogleich eine so reichliche Gasentwicklung an der in der Kalilauge befindlichen Platinplatte ein, dafs die ganze Form der Platte durch die unendliche Zahl der in der Flüssigkeit sich erhebenden kleinen Gas-

bläschen sich gleichsam abgebildet erhielt, und das Gas bald in hinreichender Menge aufgefangen werden konnte, um als das reinste Sauerstoffgas erkannt zu werden. Die Prüfung des in Röhren aufgefangenen Gases konnte so oft und mit so grossen Mengen wiederholt werden, daß über die chemische Beschaffenheit desselben nicht der mindeste Zweifel gestattet ist. Mit dem jedesmaligen Oeffnen der Kette hörte die Gasentwicklung auf, trat aber in dem Augenblick des Schliessens sogleich wieder ein, so daß das von dem Einen von uns vorgenommene Oeffnen und Schliessens der Kette von dem Andern sogleich durch das Aufhören oder Eintreten der Gasentwicklung bemerkt werden konnte. Erst nach etwa drei Stunden wurden graduirte Glasröhren zum Auffangen des Sauerstoffgases angewandt, und die Quantitäten des in gemessenen Zeiträumen aufgefangenen Gases finden sich in dem Aufsatze des Hrn. Prof. Moser im zweiten Bande des Repertoriums der Physik genau angegeben: hier wird es genügen anzuführen, daß die Menge beinahe 60 Mal so viel betrug, als Becquerel erhalten zu haben angibt.

Die einfache Magnetenadel wurde auf  $15^\circ$  abgelenkt, wobei sich die Kalilauge wie Zink, die Salpetersäure aber wie Kupfer verhielt, und diese Ablenkung erhielt sich constant, so daß vielleicht keine Kette so gut wie die Becquerel'sche geeignet ist zu Versuchen, deren Ertolge von einer constanten Entwicklung der Elektricität abhängig sind. Erst am zweiten Tage sank die Abweichung der Nadel auf  $13^\circ$ , und am dritten Tage auf  $12^\circ$ . Wurde ein feiner, sehr langer Leitungsdraht in die Kette eingeschaltet, so ging, gegen Becquerel's Angabe, die Nadel von  $15^\circ$  auf  $6^\circ$  zurück. Durch Peltier's Apparat wurde aufs Entschiedenste Wärme, und bei Umkehrung der Pole vermittelt des Gyrotropen Erhaltung nachgewiesen, so daß die bereits gegebenen Erklärungen, weshalb sich die Becquerel'sche Kette verschieden von anderen elektrischen Vorrichtungen verhalte



und verhalten müsse, unnöthig geworden sind. Wegen der genaueren Angaben muß ich auch hier wieder auf den Aufsatz des Hrn. Prof. Moser verweisen.

In etwas abgeänderter Art wurden noch folgende Versuche angestellt. In den einen Schenkel einer V-förmig gebogenen Glasröhre wurde Bleioxyd geschüttet, und in den anderen, bis zur Entfernung aller anhängenden Feuchtigkeit, in einem Platintiegel geschmolzene Phosphorsäure, während sie sich im rothglühenden Flusse befand, in die erwärmte Röhre hineingegossen, beide Schenkel aber mit Platindrähten versehen, und diese mit dem Multiplicator verbunden. Sobald nun durch die untergesetzte Weingeistlampe mit doppeltem Luftzuge die in der Glasröhre enthaltenen Substanzen in den flüssigen Zustand versetzt wurden, erfolgte sogleich eine bedeutende Ablenkung der Magnetnadel, die sich noch steigerte, als das Flüssigwerden der in den oberen Theilen der beiden Schenkel der Glasröhre enthaltenen Substanzen durch eine kleine Weingeistlampe befördert wurde. Wurde in einer zweiten Röhre Aetzkali und Phosphorsäure demselben Versuche unterworfen, so wurde beim Schmelzen der Substanzen die Nadel ganz herumgeschleudert, auch Jodkalium, wenn auch schwach, dennoch deutlich zersetzt. Bleioxyd und Kali vertraten, wie nicht anders zu erwarten war, die Rolle des Zinks, die Phosphorsäure die des Kupfers. Da jedoch die angewandten Substanzen nicht wasserfrei waren, so wurden, um jedem Einwande, daß die beobachteten Erfolge durch die Gegenwart des Wassers bedingt wurden, zu begegnen, diese Versuche noch mit völlig wasserleeren Substanzen wiederholt. Bei Bleioxyd und Wismuthoxyd trat keine Abweichung der Magnetnadel ein, weil die Glasröhre zu schmelzen anfieng, ehe das Wismuthoxyd in völligen Fluß kam; als aber Bleioxyd und Antimonoxyd in die beiden Schenkel der Glasröhre geschüttet, mit leitenden Platindrähten versehen und durch die Weingeistlampe



flüssig gemacht wurden, trat sogleich starke Ablenkung der Magnethadel ein. Chlorkalium mit Chlorblei, oder mit Chlorquecksilber (Sublimat), oder mit Chlorsilber in Berührung gebracht, gaben in dieser Reihenfolge gesteigerte Ablenkung der Magnethadel: Zersetzung des Jodkaliums konnte jedoch nicht bewirkt werden. Dafs das Chlorkalium hier das Zink war, darf kaum noch bemerkt werden. Scheiben von Blei, Zink und Zinn in Quecksilber eingetaucht, gaben zwar nicht bedeutende, aber entschiedene Ablenkungen der Nadel.

Als unabweisliche Thatsache stellt sich aus diesen hier nur kurz erzählten Versuchen heraus, dafs bei jeder chemischen Verbindung, bei jedem chemischen Prozesse, Elektricität frei wird, ohne dafs gleichzeitige Zersetzung eines zusammengesetzten Körpers, wie des Wassers, nothig, oder der Eintritt des chemischen Processes an eine gewisse Beschaffenheit der zusammengesetzten Körper, dafs sie nämlich aus 1 und 1 bestehen müßten, gebunden wäre; immer und überall wird Elektricität frei, wo zwei Körper sich chemisch mit einander verbinden, gleichviel ob sie einfach oder zusammengesetzt, ob sie durch Wasser oder durch Wärme in den flüssigen Zustand versetzt werden, wenn sie sich nur in recht vielen Punkten berühren. Man *kann* diese Versuche als für die chemische Affinitätslehre beweisend ansehen, so dafs die elektrischen Erscheinungen als Folge des chemischen Processes auftreten, man *kann* aber auch, wie mir scheint, mit gleichem Rechte daraus die Richtigkeit der elektro-chemischen Theorie herleiten, dafs nämlich das elektrische Verhalten der den chemischen Process bildenden Körper das Prius, und dieser selbst eine Folge des ersteren sey, so dafs beide Ansichten möglicherweise richtig seyn können. Letztere Ansicht scheint mir aber auch jetzt noch mit allen bekannten Erfahrungen im guten Einklang zu stehen, und den Vortheil zu gewähren, dafs wir alle Erscheinungen auf die bekann-

ten Eigenschaften einer Naturkraft, der Elektrizität, zurückführen, und jene durch diese zu begründen suchen, wogegen chemische Affinität nur ein Name für eine Summe von Erfahrungen zu seyn scheint, durch den es ausgesprochen wird, daß die verschiedenen Körper ein Bestreben haben, sich unter günstigen Umständen mit einander zu verbinden, was wir allerdings oft genug unter unseren Augen vorgehen sehen.

Wenn in den oben erzählten Versuchen Blei, Zink, Zinn mit Quecksilber in Berührung gebracht wurden, so nehmen, wie gewöhnlich, die drei ersteren Metalle positive Elektrizität gegen das negativ-elektrische Quecksilber an; aber die hiedurch hervorgerufenen elektrischen Erscheinungen konnten nur schwach hervortreten, weil die Metalle sehr viel Uebereinstimmendes in ihren Eigenschaften haben, der elektrische Gegensatz zwischen ihnen nur schwach ist, die Berührungsflächen aber durch Schmelzen nicht vermehrt werden durften; weil sonst zugleich die elektrischen Erscheinungen des Thermomagnetismus hervorgetreten wären. Die Eigenschaft aber, durch gegenseitige Berührung elektrisch zu werden, ist keinesweges auf die einfachen Körper beschränkt, sie kommt auch den zusammengesetzten zu, und zwar in einem um so höheren Grade, je größer der elektrische Gegensatz zwischen ihnen ist, und je mehr die gegenseitige Berührung befördert wird, mag dieses durch Schmelzen, oder durch Auflösen geschehen. So wie, wenn Blei und Antimon mit einander in Berührung gebracht werden, ersteres  $+$ , letzteres  $-$  elektrisch wird, eben so müssen auch Bleioxyd und Antimonoxyd die entgegengesetzten Elektricitäten sich aneignen, wenn ihre Berührungsflächen durch Schmelzen verwehrt werden, und die in den schmelzenden Metalloxyden befindlichen Platin-drähte, der durch Berührung erregten Elektricitäten als Leitungsdrähte dienend, müssen beim Schließen der Kette die Nadel des Multipliers zur Abweichung bringen.

Stär-

Stärker noch werden diese Erfolge hervortreten, wenn wir zusammengesetzte Körper von stärkerem elektrischen Gegensatz, wie Bleioxyd und Phosphorsäure, oder noch mehr, wie Kali und Phosphorsäure, auf einander einwirken lassen, und das an Kali und Phosphorsäure gebundene Wasser kann hier auf den Erfolg keinen Einfluss haben, da dieser allein in dem elektrischen Gegensatze zwischen Kali und Phosphorsäure oder Bleioxyd und Phosphorsäure begründet ist. Eben so gleichgültig für den Erfolg muß es seyn, ob die zusammengesetzten Körper Sauerstoff oder eine andere Substanz, z. B. Chlor, enthalten, wenn nur zwischen den zusammengesetzten Körpern, welche man dem Versuche unterwirft, ein hinreichend starker elektrischer Gegensatz besteht, wie dies, den erzählten Versuchen zufolge, zwischen Chlorkalium einerseits und Chlorblei oder Chlorquecksilber andererseits der Fall ist, und die hervorgebrachte Ablenkung der Magnetsadel wird der Stärke dieses elektrischen Gegensatzes entsprechen. Ein solcher Gegensatz, und zwar ein sehr starker, besteht nun auch zwischen Kali und Salpetersäure, und dieser ist als die Quelle der in der Becquerel'schen einfachen Kette freiwerdenden Elektricitäten anzusehen. Die Kalilauge, durch Thierblase und Thon von der Salpetersäure abgesondert, kommt mit dieser nur nach und nach in kleinen Massentheilen in Berührung, und hier wird die Kohlauge, wie Zink gegen Kupfer, + elektrisch, so daß die Schichten der über den Berührungsstellen befindlichen Kohlauge + Elektricität annehmen, welche sich an dem metallischen Leiter, dem Platinbleche, ansammelt, so daß an diesem der — elektrische Bestandtheil des Wassers, der Sauerstoff, auftritt, welcher gasförmig entweicht, was so lange unangesezt erfolgt, als die an dem in der Kalilauge befindlichen Platinbleche angesammelte + Elektricität sich mit uer an dem Platinbleche in der Salpetersäure auftretenden — Elektricität durch metallische

Leiter ausgleichen kann, so lange die Kette geschlossen ist, wogegen beide Elektricitäten, wenn dieser leichtere Weg der Ausgleichung nicht vorhanden, die Kette nicht geschlossen, ist, zurückzugehen genöthigt sind, und sich unmittelbar in den Flüssigkeiten ausgleichen, daher denn auch die Zersetzung des Wassers und die Entwicklung des Sauerstoffgases beim Oeffnen der Kette aufhört, und mit dem Augenblick des Schließens sogleich wieder eintritt. Dafs an dem in die Salpetersäure eintauchenden — elektrischen Platinbleche nicht der  $+$  Bestandtheil des Wassers, der Wasserstoff, gasförmig entweicht, ist durch das bekannte Verhalten desselben gegen die Salpetersäure hinreichend erklärt. Gegen die Annahme, dafs in der Becquerel'schen Kette der Contact des Platins einerseits mit der Kalilauge, wie andererseits mit der Salpetersäure die Quelle der elektrischen Erscheinungen sey, sprechen die Stärke dieser letzteren und die so bedeutende Menge Sauerstoffgas, welche in der oben beschriebenen Kette erhalten wurde. Die von Nobili vorgeriethete Kette, in welcher die Platinplatten in gleichen Flüssigkeiten, nämlich in Salpeterlösung, eintauchten, ist nichts anderes als eine Becquerel'sche Kette, in welcher die durch Berührung des Aetzkali mit der Salpetersäure erzeugten Elektricitäten durch die in den Amianthfäden enthaltene leitende Flüssigkeit, nämlich Salpeterlösung, bis zu den Platinplatten fortgeleitet wurden, so dafs diese hier wie dort nur Leiter, nicht Erreger der Elektricitäten sind. Doch ich möchte mir nicht den Vorwurf zuziehen, die Erscheinungen an den auf so verschiedene Weise vorgerietheten Ketten erklären, oder vielmehr einer aufgestellten Ansicht anpassen zu wollen; hier soll nur der Versuch gemacht werden nachzuweisen, dafs die oben erzählten Versuche mit der bisherigen elektrochemischen Theorie nicht im Widerspruch stehen.

Eine ausführlichere Beschreibung der Versuche des

Hrn. Prof. Moser wird in dem bald erscheinenden zweiten Theil des Repertoriuns der Physik enthalten seyn.

VII. *Ueber den Einfluss der Wärme auf die Leichtigkeit des Durchgangs elektrischer Ströme durch Flüssigkeiten und Metalle; von Hrn. De la Rive.*

(*Biblioth. univers. Novv. Ser. T. VII p. 388.*)

Bekanntlich schwächt die Wärme die Elektricitätsleitung der Metalle, während sie umgekehrt die der Flüssigkeiten erhöht. Dieser Unterschied rührt wahrscheinlich davon her, dass in den Metallen, als einfachen Körpern, die Erhöhung der Temperatur nur eine physische Wirkung, nämlich ein Auseinanderweichen der Theilchen hervorbringt, während sie auf die leitenden Flüssigkeiten, welche zusammengesetzte Körper sind, chemisch wirkt, und so den Durchgang des elektrischen Stromes, der bei zersetzbaren Körpern immer mehr oder weniger mit der Zersetzung selbst verknüpft ist, erleichtern hilft. Die Verschiedenartigkeit in der Wirkung der Wärme rührt also keinesweges her von einem möglichen Unterschiede zwischen dem flüssigen und starren Zustand, sondern davon, dass die Metalle einfache Körper sind, die leitenden Flüssigkeiten aber zusammengesetzte. Zur Stütze dieser Ansicht diene die Wirkung der Wärme auf das Quecksilber, einen einfachen Körper, aber flüssigen Leiter. Ich habe mich überzeugt, dass Temperatur-Erhöhung die Elektricitätsleitung des Quecksilbers bedeutend verringert, und dass dasselbe, in dieser Beziehung, in die Reihe der einfachen Leiter und nicht in die der flüssigen Körper gestellt werden muss, dass also das Flüssigseyn ohne Einfluss auf die Erscheinung ist.

Da die Wirkung der Wärme auf Leiter, sowohl auf einfache als zusammengesetzte, demnach wohl erwiesen ist, so schien es mir nicht ohne Interesse zu wissen, welchen Einfluß eine Temperaturerhöhung auf den Uebergang des elektrischen Stroms aus einem metallischen in einen flüssigen zusammengesetzten Körper haben würde. Wie bekannt verliert der elektrische Strom, so wie er aus einem dieser Leiter in den andern übergeht, einen mehr oder weniger beträchtlichen Theil seiner Intensität; und es fragt sich nun, ob, unter gleichen Umständen, dieser Verlust zu- oder abnehme, wenn man die beiden Leiter in ihren Berührungspunkten erhitzt.

Um diese Frage zu beantworten, tauchte ich zwei ziemlich dicke Platinstreifen mit einem ihrer Enden in ein Gefäß mit gesäuertem Wasser, und zwar so, daß, ein bedeutender Theil von ihnen außerhalb der Flüssigkeit blieb. Die Streifen standen senkrecht, möglichst nahe an den Wänden des Gefäßes, das mit der Flüssigkeit ganz gefüllt war; wo sie zur Flüssigkeit herausstraten, waren sie horizontal gekrümmt. Unter jeden Streifen ward eine starke Weingeistlampe gestellt, um den horizontalen Theil desselben, bis dahin, wo er senkrecht herabbug, zu erhitzen und selbst lebhaft zu glühen. Der senkrechte, in die Flüssigkeit getauchte Theil wurde dadurch in hoher Temperatur erhalten, obwohl er nicht geradezu erhitzt wurde, sondern bloß vermöge seiner Gemeinschaft mit dem horizontalen Theil. Selbst die Flüssigkeit, wo sie den senkrechten Streifen berührte, wurde dermaßen erhitzt, daß sie fast zum Sieden kam.

Vor ihrer Erhitzung brachte ich die Streifen in Verbindung, den einen mit dem positiven Pol, den andern mit dem negativen Pol einer schwach geladenen Säule von vier Plattenpaaren, sechszehn Quadratzoll Oberfläche haltend. Ein in die Kette gebrachtes Galvanometer gab  $12^\circ$  für die Intensität des Stromes an. Als ich die Streifen auf oben genannte Weise erhitze, ohne sonst



etwas an dem Versuche zu ändern, erlangte der Strom allmählig eine Intensität von  $30^\circ$ . Nun löschte ich die Lampe aus, welche den positiven Streifen erhitze., Das Erkalten dieses Streifens und seine Rückkehr zur gewöhnlichen Temperatur änderten nichts an dem Resultat; der Strom blieb immer  $30^\circ$ . Allein wenn die Lampe unter dem negativen Streifen ausgelöscht wurde, kam der Strom, in dem Maasse als der Streifen erkaltete, auf seine ursprüngliche Intensität, d. h. auf  $12^\circ$ , zurück. Ich zündete nun bloß die Lampe unter dem positiven Streifen wieder an, allein die Ablenkung änderte sich nicht; so wie ich aber auch den negativen Streifen abermals erhitze, wurde die Ablenkung wieder  $30^\circ$  <sup>1)</sup>).

Die Flüssigkeit, in welche die Streifen tauchten, war eine sehr verdünnte Schwefelsäure. Mit sehr verdünnter Salpetersäure erhielt ich dieselben Resultate. Da indess diese Flüssigkeit leitender ist, als die erstere, so war mit ihr, als sie zu derselben Stüle von vier Platten angewandt wurde, die Ablenkung vor der Erhitzung  $45^\circ$  statt  $12^\circ$ . Bei Erhitzung des positiven Streifens wurde die Intensität des Stromes nicht erhöht; so wie ich aber die Lampe unter dem negativen Streifen anzündete, erhielt ich eine Ablenkung von  $80^\circ$ . Diese Ablenkung verringerte sich nicht, wenn die Lampe unter dem positiven Streifen ausgelöscht wurde; allein nach Auslöschung der Lampe unter dem negativen Streifen sank sie bald auf die ursprünglichen  $45^\circ$  herab.

Da der außerhalb der Flüssigkeit befindliche Theil der Streifen stark erhitzt, also das Leitungsvermögen desselben geschwächt wurde, so scheint es, als hätte daraus eine Abnahme in der Intensität des Stromes erfolgen müssen. Allein diese Abnahme ist hier unmerklich, weil die Streifen sehr breit waren, und sie also, selbst rothglühend, den Strom noch besser leiteten als die Flüssigkeit. Heiß oder kalt kann man sie also bei dem vorstehenden Versuch noch als vollkommene Leiter betrach-

1) Vergl. dies. Annalen, Bd. XV S. 107.



ten; bloß die Flüssigkeit, sey es in ihren Berührungspunkten mit den Streifen oder in dem Uebrigen ihrer Ausdehnung, mußte auf die Leichtigkeit des Durchgangs, und folglich auf die Intensität des Stromes einwirken.

Andere Metalle, wie Kupfer, statt des Platins genommen, gaben mir gleiche Resultate; allein die Anwendung von Platin ist vorzuziehen, weil man bei den andern Metallen immer fürchten muß, daß durch eine chemische Einwirkung der Flüssigkeiten auf sie die Vorgänge verwickelter werden.

Eine andere wichtige Vorsichtsmaßregel ist die, daß man sich bei den eben beschriebenen Versuchen nur eines etwas schwachen voltaschen Stromes bediene. Der von mir mit Erfolg angewandte entwickelte nur eine sehr geringe, fast un wahrnehmbare Menge Gas an den beiden in die Flüssigkeit getauchten Platinstreifen. Wie schon bemerkt, erzeugte er vor der Erhitzung nur eine Ablenkung von  $12^\circ$  mit der Schwefelsäure. Ein stärkerer Strom, welcher unter denselben Umständen eine Ablenkung von  $30^\circ$  bis  $50^\circ$  hervorbrachte, gab nicht die oben beschriebenen Erscheinungen, wenigstens nicht in einer recht merklichen Weise. Diefes ist nicht überraschend, denn man weiß, wie ich in früheren Untersuchungen gezeigt habe, daß ein Strom, je schwächer er ist, desto leichter influencirt wird durch geringe Veränderungen in dem von ihm durchlaufenen Leiter, und daß umgekehrt, je stärker er ist, desto weniger merklich die Unterschiede werden, welche in seiner Fähigkeit, unähnliche Leiter oder Systeme von Leitern zu durchdringen, vorhanden seyn können.

Ich kann diese Notiz nicht schliessen, ohne zu bemerken, daß der Unterschied, welcher, den obigen Versuchen gemäß, hinsichtlich des Einflusses der Wärme auf die Leichtigkeit des Uebergangs der Ströme in eine Flüssigkeit, zwischen dem positiven und dem negativen Pol besteht, ein nicht unwichtiger ist. In der That

scheint er bis zu einem gewissen Punkt die Wirkung der Wärme mit der *Richtung* des Stroms zu verknüpfen. Und wenn wir annehmen, wie es gewöhnlich geschieht, daß der Strom in der Flüssigkeit vom positiven Pol zum negativen geht, so können wir sagen, daß die Temperatur Erhöhung ohne Einfluß sey auf den Uebergang des Stroms aus einem Metall in eine Flüssigkeit, daß er aber den Uebergang desselben aus einer Flüssigkeit in ein Metall erleichtere.

Wenn man viele Thatsachen, wie die in dieser Note beschriebenen, d. h. Thatsachen, welche an dem elektrischen Strom, je nach seiner Richtung, verschiedene Eigenschaften erweisen, zusammenstellt, wird es gelingen, die Natur dieses Stroms und die durch seinen Durchgang in den Körpern bedingten Abänderungen einigermaßen kennen zu lernen. Schon hat man bemerkt, daß der Strom das von ihm durchdrungene Wasser und kleine darin schwebende Körper vom positiven Pol zum negativen treibt. Eben so hat man bemerkt, daß die Bewegungen und die Gestalt von Quecksilberkügelchen, die sich in dem von einem Strom durchlaufenen Wasser befinden, verknüpft sind mit der Richtung dieses Stromes. Endlich weiß man, daß es unipolare Leiter giebt, welche die Elektrizität des einen Pols entladen können, aber nicht die des andern. Jedenfalls giebt es der Thatsachen, wie die eben von uns aufgezählten, noch nicht viele, und wir glauben daher, daß Physiker, die sich mit der Elektrizität beschäftigen, der Wissenschaft einen wahren Dienst erweisen würden, wenn sie die Zahl derselben zu vermehren suchen wollten.

VIII. *Ueber eine Methode das Kobaltoxyd, so wie das Nickeloxyd und Manganoxydul vom Eisenoxyd, von der Arsenik- und arsenigen Säure zu trennen; von Th. Scheerer, Hüttenmeister auf Modam's Blaufarbenwerk in Norwegen <sup>1)</sup>.*

Die analytische Chemie giebt hauptsächlich zwei Methoden an, um die Trennung des Eisenoxys vom Kobaltoxyd zu bewirken. Die eine derselben, durch kaustisches Ammoniak, ist jedoch unvollkommen, da das auf diese Weise abgeschiedene Eisenoxyd stets eine nicht unbedeutende Menge Kobaltoxyd enthält, wovon man sich leicht durch das Löthrohr überzeugen kann. Die andere Methode, bei welcher die Trennung durch bernsteinsaures Ammoniak bewirkt wird, welches man zur neutralisirten Auflösung der beiden Metalloxyde setzt, ist, obgleich genau, doch schwierig, zeitraubend und kostbar. Bei wiederholten Untersuchungen von Kobalt-schmelzen auf ihren Kobaltgehalt, war es mir daher wünschenswerth eine andere Trennungsart aufzufinden, welche Kürze und Billigkeit mit der erforderlichen Genauigkeit verbinde. Das Resultat von mehreren in dieser Absicht angestellten Versuchen habe ich in dem Folgenden beschrieben.

Beide Oxyde müssen, damit diese Methode angewendet werden kann, entweder in Schwefel- oder Salzsäure, oder in einer Mischung von beiden aufgelöst seyn; die Gegenwart der Salpetersäure muß dagegen vermieden werden. Man fugt darauf, unter fleißigem Umrühren, so lange kaustisches Kali zur sauren Auflösung, bis diese auf ein blaues Lackmuspapier nur schwach sauer reagirt. Dies ist der Fall, wenn das Papier beim auf-

1) Aus dem norwegischen *Journal for Naturvidenskaberne*, vom Verfasser mitgetheilt

fallenden Licht eine kaum kenntliche Röthe zeigt, gegen das Licht gehalten, aber deutlich violett gefärbt erscheint. Um diesen Neutralisationspunkt nicht zu überschreiten, wofür man natürlich zuletzt ein verdünntes kaustisches Kali anwenden. Sollte man gleichwohl zu viel Kali angewendet haben (dafs sich keine saure Reaction mehr zeigt), so braucht man nur so viel Schwefel- oder Salzsäure zuzusetzen, bis sich, nach einigem Umrühren, die saure Reaction von Neuem zeigt, nicht aber den ganzen Niederschlag wieder aufzulösen.

Bei dieser theilweisen Sättigung wird das Eisenoxyd als basisch schwefelsaures  $[\text{FeS}^a + 5\text{Fe}]$  oder salzsaures niedergeschlagen, je nachdem beide Oxyde in der einen oder andern Säure aufgelöst gewesen waren. Die saure Reaction dient hierbei als Zeichen, dafs noch nicht alles Eisensalz zersetzt worden ist, indem das neutrale schwefelsaure oder salzsaure Kobaltoxyd durchaus keine Einwirkung auf das Lackmuspapier ausübt.

Ist die Neutralisation bis zu dem erwähnten Grad gebracht, welches in einer halben Stunde geschehen kann, so enthält die Auflösung nur noch einen kleinen Theil Eisenoxyd, während keine Spur von Kobaltoxyd mitgefällt ist. Um nun auch diese letzte Quantität des ersteren wegzuschaffen, wird die Auflösung mit Wasser verdünnt, und darauf, sammt dem darin befindlichen Niederschlage, bis zum Kochen erhitzt. Da dies am bequemsten in einer Porcellanschale geschehen kann, so ist es gut, wenn man schon die vorhergehende Sättigung in einer solchen vornimmt. Das Kochen braucht nicht fortgesetzt zu werden, da schon beim Eintreten des Kochpunktes jene letzte kleine Menge des Eisenoxyses als basisches Salz gefällt wird <sup>1)</sup>. Man filtrirt nun die ko-

1) Das Nacheinander des Verhaltens beim Kochen der Auflösungen von Eisen- und anderen Metallsalzen, sowohl für sich, als in Vermischung mit andern Salzlösungen, behalte ich mir vor in einer spätern Abhandlung mitzutheilen.

ehendheisse Solution, und wäscht das basische Eisensalz mit kochendem Wasser aus. Aus dem Filtrirten fällt man das Kobaltoxyd auf die bekannte Weise durch kaustisches Kali. Um nun auch das Eisenoxyd als solches bestimmen zu können, übergießt man es auf dem Filtrum mit kaustischem Ammoniak, wodurch es, nach erfolgter Auswaschung, von jeder Spur von Schwefel- oder Salzsäure befreit wird.

Die Gegenwart der Salpetersäure muß darum bei dieser Trennungsart vermieden werden, weil das sich hierbei bildende basisch salpetersaure Eisenoxyd etwas auflöslich in reinem Wasser ist, und selbst in solchem, welches nur wenige Salztheile enthält, also beim Auswaschen theilweis durch das Filtrum gehen würde. Basisches Chloreisen ist zwar ebenfalls in reinem Wasser löslich; allein nicht in dem Grade, wie das basisch salpetersaure Salz. Sobald man nur das Auswaschen einigermaßen beschleunigt, glückt die Trennung vollkommen. Will man jedoch völlig sicher gehen, so ist es anzurathen, entweder bloß Schwefelsäure anzuwenden, oder die saure, mit Schwefelsäure versetzte Lösung so lange einzudampfen, bis sich Dämpfe von Schwefelsäure zeigen. Geschieht die Neutralisation mit Ammoniak, anstatt mit kaustischem Kali, so glückt die Trennung ebenfalls; allein man kann das Kobaltsalz, wegen der Gegenwart des Ammoniaks, dann nicht durch Kali niederschlagen, und muß die viel umständlichere Methode mit Schwefelammonium anwenden. Die Neutralisation mit Ammoniak ist also nicht vortheilhaft.

Auf die beschriebene Art habe ich mehrfache Kobaltschlichproben vorgenommen, ohne daß ich je eine Verunreinigung des einen Oxyds durch das andere entdecken konnte. Zur Untersuchung des Eisenoxydes auf Kobaltoxyd bediente ich mich der Löthrohrprobe; allein jedesmal war die durch Zinn reducirte Boraxperle violettgrün. Um die erhaltene Kobaltauflösung auf Eisen-

oxyd zu untersuchen, ward zu derselben eine hinreichende Menge Chlorammonium gefügt, und darauf kautistisches Ammoniak, ohne daß hierbei ein Niederschlag von Eisenoxyd sichtbar wurde. Selbst Gallapfeltinktur veränderte die Farbe der Auflösung in keinem merkbareren Grade.

Ueberdenkt man diese Trennungsmethode näher, so sieht man leicht, daß dieselbe keine mathematische Genauigkeit haben kann. Könnte man nämlich bei der beschriebenen Sättigung den vollkommenen Neutralisationspunkt erreichen, so würde in diesem Fall alles Eisenoxyd gefällt und alles Kobaltoxyd aufgelöst seyn. Um sich aber zu versichern, daß man diesen Punkt nicht überschreitet, d. h. daß man kein Kobaltoxyd fällt, muß die Reaction der Auflösung zuletzt noch in einem möglichst geringen Grade sauer seyn. Diejenige Quantität von Eisenoxyd, welche dann noch aufgelöst ist, ist höchst unbedeutend, und wird es noch mehr, indem durch das Kochen der verdünnten Auflösung der *bei weitem größere* Theil desselben niedergeschlagen wird. Dieser Theil ist um so größer, je mehr die Auflösung verdünnt worden ist. Wenn ich also sage, daß ich die Kobaltauflösung durch keine Spur von Eisen verunreinigt fand, so heißt dies, daß die Menge des letzteren so unbedeutend war, daß sie sich durch die gewöhnlichen Reagenzien nicht mehr erkennen ließ.

Die Trennung der Arsenik- oder arsenigen Säure vom Kobaltoxyd, deren ich mich bediente, ist hauptsächlich nur anwendbar, wenn es allein gilt, reines Kobaltoxyd zu erhalten, nicht aber die Quantität der einen der genannten Säuren und die des Eisenoxydes zu bestimmen. Dieselbe geschieht zugleich bei der oben beschriebenen Neutralisation, indem, wenn Arsenik- oder arsenige Säure in der Auflösung ist, nicht allein basisch schwefelsaures oder salzsaures Eisenoxyd, sondern auch arseniksaures oder arsenigsaures Eisenoxyd gefällt wird.



Nur ist hierbei zu erinnern, daß die Auflösung eines Kobaltminerals oder Kobaltschliches, häufig mehr von einer jener Säuren enthält, als erforderlich ist, um mit dem Eisenoxyd eine Verbindung einzugehen. Man sieht dies daran, daß bei der ersten Hinzufügung von Kali kein dunkelbrauner, sondern ein lichter Niederschlag entsteht, in welchem Falle man so lange schwefelsaures oder salzsaures Eisenoxyd zur Auflösung fügt, bis das erstere stattfindet. Achtet man nicht hierauf, so wird der durch Neutralisation hervorgebrachte Niederschlag kobalthaltig.

Der kürzeste Weg nun, besonders im Großen, reines Kobaltoxyd zu bereiten, ist unlaugbar der, welchen Liebig angegeben hat; doch hat es mir nicht glücken wollen, durch diese Methode ein genaues, *analytisches* Resultat zu erhalten. Bei einem schwachen Hitzgrad ist das erhaltene Kobaltoxyd stets eisenhaltig, und bei einem stärkeren werden beide Oxyde unrein. Man kann aber, selbst wenn es sich um analytische Reinheit handelt, dennoch die Zusammenschmelzung mit saurem schwefelsauren Kali anwenden, wenn man nur die saure Auflösung dieser Masse mit kaustischem oder selbst kohlensaurem Kali neutralisirt.

Ganz auf gleiche Weise, wie die Trennung des Kobaltoxydes vom Eisenoxyde, der Arsenik- und arsenigen Säure hier beschrieben wurde, kann die Trennung des Nickeloxydes und Manganoxyduls von letzteren drei Substanzen geschehen. Besonders die Abscheidung des Nickeloxydes und Manganoxyduls ist für die analytische Chemie von Wichtigkeit.

Um das Nickeloxyd vom Eisenoxyd zu trennen, bedient man sich gewöhnlich der Methode mit kaustischem Ammoniak, wobei man jedoch stets ein nickelhaltiges Eisenoxyd erhält. Mit kohlensaurem Ammoniak gelingt die Trennung noch weniger. Wendet man dagegen die beschriebene Methode an, so erhält man ein völlig nik-



kelfreies Eisenoxyd, und ein Nickeloxyd, bei dem man die Gegenwart des Eisenoxyds nicht durch Galläpfeltinktur nachweisen kann. Eben so befriedigend ist das Resultat, welches man beim Manganoxydul erhält. Nur einige Male erhielt ich ein Eisenoxyd, welches, mit Salpeter und Soda auf dem Platinblech geschmolzen, eine kaum bemerkbare Bläue zeigte, was wahrscheinlich von einem mangelhaften Auswaschen herrührte.

#### A n h a n g.

Eine quantitative Untersuchung auf Kobaltoxyd wird dadurch verlängert, daß man das erhaltene Oxyd erst durch Wasserstoffgas reduciren muß. Schneller kommt man zum Ziele, wenn man das Kobaltoxyd mit einer gewogenen Menge geschmolzenen sauren phosphorsauren Natrons zusammenschmelzt, wobei aller überschüssige Sauerstoff, den das Oxyd beim Glühen aufgenommen hat, fortgeht. Das Gewicht der beiden zusammengeschnittenen Körper, das des phosphorsauren Natrons abgezogen, ist unmittelbar das Gewicht des Kobaltoxydes. Man hat jedoch hierbei zu beobachten:

1) Die Zusammensetzung darf nur in einem Glasgefäße geschehen, welches am bequemsten die Form wie Fig. 7 Taf. I hat. Sehr gut kann man hierzu den untersten abgeschnittenen Theil eines Probirglases benutzen. Man setzt dieses Glas senkrecht in einen Platintiegel, dessen Boden mit gut ausgeglühtem Sand überstreut ist, um zu verhindern, daß das Glas an den Tiegel festschmilzt. Ein Glasgefäß ist darum erforderlich, weil Platin von der schmelzenden Masse angegriffen wird, und Porcellantiegel gewöhnlich springen.

2) Das hierzu nöthige saure phosphorsaure Natron erhält man durch Schmelzen eines kochsalzfreien phosphorsauren Natronammoniaks, und dasselbe muß so lange in einem bedeckten Platintiegel ausgeglüht werden, bis es nichts mehr am Gewichte verliert, welches der Fall

ist, sobald keine Gasentwicklung mehr bemerkt wird. Dasselbe muß in einer wohlzuverschließenden Flasche verwahrt werden. Will man es anwenden, so wiegt man davon ungefähr das Fünffache der Quantität des Kobaltoxydes ab, welche zur weiteren Untersuchung bestimmt ist, bringt es in den Apparat, und erhitzt diesen, um jede Spur von hygroskopischer Feuchtigkeit zu vertreiben, allein nicht so stark, daß das phosphorsaure Natron schmilzt. Hierauf tarirt man den Apparat genau, fügt das vorher abgewogene Kobaltoxyd hinzu, und erhitzt den Apparat gradweis so lange, bis alle Gasentwicklung aufgehört hat. Es trifft zuweilen, daß einige Gasblasen fest am Glase hängen bleiben, und sich selbst bei der stärksten Hitze, die man mittelst einer Berezellius'schen Spirituslampe hervorbringen kann, sich nicht von demselben trennen. Die Operation kann jedoch als beendet angesehen werden, sobald man nicht mehr die Entwicklung neuer Gasblasen bemerkt. Man erhält, bei Beobachtung der angegebenen Vorsichtsmaßregeln, auf diese Weise ein zuverlässigeres Resultat, als bei der Reduction mit Wasserstoffgas, da es bei letzterer leicht geschieht, daß ein kleiner Theil des Oxyds nicht reducirt wird.

Setzt man diese Methode, das Kobaltoxyd zu bestimmen, in Verbindung mit der erst beschriebenen, daselbe vom Eisenoxyd, der Arsenik- und arsenigen Säure zu trennen, so braucht man kaum mehr als den vierten Theil von der Zeit, welche hingeht, wenn man die Arseniksäure mit Schwefelwasserstoffgas fällt, das Eisenoxyd mittelst Bernstein-sauren Ammoniaks trennt, das Kobaltoxyd durch Schwefelammonium niederschlägt, und das zuletzt erhaltene Kobaltoxyd durch Wasserstoffgas reducirt. Zugleich ist es klar, daß man bei diesem längeren Proceß viel mehr einigem Verlust ausgesetzt ist, als wenn man den weit kürzeren anwendet.

IX. *Ueber die einfachen und doppelten Cyanmetalle; von Carl Rammelsberg in Berlin.*

Die zahlreiche Klasse derjenigen Doppelverbindungen, welche durch die Vereinigung zweier einfachen Haloidsalze eines und desselben Salzbildners entstehen können, ist in neuerer Zeit von ausgezeichneten Chemikern untersucht worden. So hat Polydore Boullay die Doppeljodüre, P. A. von Bunsdorff die Doppelchlorüre und Bromüre beschrieben, und auch in Betreff der Fluormetalle haben wir ähnliche Verhältnisse durch Berzelius's wichtige Abhandlung über die Fluorspatssäure kennen gelernt.

Wenn das Cyan in allen Beziehungen mit den genannten einfachen Salzbildnern die grösste Analogie verhält, und sich dies namentlich in seinen Salzen ausspricht, so schließt es sich ihnen dadurch noch enger an, daß diese Salze sich ebenfalls unter einander verbinden können, und Doppelsalze liefern, in denen die Bestandtheile nicht selten durch eine weit stärkere Affinität zusammengehalten werden, als in den einfachen Cyanuren. Von allen diesen Doppelsalzen haben indess diejenigen, welche die Cyanüre des Eisens liefern, fast ausschließlich die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und da sie zum Theil von technischer Wichtigkeit sind, zahlreiche Untersuchungen von vielen Chemikern, wie von Litner, L. Gmelin, Porret, Thomson, Robiquet, Doberainer, insbesondere aber von Berzelius veranlaßt; ihre Eigenschaften und ihre Zusammensetzung sind deswegen so genau bekannt, daß darüber kein Zweifel mehr obwaltet. Dies gilt jedoch keinesweges von allen übrigen Doppelcyanuren, deren Zahl nicht unbeträchtlich ist, und es sind vorzugweise ältere Ar-

beiten, welche dieses Feld der Untersuchungen betreffen. v. Ittner hat zuerst gezeigt, daß die Cyanüre des Goldes, Silbers, Platins und Kupfers sich mit dem Cyankalium zu krystallisirbaren Doppelsalzen verbinden können; L. Gmelin hat beim Palladium, Quecksilber, Zink, Mangan und Kobalt, Wöhler beim Nickel, und Booth beim Iridium dasselbe Verhältniß nachgewiesen. Da indeß eine nähere Kenntniß der Eigenschaften vieler dieser Salze, so wie die ihrer chemischen Zusammensetzung, welche bisher vermißt wurde, nicht ohne Interesse zu seyn schien, so habe ich mich bemüht, diese Punkte, namentlich den zuletztgenannten, durch einige Untersuchungen festzustellen.

In einer früheren Abhandlung <sup>1)</sup> habe ich das *Cyancadmium* und dessen Verbindungen mit anderen Cyanuren, insbesondere mit Cyankalium, beschrieben, und ferner gezeigt, daß dieß letztere, so wie die Doppelsalze des Cyankaliums mit *Cyanzink*, *Cyannickel*, *Cyansilber* und *Cyanquecksilber*, sämmtlich nach der allgemeinen Formel  $KCy + xCy$  zusammengesetzt sind, worin  $x$  eins der genannten Metalle bedeutet. Dem über diese Salze Angeführten habe ich noch einiges hinzuzufügen.

*Natriumzinkcyanür* wird auf gleiche Art, wie das Kaliumsalz, mittelst Cyannatrium dargestellt. Dieses Letztere war durch Sättigen der reinen Cyanwasserstoffsäure mit Kalkerde, und Zerlegung des entstandenen Cyancalcium durch kohlensaures Natron erhalten worden. Die Auflösung des gebildeten Zink-Doppeleyanürs liefert erst nach starker Concentration Krystalle in der Gestalt glänzendweißer Blättchen, deren genauere Form sich nicht erkennen ließ. Die Eigenschaften dieses Salzes sind im Allgemeinen die des Kaliumzinkcyanürs; nur ist es viel leichter löslich in Wasser, und enthält dasselbe im gebundenen Zustande, verliert es jedoch, wie es

1) Diese Annalen, Bd. XXVIII S. 364.

es scheint vollständig, bei einer Temperatur von 200° C. Der Gewichtsverlust betrug in zwei Versuchen 21,709 und 23,88 Proc. Die Analyse des entwässerten Salzes geschah auf die beim Kaliumzinkcyanür angeführte Art.

I. 0,158 Grm. gaben 0,2194 Zinkoxyd = 0,17584 Zink, und 0,21 schwefelsaures Natron = 0,068478 Natrium.

II. 0,51 lieferten 0,475 schwefelsaures Zinkoxyd = 0,190695 Zink, und 0,26 schwefelsaures Natron = 0,08478 Natrium.

Wir haben folglich in 100 Theilen:

	Beobachtet.		Berechnet.	
	I.	II.		
Zink	38,393	37,391	38,650	= 2 At.
Natrium	14,951	14,624	13,938	= 1 "
Cyan			47,422	= 6 "
			100	

oder eine Verbindung von 2 At. Cyanzink und 1 At. Cyannatrium, womit im krystallisirten Salze 5 At. Wasser verbunden zu seyn scheinen, welche alsdann 21,227 Proc. ausmachen müßten. Der Mangel an Uebereinstimmung zwischen dem gefundenen und berechneten Resultate liegt ohne Zweifel in einer kleinen Menge kohlensauren Natrons, die dem untersuchten Salze stets beigemengt war.

*Bariumzinkcyanür* fällt als ein, in Wasser sehr schwerlösliches, weißes Pulver nieder, wenn man die Auflösung des Kaliumsalzes mit essigsauerm Baryt versetzt. Die Analyse zeigte, daß das Salz wasserfrei ist, und ergab einen Gehalt an Kalium von 0,465 Proc. Die Quantitäten des Zinks und Baryums erlaubten nur eine Annäherung an die Formel  $BaCy + 2ZnCy$ .

In Betreff des *Bleizinkcyanürs*, welches vermitteltst essigsauern Bleioxyds wie das vorige dargestellt wurde, und demselben ganz ähnlich ist, will ich nur bemerken,

dafs es kein Alkali in seiner Zusammensetzung enthält. Im Uebrigen dürften die analytischen Resultate für beide Salze keinen grösseren Werth haben, als die für die entsprechenden des Cadmiums, da sie ebenfalls beim Auswaschen zersetzt zu werden scheinen.

Das zu allen diesen Versuchen angewandte *Cranzink* ist, der Untersuchung zufolge, wasserfrei, und enthält 55,758 Proc. Zink, entsprechend der Formel  $\text{ZnCy}$ .

*Kaliumnickelcyanür.* A. a. O. beschrieb ich ein Salz, entsprechend der Formel  $2(\text{KCy} + \text{NiCy}) + \text{H}$ . Später habe ich gefunden, dafs unter gewissen Umständen aus der Auflösung das Salz mit einem doppelt so grossen Wassergehalt anschiefst; denn es gab in diesem Fall in zwei Versuchen 6,543 Proc. und 6,615 Proc. Wasser, was 1 At. Wasser ( $=6,892$  Proc.) gegen 1 At. des wasserfreien Salzes ausmacht. Das letztere gab 32,822 Proc. Kalium und 24,792 Proc. Nickel, woraus die Identität mit dem früher beschriebenen Salze hervorgeht. Die Krystalle besitzen eine mehr in das Braune ziehende Farbe, während die des weniger Wasser enthaltenden Salzes mehr orangefarbig erscheinen. Vielleicht gehören auch jene dem von Wöhler<sup>1)</sup> zuerst beschriebenen Salze an, obwohl derselbe darin nur 5 Proc. Krystallwasser gefunden hat.

*Natriumnickelcyanür.* Auch dies ist schon von Wöhler untersucht worden, welcher es durch Zersetzung der Calciumverbindung vermittelt kohlensauren Natriums darstellte. Ich habe mich der bei dem Natriumzinkcyanür angeführten Methode bedient. Es bildet gelbrothe, langsaulen- und nadelförmige Krystalle, und verliert (schon unter  $150^{\circ}$  C.) 20,731 Proc. Wasser, während der Rest 1 Atom eines jeden Cyanürs enthält. Dieser Wassergehalt nähert sich 3 Atomen ( $=20,351$  Proc.); Wöhler dagegen hat 22 Proc. gefunden, was

1) *Berzelius Lehrbuch*, Bd. IV S. 466



er bei der von ihm supponirten Zusammensetzung für das wasserfreie Salz zu 5 At. berechnet.

*Cyannickel.* Wenn man essigsaures Nickeloxyd mit Cyanwasserstoffsäure vermischt, so erfolgt bekanntlich ein hellgrüner Niederschlag, welcher nach dem Trocknen eine dunkelgrüne sprode Masse liefert, und neben dem Cyannickel noch Wasser enthält, welches chemisch gebunden ist, da es unter  $100^{\circ}$  C. gar nicht, vollständig erst zwischen  $180^{\circ}$  und  $200^{\circ}$  abgegeben wird, während das wasserfreie Salz mit gelbbrauner Farbe übrig bleibt. Die Quantität des Wassers fand ich in drei Versuchen zu 18,688; 18,972; 19,114 Proc. Da das entwässerte Salz, welches bei der Analyse 53,615 Proc. Nickel lieferte, sich als Ni Cy erwies, so scheint dieses Wasser  $1\frac{1}{2}$  At. zu betragen, indem es in diesem Fall 19,13 Proc. hätten seyn müssen.

#### K o b a l t.

*Cyankobalt.* Eine dem Oxyde (Co) entsprechende Verbindung läßt sich, wie Wöhler zuerst gezeigt hat, am reinsten auf die beim Cyanzink und Cyannickel angeführte Art darstellen. Getrocknet ist es ein zimtbraunes Pulver, welches bei einer Temperatur über  $100^{\circ}$  C., unter Verlust einer ansehnlichen Wassermenge, eine lebhaft blaue Farbe annimmt. Stellt man den Versuch beim Ausschluss der Luft, in einer kleinen Retorte, an, so kann man die Temperatur bis fast  $300^{\circ}$  erhöhen, ohne daß eine Zersetzung des Cyankobalts eintrete. Beim Zutritt der Luft hingegen entzündet es sich leicht, schon bei  $250^{\circ}$ , und verglimmt mit vielem Glanz, eine poröse, schwarze Masse (Kohlenstoffkobalt) hinterlassend. Einem Versuche zufolge beträgt der Gewichtsverlust, bei  $290^{\circ}$ , 32,261 Proc. Da nun das wasserfreie Salz 1 At. Metall gegen 2 At. Cyan enthält (in sofern es bei der Analyse 33,953 bis 34,211 Proc. Kobalt lieferte), so kann man im wasserhaltigen 3 Atome.



Wasser annehmen, welche sich zu 32,56 Proc. berechnen würden, um so mehr, als die gefundene Menge des Kobalts etwas niedriger als die berechnete (35,608 Proc.) ist, und daraus zu folgen scheint, daß das Salz noch eine kleine Quantität Wasser bei der angegebenen Temperatur zurückgehalten habe.

Die Darstellung einer dem Superoxyd (Co) entsprechend zusammengesetzten Verbindung gelang auf directem Wege nicht, obwohl dieselbe in dem von L. Gmelin entdeckten *Kaliumkobaltcyanid* enthalten ist. Wenn man nämlich das oben beschriebene Cyankobalt mit Cyanwasserstoffsäure übergießt, und sodann mit Kali neutralisirt, so löst sich ersteres mit großer Leichtigkeit auf; dampft man die gelbliche Lösung ein, so schießt das Doppelcyanür nach dem Erkalten an. L. Gmelin hat gezeigt <sup>1)</sup>, daß die Umwandlung des angewandten Cyankobalts von einer Wasserstoffgasentwicklung begleitet ist. Das Kaliumkobaltcyanid krystallisirt, nach der Untersuchung des Hrn. Profess. Mitscherlich, in der Form des rothen Kaliumeisencyanids, mit dem es in den Zusammensetzungsverhältnissen übereinstimmt. Da diese letzteren schon von dem Entdecker untersucht worden sind, so dürfte es fast überflüssig erscheinen, sie von Neuem zu erörtern. Ich begnüge mich deshalb, hier nur die Resultate einer Analyse mit den von Gmelin gefundenen und den berechneten Zahlen zusammenzustellen, woraus sich die genügendste Uebereinstimmung ergibt:

		Gmelin.	Rechnung.	
Kobalt	17,888	17,19	17,624	= 2 At.
Kalium	33,313	35,23	35,102	= 3 -
Cyan			47,274	= 12 -
			<hr/> 100	

woraus die Formel  $3KCy + CoCy^2$  folgt.

Ich will hier noch erwähnen, daß der Kobaltgehalt  
 1) *Deussen Handbuch*, Bd. I S. 1206.

auf die Art bestimmt wurde, daß das mit Schwefelsäure eingekochte Salz in Wasser gelöst und mit Ammoniumsulfhydrat gefällt, das Schwefelkobalt aladann in Königswasser gelöst, mit Schwefelsäure versetzt und im Platiniegel bis zum schwachen Glühen erhitzt wurde. Aus dem Gewicht des schwefelsauren Kobaltoxyds ergab sich die Menge des Kobalts.

#### M a n g a n.

Das dem Oxydul entsprechende Cyanür liefs sich nicht in einem zur Untersuchung geeigneten Zustande darstellen, da der graugrüne Niederschlag, welcher beim Vermischen eines aufgelösten Manganoxydulsalzes mit Cyankalium niedersfällt, sich bei Berührung mit der Luft augenblicklich braun färbt; ein Verhalten, welches eine geringe Verwandtschaft des Mangans zum Cyan anzudeuten scheint.

*Kaliummangancyanid.* Wenn man bei der Fällung des eben erwähnten Mangancyanürs einen grossen Ueberschuß von Cyankalium anwendet, so wird ein gewisser Antheil des entstandenen Niederschlags von letzterem wieder aufgelöst; ein anderer bleibt aber zurück, wie groß auch immer die Menge des Cyankaliums seyn mag. Ich bediente mich zur Darstellung des Doppelcyanürs gewöhnlich des essigsauren Manganoxyduls, dessen concentrirte Auflösung mit einer ansehnlichen Menge Cyanwasserstoffsäure vermischt, und sodann mit Kali neutralisirt wurde. Die so erhaltene Flüssigkeit erscheint nach dem Filtriren farblos oder schwach gelblich; dampft man sie aber sehr gelinde ein, so tritt sehr bald ein Zeitpunkt ein, in welchem sie plötzlich eine dunkelrothbraune Farbe annimmt, während sich eine schwarzbraune Substanz ausscheidet, die sich in jeder Hinsicht wie Manganoxydhydrat verhält. Diese Erscheinung findet, wie ich mich überzeugt habe, immer statt, das Verdampfen der Flüssigkeit mag beim Zutritt oder Ausschluss der Luft

geschehen. Wird letztere nach hinlänglicher Concentration filtrirt, so krystallisirt beim Erkalten ein Doppelcyanür heraus, welches, in Folge der sogleich anzuführenden Analysen, ein dem Manganoxyde entsprechendes Mangancyanid enthält. Es läßt sich nun wohl annehmen, daß die Flüssigkeit, so lange sie ungefärbt ist, Mangancyanür in Verbindung mit Cyankalium enthält; daß sich dasselbe jedoch beim Abdampfen unter Mitwirkung des Wassers so zerlegt, daß Mangancyanid ( $\text{MnCy}^3$ ) und Mangapoxyd entstehen, während zugleich Wasserstoffgas frei wird. Es würde mithin hier ein ähnlicher Vorgang wie beim Auflösen des Kobaltcyanids ( $\text{CoCy}$ ) in Cyankalium anzunehmen seyn, wo das erstere in  $\text{CoCy}^3$  verwandelt wird, und zwar, wie L. Gmelin fand, unter Entwicklung von Wasserstoffgas. Diefes wird um so wahrscheinlicher, als wir in dem Mangandoppelcyanür das vollständigste Analogon jenes Kobaltsalzes und zugleich des rothen Kaliumeisencyanids finden, sowohl was die Zusammensetzung, als auch die Krystallform betrifft.

Die Krystalle sind von braunrother Farbe, in der Regel aber sehr klein; leicht in Wasser löslich. Die Auflösung wird von Säuren zersetzt und Cyanwasserstoffsäure frei gemacht. Alkalien scheinen keine Wirkung auszuüben. Ammoniumsulfhydrat schlägt nur langsam und schwierig einen Theil des Mangans nieder, was jedoch sogleich und in reichlichem Maaße stattfindet, sobald man die Auflösung zuvor mit einer Säure vermischt und zum Kochen erhitzt hat. In den Auflösungen von Metallsalzen bewirkt auch dieses Doppelcyanür Niederschläge, welche meist eigenthümlich gefärbt sind. So werden z. B. Kupferoxydsalze grau, Bleisalze braun, Manganoxydsalze röthlichgelb (vielleicht ein Cyanür-Cyanid). Eisenoxydsalze lebhaft blau, Eisenoxydsalze dagegen nicht gefällt. In salpetersaurem Silberoxyd erfolgt ein gelbbrauner Niederschlag, welcher, bei einem

Ueberschuß des Silbersalzes und auf Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure, eine zinnoberrothe Farbe annimmt, die jedoch schon beim Auswaschen in's Braune übergeht. In höherer Temperatur zersetzt sich das Kaliummanganeyanid sehr bald: es schwärzt sich, entwickelt gewöhnlich eine kleine Menge Cyanwasserstoffsäure, und hinterläßt nach dem Glühen einen braunrothen alkalischen Rückstand.

Die Analyse des Salzes geschah auf folgende Art: 0,602 Grm. wurden einer Temperatur von 200 ausge-  
 setzt; sie verloren indeß dadurch nichts an Gewicht. Sie wurden nun im Platintiegel mit Schwefelsäure übergossen, und, nachdem die erste heftige Einwirkung vorüber war, erhitzt, und zwar so lange, bis der Ueberschuß der hinzugesetzten Säure wieder fortgeraucht war. Die trockne Masse wurde in Wasser gelöst und eine hinreichende Menge Ammoniumsulfhydrat hinzugefügt. Das wiedergefallene Schwefelmangan lieferte, nachdem es in Chlorwasserstoffsäure aufgelöst, kochend mit kohlensaurem Kali gefällt, und der Niederschlag nach dem Auswaschen und Trocknen geglüht worden, 0,145 Mangan-  
 oxydul, welches 0,10516 oder 17,522 Proc. Mangan entspricht. Die vom Schwefelmangan abfiltrirte Flüssigkeit gab, nach dem Abdampfen, Glühen des Rückstandes und Entfernung des Säureüberschusses vermittelst kohlensauren Ammoniaks, 0,472 schwefelsaures Kali, worin 0,25519 Kali = 0,211939 Kalium enthalten sind, welche 35,205 Proc. vom Salze ausmachen.

Bei einer zweiten Analyse wurden aus 0,647 Grm. des Salzes 0,293 wasserfreien schwefelsaures Mangan-  
 oxydul erhalten, in sofern hier das Schwefelmangan in schwefelsaures Manganoxydul verwandelt und letzteres im Platintiegel bis zum Glühen erhitzt wurde. Die angeführte Menge enthält 0,1379 Manganoxydul oder 0,107 Mangan, entsprechend 16,337 Proc. Das, wie zuvor bestimmte schwefelsaure Kali wog 0,514, worin 0,2779 Kali oder

0,230798 Kalium, d. h. 35,672 Proc. vom Salze enthalten sind.

Wir stellen hier die Resultate beider Analysen einer daraus abgeleiteten theoretischen Zusammensetzung des Salzes gegenüber:

	Versuch.		Rechnung.	
	I.	II.		
Mangan	17,522	16,557	16,705	= 2 At.
Kalium	35,205	35,672	35,492	= 3 -
Cyan			47,803	= 12 -
			100.	

Hieraus ergibt sich, in Uebereinstimmung mit dem entsprechenden Eisen- und Kobaltsalze, die Formel:  
 $3\text{KCy} + \text{MnCy}^2$ .

#### Kupfer.

Nächst dem Eisen scheint kein Metall in Betreff seiner Verbindungen mit Cyan und den daraus hervorgehenden Doppelcyanüren so mannigfache Producte zu liefern als das Kupfer. Wie bei jenem finden wir auch hier ein Cyanür, ein Cyanid und ein Cyanür-Cyanid, freilich nicht von entsprechender Zusammensetzung, obwohl der merkwürdige Umstand eintritt, daß die beiden erstgenannten sowohl beim Eisen, als auch beim Kupfer ziemlich feste Verbindungen sind, während das Cyanid beim Eisen gar nicht, beim Kupfer nur sehr vorübergehend in fester Form zu existiren scheint.

*Kupfercyanür.* Unter den verschiedenen Methoden, welche man zu seiner Darstellung vorgeschlagen hat, scheint mir diejenige die vorzüglichste zu seyn, nach welcher man Kupferchlorid (durch Auflösen von Kupfer in Chlorwasserstoffsäure, welcher etwas Salpetersäure hinzugefügt wird, dargestellt) in einem bedeckten Tiegel so lange schmilzt, bis es sich in Chlorür verwandelt hat, dies in concentrirter Chlorwasserstoffsäure auflöst.

die Auflösung mit Wasser verdünnt, und dann mit einem Ueberschuß von reiner Kohlensäure versetzt. Es wird dadurch orangefarbiges Kupferoxydulhydrat niedergeschlagen, welches man abfiltrirt, etwas auswäscht, und sodann mit Cyanwasserstoffsäure übergießt, wodurch es sich augenblicklich unter Wärmeerzeugung in weißes Kupfercyanür verwandelt.

Die Eigenschaften dieser Verbindung sind im Allgemeinen bekannt; ich will deshalb nur anführen, daß sie wasserfrei ist, und auch, zufolge der Analyse, eine Zusammensetzung aus gleichen Atomen Kupfer und Cyan ergeben hat.

*Kupfercyanid.* Wenn man die Auflösung eines Kupferoxydsalzes, z. B. des neutralen essigsauren Kupferoxyds, mit Cyanwasserstoffsäure oder mit Cyankalium vermischt, so entsteht ein reichlicher gelber Niederschlag, welcher ohne Zweifel Kupfercyanid ist. Denselben Körper erhält man durch Schütteln von frisch gefälltem Kupferoxydulhydrat mit Cyanwasserstoffsäure. Aber schon nach einigen Minuten verändert er unter der Flüssigkeit seine Farbe, wird hellgrün und krystallinisch, indem sich zugleich eine ansehnliche Menge Cyangas aus der Flüssigkeit entwickelt. Dieses Verhalten der Kupfersalze ist schon von Scheele, v. Ittner, Vauquelin, Wöhler und L. Gmelin beobachtet worden, und der Letztere, dem wir die genauesten Untersuchungen in dieser Beziehung verdanken, vermuthete schon <sup>1)</sup>, die neue Verbindung müsse ein Gemisch von blausaurem Kupferoxyd und blausaurem Kupferoxydul seyn. Allein sie ist in der That eine feste Verbindung von Cyanür und Cyanid, wie schon ihre krystallinische Form andeutet, verbunden mit einer ziemlich bedeutenden Menge Wasser.

Die Krystalle sind sehr klein; mit der Lupe erkennt man eine prismatische Form; sie sind durchsichtig und starkglänzend. Werden sie bis 100° C. erhitzt, so ver-

1) Dessen Handbuch, I 3. 1263.



lieren sie Cyangas und Wasser, und verwandeln sich schon bei dieser Temperatur, mit Beibehalt ihrer Form, in reines Kupfercyanür. Chlornasserstoffsäure entfärbt sie, entwickelt Cyanwasserstoffsäure und löst sie in der Wärme vollkommen auf. Aus dieser Auflösung fällt kaustisches Kali ein Gemenge von Kupferoxydul und Oxyd. Salpetersäure wirkt ähnlich, aber sie verwandelt natürlich sämtliches Kupfer in Oxyd. Ammoniak löst einen Theil der Verbindung auf, färbt sich blau, theilt aber auch dem Ueigelösten diese Farbe. Auch reines Kali, wenn es mit dem Salze geschüttelt wird, nimmt diese Farbe an; kocht man die filtrirte Flüssigkeit, so entfärbt sie sich, während schwarzes Kupferoxyd niederfällt.

Um die Zusammensetzung auszumitteln, bestimmte ich zunächst die Menge des Kupfercyanürs, welche das Salz beim Erhitzen bis 100° liefert.

I. 0,663 Grm., in einem Platintiegel anhaltend einer Temperatur von 100° ausgesetzt, hinterlassen 0,468, welche beim Erhitzen bis 200° nichts verloren.

II. 0,718 Grm. gaben, auf gleiche Art behandelt, einen Rückstand von 0,505.

Dem zufolge bestehen 100 Th. der Verbindung aus:

	nach I.	nach II.
Kupfercyanür	70,589	70,331
Cyan und Wasser	29,412	29,666
	100.	100.

Dass die rückständige Substanz in der That reines Kupfercyanür ist, davon habe ich mich durch die quantitative Bestimmung ihres Kupfergehalts überzeugt.

Es blieb nun noch übrig, die relativen Mengen des Cyans und Wassers zu bestimmen. Zu dem Ende wurden 2,818 Grm. des Salzes in eine kleine Glasretorte gebracht, und diese in kochendes Wasser gestellt. Mit der Retorte war ein mit Chlorcalcium gefülltes Rohr



verbunden, und mit diesem ein anderes dreifach gekrümmtes, welches in ein Gefäß mit Quecksilber tauchte, doch so, daß seine Mündung sich über der Oberfläche des Quecksilbers befand, und das sich entwickelnde Cyangas in einer graduirten Glocke gesammelt werden konnte. Die Menge desselben betrug bei 15° C. und 760 Millim. Barometerstand 78 Kubikcentimeter, welche bei 0° 73,516 C.C. betragen, und 0,1744795 Grm. wiegen. Die Menge des Wassers wurde nicht direct bestimmt.

In einem zweiten Versuche lieferten 1,67 Grm. der Verbindung 16 C.C. Cyangas bei 15°,5 C. und einem Barometerstande von 759,2 Millim., welche = 43,473 C.C. bei 0° und 760 Millim. Druck sind, und 0,1027156 Grm. wiegen.

Nehmen wir nun das Mittel aus den beiden zuvor für das Gesamtgewicht des Cyans und Wassers gefundenen Zahlenwerthen, und ziehen davon die Menge des Cyans ab, so ergibt sich die des Wassers aus dem Verlust.

Es wären demnach in 100 Th. des Salzes:

	nach Versuch	
	I	II.
Kupfercyanür	70,461	70,461
Cyan	6,191	6,150
Wasser	23,348	23,389
	<hr/> 100	<hr/> 100

oder:

Kupfer	49,731	49,731
Cyan	26,921	26,880
Wasser	23,348	23,389
	<hr/> 100.	<hr/> 100.

Diese Zahlen stimmen mit der Annahme, daß in der untersuchten Verbindung 3 At. Kupfer, 4 At. Cyan

und 5 At. Wasser seyen; denn sie müßte in diesem Fall in 100 Th. enthalten:

Kupfer	49,272	= 3 At.
Cyan	27,386	= 4 -
Wasser	23,342	= 5 -
<hr/>		
100.		

Also haben wir hier eine Verbindung von 1 At. Kupfercyanür, 1 At. Kupfercyanid und 5 At. Wasser, entsprechend der Formel  $\text{Cu Cy} + \text{Cu Cy} + 5 \text{H}$ .

*Kaliumkupfercyanür.* L. Gmelin hat zuerst darge-  
gethan, daß nur das Cyanür des Kupfers fähig ist, sich  
mit anderen Cyanmetallen zu verbinden, in sofern das  
Cyanürcyanid, wenn es mit einer Auflösung von Cyan-  
kalium übergossen wird, unter lebhafter Cyangasenwick-  
lung zu Cyanür reducirt wird.

Er hat ferner zwei verschiedene Verbindungen des  
letzteren mit Cyankalium beschrieben, ein in *gelben Pris-*  
*men* und ein in *farblosen Rhomboëdern* krystallisiren-  
des Salz, ohne jedoch ihre Zusammensetzung untersucht  
zu haben. Ich habe bei meinen oft wiederholten Ver-  
suchen über diesen Gegenstand ebenfalls zwei sehr wohl  
charakterisirte und deutlich verschiedene Salze erhalten,  
beide jedoch farblos <sup>1)</sup>, und habe gefunden, daß die  
Flüssigkeit, aus welcher das eine angeschossen war, stets  
auch das andere enthielt.

Zur Darstellung dieser Salze bediente ich mich meh-  
rerer Methoden mit gleichem Erfolge.

a) Kupfercyanür, auf die oben angeführte Art dar-  
gestellt, wurde in Cyankalium aufgelöst. b) Kupfercya-  
nürcyanid wurde eben so behandelt. c) Eine Auflösung  
von neutralem essigsauren Kupferoxyd wurde so lange  
mit Cyankalium vermischet, bis der anfangs entstandene  
Niederschlag sich unter Cyanentwicklung wieder aufge-

1) Vielleicht rührte die gelbe Farbe des einen Salzes bei Gme-  
lin von unvollkommener Reinheit her.

löst hatte, wobei die Flüssigkeit gewöhnlich eine purpurrothe Farbe annahm, die sich jedoch beim Zusatz von mehr Cyankalium und beim Erwärmen in Gelb verwandelte.

Dampft man die nach einer dieser drei Methoden erhaltene Auflösung ein, so liefert sie zuerst farblose prismatische, oft nadelförmig verlängerte Krystalle (*A*), und bei fernerm Abdampfen ein Salz in farblosen Rhomboëdern (*B*).

*A.* Die prismatischen Krystalle sind oft nach zwei Seitenflächen so stark ausgedehnt, daß sie blattartig dünn und durchsichtig wie ein Glimmerblatt erscheinen. Nur bei sehr vorsichtiger und langsamer Abkühlung habe ich sie gleichförmiger ausgebildet erhalten. Sie sind in Wasser schwerlöslich, und erleiden dadurch eine Zersetzung, welche sich durch augenblickliches Undurchsichtigwerden der klaren Krystalle zu erkennen giebt. Wendet man zu diesem Versuche nur *kalt*es Wasser an, so scheidet sich ein weißes Pulver ab, welches, nach hinreichendem Ausfüßen, als reines Kupfercyanür erscheint, ohne eine Spur Alkali zu enthalten. Die Flüssigkeit liefert beim Verdampfen einen Theil des Salzes im unzersetzten Zustande, später krystalhelt indess das folgende Salz (*B*) heraus. Diese Erscheinung beruht darauf, daß jenes in einer Auflösung des letzteren ohne Zersetzung löslich ist.

Das Doppelcyanür ist wasserfrei; zur Erforschung der relativen Gewichtsmengen seiner Bestandtheile verfuhr ich folgendermaßen:

I. 0.964 Grm. wurden im Platintiegel mit Schwefelsäure übergossen, und so lange erhitzt, bis die freie Säure verflüchtigt war. Der Rückstand, in Wasser gelöst, wurde durch einen Strom von Schwefelwasserstoffgas zersetzt, das gefällte Schwefelkupfer abfiltrirt, in Salpetersäure aufgelöst und die kochende Lösung mit Aetzkali niedergeschlagen. Das erhaltene Kupferoxyd

wog nach dem Glühen 0,5. Die vom Schwefelkupfer abfiltrirte Flüssigkeit wurde abgedampft, und das darin enthaltene schwefelsaure Kali auf die gewöhnliche Art in neutrales Salz verwandelt: es wog 0,58. Nun enthalten 0,5 Kupferoxyd 0,399 Kupfer = 41,232 Proc., und 0,58 schwefelsaures Kali 0,31358 Kali oder 0,26043 Kalium = 26,904 Proc.

II. 1,218 Grm. des Salzes gaben in einem zweiten Versuche 0,602 Kupferoxyd, worin 0,4805 Kupfer = 39,433 Proc.; 0,688 schwefelsaures Kali, worin 0,3716 Kali oder 0,3096 Kalium = 25,338 Proc.

III. 1,228 Grm. lieferten 0,635 Kupferoxyd, entsprechend 0,50689 Kupfer = 41,278 Proc.; ferner 0,705 schwefelsaures Kali, worin 0,360 Kali oder 0,31566 Kalium = 25,705 Proc.

IV. Von 1,2 Grm. wurden 0,605 Kupferoxyd = 0,4829 Kupfer, und 0,7 schwefelsaures Kali erhalten, worin 0,3781 Kali = 0,3113 Kalium; diese Zahlen entsprechen 40,245 Proc. Kupfer und 26,193 Proc. Kalium in dem Salze.

Die Resultate dieser vier Analysen sind demnach:

	I.	II.	III.	IV.
Kupfer	41,232	39,433	41,278	40,245 Proc.
Kalium	26,904	25,338	25,705	26,193 -

Wenn man nun in dem untersuchten Salze 2 At. Kupfer und 1 At. Kalium gegen 4 At. Cyan annimmt, so erfordert die Rechnung in 100 Th. des Salzes:

Kupfer	40,769	= 2 At.
Kalium	25,239	= 1 -
Cyan	33,992	= 4 :

100.

Man sieht, daß hier 1 At. Cyankalium mit 1 At. Kupfercyanür ( $\text{CuCy}$ ) verbunden ist.

Beim Erhitzen schmilzt das Salz zu einer farblosen

Flüssigkeit, aus welcher sich das Kupfer im Kufserst fein vertheilten Zustande ausscheidet, weshalb sie beim Hindurchsehen eine bläuliche Farbe annimmt.

Die wässrige Auflösung wird von den stärkeren Säuren augenblicklich zerlegt, indem Cyanwasserstoffsäure entwickelt und Kupfercyanür mit rein weißer Farbe gefällt wird. Die Alkalien haben keine merkliche Wirkung. Schwefelwasserstoffgas schlägt, selbst nach längerem Hindurchleiten, nur sehr wenig Kupfer nieder. Die wässrige Auflösung giebt mit essigsaurem Bleioxyd einen weißen, mit schwefelsaurem Eisenoxydul einen weißen, bald gelb und an der Oberfläche hellgrün werdenden, und mit salpetersaurem Silberoxyd anfangs ebenfalls einen weißen Niederschlag, welcher durch mehr hinzugesetztes Silbersalz blaugrau wird, und auf Zusatz von Salpetersäure unter schwacher Cyanentwicklung eine gelblichweiße Farbe annimmt. Kupfersalze schlagen hellgrünes Cyanür-Cyanid nieder.

B. Das andere Doppelcyanür, welches stets nach dem vorigen, und im Allgemeinen in größerer Quantität anschießt, bildet, nachdem man es durch Umkrystallisiren gereinigt hat, farblose, oft  $\frac{1}{2}$ " große Rhomboider, welche in Wasser leicht auflöslich sind und an der Luft sich nicht verändern. Es unterscheidet sich, was die Zusammensetzung betrifft, von dem vorigen Salze dadurch, daß es 3 At. Cyankalium mit 1 At. Kupfercyanür verbunden enthält, wie die Analysen beweisen, welche in derselben Art wie die oben mitgetheilten ausgeführt wurden. Das Salz enthält gleichfalls kein Wasser.

I. 2,08 Grm. gaben 0,378 Kupferoxyd, worin 0,46139 Kupfer, ferner 1,89 schwefelsaures Kali, worin 1,02186 Kali oder 0,848654 Kalium enthalten sind.

II. Von 1,66 Grm. des Salzes wurden 0,462 Kupferoxyd = 0,36479 Kupfer, und 1,596 schwefelsaures Kali = 0,8629 Kali = 0,716638 Kalium erhalten.

III. 1,742 Grm. lieferten 0,494 Kupferoxyd = 0,3943

Kupfer, und 1,599 schwefelsaures Kali = 0,8637 Kali = 0,71732 Kalium.

Dem zufolge enthalten 100 Th. des Salzes:

	I.	II.	III.
Kupfer	22,182	22,216	22,636
Kalium	40,800	41,286	41,178

Diese Zahlen verhalten sich aber wie die Gewichte von 2 At. Kupfer gegen 3 At. Kalium. Berechnet man danach die Zusammensetzung des Salzes, so erhält man:

Kupfer	22,100	= 2 At.
Kalium	41,045	= 3 -
Cyan	36,855	= 6 -
	<hr/> 100	

woraus die schon oben angedeutete Zusammensetzung und die Formel  $3K.Cy + Cu.Cy$  folgt.

Was die übrigen Eigenschaften dieses Salzes betrifft, so sind es im Allgemeinen die des vorigen, insbesondere stimmt das Verhalten in der Hitze und gegen Säuren ganz mit dem darüber Angeführten überein. Nur schlägt es einige Metallsalze unter anderen Erscheinungen nieder. Mit Blei-, Zink- und Mangansalzen giebt es weisse Niederschläge; schwefelsaures Eisenoxydul fällt es gelb; der Niederschlag wird an der Luft schnell grünlich; aus Eisenoxydsalzen fällt ein Gemenge von Kupfercyanür und Eisenoxyd unter Cyanwasserstoffentwicklung; salpetersaures Silber bewirkt eine bläulichweisse, bald grau werdende, im Ueberschuss des Doppelcyanüres lösliche Fällung; Nickelsalze fallen bläulichgrün.

Wenn man zu einer concentrirten Auflösung dieses Salzes Kupfercyanür hinzusetzt, so wird es mit grosser Leichtigkeit aufgenommen; beim Erkalten schiebt alsdann das zuvor beschriebene Doppelcyanür an, und es ist dies die beste Methode, um letzteres vollkommen rein zu erhalten, besonders wenn man einen geringen Ueberschuss von Kupfercyanür anwendet. Auf diesem

Um-

Umstand beruht auch eine Erscheinung beim Auflösen des Salzes *A* in Wasser, in sofern *kaltes* Wasser eine Zerlegung und Abscheidung von Kupfercyanür zur Folge hat, worauf beim Erhitzen bis zum Kochen eine vollständige Auflösung stattfindet.

Es bleibt nur noch übrig zu untersuchen, ob die beiden von L. Gmelin beschriebenen Salze mit den hier erwähnten identisch sind. Dieser Chemiker erhielt durch Auflösen von Kupfercyanür in Cyankalium zuerst das *gelbe*, sodann das *weiße* Doppelcyanür (Handbuch, Bd. I S. 1268); letzteres außerdem bei Anwendung des grünen Kupfercyanür-Cyanids, nach Methoden also, deren ich mich gleichfalls und sehr häufig zur Darstellung der beschriebenen Salze bediente. Nachdem ich meine Versuche über diese letzteren schon beendigt hatte, wurde ich durch Hrn. Prof. Mitscherlich in den Stand gesetzt, einen directen Vergleich in dieser Beziehung anzustellen, da Derselbe eine kleine Quantität des einen von L. Gmelin dargestellten Salzes besitzt. Dasselbe ist zwar farblos, allein seine Form ist die des Salzes *A*, und es zeigt auch, in Wasser gebracht, ganz dieselben Erscheinungen wie jenes, so daß an seiner Identität mit dem von mir beschriebenen wohl nicht zu zweifeln ist. Es ist dies auch unstreitig das von Gmelin erwähnte *gelbe* Salz, dessen Färbung gewiß unwesentlich war, da alle übrigen Eigenschaften, namentlich das Verhalten in der Hitze gegen Säuren und Alkalien, Schwefelwasserstoffgas etc. sehr gut stimmen. Nur die Reactionen gegen einige Metallsalze differiren etwas, indem Gmelin z. B. in Bleisalzen einen hellgrünen, in Silbersalzen einen schwarzbraunen Niederschlag erhielt. Allein die Farben dieser Niederschläge scheinen von Nebenumständen so sehr modificirt zu werden, daß sie wohl keinen Zweifel über die angenommene Identität beider Salze erregen können.

Das zweite von Gmelin beschriebene Doppelcya-



nür stimmt in gleicher Art mit dem Salze *B* überein, obgleich ich ersteres nicht gesehen habe, insbesondere was die Krystallform und die wichtigsten der von ihm angegebenen Eigenschaften betrifft <sup>1)</sup>; aber auch hier weichen beide in einigen Reactionen von einander ab, in sofern, nach Gmelin, schwefelsaures Eisenoxydul gar nicht <sup>2)</sup>, salpetersaures Silberoxyd aber weiß <sup>3)</sup> gefällt wird.

Vor einiger Zeit hat Cenedella <sup>4)</sup> angegeben, daß er durch Rothglöhen von getrocknetem Blut mit kohlen-saurem Kali, Kohle und aus dem Destillationsrückstande des essigsauren Kupferoxyds ein Cyankupferkalium erhalten habe. Es sollen blaßrothe Prismen seyn, welche an der Luft feucht werden und sich zersetzen, 21 Proc. Wasser enthalten, und nach der Analyse ver-mittelt Schwefel und durch Erhitzen (?) aus 1 At. Kupfer-cyanür, 1 At. Cyankalium und 1 At. Wasser bestehen sollen, was indess ganz und gar nicht aus den von Cenedella angegebenen procentischen Zahlen hervorgeht, da diese vielmehr die Formel  $KCy + CuCy + 3H$  liefern würden.

Die näheren Angaben lassen keinen Zweifel, daß der Verfasser wirklich ein Kupfer-Doppelcyanür gehabt habe, wahrscheinlich aber in einem sehr unreinen Zustande, wie dies namentlich aus seinem Verhalten gegen Säuren und seiner alkalischen Reaction hervorgeht. Eine richtige Deutung der beobachteten Thatsachen scheint indess dieser Arbeit Cenedella's zu mangeln, welche auch von Berzelius eine Beurtheilung erhalten hat. (S. dessen Jahresbericht, No. XV S. 176.)

1) Gmelin's Handbuch, Bd. I S. 1289.

2) Ibid. S. 1279.

3) Ibid. S. 1372.

4) *Giorn. di Farm.* 1833, 38; und *Pharm. Centralblatt*, 1834, S. 269.

Endlich haben wir auch einige Angaben von Fr. und Edw. Rodgers <sup>1)</sup>, das Kaliumkupfercyanür betreffend, erhalten. Sie fanden, daß Kupferoxydhydrat (nicht Oxydulhydrat, wie in der Uebersetzung wohl irrig steht, da es aus dem schwefelsauren Salze durch Kali gefällt seyn soll) mit Cyankalium und Cyanwasserstoffsäure digerirt, eine rothe oder farblose neutrale Auflösung liefert, welche sie indess nur mit einigen Substanzen geprüft, nicht aber krystallisirt haben.

#### Quecksilber.

*Kaliumquecksilbercyanid.* Die Zusammensetzung dieses Salzes habe ich schon früher angegeben, und füge hier nur noch Einiges, seine sonstigen Eigenschaften betreffend, hinzu. Erhitzt man seine Auflösung mit Chlorwasserstoffsäure, so entweicht Cyanwasserstoffsäure, und auf Zusatz von Kali erfolgt ein gelber Niederschlag von Quecksilberoxyd; es werden in diesem Fall beide Cyanmetalle zersetzt; wendet man dagegen Salpetersäure an, so entwickelt sich zwar Cyanwasserstoffsäure in Menge, aber die Flüssigkeit wird von Kali nicht gefällt, da das Cyanquecksilber von Sauerstoffsäuren nicht angegriffen wird. Alkalien haben keine Wirkung auf das Doppelcyanür. Eisenoxydulsalze fällt es gelbbraun; der Niederschlag wird an der Luft grün; Zink-, Blei- und Silbersalze weiß; aus Kupfersalzen wird, wie es scheint, reines Kupfercyanid gefällt, da der gelbe Niederschlag unter Cyanentwicklung sich in hellgrünes Cyanür Cyanid verwandelt.

*Chromsaures Kali-Quecksilbercyanid.* Unter den eigenthümlichen Verbindungen des Quecksilbercyanids mit Sauerstoffsalzen ist diese schon ziemlich lange bekannt. Man erhält sie, wie auch ihre Entdecker, Caillet und Podevin, angeben, leicht durch Abdampfung der vermischten Auflösungen beider einfachen Salze. Da

1) *Phil. Mag.* 1834, Febr. p. 91; u. *Pharm. Centralbl.* 1834 S. 630.

die Zusammensetzung dieses Salzes noch nicht ermittelt zu seyn scheint, so habe ich es in dieser Beziehung näher untersucht. Beim Erhitzen verliert es kein Wasser. 2,337 Grm. wurden in Wasser aufgelöst und salpetersaurer Baryt hinzugefügt; der gefällte chromsaure Baryt wurde abfiltrirt, ausgewaschen und getrocknet, er wog, nach gelindem Glühen, 1,015, entsprechend 0,41125 Chromsäure. Nachdem der Barytüberschuß durch Schwefelsäure wieder entfernt war, wurde das Quecksilber durch einen Strom von Schwefelwasserstoffgas niedergeschlagen. Das Schwefelquecksilber wog im scharf getrockneten Zustande 1,385, worin 1,1950 Quecksilber enthalten sind. Die Flüssigkeit wurde eingedampft, und das darin befindliche Kali als neutrales schwefelsaures Salz bestimmt, dessen Menge 0,747 betrug, und 0,403879 Kali entspricht.

Das Resultat dieser Analyse, verglichen mit der berechneten Zusammensetzung des Salzes, ist für 100 Th. desselben:

	Versuch.	Rechnung.	
Chromsäure	17,597	17,929	= 2 At.
Kali	17,281	16,228	= 2 -
Quecksilber	51,136	52,230	= 3 -
Cyan	13,986	13,613	= 6 -
	100.	100.	

Es enthält also 2 At. chromsaures Kali gegen 3 At. Quecksilbercyanid. ( $3\text{Hy Cy} + 2\text{K Cr.}$ )

#### G o l d.

Nach Scheele entsteht in einer Auflösung von Goldchlorid durch Cyankalium oder Cyancalcium ein weißer Niederschlag von *Crangold*, welcher, nach Proust's Erfahrung, beim Erhitzen sich gelb färbt, in höherer Temperatur Wasser und gasförmige Producte, unter Zu-

rücklassung von kohlehaltigem Golde, liefert <sup>1)</sup>. Nach Anderen ist das gefällte Cyangold blaßgelb; so hat neuerlich Figuier die Darstellung und die Eigenschaften des Cyangoldes beschrieben <sup>2)</sup>. In Betreff der ersteren erinnert er an die von Ittner gemachte Erfahrung, daß sich die Verbindung in einem Ueberschusse von Cyankalium auflöse, daher man diesen vermeiden müsse. Er beschreibt sie als ein hellgelbes Pulver, welches selbst von starken Säuren fast gar nicht angegriffen wird, und schon vor dem Glühen sein Cyan abgibt.

Ich verschaffte mir eine concentrirte, möglichst neutrale Auflösung von Goldchlorid, und vermischte sie mit der von Cyankalium. Es entstand indess kein Niederschlag, selbst bei einem großen Ueberschusse des Goldsalzes, wohl aber verschwand die gelbe Farbe desselben. Aus der durch Abrauchen concentrirten farblosen Flüssigkeit krystallisirte beim Erkalten das *Kaliumgoldcyanid* in farblosen, wohl ausgebildeten Krystallen, den Angaben Ittner's entgegen, nach welchem die Flüssigkeit gefärbt bleibt und ein Doppelcyanür in hellgelben Prismen liefert.

I. Als 1,035 Grm. der lufttrocknen Krystalle in einem Platintiegel bis 100° C. erhitzt wurden, verloren sie 0,04 oder 3,861 Proc. an Gewicht; als darauf die Temperatur bis zu 200° erhöht wurde, vermehrte sich dieser Verlust nicht.

II. 0,865 Grm. des Salzes, nachdem es noch einmal umkrystallisirt war, wurden wie zuvor behandelt; sie verloren unter denselben Umständen 0,03 oder 3,39 Procent.

Um den Gehalt an Gold und Kalium zu erfahren, wurde nun das entwässerte Salz angewandt.

1) Gmelin's Handb. Bd. 1 S. 1388.

2) Journ. de Pharm. 1836, p. 329, und Pharm. Centralblatt, 1836, S. 575.

I. 0,995 Grm. wurden in einem kleinen Porcelläntiegel über der Lampe mit doppeltem Luftzuge möglichst stark erhitzt. Sie schmolzen sehr schnell zu einem braunen Liquidum, aus welchem sich Gold absonderte; nach dem Erkalten wurde die Masse mit Wasser behandelt, und das ausgeschiedene Gold auf ein Filtrum gebracht. Die Flüssigkeit enthält aber noch eine ansehnliche Menge des Doppelcyanürs; sie war gelb gefärbt und verbreitete einen starken Geruch nach Cyanwasserstoffsäure. Sie wurde durch Abdampfen zur Trockne gebracht, der gelbe Rückstand mit Königswasser eingetrocknet, und die gelbgrüne Masse in einem Strom von trockenem Wasserstoffgas erhitzt. Nach erfolgter Reduction wurde das Gold durch Wasser vom Chlorkalium getrennt. Es wog nebst dem früher erhaltenen 0,555, während die Flüssigkeit 0,23 Chlorkalium lieferte.

II. 0,555 Grm. des Salzes wurden unmittelbar in Chlorgas erhitzt; in der Kälte schien keine Einwirkung stattzufinden; als aber die Kugel, worin sich das Salz befand, sehr gelinde erhitzt wurde, färbte es sich sogleich dunkel, schmolz unter Aufwallen zu einer braunschwarzen Masse, während der Geruch des Chloreycans sich bemerklich machte. Die Reduction in Wasserstoffgas geschah wie vorher. Auf diese Art lieferte das Salz 0,492 Gold und 0,186 Chlorkalium.

0,23 Chlorkalium enthalten aber 0,1208 Kalium, 0,186 dieses Salzes 0,0977 des letzteren; folglich enthalten 100 Theile des trocknen Salzes:

	I.	II.
Gold	55,779	57,544
Kalium	12,143	11,428

Dafs die erste Analyse nicht den Grad von Genauigkeit besitzen kann, wie die zweite, ist bei dem angegebenen Verfahren unzweifelhaft; das Resultat der letzteren

stimmt sehr gut mit folgender berechneten Zusammensetzung:

Gold	57,874	= 2 At.
Kalium	11,405	= 1 -
Cyan	30,721	= 8 -
	<hr/> 100	

wonach das Salz eine Verbindung von 1 At. Goldeyanid mit 1 At. Cyankalium,  $KCy + AuCy^2$ , ist. Der Wassergehalt des krystallisirten kommt  $1\frac{1}{2}$  At. nahe, welche 3,77 Proc. erfordern würden.

Die Krystalle fatesciren an der Luft sehr schnell. In der Hitze schmelzen sie, indem Gold und Cyangas ausgeschieden werden, obwohl eine vollkommene Zersetzung auf diesem Wege sehr schwer zu erreichen seyn dürfte. Säuren verursachen in der Auflösung des Salzes keine Fällung, jedoch wird Cyanwasserstoffsäure frei, und die Flüssigkeit färbt sich gelb. Dies Verhalten steht mit der Angabe Ittner's im Widerspruch, wonach durch Säuren Goldeyanid niedergeschlagen werden soll. Dagegen bewirkt Quecksilberchlorid eine gelbe Fällung von *Cyngold*, welches, nach dem Trocknen an der Luft erhitzt, unter Cyanentwicklung lange vor dem Glühen verglimmt, und metallisches Gold zurückläßt, dessen Menge, einem Versuche zufolge, welcher indess nur mit 0,1 Grm. angestellt wurde, 76,19 Proc. vom lufttrocknen Salze betrug. Figuier hat in dem von ihm beschriebenen Goldeyanid, welches mit jenem identisch zu seyn scheint, 75 Proc. Gold gefunden. Beide Zahlen stimmen indess nicht genau mit der berechneten Zusammensetzung eines Goldeyanids ( $AuCy^2$ ), in welchem 71,53 Gold und 28,47 Cyan enthalten seyn müssen.

## Platin.

*Platincyaur.* Döbereiner hat vor Kurzem <sup>1)</sup> gezeigt, daß man das Platincyaur erhält, wenn man das Doppelcyanür mit einer Quecksilberoxydul-Auflösung vermischt, und den blauen Niederschlag, welcher eine Verbindung von Quecksilberplatincyaur mit dem Quecksilbersalze zu seyn scheint, mit verdünnter Salpetersäure behandelt. Es bleibt dann weißes Quecksilberplatincyaur, welches, beim Erhitzen in einem verschlossenen Gefäße, Platincyaur hinterläßt. Ich habe es auf diese Art in Form eines grünlichgelben Pulvers erhalten. Nach Döbereiner entspricht es dem Platinoxidul, ist also Pt Cy.

*Kaliumplatincyaur.* Diefes Salz ist schon von L. Gmelin genauer untersucht worden, welcher auch seine Zusammensetzung vorläufig so bestimmte, daß es 1 At. des erwähnten Platincyaur's, 1 At. Cyankalium und 3 At. Wasser enthalten sollte <sup>2)</sup>. Nur in dieser Beziehung habe ich es untersucht, und kann Gmelin's Angabe dadurch vollkommen bestätigen. Es wurde durch Glühen von Platinschwamm mit Kaliumeisencyaur dargestellt.

0,828 Grm. verloren beim anhaltenden Erhitzen bis 200° 0,115 oder 13,898 Proc. Der Rest wurde in einem Strom von trockenem Chlorgas erhitzt, und bierauf mittelst Wasserstoffgas reducirt. Beim Uebergießen mit Wasser blieben 0,36 metallisches Platin zurück, während die Flüssigkeit durch Abdampfen und gelindes Glühen des Rückstandes 0,265 Chlorkalium lieferte, worin 0,14972 Kalium enthalten sind.

In 100 Theilen des wasserfreien Salzes sind nun enthalten:

1) Diese Annalen, Bd XXXVII S. 545

2) Dessen Handbuch, Bd 1 S. 1456, und Berzelius Lehrbuch, Bd IV S. 671



	Versuch.	Bechnung.	
Platin	50,190	51,757	= 1 At.
Kalium	20,998	20,557	= 1 -
Cyan		27,686	= 4 -

100.

Danach berechnet, machen 3 At. Wasser 12,402 Proc. aus; der Versuch gab etwas mehr, da das Salz noch etwas Feuchtigkeit enthielt, die nicht gut durch Liegenlassen an der Luft ganz vollständig entfernt werden konnte, in sofern das Doppelcyanür zum Verwittern sehr geneigt ist.

## Palladium.

Wenn man eine neutrale Auflösung von Palladiumchlorür mit Cyanquecksilber vermischt, und das gefällte und ausgewaschene Palladiumcyanür in Cyankalium auflöst, so erhält man nach dem Verdampfen ein *Kalium-palladiumcyanür* in farblosen durchsichtigen Blättchen, welche sich an der Luft nicht verändern.

I. 0,895 Grm. der Krystalle, längere Zeit einer Temperatur von 200° C. ausgesetzt, verloren 0,055 oder 6,145 Proc.

II. 1,223 Grm. verloren auf gleiche Art 0,071 oder 6,132 Proc.

I. 0,792 des entwässerten Salzes wurden eine Zeit lang beim Zutritt der Luft geschmolzen, die erkaltete Masse mit Schwefelsäure übergossen, erhitzt und die freie Säure wieder verjagt, alledann in Wasser gelöst und das Palladium durch Schwefelwasserstoffgas niedergeschlagen. Da der Niederschlag sich an der Luft nicht veränderte, so wurde er so lange getrocknet, bis er nichts mehr an Gewicht verlor, und aus ihm, bei der Annahme, daß er Pd sey, das Palladium berechnet. Er wog 0,38, und enthält so 0,29184 Palladium oder 36,848 Proc. des wassersfreien Salzes. Das Kali wurde aus der

vom Schwefelpalladium abfiltrirten Flüssigkeit auf die gewöhnliche Art als schwefelsaures Salz bestimmt, dessen Menge 0,55 betrug, worin 0,29736 Kali oder 0,22626 Kalium, d. h. 28,568 Proc. enthalten sind.

II. 1,148 Grm. gaben, ohne dass sie jedoch vor dem Behandeln mit Schwefelsäure durch Glühen theilweise zersetzt worden wären, 0,4072 Palladium = 35,47 Proc. und 0,3089 Kalium oder 26,91 Proc.

Die Resultate beider Analysen führen zu folgender berechneten Zusammensetzung:

	Versuch.		Rechnung.	
	I.	II.		
Palladium	36,848	35,47	36,676	= 1 At.
Kalium	28,568	26,91	26,984	= 1 -
Cyan			36,341	= 4 -
			<hr/> 100.	

Wenn die Menge des Wassers im krystallisirten Salze 1 Atom beträgt (= 5,83 Proc.), so ist die Formel für dasselbe in Folge dieser Versuche:



Mehrmals erhielt ich indess nicht dieses Salz, sondern ein anderes in prismatischen Krystallen, welche sich schon dadurch sehr kenntlich machen, dass sie in sehr kurzer Zeit ihre Durchsichtigkeit verlieren und an der Oberfläche verwittern. Die nachstehenden Versuche zeigen, dass diese Krystalle sich von den zuvor beschriebenen nur dadurch unterscheiden, dass sie 3 At. Wasser enthalten. Ich konnte wegen Mangel an Material nicht die Umstände ermitteln, unter denen sich beide vorzugsweise bilden.

I. 1,588 Grm. der noch etwas feuchten Krystalle verloren bei 150° C. 0,295 oder 18,576 Proc.

II. 1,118 Grm. verloren eben so 0,191 oder 16,71 Procent.

0,927 des entwässerten Salzes lieferten auf die oben

angeführte Art 0,475 Schwefelpalladium, worin 0,3648 Palladium oder 39,352 Proc.

Das schwefelsaure Kali wog, 0,573 = 0,3098 Kali = 0,25729 oder 27,371 Proc. Kalium.

Diese Zahl nähert sich der oben mitgetheilten; nur der Palladiumgehalt fällt etwas zu hoch aus. Das Wasser müßte unter der angenommenen Voraussetzung 15,6 Proc. betragen: daß eine größere Menge gefunden wurde, rührt von der Schwierigkeit her, das Salz zu trocknen, ohne daß es schon auf der ganzen Oberfläche verwittert wäre.

#### I r i d i u m.

*Cyaniridiumkalium* ist ganz neuerlich von Booth entdeckt und von Wöhler beschrieben worden <sup>1)</sup>. Ich habe es auf die dort angegebene Weise dargestellt, und mit denselben Eigenschaften erhalten. Als ich die relativen Mengen des Iridiums und Kaliums zu bestimmen versuchte, stieß ich auf große Schwierigkeiten, welche in der starken Verwandtschaft des Cyans zum Iridium begründet zu seyn scheinen, da diese Verbindung der Einwirkung der stärksten Reagentien mit seltener Hartnäckigkeit widersteht.

Anfangs versuchte ich das Salz durch Erhitzen in einem Strom von getrocknetem Chlorwasserstoffgas in eine Chlorverbindung zu verwandeln, welche durch Wasserstoffgas sehr leicht hätte reducirt werden können. Diefs glückte jedoch nur sehr unvollkommen; das Salz erwärmte sich zwar schon von selbst in dem Gase, und nahm später eine graugrüne Farbe an; allein als er nach sehr lange fortgesetztem Darüberleiten des Chlorwasserstoffs in Wasserstoffgas erhitzt wurde, entband sich eine große Menge Ammoniak, und als die Masse später herausgenommen und mit Wasser übergossen wurde, löste

1) Diese Annalen, Bd XXXI S 167

dieses letztere unzersetztes Doppelscyanür auf, und zeigte außerdem einen merklichen Blausäuregeruch.

Statt des Chlorwasserstoffgases versuchte ich später Chlor zur Zersetzung anzuwenden; allein mit dem nämlichen Resultate, selbst unter Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln; ja es war selbst kein besserer Erfolg wahrzunehmen, wenn das Salz zuvor mit Königswasser eingedampft, oder wenn es an der Luft eine Zeit lang erhitzt worden war.

Indefs scheinen die angestellten Versuche zu beweisen, daß das darin enthaltene Cyaniridium dem Oxydul proportional sey ( $\text{IrCy}$ ). Dafür spricht die grüne Färbung im Chlorwasserstoff- wie im Chlorgas, mehr aber noch der Umstand, daß beim Kochen des Salzes mit Chlorwasserstoffsäure oder Königswasser ein graugrünes Pulver (Iridiumchlorür) sich abscheidet, und eine, eben so gefärbte Auflösung entsteht.

Ich will hier die Resultate eines Versuches anführen, bei welchem die Zersetzung ziemlich vollständig erfolgt war, daher sie vielleicht annäherungsweise die richtigen Verhältnisse ausdrücken. Nachdem 1,15 Grm. des gepulverten Salzes (welches wasserfrei ist) mit Chlor und Wasserstoffgas hinreichend lange behandelt werden, wurde das reducirte Iridium durch Wasser von der Salzmasse getrennt, letztere zur Trockne abgeraucht und von Neuem der Einwirkung jener beiden Gase ausgesetzt. Das so erhaltene Chlorkalium, 0,702 an Gewicht, enthielt nur Spuren des Doppelscyanürs, aber eine Quantität Kieselsäure, von der Zersetzung des Glases herrührend, deren Menge leider nicht bestimmt wurde. Das Iridium betrug im Ganzen, nachdem es in gelinder Hitze, um Oxydation zu vermeiden, getrocknet worden war, 0,41 oder 35,652 Proc. In 0,702 Chlorkalium sind 0,37824 Kalium enthalten, mithin 32,890 Proc.

Es scheint, daß das Salz 1 At. Iridiumcyanür gegen 2 At. Cyankalium enthält, es wären dann in 100 Th.:

	Versuch.	Rechnung.	
Iridium	35,652	38,510	= 1 At.
Kalium	32,690	30,591	= 2 "
Cyan		30,899	= 6 "

100.

Vermischt man die Auflösung des Salzes mit der von salpetersaurem Quecksilberoxydul, so entsteht ein gelblichweißer Niederschlag, welcher beim Glühen in einer kleinen Retorte ein graues Pulver hinterläßt. An der Luft geblüht, wird dasselbe schwarz. Die geringe Menge der Substanz erlaubte nicht zu untersuchen, ob es reines Iridiumcyanür war.

## Chrom.

Fr. und Edw. Rodgers <sup>1)</sup> haben ein *Cyanchrom* dadurch erhalten, daß sie eine Auflösung des sogenannten Chromalauns mit Cyankalium fällten. Der Niederschlag besitzt eine grüne Farbe, und soll, in Salpetersäure gelöst, auf Zusatz einer Silberauflösung, eine Fällung von Cyansilber geben. Ich habe das Cyanchrom auf die angegebene Art sowohl mit dem Kali- als Ammoniak-Alaun darzustellen versucht. Der entstehende Niederschlag besaß das Ansehen des Chromoxydhydrats, und seine Fällung war immer mit Freiwerden von Cyanwasserstoffsäure verbunden. Nach hinlänglichem Auswaschen in Salpetersäure aufgelöst, gab er mit salpetersaurem Silber keine Spur eines Niederschlags. Auch durch starke Säuren wird keine Cyanwasserstoffsäure aus ihm entbunden. Beim Erhitzen verliert er viel Wasser, verglimmt hierauf, wird dunkelgrün und unlöslich in Säuren; und zeigt mithin, daß er nicht Cyanchrom, sondern Chromoxydhydrat sey. In der That ist es bis jetzt noch nicht gelungen, eine directe Verbindung der Art bei denjenigen Oxyden hervorzubringen, welche = R

1) *Berzelius's Jahresbericht*, No XV S. 185.

sind, z. B. Thonerde, Eisenoxyd, Manganoxyd, Chromoxyd.

Zum Schluss sey es mir erlaubt, die Resultate der angeführten Analysen zu einer Classification sämmtlicher Doppelcyanüre zu benutzen. Es ergiebt sich aus jenen, daß das Verhältniß des Cyans in den beiden einfachen Salzen sehr einfach, entweder wie 1 : 1, oder wie 1 : 2, oder wie 1 : 3 ist.

I) Verhältniß des Cyans = 1 : 1.

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1) Kaliumeisencyanid  | $3K\text{Cy} + Fe\text{Cy}^3$ |
| 2) Kaliumkobaltcyanid | $3K\text{Cy} + Co\text{Cy}^3$ |
| 3) Kaliummanganeyanid | $3K\text{Cy} + Mn\text{Cy}^3$ |

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 4) Kaliumzinkcyanür                                      | $K\text{Cy} + Zn\text{Cy}$  |
| 5) Kaliumcadmiumcyanür                                   | $K\text{Cy} + Cd\text{Cy}$  |
| 6) Kaliumnickelcyanür                                    | $K\text{Cy} + Ni\text{Cy}$  |
| (das krystallisirte theils $\frac{1}{2}H$ , theils $H$ ) |                             |
| 7) Natriumnickelcyanür                                   | $Na\text{Cy} + Ni\text{Cy}$ |
| (das krystallisirte $5H$ )                               |                             |
| 8) Kaliumquecksilbercyanid                               | $K\text{Cy} + Hg\text{Cy}$  |
| 9) Kaliumsilbercyanid                                    | $K\text{Cy} + Ag\text{Cy}$  |
| 10) Kaliumkupfercyanür                                   | $K\text{Cy} + Cu\text{Cy}$  |
| 11) Kaliumplatincyanür                                   | $K\text{Cy} + Pt\text{Cy}$  |
| (das krystallisirte mit $3H$ )                           |                             |
| 12) Kaliumpalladiumcyanür                                | $K\text{Cy} + Pd\text{Cy}$  |
| (das krystallisirte theils mit $H$ , theils mit $3H$ )   |                             |

II. Verhältniß des Cyans = 2 : 1.

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) Kaliumeisencyanür            | $2K\text{Cy} + Fe\text{Cy}$  |
| (das krystallisirte mit $3H$ )  |                              |
| 2) Natriumeisencyanür           | $2Na\text{Cy} + Fe\text{Cy}$ |
| (das krystallisirte mit $12H$ ) |                              |

- 3) Natriumzinkeyanür  $\text{Na Cy} + 2\text{Zn Cy}$   
 (das krystallisirte mit 5H)  
 4) Kaliumirridiumcyanür  $2\text{K Cy} + \text{Ir Cy}$

III. Verhältniß des Cyans = 3 : 1.

- 1) Kaliumkupfercyanür  $3\text{K Cy} + \text{Cu Cy}$   
 2) Kaliumgoldcyanür  $\text{K Cy} + \text{Au Cy}^3$   
 (das krystallisirte mit  $1\frac{1}{2}\text{H}$ ).

Vielleicht ist es hier nicht ganz am unrechten Orte, daran zu erinnern, wie unter den äußeren Charakteren der meisten Doppelcyanüre ihre Farbe häufig nicht diejenige der übrigen Salze des betreffenden Metalles ist; indem hier die gelbe Farbe bei den Salzen des Nickels, Kobalts und Eisens, Farblosigkeit hingegen bei denen des Kupfers, Goldes, Palladiums und Iridiums eintritt. — Ein anderer bemerkenswerther Umstand ist ihr so sehr verschiedenes Verhalten gegen Schwefelwasserstoff; denn während einige durch dieses Gas sehr leicht zersetzt, und die in ihnen enthaltenen Metalle vollkommen als Schwefelmetalle gefällt werden (die Doppelcyanüre des Silbers, Quecksilbers, Cadmiums), so läßt sich aus anderen durch Schwefelwasserstoffgas das Metall entweder gar nicht, oder doch erst nach längerer Zeit und nicht vollständig niederschlagen (hierher vorzüglich die Doppelcyanüre des Eisens, Kupfers, Nickels, Kobalts, Zinks u. a.)<sup>1)</sup>.

1) Neuerlich sind von A. Bette (Ann. d. Pharm. Bd. XXII S. 148, und Bd. XXIII S. 115) noch folgende Verbindungen krystallisirt (aufser No. 3) dargestellt und zerlegt:

- 1) Natriumeisencyanid  $3\text{Na Cy} + \text{Fe Cy}^3 + 2\text{Aq}$   
 2) Ammoniumeisencyanid  $3\text{NH}^4\text{Cy} + \text{Fe Cy}^3 + 6\text{Aq}$   
 3) Magnumeisencyanid  $3\text{Mg Cy} + \text{Fe Cy}^3 + 18\text{Aq}?$   
 4) Calceumeisencyanid  $3\text{Ca Cy} + \text{Fe Cy}^3 + 10\text{Aq}$   
 5) Kalium-Bariumeisencyanid  
 $= (3\text{K Cy} + \text{Fe Cy}^3) + 2(3\text{Ba Cy} + \text{Fe Cy}^3) + 6\text{Aq}$   
 6) Magnumeisencyanür  $2\text{Mg Cy} + \text{Fe Cy}^3 + 10\text{Aq}$   
 7) Strontumeisencyanür  $2\text{Sr Cy} + \text{Fe Cy}^3 + 15\text{Aq}$

Die Cyanide bilden schön rothe Krystalle (nur No. 3 krystallisirt nicht), und entstehen aus den entsprechenden Chlorüren durch Behandlung mit Chlor. No. 5, analog aus dem No. 4'schen Cyanürsalz (Ann. Bd. XXV S. 391) gebildet, gehört einer neuen Klasse von Doppelcyaniden an. P.



X. *Darstellung reiner schweflichter Säure;*  
*von Richard Felix Marchand.*

**B**erthier's Methode, die schweflichte Säure durch Erhitzen eines Gemenges von Mangansuperoxyd und Schwefelblumen darzustellen, ist unzweckmässig, weil man sie stets mit Sauerstoff, Schwefelgas und anderen beim Glühen des Braunsteines, wenn man ihn nicht vorher recht sorgfältig gereinigt hat, stets erscheinenden Unreinigkeiten vermischt erhält. Am allerreinsten ist sie auf trockenem Wege durch Erhitzen eines sehr innigen Gemenges von Schwefelblumen und Kupferoxyd zu erhalten, indem man das Dreifache vom Gewicht des Schwefels an Kupferoxyd anwendet. Man bringt dieses Gemenge in eine enge, unten zugeschmolzene Glasröhre, und packt darüber eine halb so hohe Schicht reines Kupferoxyd, welches man erst bis zum Glühen erhitzt, bevor man das Gemenge erwärmt. Es ist nicht nöthig das Kupferoxyd zu trocknen, da sich kein Schwefelwasserstoffgas bildet, und man das ausgetriebene Wasser durch eine Chlorcalciumröhre, durch welche man das entwickelte Gas leiten kann, leicht entfernt. Zu den meisten Zwecken genügt das Erhitzen von Schwefelsäure mit Kupferspänen, oder, was bei weitem den Vorzug verdient, und auch von der neuen *Pharmacopée française etc.* vorgeschrieben wird, mit Quecksilber, da die Masse hier niemals steigt, was bei dem Kupfer fast stets der Fall ist.

XI. *Ueber eine Reihe organischer Verbindungen, welche Arsenik als Bestandtheil enthalten; von Dr. G. R. Bunsen in Cassel.*

(Fortsetzung der Abhandlung Ann. Bd. XXXX S. 219.)

Der erste Abschnitt dieser Arbeit beschäftigte sich mit der Untersuchung des Alkarsins, einer Substanz, welche durch die Einfachheit ihrer Zusammensetzung eben so sehr als durch die Eigenthümlichkeiten ihres Verhaltens beachtenswerth, zugleich als erstes Beispiel einer Verbindung dasteht, in der Arsenik die Rolle eines der organischen Bestandtheile übernimmt. Schon damals bot sich die Gelegenheit dar, auf einige Zersetzungsproducte dieser Arsenikverbindung hinzuweisen, welche ein bisher noch nicht betretenes, vielleicht sehr umfassendes Feld für neue Untersuchungen eröffnen dürfte. Unter diesen Producten verdient derjenige Stoff zuerst erwähnt zu werden, welcher aus der directen Einwirkung von Sauerstoff auf Alkarsin hervorgeht, und den ich in Beziehung auf seine Entstehungsart mit dem Namen *Alkargen* belege.

Es wird vielleicht nützlich seyn, wenn die Untersuchung der übrigen hiehergehörigen Verbindungen beendigt, und der rationelle Zusammenhang, der unter ihnen obwaltet, ermittelt ist, manche der gewählten Benennungen mit passenderen zu vertauschen, die indessen, einer rationellen Betrachtungsweise vielleicht mehr entsprechend, doch gewiss bald wieder, bei der rasch fortschreitenden Erweiterung unserer Ansichten Werth und Bedeutung verlieren würden.

## Zweite Abtheilung.

Vom Alkargen, seiner Darstellung, seinen Eigenschaften und seiner Zusammensetzung.

Da man bei der Darstellung des Alkargens mit großen Quantitäten der Cadet'schen Flüssigkeit zu arbeiten gezwungen ist, dürfte es nicht unpassend seyn, bevor ich die dabei befolgte Methode weiter erörtere, Diejenigen, welche sich nach mir mit Untersuchung über diesen Gegenstand beschäftigen sollten, auf einige Vorsichtsmaßregeln aufmerksam zu machen, deren Befolgung auf das Dringendste bei der Handhabung dieser Stoffe zu empfehlen ist. Wer auch nur mit kleinen Quantitäten Alkarsin gearbeitet hat, dem wird es nicht entgangen seyn, wie nöthig es ist, die Versuche im Freien vorzunehmen, indem in einem geschlossenen Raume der Geruch bald bis zur Unerträglichkeit gesteigert wird, und mannigfaltige Unbequemlichkeiten zur Folge hat. Vor Allem aber macht es die große Selbstentzündlichkeit des Alkarsins erforderlich, bei den Versuchen ein Gefäß mit Wasser stets zur Hand zu haben. Die geringste Menge dieser Substanz entzündet sich fast momentan an der Luft, und bewirkt dabei, mit Theilen des Körpers in Berührung gebracht, Brandwunden, die äußerst gefährlich sind, indem das Alkarsin noch giftiger wirkt, als selbst die arsenige Säure, wovon ich mich durch Versuche an Thieren überzeugt habe. Erlüzt sich die Flüssigkeit nur auf der Haut, ohne sich zu entzünden, so entsteht eine Röthung und leichte Entzündung, die durch Umschläge von essigsaurem Eisenoxyd leicht zu entfernen sind. Die enorme Entzündlichkeit dieses Stoffes macht es ohnehin sehr schwierig, größere Mengen desselben aus einem Gefäße in das andere überzufüllen. Es ist daher am bequemsten, die über Kalk in einer doppelt tubulirten Vorlage destillirte Flüssigkeit in dieser selbst aufzubewahren.

Um sie vorkommenden Falls in andere Gefäße überzufüllen, habe ich mich einer kleinen Retorte bedient, deren Hals vor der Lampe zu einer langen Spitze ausgezogen und die mit Kohlensäure angefüllt war. Nachdem man dieses Gas zum Theil durch Erwärmen ausgetrieben, und die Spitze durch eine kleine Oeffnung der tubulirten Vorlage in das Alkarsin gesteckt hat, tritt dasselbe in die Retorte ein, und läßt sich dann leicht durch abermaliges Erwärmen des Retorten-Bauches in andere Gefäße überfüllen. Nie darf man versäumen, die Retorte vorher mit Kohlensäure anzufüllen, indem man diese durch die Spitze zwei bis drei Mal durch Erwärmen aus- und eintreten läßt. Versäumt man diese Vorsicht, so findet im Innern des Gefäßes eine Entzündung statt, bei der dieselbe nicht selten zertrümmert und das brennende Alkarsin umhergeschleudert wird. Ich habe mich von der Nothwendigkeit dieser Vorsichtsmaßregeln mehr als einmal zu überzeugen Gelegenheit gehabt, aber auch die Ansicht dabei gewonnen, daß bei ewiger Vorsicht diese Untersuchungen vollkommen gefahrlos sind, und daß selbst das Einathmen dieser fast unerträglichen arsenikalischen Gerüche, so weit es nicht zu vermeiden, ohne *bleibende* Nachteile für die Gesundheit ist — ein Grund mehr, diese interessanten Stoffe einer Dunkelheit zu entziehen, zu der sie eine übertriebene Furcht der Chemiker verurtheilt zu haben scheint.

Bei der Darstellung des Alkargen muß man besonders darauf bedacht seyn, den Sauerstoff anfangs sehr langsam zutreten zu lassen. Später ist es nicht erforderlich, diese Vorsicht anzuwenden, indem die Oxydation in dem Wasser schwieriger von Statten geht, als der Gehalt an Alkargen in der Flüssigkeit zunimmt. Anfangs scheiden sich sehr schöne Krystalle von Alkargen aus, die man indessen wegen der großen Selbstentzündlichkeit des sie umgebenden Alkarsins nicht mechanisch trennen kann. Nach und nach verdicht sich die ganze

Flüssigkeit zu einer weissen körnigen Masse; die einen Stich in's Braune zeigt, der um so tiefer ist, je schneller man die Oxydation bewirkte. Ausser dem Alkargen entsteht bei dieser Oxydation noch ein unerträglich riechender, im Wasser leichtlöslicher ätherartiger Stoff, den ich vorläufig, der Kürze wegen, *Hydrarsin* nennen will, und eine kleine Menge arseniger Säure, deren Bildung indessen fast vollständig vermieden werden kann, wenn man den Sauerstoff möglichst langsam Zutreten läßt. Die erhaltene bräunliche Masse löst sich in allen Verhältnissen, mit Zurücklassung der etwa gebildeten arsenigen Säure, im kalten Wasser auf. Man trennt die Säure durch Filtration, und dampft die Auflösung im Wasserbade so lange ab, bis sie beim Erkalten zu einer festen Masse erstet. Diese ist vollständig in absolutem Alkohol auflöslich, der beim Erkalten das Alkarsin in Krystallen absetzt, die indessen noch mit einer Quantität Hydrarsin und etwas arseniger Säure unreinigt sind. Man sammelt sie auf einem kleinen Filter, und wäscht sie einige Male mit kleinen Mengen absoluten Alkohols aus, welcher das Hydrarsin leichter aufnimmt als Alkargen. Das Auswaschwasser vereinigt man mit der anfänglichen Mutterlauge, aus der man, durch eine zweimalige gleiche Behandlung, noch eine beträchtliche Menge unreines Alkargen erhält. Von einem grossen Theile des Hydrarsins kann man die Krystalle durch Auspressen zwischen Löschpapier, oder dadurch befreien, daß man sie wiederholt im Wasser auflöst und im Wasserbade zur Trockenheit abraucht, wobei das beigemengte Hydrarsin mit den Wasserdämpfen grösstentheils entweicht. Um die letzten Antheile der arsenigen Säure von den Krystallen zu trennen, behandelt man ihre Auflösung mit Eisenoxydhydrat in der Kälte. Die filtrirte Flüssigkeit enthält dann zwar etwas Eisenoxyd in Auflösung; dampft man sie indessen ab, so scheidet sich ein Theil desselben wieder aus, ein anderer Theil bleibt

in der alkoholischen Auflösung, wenn man die Substanz einer wiederholten Krystallisation unterwirft. Diese muß drei bis vier Mal vorgenommen werden, um jede Verunreinigung zu vermeiden. Da das Alkargen aus einer hydratanhaltigen Mutterlauge schwer krystallisirt, so habe ich bei einem Theile des für die nachstehende Untersuchung bereiteten Körpers diese Substanz gleich anfangs durch Pressen des oxydirten Alkarsins zwischen mehreren Lagen Filtrirpapier größtentheils entfernt, und dann das erhaltene, fast weiße Alkargen, durch Behandeln mit Eisenoxydhydrat und absolutem Alkohol, vollends auf die angegebene Weise gereinigt. Diese Methode gewährt den Vortheil, daß man dabei Hydrarsin zugleich gewinnen kann, und nicht so sehr von den Dämpfen dieser letzteren Substanz belästigt wird.

Vollkommen reines Alkargen zeigt folgende Eigenschaften: Es bildet spröde, glasglänzende, vollkommen durchsichtige, farblose oder weiße, sehr nett ausgebildete Krystalle. Aus der Lage und Combination der Flächen ergibt sich, daß sie einem trimetrischen Systeme, nach Hausmann, angehören. Sie bilden geschobene vierseitige Säulen mit ungleicher, gegen die Seitenflächen schräg eingesetzter Zuschärfung. Da sie kein besonderes Interesse darbieten, habe ich es für überflüssig gehalten, ihre Grundform zu berechnen. Lage und Größe der Winkel ist folgende (Siehe Taf. I Fig. 8):

$$\begin{array}{ll} a - d = 123^{\circ} 32' & d - f = 97^{\circ} 27' \\ a' - d' = 116 \quad 30 & d - f = 82 \quad 23 \\ f - a = 65 \quad 23 & a - a' = 119 \quad 52 \\ f' - a' = 94 \quad 45. \end{array}$$

Beachtenswerth ist die große Annäherung des Winkels, welchen die Zuschärfungsflächen mit einander bilden, an  $120^{\circ}$ , die man bei den anisometrischen Systemen nicht selten antrifft, ohne einen Grund dafür angeben zu können.

Die Krystalle sind vollkommen geruchlos, und zei-



gen einen kaum bemerkbaren Geschmack. An trockner Luft sind sie beständig, an feuchter zerfließen sie; Wasser und sehr verdünnter Alkohol löst sie in allen Verhältnissen auf, absoluter ebenfalls, aber in geringerem Verhältniss, und setzt beim Erkalten oder freiwilligen Verdunsten sehr deutliche und grosse Krystalle wieder ab. Wasserhaltiger Aether löst eine geringe Menge davon auf, die sich beim freiwilligen Verdunsten in feinen schillernden Krystallblättchen wieder aussondert; wasserfreier hingegen nimmt nichts davon auf, sondern fällt sie aus ihrer alkoholischen Auflösung. Sie besitzt eine sehr schwach saure Reaction, und scheint sich mit Basen verbinden zu können. Diese Verbindungen sind indessen so unbeständig, dass man sie nicht in fester Gestalt erhalten kann. Mit Alkalien und alkalischen Erden bildet sie eine gummiartige Masse, ohne Anzeigen von Krystallisation. Mit Eisenoxydhydrat gekocht, entsteht eine braune, eisenoxydhaltige Auflösung, die beim Abdampfen wieder zersetzt wird. Kupferoxydhydrat wird davon in grösserer Menge aufgenommen, und bildet eine blaue Solution, die, im luftleeren Raume verdampft, eine blaue extraktartige Masse hinterlässt. Schon beim Kochen dieser Lösung findet eine Zersetzung statt, indem sich höchst fein zertheiltes Kupferoxyd ausscheidet, das durch Filtriren nicht getrennt werden kann. Mit Säuren vereinigt sich das Alkargen nicht, direct namentlich geht Schwefelsäure keine Verbindung damit ein. Bringt man diese Substanz im wasserfreien oder wasserhaltigen Zustande damit zusammen, und behandelt man die in Wasser aufgelöste Masse mit kohlensaurem Baryt, so krystallisirt das Alkargen, ohne mit Schwefelsäure sich verbunden zu haben, unverändert aus. Salpetersäure, selbst rauchende, und sogar Königswasser bewirkt keine vollständige Oxydation. Verdünnt man die bis zur Zerstörung der Salpetersäure gekochte Auflösung mit Wasser, und leitet man wiederholt einen Strom Schwefelwas-



serstoff hindurch, so bleibt stets eine durch dieses Gas nicht fällbare Arsenikverbindung in Auflösung, deren Arsenikgehalt sich erst beim Glühen zu erkennen giebt. Das Alkargen zeigt also auch in dieser Beziehung ein den organischen Verbindungen analoges Verhalten, welche meistens, wie der Indigo, der Zucker, das Gummi u. s. w., unter dem Einflusse dieser oxydirenden Substanz eigenthümliche Zersetzungsproducte bilden. Dafs solche Producte auch beim Alkargen entstehen, und dafs ihre Untersuchung vielleicht auf interessante Resultate führen dürfte, ist nicht unwahrscheinlich. Leider aber war die mir zu Gebote stehende Menge der Substanz nicht hinreichend, um die Untersuchung auch nach dieser Richtung hin auszudehnen.

Der Stoff läfst sich, ohne eine Veränderung zu erleiden, bis zu  $200^{\circ}$  C. erhitzen: bei dieser Temperatur schmilzt er zu einem ölartigen Liquidum, das erst bei  $90^{\circ}$  C. wieder zu einer krystallinisch strahligen Masse erstet. Während des Schmelzens findet schon eine theilweise Zersetzung statt, die sich durch eine schwache braune Färbung, und durch einen stechenden arsenikalsischen Geruch zu erkennen giebt. Bis zu  $230^{\circ}$  C. und darüber erhitzt, wird die Substanz völlig zersetzt, bräunt sich anfangs, färbt sich immer dunkler, stöfst dabei nach Alkarsin riechende Dämpfe aus, und setzt metallisches Arsenik und arsenige Säure ab. Dafs auch hier besondere Zersetzungsproducte entstehen, dürfte wohl kaum zu bezweifeln seyn.

Unter dem Einflusse stark desoxydirend wirkender Substanzen erleidet das Alkargen eine sehr merkwürdige Zersetzung, auf die ich später noch einmal zurückkommen werde, wenn die Zusammensetzung desselben näher betrachtet worden. Bringt man z. B. Zinnchlorür mit einer Auflösung von Alkargen zusammen, so entsteht beim schwachen Erwärmen eine milchige Trübung, die sich bald zu ölartigen Tropfen ansammelt. Diese

Tropfen stoßen an der Luft dicke weiße Nebel aus, erhitzen sich dabei, und besitzen den eigenthümlichen Geruch und alle übrigen Eigenschaften des *Alkarsins*. Phosphorige und phosphatische Säuren bringen dieselben Erscheinungen, besonders beim Erhitzen hervor. Man kann dieß Verhalten sehr vorthellhaft benutzen, um die Gegenwart kleiner Mengen von Alkargen zu erkennen, indem man die dasselbe enthaltene Auflösung mit phosphoriger Säure, oder noch besser mit Zinnchlorür kocht, wobei der durchdringende Alkarsingeruch sogleich hervortritt. Schwefelwasserstoff bringt weder für sich noch bei Gegenwart von freier Chlorwasserstoffsäure die geringste Spur einer Fällung von Schwefelarsenik in den Auflösungen des Alkargens hervor. Dagegen entsteht eine milchige Trübung, die sich beim Erwärmen zu ölartigen Tropfen ansammelt. Diese besitzen einen vom Alkarsin durchaus verschiedenen, mehr lauchartigen Geruch. Die nähere Betrachtung dieser Substanz übergehe ich für jetzt. Andere schwächer desoxydirend wirkende Stoffe, z. B. schwefelsaures Eisenoxydul, schwellige Säure, Oxalsäure u. a. m., äußern diese desoxydirenden Wirkungen nicht.

Eben so zeigt das Alkargen ein in toxikologischer Beziehung sehr merkwürdiges Verhalten. Obgleich es mehr als 78 Procent Arsenik und Sauerstoff in demselben relativen Verhältniß enthält, wie sie in der Arseniksäure vorhanden sind, zeigt es dessen ungeachtet gar keine, oder doch nur höchst unbedeutende giftige Eigenschaften. Frösche, denen kleine Mengen dieser Substanz, selbst bis zu einem Gran, beigebracht waren, blieben mehrere Tage gesund und starben erst längere Zeit darauf. Erwägt man nun, daß die zu dem Versuche benutzten Thiere eine große Empfindlichkeit gegen die metallischen Gifte zeigen, daß schon  $\frac{1}{10}$  Gran aufgelöster arseniger Säure bei denselben nach weniger als einer Stunde ein Erlöschen der Lebenskraft nach sich zieht,

wobei selbst die Erregbarkeit der Muskeln durch den galvanischen Strom nach zwei Stunden schon verschwindet, so wird man das Alkargen nicht für eine giftige Substanz erklären können. Dieses unerwartete Verhalten steht übrigens in vollkommenem Einklange mit einer allgemeinen, aber weniger beachteten Thatsache, die sich in den pharmakodynamischen Eigenschaften der organischen Stoffe ausspricht, und in der eines der unterscheidenden Merkmale begründet ist, welche diese unter dem Einflusse der Lebenskraft erzeugten Substanzen vor den anorganischen voraus haben. Treten nämlich Stoffe zu unorganischen Verbindungen zusammen, so werden dadurch ihre pharmakodynamischen Eigenschaften nur modificirt, aber nicht aufgehoben; vereinen sie sich hingegen zu organischen, so gehen diese Eigenschaften verloren. Das Kupfer, das Quecksilber, das Blei, das Baryum verlieren ihre Wirkungen nicht, welches auch die lösliche Verbindung seyn möge, in der sie sich befinden. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff hingegen, die im Strychnin oder Emetin die heftigsten Gifte bilden, erscheinen im Kleber und Eiweiß als vollkommen unschädliche Stoffe. Eine sehr schöne Bestätigung findet diese Thatsache im Alkargen. Arsenik ist darin, gleichsam durch organische Verwandtschaft gebunden, zum unschädlichen Stoffe geworden.

Die Analyse des Alkargens bietet keine Schwierigkeiten dar. Wasserstoff und Sauerstoff lassen sich sehr genau nach der Liebig'schen Methode ermitteln; der Arsenikgehalt hingegen erfordert eine getrennte Bestimmung. Bei dem ersten Versuche wurde eine Substanz benutzt, die drei Mal umkrystallisirt war. Zu dem zweiten, der mit möglichst großer Vorsicht angestellt wurde, diente eine vier Mal umkrystallisirte. In beiden Fällen war dieselbe bei 109° C. in einem entwässerten Luftstrome getrocknet.

## No. I.

Menge des angewandten Alkargens	0,4556 Grm.
Erhaltene Kohlensäure	0,2497 -
Erhaltenes Wasser	0,1997 -

## No. II.

Menge des angewandten Alkargens	0,9398 -
Erhaltene Kohlensäure	0,5768 -
Erhaltenes Wasser	0,4116 -

Der letztere Versuch war mit besonderer Sorgfalt und mit sehr reinem Alkargen angestellt. Das Arsenik hatte sich zum Theil in Substanz im kälteren Theile des Verbrennungsrohrs sublimirt, zum Theil befand es sich als Arsenikkupfer, hauptsächlich aber als arseniksaures Kupferoxyd darin. Im Chlorcalcium zeigte sich keine Spur davon.

Was die Bestimmung des Arsens anbelangt, so ist es mir nicht gelungen, dasselbe von der grossen Menge Kupferoxyd, mit dem es im Verbrennungsrohre gemengt ist, mit Genauigkeit zu trennen. Die in den Lehrbüchern der analytischen Chemie angegebene Scheidungsmethode durch schwefelwasserstoffsäures Ammoniak ist völlig unbrauchbar, da das Schwefelkupfer, welche Vorsichtsmaassregeln man auch anwenden mag, in diesem Körper nicht ganz unlöslich ist. Durch Eisen lässt sich das Kupfer ebenfalls nicht abscheiden, da auch Arsenik durch diese Substanz reducirt wird. Eine andere Methode, die ich versuchte, gelang ebenfalls nicht vollständig. Mit Cyanwasserstoffsäure nämlich versetzt und in Kali aufgelöst, verliert das Kupferoxyd die Eigenschaft, durch Schwefelwasserstoff gefällt zu werden, indem sich Cyankupferkalium bildet. Die grosse Menge Cyanwasserstoffsäure indessen, welche bei dieser Scheidung erforderlich ist, so wie die Einwirkung, welche der Schwefelwasserstoff auf die Cyanwasserstoffsäure ausübt, machen diese

Methode unpractisch. Besser gelingt die Scheidung, nach Stromeyer's Vorschlag, durch schwefelwasserstoffsaureres Kali, unter Beobachtung der bekannten Vorsichtsmafsregeln. Indessen gelang es mir auf diesem Wege ebenfalls nicht, eine *genaue* Trennung zu erhalten. Es blieb mir daher nichts weiter übrig, als die Oxydation mit chlorsaurem Kali zu bewirken. Dieser Versuch ist mit Gefahr verbunden, wenn man nicht einen sehr grossen Ueberschufs des Oxydationsmittels, etwa die 60- bis 80fache Menge, dabei anwendet, damit nicht die bei dem Erhitzen des Alkargens freiwerdenden brennbaren Gase in einem solchen Verhältnisse mit dem zugleich entweichenden Sauerstoff gemischt sind, dafs eine Explosion entstehen kann. 0,313 Grm. bei 100° getrocknetes Alkargen wurden auf die angegebene Weise oxydirt, in chlorwasserstoffsäurehaltigem Wasser aufgelöst, und so lange mit Schwefelwasserstoff behandelt, bis beim Stehen an der Luft kein Schwefelarsenik mehr ausgeschieden wurde. Die erhaltene Menge des Niederschlags betrug 0,352 Grm. 0,3188 Grm. dieser Fällung mit rauchender Salpetersäure im Wasserbade oxydirt, lieferten, mit Chlorbaryum gefällt, 1,2687 schwefelsauren Baryt. Nach diesem Resultate beträgt der Arsenikgehalt 50,72 Procent. Da der Versuch mit grosser Sorgfalt ausgeführt war, habe ich ein Wiederholen desselben für überflüssig gehalten.


Legt man die zweite Analyse, die mit der grössten Menge Alkargen angestellt wurde, und die mit der ersten sehr gut übereinstimmt, zum Grunde, so ergibt sich folgende procentische Zusammensetzung dieses Stoffes, wenn man den Sauerstoff aus dem Verluste bestimmt:

Kohlenstoff	16,97
Wasserstoff	4,88
Sauerstoff	27,43
Arsenik	50,72
	<hr/> 100,00.


Diesem Resultate entspricht folgende theoretische Zusammensetzung:

C <sup>4</sup>	305,6	16,67
H <sup>14</sup>	87,3	4,76
O <sup>3</sup>	500,0	27,28
As <sup>2</sup>	920,0	52,29
	<hr/> 1832,9	<hr/> 100,00.


Das Alkargen enthält daher 2 Atome Wasserstoff und 5 Atome Sauerstoff mehr als das Alkarsin. Diese ersteren 2 Atome sind unstreitig als Wasser in der Verbindung enthalten. Denn obgleich das Alkargen beim Erhitzen, ohne eine Zersetzung zu erleiden, dieses Wasser nicht ausgießt, so läßt sich doch sein Vorhandenseyn aus der Entstehung, so wie aus der Zersetzung dieser Arsenikverbindung durch Zinnchlorür und phosphorige Säure mit Gewißheit nachweisen. Diese Entstehung aus dem Alkarsin folgt sehr einfach daraus, daß das letztere 4 At. Sauerstoff und 1 At. Wasser aufnimmt, wie sich aus der beistehenden Zusammenstellung ergibt:



Auf dieselbe Weise wie das Alkargen gebildet wird, zerfällt es auch wieder durch desoxydirende Stoffe in die Substanzen, aus denen es entstand. Aus den nachstehenden Schematen ist diese Zersetzung ersichtlich:








Das Alkargen gehört daher zu den wenigen organischen Stoffen, deren Zusammensetzung sich durch Analyse und Synthese zugleich nachweisen läßt.

Ohne schon jetzt eine bestimmte Ansicht über das Verhältniß zu äußern, in welchem das Alkargen zum Alkarsin steht, wird man doch unmittelbar durch dieses Verhalten darauf geführt, das erstere als ein Oxydhydrat des letzteren zu betrachten, dem die nachstehende Formel entsprechen würde:



Ich habe schon jetzt Grund zu vermuthen, daß die Verbindung  $\text{C}^4\text{H}^{12}\text{As}^3 + \text{O}^4$  wirklich existirt, und daß sich das Wasseratom durch andere Wasserstoffsäuren ersetzen läßt<sup>1)</sup>. In diesem Falle würde es nicht unwahrscheinlich seyn, daß auch einfache elektropositive Sub-

1) Berzelius hält es, nach einer brieflichen Mittheilung, für wahrscheinlich, daß das Alkarsin 1 At. Sauerstoff enthält, indem dann die Bildung desselben sehr einfach darauf beruhen würde, daß 1 At. arsenige Säure und 2 At. Essigsäure beim Erhitzen, in 4 Atome Kohlensäure und 1 Atom Alkarsin zerfallen. Nämlich:




Mit dieser Ansicht steht auch das Lichtbrechungsvermögen des Alkarsins nicht im Widerspruche, welches nur 1,762 beträgt, und daher ebenfalls dafür zu sprechen scheint, daß das Alkarsin eine oxydirte Substanz ist. Die einer genauen Arsenikbestimmung entgegenstehenden Schwierigkeiten haben es mir bisher nicht gestattet, diese interessante Frage durch einen directen Versuch zu beantworten. Ich hoffe indessen vermittelt einer organischen Analyse mit arsenikfreiem Nickeloxyd den Arsenikgehalt mit der erforderlichen Genauigkeit ermitteln, und dadurch diese scharfsinnige Conjectur vielleicht realisiren zu können, die das Alkarsin und die große Reihe seiner Zersetzungsproducte zur Acetyltheorie in eine so nahe und einfache Berührung bringt.



stanzen ( $\text{As}^2$ ) sich mit zusammengesetzten ( $\text{C}^4\text{H}^{11}$ ) verbinden können, ohne ihre Eigenschaften als Radicale zu verlieren, ähnlich wie unter zusammengesetzten, z. B. die Schwefelsäure, sich mit Aether, Benzin etc. vereinigt, ohne den Charakter einer Säure dadurch einzubüßen.

Zu der Aethertheorie scheint das Alkargen in keiner einfachen Beziehung zu stehen. Im Sinne der Acetyltheorie hingegen erscheint es als ein wasserhaltiger überacetylsaurer Arsenikwasserstoff. Nämlich:



Bei dieser Annahme würde man vier Oxydationsstufen des Acetyls ( $\text{C}^4\text{H}^6$ ) annehmen können, und zwar:

$\text{C}^4\text{H}^6 = \bar{\text{Ac}}$  unbekannt.

$\bar{\text{Ac}}$  im Aldehyd und vielleicht im Alkarsin

$\bar{\text{Ac}}$  in der wasserhaltigen Aldehydsäure

$\bar{\text{Ac}}$  in der wasserhaltigen Essigsäure

$\bar{\text{Ac}}$  im Alkargen.

Bevor nicht die Untersuchung der übrigen hieher gehörigen Verbindungen beendigt ist, wage ich es noch nicht, eine bestimmte Ansicht über die Zusammensetzung des Alkargens auszusprechen, deren Begründung dem Schlusse dieser Abhandlungen vorbehalten bleiben mag. Im nächsten Abschnitte werde ich eine andere organische Arsenikverbindung beschreiben, die sich unmittelbar an den eben betrachteten Stoff anzuschließen scheint.

**XII. Paton's, Marsh's und Simon's Methoden, Arsenik zu entdecken, nebst Bemerkungen von Berzelius.**

(Aus Berzelius's Jahresbericht, No. 17 p. 173 d. O.)

Um arsenige Säure in thierischen Stoffen zu entdecken, empfiehlt Paton <sup>1)</sup>, diese Stoffe zuvörderst durch Gallapfelaufguss aus der Lösung zu fällen, und sodann das Arsenik durch Schwefelwasserstoff niederzuschlagen. Ungewiss ist es, ob diese Methode einen Vorzug habe vor der von Taufflieb <sup>2)</sup>, bei der die thierischen Stoffe durch eine Lösung von Zinkoxyd in Aetzkali gefällt werden.

Eine andere Methode hat Marsh <sup>3)</sup> vorgeschlagen, und diese verdiente alle Aufmerksamkeit, sobald sie noch bei einem sehr kleinen Arsenikgehalt gelingt. Diese Methode beruht auf der Verwandlung des Arseniks in Arsenikwasserstoffgas, welche, nach seinen Versuchen, sehr leicht vor sich gehen soll, wenn man die auf Arsenik verdächtige Masse mit Schwefelsäure sauer macht und ein Stück Zink hineinlegt. Das sich entwickelnde Wasserstoffgas wird dann arsenikhaltig. Er hat hiezu recht passende Apparate erdacht, aber das Gas zur Entdeckung des Arseniks ungeschickt angewandt. Er lässt nämlich das gesammelte Gas durch eine feine Oeffnung ausströmen, zündet es an, und hält entweder über die Flamme eine Glastafel, welche sich dann mit metalli-

1) *Journ. de chim. med. Ser. II T. I p. 524.*

2) *Journ. de Pharm. T. XX p. 392.*

3) *Ed. New phil. Journ. T. XXI p. 229.*

schem Arsenik beschlägt, oder leitet die Flamme in eine an beiden Enden offene Glasröhre, worin sich dann sowohl metallisches Arsenik als arsenige Säure absetzt.

Marsh hat hiebei eine Eigenschaft des Gases übersehen, welche mit weit größerer Sicherheit benutzt werden kann, nämlich die, in der Hitze das Arsenik abzusetzen. Man braucht es nur durch eine Rohre zu leiten, die an einer Stelle glühend gemacht ist; das Arsenikwasserstoffgas zerfällt dann in Arsenik, welches sich etwas weiterhin auf eine kältere Stelle des Glases niederschlägt, und in Wasserstoffgas, das rein davongeht. Auf diese Weise braucht man keinen anderen Apparat als eine gewöhnliche Gasentwicklungsflasche, aus der man das Gas, in dem Maasse als es sich entwickelt, durch eine über einer Wingeistflamme glühend erhaltene Glasröhre leitet. Will man zur größeren Sicherheit eine kleine gewogene Menge von mit Wasserstoff reducirtem Kupfer in die Röhre auf die glühende Stelle legen, so erhält man weißes Arsenikkupfer, und kann so das Arsenik, welches dem Wasserstoffgas folgte, mit der äußersten Genauigkeit wägen.

Ich löste ein Milligramm weißen Arseniks in ein wenig verdünnter Schwefelsäure auf, verdünnte die Lösung noch bis zum Volum von sechs Unzen Wasser (setzte Zink hinzu) und leitete das erhaltene Wasserstoffgas über ein Bischen gewogenes, zuvor mit Wasserstoffgas reducirtes und in einer engen Glasröhre glühendes Kupfer. Die Reaction auf Arsenik war ganz deutlich. Der vordere Theil des Kupfers wurde silberweiß, und roch, vor dem Löthrohr erhitzt, stark nach Arsenik. Als ich den Versuch mit einem Centigramm arseniger Säure anstellte, wurden ungefähr zwei Drittel des darin enthaltenen Arseniks, verbunden mit Kupfer, erhalten. Hieraus erhellt, daß diese Probe, wenn sie auch nicht zur quantitativen Bestimmung anwendbar ist, doch alle Aufmerksamkeit  
als

als eine qualitative verdient, und mehr bedarf es nicht in allen gerichtlich-medizinischen Fällen <sup>1)</sup>).

- 1) Zur sicheren Anwendung dieser Methode ist übrigens wesentlich erforderlich, worauf auch schon Marsh aufmerksam machte, daß die dabei gebrauchten Stoffe, Zink und Schwefelsäure, gänzlich frei von Arsenik seyen, was namentlich bei der englischen Schwefelsäure häufig nicht der Fall ist. F. Mohr hat bei einer Prüfung dieser Methode (welche völlig zu Gunsten derselben ausfiel. — S. Ann. d. Pharm. Bd. XXIII S. 217) sogar gefunden, daß reine Zinkstücke, die einmal zu dem Versuch gedient haben, nicht wieder angewandt werden können, weil sie sich, in Berührung mit arseniger Säure, auch schon ohne Gegenwart von Salz- oder Schwefelsäure, mit einer Schicht Arseniark bedecken, und dann, selbst mit reiner Salz- oder Schwefelsäure behandelt, arsenikhaltiges Wasserstoffgas liefern.

Die große Empfindlichkeit der Flamme des arsenikhaltigen Wasserstoffs in Ablagerung von metallischem Arsenik auf eine darüber gehaltene glatte Porcellanplatte ist auch von Liebig bestätigt worden (Ann. Pharm. Bd. XXIII S. 223). Derselbe macht bemerkt, daß dabei leicht eine Täuschung stattfinden könne, indem auch Eisen, so wie überhaupt jedes andere schwere Metall, namentlich Antimon, bei Auflösung in Salzsäure ein Wasserstoffgas giebt, dessen Flamme an eine darüber gehaltene Porcellanfläche einen schwarzen Anflug absetzt. Dieser Anflug, welcher sich sogar, nach Hindurchleitung des Gases durch eine 12 Zoll lange, mit groben kohlhydratstücken gefüllte Röhre, noch zeigt, und nur ein gerades verschwindet, wenn man es durch eine mit lockerer Baumwolle gefüllte Röhre streichen läßt, röhrt, bei Gegenwart von Eisen in der Flüssigkeit, von Eisenchlorür her, das, mechanisch mit fortgerissen, in der Flamme zu metallischem Eisen reducirt und als solches auf das Porcellan abgesetzt worden ist. Ein Tropfen Salpetersäure oder Schwefelammonium entscheidet, ob der Anflug Eisen oder Arsenik sey. Ist er Eisen, so greift die Salpetersäure ihn nicht an, und das Schwefelammonium macht ihn schwarz.

Gleich Berzelius hat auch Liebig die Marsh'sche Methode dahin verbessert, daß er das arsenhaltige Wasserstoffgas durch Glühen in einem Glasrohre zur Ablagerung seines Arsenikgehaltes zwingt, und überdies hat er dieselbe Methode auf die Reduction von Schwefelarsenik angewandt. Sein Verfahren ist dieses:

Schwefelarsenik, das man, nach Berzelius's Methode, Poggendorf's Annal. Bd. XXXII.

Simon <sup>1)</sup> hat vorgeschlagen, statt des aus gebranntem weinsauren Kalk dargestellten kohlehaltigen Kalks, Aetzkalk, bereitet aus Hydrat, zur Reduction von Schwefelarsenik anzuwenden, nämlich den ersteren auf das letztere zu legen, und sodann das Ganze zu glühen, bis dieses in Dampfform durch jenen streicht. Allein auch diese Methode hat die Unbequemlichkeit, daß der Kalk fortgestoßen wird und oft zurückgeschoben werden muß:

durch Schwefelwasserstoff aus den thierischen Substanzen niedergeschlagen hat, löst man in Kalilauge auf, und setzt nun essigsaures Bleioxyd hinzu, so lange, bis ein Tropfen der Flüssigkeit mit Essigsäure keinen Niederschlag giebt, andererseits aber immer einen Ueberschuß vom Alkali in der Flüssigkeit bleibt. Aller Schwefel des Schwefelarseniks tritt dann an das Blei, und alles Arsenik findet sich als arsenige Säure in der Flüssigkeit. Diese wird nun mit Zink und Schwefelsäure behandelt, und das entweichende Gas durch eine enge, an einer Stelle glühende Glasröhre geleitet, worauf sich dann das Arsenik als ein schwach metallischer Ring in dem kälteren Theil der Röhre ansetzt. Selbst 0,5 Milligram. Schwefelarsenik giebt noch ein zuverlässiges Resultat, wiewohl man auf diesem Wege nie alles Arsenik bekommt.

Als ganz zuverlässig empfiehlt L. noch folgende Methode. Man löst das Schwefelarsenik in Kalilauge, setzt dann salpetersaures Silberoxyd hinzu, so lange, bis ein Tropfen der Flüssigkeit mit Essigsäure keinen gelben Niederschlag giebt (Kali muß auch hier immer in Ueberschuß bleiben). So entsteht Schwefelsilber, und alles Arsenik bleibt als arsensaures Kali in der Flüssigkeit. Diese übersättigt man nun schwach mit Salzsäure, erhitzt sie, nachdem Chlor- und Schwefelsilber abfiltrirt worden, zum Sieden, um die freie Kohlensäure zu entfernen, und übersättigt sie dann mit Kalkwasser. Der Niederschlag, arsensaurer Kalk, wird scharf getrocknet und mit Kohlenpulver auf bekannte Weise reducirt. — Statt die Flüssigkeit mit Kalkwasser zu fällen, kann man sie auch geradezu im Wasserbade eintrocknen, den Rückstand mit Kohle mengen und glühen. — Statt des salpetersauren Silberoxyds läßt sich auch salpetersaures Kupferoxyd anwenden, nur müssen, vor der Sättigung mit Salzsäure, Schwefelkupfer und Kupferoxyd abfiltrirt werden.

1) Poggendorff's Ann. Bd. XXXIX S. 326.

auch erhält man mit ätzendem Kalk nur einen Theil des Arsens.

Ich wende mit aller Bequemlichkeit eine lockere Kohle an, welche durch Eintauchung in eine Lösung von kohlensaurem Natron mit derselben getränkt, darauf getrocknet und in einem bedeckten Tiegel gelinde geglüht worden ist. In eine, an einem Ende zugeschmolzene Röhre von einer halben Linie inneren Durchmessers lege ich erst das Schwefelmetall, auf dieses einige,  $\frac{1}{2}$  bis 1 Zoll lange Splitter dieser Kohle, packe dieselbe zusammen, und ziehe nun, vor der Kohle, die Röhre zu einer feinen Spitze aus. Zuerst erbitze ich die Kohle über einer Weingeistlampe mit doppeltem Luftzug, und dann bringe ich das Schwefelmetall in die Flamme. Das Schwefelmetall vereinigt sich erst ohne Reduction mit der Kohle; aber allmählig, bei voller Glühhitze, in welcher die Röhre erweicht und sich biegt, bildet die Kohle, auf Kosten des Schwefels im Schwefelarsenik, Schwefelnatrium, und das Arsenik sublimirt vollständig in dem ausgezogenen Theil der Röhre. Offenbar kann dieselbe Methode auch auf die arsenige Säure angewandt werden. Vor Liebig's Methode mit Kalk und Kohle hat sie indess keinen anderen Vorzug, als den, daß die Masse still liegt, und daß die Natronkohle jeden Augenblick innerhalb weniger Minuten in einem Platintiegel bereitet werden kann.

### XIII. *Die Reduction des Schwefelarseniks durch Silberkohle; von F. F. Runge.*

Die Reduction der *arsenigen Säure* durch einen Kohlensplitter läßt nichts zu wünschen übrig. Nicht so genügend sind die Methoden, das *Schwefelarsenik* zu redu-

ciren, weil man gewöhnlich pulverförmige Gemenge anwendet, die leicht in die Höhe getrieben werden und das Experiment unsicher machen. Allem diesem weicht man aus durch die Anwendung einer *silberhaltigen Kohle*.

Man kocht Kohlensplitter mit einer Auflösung von essigsaurem Silberoxyd und dampft fast bis zur Trockne ab. Hierauf trocknet man die Splitter, ohne sie abzuwaschen, und glüht sie in einer Glasröhre. So sind sie zum Gebrauch fertig, und werden eben so angewendet, wie die Kohlensplitter ohne Silber bei der Reduction der arsenigen Säure.

Silber für sich, reducirt zwar auch das Schwefelarsenik, allein das Metall sublimirt sich in kleinen Kügelchen und nicht in der Form des so charakteristischen Arsenikspiegels, wie es hier der Fall ist.

XIV. *Notiz über die Verbindung des Stickstoffs mit den Metallen, namentlich mit dem Kupfer, im Glühzustande; von C. H. Pfaff in Kiel.*

Die Versuche, welche zuerst Thénard, und besonder später Despretz (Poggendorff's Annalen, Bd. X S. 296) über die *Veränderungen*, welche die Metalle, besonders *Eisen* und *Kupfer*, sobald *Ammoniakgas* über dieselben, wenn sie im glühenden Zustande sich befinden, geleitet wird, erleiden, sind den Chemikern hinlänglich bekannt. Despretz glaubte durch die von ihm in dieser Hinsicht eigenthümlich angestellten Versuche es außer Zweifel gesetzt zu haben, daß diese Veränderungen von einer wirklichen Aufnahme des *Stickstoffs* durch diese Metalle abhängen. Berzelius, nachdem er Despretz's Versuche kurz erzählt (Lehrbuch



der Chemie, 1833, Bd. II S. 335) äußert sich, daß Despretz's Untersuchung viel zu wünschen übrig lasse, daß aber jedenfalls diese Materie ein interessanter Gegenstand für neue und gründliche Untersuchungen sey.

Es schien mir noch ein anderer Weg als der von Despretz eingeschlagene vorhanden zu seyn, um die Aufnahme des *Stickstoffs* durch gewisse Metalle, wenn sie sich im glühenden Zustande befinden, zu beweisen. Es ist nämlich bekannt, daß das *Ammoniakgas*, wenn es in seine Bestandtheile zerlegt wird, in ein Gemenge von *Stickgas* und *Wasserstoffgas* zerfällt, das dem Volumen nach aus 1 Volumen des ersteren und 3 Volumen des letzteren besteht. Bei Zerlegung des Ammoniakgases, wie es durch das Streichen über glühende Metalle bewirkt wird, muß sich demnach dasselbe Verhältniß von Wasserstoffgas und Stickgas finden, wenn der Stickstoff von den Metallen nicht absorbiert wird, und die merkwürdige Veränderung, welche sie in ihren Eigenschaften erfahren, nicht von der Aufnahme von Stickstoff herrührt; im entgegengesetzten Falle muß sich ein vergrößertes Verhältniß von *Wasserstoffgas* gegen das *Stickgas* ergeben. Der Versuch erfordert allerdings viele Sorgfalt und Vorsicht. Ich zog den Kupferdraht dem Eisendrahte vor, um jede Ungewißheit, welche durch die Zersetzung eines kleinen Antheils Wasserdampf, der dem Ammoniakgas noch beigemischt gewesen seyn könnte, zu beseitigen. Zu dem Versuche, der wiederholt angestellt ward, wurden gute Porcellanröhren ausgewählt, in welche eine beträchtliche Länge aufgerollten Kupferdrahts von 1 Par. Linie Dicke gesteckt wurde. Das Ammoniakgas wurde aus Salmiak durch gebrannten Kalk entwickelt und über scharf geglühtes Aetzkalk geleitet, und die Porcellanröhre an ihrem anderen Ende durch eine rechtwinklich gebogene Röhre mit einer Woulf'schen Flasche verbunden, in welcher Wasser vorge-schlagen war, um das unzersetzt gebliebene Ammoniak-

gas zu absorbiren. Der Versuch wurde mehrere Stunden fortgesetzt, um eine große Menge Ammoniakgas zu zersetzen. Das übergelassene Gas wurde in getrennten Portionen aufgefangen. Nach beendigten Versuche zeigte sich der Kupferdraht mit den schönsten Regenbogenfarben spielend, und die am meisten veränderten Portionen desselben waren in hohem Grade zerreiblich. Die Analyse des übergelassenen Gases geschah durch ein sehr gutes Volta'sches Endiometer, das  $\frac{1}{100}$  des Volumens des Gases noch sehr genau anzeigte. Das Gas war erst zur Untersuchung gezogen, nachdem ein beträchtlicher Theil, welchem die atmosphärische Luft der Gefäße beigemengt seyn mußte, übergelassen war.

Folgendes waren die Resultate dreier Gasportionen, in der Folge der Zeit, in welcher sie übergelassen waren, geordnet:

*Erste Portion.* 400 Volume wurden mit 200 Volume Sauerstoffgas verpufft. Der Rückstand betrug 200 Vol. Es waren demnach 400 Vol. verschwunden, von denen  $266\frac{2}{3}$  auf Rechnung des Wasserstoffgases kommen, so daß demnach jene 400 Vol. des analysirten Gases nur  $266\frac{2}{3}$  Wasserstoffgas enthalten. Aus den folgenden Versuchen läßt sich schließen, daß dieser ersten Portion noch ein Theil atmosphärischer Luft der Gefäße beigemengt war.

*Zweite Portion.* Es wurden 300 Vol. des übergelassenen Gases mit 300 Vol. Sauerstoffgas verpufft. Der Rückstand betrug nur 213, und es waren demnach 387 Vol. verschwunden, von denen auf Rechnung des Wasserstoffgases 258 kommen. Jene 300 Vol. des zerlegten Gases hätten, wenn sie nach dem Verhältnisse von 3 : 1 aus Wasserstoffgas und Stickgas zusammengesetzt gewesen wären, nur 225 Vol. Wasserstoffgas und 75 Stickgas enthalten sollen; es war demnach ein Ueberschuß von 33 auf 300, und das Stickgas betrug, statt  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  volles Siebentel

*Dritte Portion.* Es wurden abermals 300 Vol. des übergegangenen Gases mit 300 Vol. Sauerstoffgas verpufft. Der Rückstand betrug 210 Vol., wovon demnach 390 Vol. verschwanden. Von diesen kommen auf Rechnung des Wasserstoffgases 260, was einen beinahe gleichen Verlust an Stickgas wie in der zweiten Portion anzeigt. Da der Ueberschuß an Wasserstoffgas nicht wohl einer Zersetzung von Wasserdämpfen zugeschrieben werden kann, indem bekanntlich das Wasser durch glühendes Kupfer nicht zersetzt wird, auch für Austrocknung des *Ammoniakgases* die nöthige Sorge getragen worden war, so bleibt keine andere Erklärung übrig, als daß die Verwandtschaft des Kupfers durch starke Glühhitze hinlänglich gesteigert wird, um wirklich Stickstoff aufzunehmen, von dessen Aufnahme auch jene merkwürdigen physischen Veränderungen abhängen, welche Thénard zuerst beobachtet, und Despretz genauer bestimmt hat, dessen Resultate hierdurch auf einem andern Wege ihre Bestätigung gefunden haben.

---

XV. *Beschreibung zweier Apparate zur Bestimmung der Dämpfe der Fumarollen und der in den Mineralwässern enthaltenen Kohlensäure; vom Dr. Hermann Abich.*

---

Eigene Erfahrung hat mich die Schwierigkeit kennen gelehrt, mit denen die scheinbar so leicht auszuführenden Untersuchungen der elastischen Flüssigkeiten verbunden sind, welche den *Fumarollen* der Solfataren, so wie dem Inneren der vulkanischen Cratere im Laufe ihrer periodischen Eruptionsercheinungen entsteigen. Durch vielfache Versuche überzeugt, daß die Hauptbedingung bei diesen Untersuchungen, beliebige Quantitäten der zu

prüfenden Gase an jeder Stelle mit Leichtigkeit und insbesondere vollkommen *frei* von atmosphärischer Beimengung aufzufangen, mit Anwendung der bisher zu diesem Endzweck beschriebenen Mittel nicht vollständig zu erreichen ist, kam ich zur Zusammenstellung eines Apparates, der jene Bedingungen zu meiner Zufriedenheit erfüllt. — Die Einfachheit seiner Zusammenstellung, so wie die Leichtigkeit und Schnelle vermittelt desselben, ohne weitere Umwege, sichere qualitative Resultate zu erhalten, sind Eigenschaften, welche eine nähere Beschreibung an diesem Orte vielleicht rechtfertigen dürfen. Die Vorrichtung ist folgende: — Eine Flasche von starkem Glase und möglichst cylindrischer Form, Fig. 9 Taf. I, wird unmittelbar über dem Boden durchbohrt und die Oeffnung mit einem genau passenden Kork verschlossen, durch welchen ein, nach Angabe der Figur gebogenes, luftdicht eingefügtes Glasrohr *a* im Inneren der Flasche ausmündet. Die obere Krümmung des Rohres befindet sich in gleichem Niveau mit dem unteren Theile des Korkes, der den Hals der Flasche gleichfalls luftdicht verschließt und von dem offenen Rohre *b* durchsetzt wird, welches bis zum Boden der Flasche hinabreicht. Oben ist dasselbe gekrümmt und zur Aufnahme einer beliebigen Verlängerungsröhre mit Cautschuck versehen. Vermittelt dieser Vorrichtung wird es möglich, die Dämpfe auch solcher Localitäten schnell und sicher aufzufangen, welche, wie dies so häufig der Fall ist, nur ein momentanes Annähern, keinesweges aber einen längeren Aufenthalt und unmittelbare Anwendung der, wenn auch noch so gut verwahrten Hände gestatten. Nachdem man dem mit Wasser oder Quecksilber gefüllten Apparate, in möglichster Nähe des Emanationspunktes der zu untersuchenden Dämpfe, eine passende Unterlage gegeben, und das, so tief und dicht als möglich in das Innere der Fumarolle gesenkte Verlängerungsrohr *c* selbst eine Zeit lang dem Durchzuge der Dämpfe

ausgesetzt hat, wird dasselbe mittelst des Cautschuckröhrchens mit dem Rohre *b* in luftdichte Verbindung gesetzt. Durch bloßes Umdrehen und Heruntersenken des vorerwähnten Rohres *a* wird nun der Eintritt der Dämpfe in die Flasche schnell vermittelt, der durch Wiederaufrichtung des Rohres nach Belieben zu hemmen ist. Sorgt man dafür, die absperrende Flüssigkeit nicht allzusehr zu vermindern, so bleibt der Apparat nach der Trennung vom Rohre *c*, auch bei starker Bewegung, vermöge des, bis auf den Boden der Flasche reichenden Rohres *b* doch vollkommen geschlossen. — Ist die Flasche kalibriert, und hat man sich nur mit einem kleinen pneumatischen Apparat, bestehend in einer der Form und GröÙe der Flasche zweckmäÙig angepaßten hölzernen Kapsel, versehen, so ist ersichtlich, wie man mit Leichtigkeit und mit Anwendung einer sehr geringen Menge Quecksilber, mittelst zuvor in die Flasche gebrachten kaustischen Alkalis, den etwaigen Gehalt an Kohlensäure z. B. selbst *quantitativ* auf der Stelle bestimmen kann, indem man nur nöthig hat das Rohr *a* nahe am Kork unter Quecksilber abzubrechen, um die Absorption der Kohlensäure wahrnehmen zu können, deren Volum durch die kalibrierte Flasche sogleich angezeigt wird. Entsprechender für die *qualitative* Untersuchung der Gasmenge wird der Apparat aber durch Anwendung präcipitirender Flüssigkeiten, die man zur Absperrung anwendet und leicht in besonderen Fläschchen mit sich führen kann. Da man es in seiner Gewalt hat, die absperrende Flüssigkeit, so oft man will, wieder in die kalibrierte Flasche zu bringen und *bestimmte* Gasmenge auf das Neue hindurch zu leiten, so dürfte eine spätere, mit leichten Mitteln zu bewerkstelligende Absonderung und Bestimmung des gewonnenen Niederschlages auch wohl für annähernde Schlüsse auf den quantitativen Gehalt gewisser Gase in einem gegebenen Volum des Gemenges nicht ganz unbrauchbar erscheinen.

Ich habe mich mit Hülfe dieses einfachen Apparates sehr oft von dem Vorhandenseyn, selbst der kleinsten Mengen von Kohlensäure, Salzsäure, Schwefel- und Hydrothionsäure an solchen Orten überzeugt, wo eine der gewöhnlichen Auffangungsmethoden durchaus zu keinem sicheren Resultate geführt haben würde, und glaube deshalb die Anwendung desselben, namentlich dem reisenden Geologen empfehlen zu können, der selten complicirtere Apparate mit sich zu führen im Stande ist. Zwei bis drei, in der beschriebenen Art vorgerichtete Flaschen, einige schon im Voraus eingepasste Reservoröhren von verschiedener Stärke und in seine Spitzen ausgezogen, die sich nach Bedürfniss durch Abbrechen leicht erweitern, so wie mit dem Löthrohr verschmelzen lassen, eine Flasche mit destillirtem oder Regenwasser und geringe Mengen concentrirter Lösungen der nöthigen Reagenzien, sind in der Regel vollkommen genügend, und können ohne grosse Schwierigkeiten überall mitgeführt werden, wo günstige Umstände für dergleichen Untersuchungen ein reiches Feld versprechen.

Aus denselben Motiven, welche mich zur Mittheilung des erwähnten Apparates veranlafsten, glaube ich die Beschreibung eines zweiten hinzufügen zu dürfen, von dem mir die Erfahrung gleichfalls bewiesen hat, daß er die Aufgabe, auf möglichst schnelle und einfache Weise den Gehalt an freier Kohlensäure in besonders reich damit versehenen Mineralwässern, mit Vermeidung jedes Verlustes während der Manipulation, zu bestimmen, wenn auch nicht gänzlich frei von jedem Mangel, doch noch immer entsprechend genug löst, um seine Anwendung auf flüchtigen Reisen empfehlenswerth zu machen.

Ein möglichst fein kahbrirter Cylinder von wenigstens 10 Kubikzoll Inhalt wird durch einen sorgfältig ausgewählten Kork luftdicht verschlossen, in welchen zwei enge Glasröhren *a* und *b*, Fig. 10 Taf. I, gleichfalls luftdicht eingepaßt sind. Die offene Röhre *b* ist unmit-



telbar über dem Korne abgeschnitten, und reicht mit ihrer unteren Oeffnung bis auf den Boden des Cylinders hinab. Die zweite Röhre *a*, von etwa gleicher Länge, muß, ihrer Bestimmung gemäß, im Korne auf und nieder zu schieben seyn. Die Anwendung des Apparats, vermittelt eines die Kohlensäure präcipitirenden Reagenz, ergiebt sich nun leicht. Nachdem durch einen vorläufigen Versuch ermittelt worden, in welcher Menge und Verdünnung eine schon im Voraus präparirte Mischung von Chlorbaryum und Ammoniak anzuwenden ist, um einem, dem Inhalte des Cylinders gleichkommenden Volum des zu untersuchenden Wassers alle Kohlensäure zu entziehen, wird eine, zur gänzlichen Ausfällung der Kohlensäure etwas *mehr* als hinreichende Quantität jenes Reagenz in den Cylinder gebracht, und der Stand dieser Flüssigkeit in demselben genau angemerkt. Das Rohr *a* wird hierauf bis zu einiger Entfernung seiner unteren Mündung von dem Pfropfen in die Höhe gezogen (Fig. 10 Taf. I), und der Apparat, durch Gewichte beschwert, hierauf schnell bis an die obere Mündung des Rohres *a* in die Quelle gesenkt. Nachdem der Cylinder sich bis zu dem Punkte, wo die aufsteigende Flüssigkeit die Röhre *a* verschließt, gefüllt hat, und die vorhandene Kohlensäure auf diese Weise mit Vermeidung jedes Verlustes durch Entweichung im Innern der Quelle selbst vollständig gefällt ist, wird der Apparat heraufgezogen. Ist man mit Trichter und Papier versehen, so läßt sich das gewonnene Präcipitat, welches die sämtliche Kohlensäure enthält, die sowohl im freien als gebundenen Zustande in einem, vermittelt des kalibrirten Cylinders direct bestimmbaren Volum des Wassers enthalten war, sogleich filtriren, und kann so für die weitere Untersuchung (in einem Kastellglase mit eingeriebenem Stüpsel) aufbewahrt und mitgenommen werden.

Einer später, mit hinreichender Quantität desselben Wassers anzustellenden Analyse muß es natürlich vor



behalten bleiben, den Gehalt desselben an einfachen und doppelten Carbonaten besonders auszumitteln, und die demselben entsprechende Kohlensäuremenge von jenem Niederschlage in Abrechnung zu bringen.

### XVI. Künstlicher Rubin.

Vor einigen Monaten überreichte Hr. Gaudin der Pariser Academie eine Notiz, in der derselbe anzeigte, daß es ihm geglückt sey, Rubin im Großen zu erzeugen. Diese Notiz, in welcher jedoch das Verfahren nur angedeutet war, wurde den Hrn. Berthier und Becquerel zur Prüfung übergeben, und dieselben erstatteten darüber neuerlich folgenden Bericht.

Zur Darstellung rubinähnlicher Substanzen gebraucht Hr. Gaudin ein Löthrohr aus einem Stück, gebildet aus zwei concentrischen hohlen Cylindern von Platin, von denen das eine mit einem seiner Enden zu einem Behälter voll Sauerstoffgas, und das andere zu einem Behälter mit Wasserstoffgas führt, während die beiden anderen Enden, zur besseren Vermischung der Gase, mit convergirenden Oeffnungen versehen sind <sup>1)</sup>.

Seit langer Zeit weiß man, daß Thonerde vor dem Knallgasgebläse schmilzt, aber Niemand vor Hrn. Gaudin hat gesucht, diese Erde in Kügelchen von mehreren Millimetern Dicke zu schmelzen. Als er ein Stück Kali-Alaun der Wirkung seines Löthrohrs aussetzte, erhielt er eine vollkommen runde und klare Kugel. Da indess das Platinrohr an mehreren Punkten durchbohrt und geschmolzen war, so hatte er nach dem Erkalten, statt einer klaren Kugel, ein trübes Sphäroid, das inwendig

1) Der Apparat scheint also dem Daniell'schen Ahaue (*Annalen*, Bd. XXVIII S. 635) ähnlich zu seyn. P.

mit kubischen oder rhomboëdrischen Krystallen ausgekleidet war. Diese Krystalle ritzten Bergkrystall, Topas, Granat, Spinell; sie verhielten sich also, was Härte betrifft, wie gewöhnlicher Rubin. Sie schienen bloß aus Thonerde zu bestehen, da das Kali bei der hohen Temperatur, welcher der Alaun ausgesetzt wurde, verfliegt.

Mit einem noch stärkeren Apparat, als der erstere, wiederholte er den Versuch mit einem Gemenge von Ammoniak-Alaun und 4 bis 5 Tausenteln chromsauren Kalks, nachdem er dieses Gemenge zuvor geglüht und zu einem Schälchen geformt hatte, um durch Richtung der Flamme auf den concaven Theil den größten Effect hervorzubringen. In wenig Augenblicken war die innere Fläche dieses Schälchens mit schön rubinrothen, schwach durchsichtigen Kügelchen bekleidet, von denen einige die Form und die Spaltbarkeit des Rubins besaßen.

Hr. Malaguti, der diese Kügelchen zerlegte, fand sie zusammengesetzt aus 97 Kieselerde, 1 Chromoxyd, und 2 Kieselerde und Kalk, also dem Rubin analog <sup>1)</sup>.

Bei den Versuchen, welche die III. B. und B. neuerdings mit bewohnten, bediente sich Hr. Gaudin nur einer mit Sauerstoffgas gespeisten Alkohollampe. Sie fanden die von ihm angegebenen Thatsachen richtig. (*Compt. rend.* 1837, II, p. 325.)

1) Ausführlicher ist die Analyse in den *Compt. rend.* 1837, I p. 999 angegeben. Es sey daraus nur bemerkt, daß Hr. Malaguti ausdrücklich versichert, kein Kali in dem künstlichen Rubin gebunden zu haben. Die analysirte Probe wog 0,187 Grm

XVII. *Nephelin in Sachsen.*

Bei der Stadt Löbau in der sächsischen Ober-Lausitz fand ich im Herbst v. J. ein krystallinisch-körniges, aus Nephelin, Augit und Magneteisen bestehendes Gestein, das den größeren Theil des Löbauer Berges bildet, und nur am westlichen und nordwestlichen Abhange desselben durch dichten, festen Basalt und Olsin ersetzt wird. Unter den drei vollkommen deutlich unterscheidbaren Gemengtheilen dieses sehr ausgezeichneten Dolerits erschien der Nephelin an mehreren Punkten des Berges sogar als der vorherrschende, selten dagegen krystallisirt, obwohl ich auch mehrere ganz ausgebildete Krystalle desselben von 1 bis 2 Linien Länge, die sechsseitige Säule mit gerade angesetzter Endfläche, in Drüsenräumen auffand. Der Nephelin ist hier theils graulichweiß und durchscheinend, theils grünlichweiß oder lichtbräunlich, und in letzterem Falle weniger durchscheinend; der Augit stets dunkelschwarz und am häufigsten krystallisirt. Das Magneteisen dagegen erscheint meist nur untergeordnet, seltner angehäuft, immer aber stark glänzend mit metallischem Glanze. Abgesehen von dem Vorhandenseyn der für Nephelin so bezeichnenden Krystallform läßt auch das Undurchsichtigwerden durchsichtiger Splitter in Salpetersäure, das Gelatiniren in erhitzter Chlorwasserstoffsäure, endlich die der des Feldspaths gleichkommende Härte über die Richtigkeit der Bestimmung unseres Gemengtheils im Dolerit als Nephelin keinen Zweifel. — Sonst habe ich den Nephelindolerit an keinem anderen Punkte der Ober-Lausitz mehr vorgefunden.

T. E. Gumprecht.

XVIII. *Ueber die Ausdehnbarkeit der Luft.  
Briefliche Notiz an den Herausgeber.*

— In Bezug auf Rudberg's Bestimmung des Ausdehnungs-Coefficienten der atmosphärischen Luft (*Annalen*, Bd. XXXI S. 271) nehmen Sie vielleicht von folgender Bemerkung Notiz. In den *Tabulis Regiomontanis* (p. LX) giebt Bessel an, er habe aus den Beobachtungen von 56 Sternen, deren Zenithdistanzen  $60^\circ$  überstiegen, den Ausdehnungs-Coefficienten  $= 0,36138$  gefunden. Rudberg giebt für denselben die Grenzen 0,361 und 0,365. Doch muß ich noch bemerken, daß Bessel an der angezogenen Stelle seinen Coefficient als einem mittleren Feuchtigkeitszustande der atmosphärischen-Luft entsprechend bezeichnet. —

Berlin.

F. Strehlke.

XIX. *Darstellung des Aconitin. Briefliche Mittheilung vom Hrn. T. Morson in London.*

Das Aconitin ist in England in vielen sehr verzweifeltten Fällen des *Tic douloureux* mit großem Erfolg angewandt worden, und zwar in Form einer Salbe, bestehend aus einem Gran des Alkaloids und sechszig Gran Schmalz, mit welcher die leidenden Theile 10 bis 15 Minuten lang gerieben wurden.

Man bereitet dieses Alkaloid am besten, wenn man das alkoholische Extract der trocknen Wurzel mit verdünnter Säure (z. B. Schwefelsäure) behandelt, um das fette Oel abzusondern. Darauf setzt man zu der sauren

Lösung so viel Ammoniak, daß sie ein wenig alkalisch reagirt. Das Aconitin schlägt sich nun nieder, und bedarf zu seiner ferneren Reinigung nichts als einer Auflösung in Aether und einer Behandlung mit Thierkohle in der gewöhnlichen Weise. Hitze ist bei dem ganzen Proceß zu vermeiden. Im Zustande der Reinheit ist das Aconitin vollkommen weiß, so gut wie unlöslich in Wasser, löslich aber in Alkohol, Aether und Säuren. Die Menge, in der man es aus der Wurzel erhält, ist sehr gering.

## XX. Vorrichtung zur Darstellung Newton'scher Ringe.

Man nehme zwei Scheiben von dünnem Tafelglase (*Dutch plate*), etwa sechs bis acht Zoll im Durchmesser haltend, und vergolde die eine auf einer Seite ringsum einen Viertelzoll breit, vom Rande gerechnet, durch einfach aufgelegtes Blattgold: dann lege man die Platten so auf einander, daß der Goldring dazwischen kommt, und presse sie nun in der Mitte gegen einander, mittelst einer Schraube, die, einem Stifte gegenüber, in einem um die Platten geschobenen Rahmen von Eisen oder Messing angebracht ist. Dadurch kommen die Glasplatten in der Mitte zur gegenseitigen Berührung, während sie vom Rande ringsum nur durch die Dicke eines Goldblatts getrennt bleiben. Man hat also zwei Kugelflächen von sehr großem Radius, und muß demnach bei etwas schief einfallendem Licht die Ringe in großer Vollkommenheit sehen. (Ritchie in *Mag. Ser. III T. X p. 183.*)

### Berichtigungen zum Heft 8.

Im Aufsatz von F. Simon. S. 569 Z. 12 v. u. statt, alkalische Extract 1. alkoholische Extract.

Im Aufsatz von Thaulow. S. 639 Z. 8 v. u. statt, kohlensauren Eisenoxyd 1. kiesel sauren Eisenoxyd.

I. *Ueber den bei manchen Personen vorkommenden Mangel an Farbensinn; von A. Seebeck.*

Unter den Unvollkommenheiten, welche man in Beziehung auf den Gesichtssinn zuweilen antrifft, ist eine der merkwürdigsten, das mangelhafte Vermögen, Farben zu unterscheiden. Angeboren, nicht selten erblich und mehreren Gliedern einer Familie gemeinsam, findet sich dieser Fehler häufiger, als man wohl gewöhnlich glaubt, und verdient nicht minder die Aufmerksamkeit des Physikers, als des Physiologen. Zwar sind bereits viele Fälle dieser Art in verschiedenen Schriften angeführt, aber nur die Minderzahl derselben ist in hinreichender Ausführlichkeit beschrieben, und selbst wo dies geschehen ist, sind nicht alle Folgerungen aus den Beobachtungen so gezogen, als erforderlich ist, um sich eine vollständige Vorstellung von dem Gegenstande zu machen.

Vergleicht man die vorhandenen Beschreibungen dieses Gesichtszustandes mit einander, so findet man fast immer eine so große Uebereinstimmung zwischen denselben, daß es scheint, als kämen zwar in Beziehung auf die *Stärke* der Verwechslungen Unterschiede vor, nicht aber in Beziehung auf die *Art* derselben. Das Erstere nämlich wird stattfinden, wenn der Eine das nur ähnlich findet, was dem Andern ganz gleich erscheint, nicht aber umgekehrt; das Letztere dagegen würde der Fall seyn, wenn der Eine Farben unterscheidet, die der Andere verwechselt, aber umgekehrt andere verwechselte, die dieser unterscheidet. Ob Unterschiede der letzten Art vorkommen, wird sich nicht leicht anders entscheiden lassen, als wenn ein Beobachter mehrere Fälle un-

mittelbar mit einander zu vergleichen Gelegenheit hat, wie denn überhaupt bei Erscheinungen dieser Art vorzüglich durch eine Vergleichung vieler Fälle eine sichere Schlussfolgerung zulässig wird.

Ich halte daher nicht für überflüssig von den Beobachtungen, die ich an zwölf Personen in Betreff dieses Gegenstandes angestellt habe, und zu denen noch ein von meinem Vater untersuchter Fall hinzukommt, hier einen genauen Bericht zu geben.

Es wird sich zeigen, daß die von mir untersuchten Individuen in Beziehung auf die Art der Verwechslungen in zwei deutlich unterschiedene Klassen zerfallen, so jedoch, daß auch unter den zu einer Klasse gehörigen Personen noch kleine Unterschiede in Beziehung auf die Art, größere in Beziehung auf die Stärke der Verwechslungen vorkommen.

Wie häufig ein solcher Mangel an Farbensinn ist, mag man unter anderem daraus entnehmen, daß unter einigen und vierzig jungen Leuten aus den beiden obersten Klassen eines Gymnasiums sich fünf befanden, die diese Eigenschaft besitzen (die nachher unter I, II, VIII, IX und XI beschriebenen Fälle). Es wird jedoch sehr oft das Vorkommen eines solchen Mangels unbeachtet bleiben, indem zuweilen die nächsten Angehörigen solcher Personen, ja sogar diese Personen selbst ihn nicht gewahr werden, wovon weiterhin einige Beispiele vorkommen.

Man hat bemerkt, daß diese Eigenschaft viel häufiger bei blauen, als bei braunen Augen stattfindet; auch unter den von mir untersuchten Fällen sind nur zwei der letzteren Art. Doch hat dies wohl, wenigstens zum Theil, seinen Grund darin, daß blaue Augen überhaupt bei uns viel häufiger sind, als braune: eben so in England, von wo wir die meisten Beschreibungen ähnlicher Fälle haben.

*Ueber die Art, wie meine Untersuchungen augo-*



stellt sind, bemerke ich voraus Folgendes: Man erhält nur unvollständige und wohl selbst irrige Resultate über diesen abnormen Gesichtszustand, wenn man sich bloß die Namen der vorgelegten Farben sagen läßt, und aus dem unrichtigen Gebrauche derselben die stattfindenden Verwechselungen beurtheilen will. Ein genaueres Resultat und eine vollständigere Uebersicht aller Verwechselungen erhält man, wenn man ein möglichst vollständiges Sortiment farbiger Gegenstände ungeordnet den zu prüfenden Individuen vorlegt und sie dieselben nach ihrer Weise ordnen läßt. Man findet dann leicht solche, die, so verschieden sie auch dem normalen Auge erscheinen, von dem abnormen für ganz gleich, oder wenigstens für sehr ähnlich gehalten werden. Im letzteren Falle erhält man einen guten Maassstab für die Aehnlichkeit zwischen zwei Farben, wenn man eine dritte dazu nimmt, die einer von beiden in Wirklichkeit (d. h. für das gewöhnliche Auge) sehr nahe kommt, sich aber von ihr nach dem Urtheile des fehlerhaften Auges wenigstens eben so sehr unterscheidet, als die beiden ersten unter sich <sup>1)</sup>). Mit undurchsichtigen gefärbten Gegenständen läßt sich diese am vollständigsten ausführen, weil man sich dieselben leicht in hinreichender Auswahl verschaffen kann. Gefärbte Wolle würde sich dazu recht gut eignen, weniger Seide, da der Glanz derselben den mit diesem Fehler behafteten Personen die Bestimmung der Farben sehr erschwert. Ich habe mich eines Vorraths von 300 farbigen Papieren bedient, die den zu prüfenden Individuen nach und nach zur Anordnung übergeben wurden. Aehnliche Versuche sind mit farbigen Gläsern gemacht worden. Endlich sind bei einigen Individuen Versuche

1) Dabei ist vorausgesetzt, was nach allen meinen Beobachtungen, und besonders nach einigen später auszuführenden Versuchen der Fall zu seyn scheint, daß das fehlerhafte Auge einen Unterschied zweier Farben, wohl geringer, nicht aber größer sehn kann, als das gewöhnliche.

mit den prismatischen und mit Interferenzfarben angestellt. Diese letzte Art des Versuchs würde in sofern den Vorzug verdienen, als man hier die physikalische Beschaffenheit der Farben kennt; allein diese Versuche sind darum weniger ergiebig, weil man sich dabei größtentheils nur an die unrichtigen Benennungen halten kann.

### Erste Klasse.

#### I.

E., 18 Jahr alt, hat hellblaue Augen und hellbraune Haare. Sein Gesicht ist scharf und reicht gut in die Ferne. Von früher Zeit her ist ihm bekannt, daß er die von seinem Vater geerbte Eigenschaft besitzt, Farben zu verwechseln.

In dem Gebrauche der Farbennamen zeigte sich E. höchst unsicher; er gebrauchte den Namen *Blau* für Blau und Lila, auch wenn diese Farben bis fast in's Grüne gingen; den Namen *Grün* für Grün, besonders bläuliches Grün, für Grau, sowohl reines, als solches, das in's Lila neigt, für Rosenroth bis zu ziemlich dunkler Schattirung, und auch wenn dasselbe schon etwas in's Violett neigt, endlich auch für sehr helles, in's Graue oder Grünliche gehendes Blau; die Benennung *Roth* gebrauchte er für alles Gelb und Orange, für Gelbroth, für helleres, besonders gelbliches Grün, so wie für Gelbbraun und Rostbraun; den Namen *Braun* für dunkleres Gelbroth, auch Dunkelgrasgrün; als eine Art *Roth* oder *Braun* bezeichnete er endlich Carmoisin, Dunkelviolett, schwärzliches und bräunliches Dunkelgrün und Braun. Die Benennungen Gelb und Grau gebrauchte er gewöhnlich gar nicht. Indefs würde man sich aus diesem Gebrauche der Namen leicht eine unrichtige, in jedem Falle eine unvollständige Vorstellung von der Art seines Farbensinnes machen. Genauer ist dieser charakterisirt durch folgende Resultate, die aus der den Papieren von ihm

gegebenen Anordnung und den dabei gemachten Bemerkungen hervorgingen.

Die auffallendste Verwechslung, die bei ihm vorkommt, ist die von Roth mit Grün und beider Farben mit Grau oder nach Umständen mit Braun <sup>1</sup>). Er stellte Rosenroth, selbst ziemlich tiefes, mit einem etwas bläulichen Grün und beide mit reinem Grau als gleich zusammen. Ein lebhaftes Carmoisin fand er einem grünlichen Grau, und ein anderes mehr in's Violette gehendes einem dunkeln, wenig in's Bräunliche gehenden Grau, so wie einem matten Bläulichgrün, ganz gleich. Dunkles Grasgrün, Dunkelcarminroth und Dunkelbraun legte er als ähnlich zusammen, eben so helleres Grasgrün mit hellerem Graubraun. Sehr dunkles Grün fand er mit schwärzlichem Braun, dunkles Olivengrün mit reinem Braun, so wie ein lebhaftes und reines Hellgrün mit einem etwas unreinen Fleischroth und mit hellem Graubraun ganz einerlei. Ein höchst lebhaftes gesättigtes Grün (etwas gelblich) erschien ihm von einem nicht minder lebhaften und tiefen Gelbroth (dunkelponceau) nur durch etwas größere Helligkeit verschieden; helleres Gelblichgrün verwechselte er mit gesättigtem Orange und Gelbbraun. — Weniger auffallende Verwechslungen kommen beim Gelb und beim Blau vor. Doch fand E. ein lebhaftes Orange mit einem dunkeln, aber ziemlich reinen Gelb einerlei. Blasses Orange legte er mit reinem Hellgelb zusammen. — Himmelblau verwechselte er mit Graublau, und, zumal wenn es etwas in's Grünliche ging, mit Graulila <sup>2</sup>). Lila fand er theils

1) Dafs Farben auch mit Grau verwechselt werden, ist eine Erscheinung, die ich auch in allen übrigen von mir untersuchten Fällen bemerkt habe, und es ist auffallend, dafs dieser Umstand, der nicht ohne Wichtigkeit ist, in den sonstigen Beschreibungen ähnlicher Fälle größtentheils unbeachtet geblieben ist.

2) Ich will nicht unerwähnt lassen, dafs das reine Blau mir eher etwas heller zu seyn schien, als das damit verglichenen unreine, obgleich ich auf diese Wahrnehmung keinen besonderen Werth

einem bläulichen Grau, theils einem Graublau gleich. Auch ein helles Bläulichgrün fand er einem blassen, in's Grau fallenden, ziemlich röthlichen Violett ähnlich. — Blau und Gelb werden gar nicht mit einander verwechselt, vielmehr scheint zwischen diesen beiden Farben der stärkste Contrast stattzufinden, daher auch, als die sämtlichen Papiere zu einer Reihe geordnet wurden, die blauen (nebst Graublau und Lila) an das eine, die mit überwiegendem Gelb (die gelbrothen, gelbgrünen, gelbbraunen) an das andere Ende der ganzen Reihe gestellt wurden. Blau und Roth werden ebenfalls nicht mit einander verwechselt, doch ist der Contrast zwischen diesen geringer, wie man aus der Verwechslung von Blau mit Graulila erkennt, und auch in der diesen Farben gegebenen Folge bemerken kann. Mit Roth und Gelb verhält es sich ähnlich; nie wird reines Roth, wohl aber Orange mit Gelb verwechselt; auch reichte E. die gelben Papiere den gelbrothen, gelbgrünen und gelbbraunen als hellere Schattirung an.

Ich liefs E. zuletzt sämtliche Papierproben in Schattirungen legen, so dafs jede Farbe allmählig vom Helleren in's Dunklere abstuft. Aus diesen liefs ich ihn, der leichteren Uebersicht wegen, einen Theil so ausschiessen, dafs die übrigbleibenden für sein Auge noch immer eine eben so gute, und hin und wieder selbst verbesserte Abstufung bilden, während ich jedoch diefs Geschäft so beaufsichtigte, dafs er nicht etwa zufällig, vielleicht in der Meinung, eine Doublette zu tilgen, die auffallendsten Beispiele von Verwechslung zerstörte. So erhielt ich eine aus 140 Nummern bestehende Farbens tafel, um sie zum Vergleiche in anderen Fällen zu gebrauchen. Dieselbe besteht aus vier Reihen, von denen

legen darf; denn da diese Verwechslung nur in hellen Schattirungen vorkam, so liefs sich nicht mit Sicherheit darüber entscheiden; auch ist mir sonst durchaus nichts vorgekommen, was eine geschwächte Empfindung für das blaue Licht zeigte

die erste alles reine Blau enthält, zugleich aber auch Lila und Graublau bis fast Bläulichgrau, und von ihm *blau* genannt wurde; die zweite umfasst reines Grau, Rosenroth und Grün, das ein wenig in's Bläuliche oder Graue neigt, und wurde *grün* genannt; die dritte, die E. *braun* nannte, enthält Schwärzlichbrann, Dunkelbläulichgrün und Dunkelviolett, und weiterhin Carmousin, reines Dunkelgrün und solches Dunkelbrann, das ein wenig in's Grau neigt; die vierte wurde *roth* genannt, und geht von Dunkelroth durch Grasgrün, Zinnober- und Ziegelroth, so wie durch Gelblichbraun in Orange und reines Gelb. Die erste Reihe enthält also am meisten Blau, die letzte am meisten Gelb, die beiden anderen stehen ziemlich in der Mitte, doch streifen die Farben der dritten Reihe sehr nahe theils an die der vierten, theils in den helleren Tönen an die der zweiten; auch kommen zum Theil die der ersten Reihe einigen der zweiten und dritten ziemlich nahe. Es zeigt sich daher hierin, wie überhaupt in der Schwierigkeit, welche E. bei dieser ganzen Anordnung fand, daß er *überall* nur schwache Contraste der Farben wahrnimmt.

Der unvollkommene Farbensinn E.'s läßt sich auf folgende sehr einfache Bemerkungen zurückführen:

1) Das rein rothe Licht (Rosa) ist ihm vom farblosen wenig oder gar nicht verschieden; ebenso daher auch das Grün, das, mit jenem Roth gemischt, farbloses Licht, Grau, giebt. Die Verwechselung von gelblichem Roth, Grün und Braun folgt daraus, indem man sich zu jenem Roth, Grün und Grau einen gleichen Antheil Gelb zugemischt denkt <sup>1)</sup>.

1) Es ist hierbei vorausgesetzt, daß zwei Farben, die einzeln gleich erscheinen, auch mit einer dritten, der sie beide in gleichem Maasse zugesetzt werden, eine gleiche Mischung geben müssen, eine Annahme, die sowohl in der Natur der Sache liegt, als auch durch einige Versuche mit Farbenkreislern bei einem der nachher folgenden Individuen bestätigt ist.

2) Das blaue Licht unterscheidet er zwar besser, als das rothe und grüne vom farblosen, aber doch weit mangelhafter als ein normales Auge, indem eine starke Beimischung von Grau oder — was für ihn dasselbe ist — von Roth ihm diese Farbe oft kaum merklich verändert, so daß er zwischen Blau und Grau weit weniger Abstufungen hat, als wir.

3) Daß auch für das gelbe Licht die Wahrnehmung in ähnlicher Weise wie für das blaue unvollkommen seyn muß, ergibt sich theils daraus, daß er auch diese Farbe, wenn sie rein ist, von einer Mischung derselben besonders mit Roth nicht unterscheidet, theils daraus, daß, wo das Roth und Blau nicht vollkommen vom Grau unterschieden wird, dies auch der Fall seyn muß mit dem Gelb, das, mit jenen beiden Farben gemischt, Grau erzeugt.

E. hat demnach eine nur sehr unvollkommene Wahrnehmung für *alle* Farbencontraste, unterscheidet jedoch einigermaßen drei Grundfarben. Die eine, die er gewöhnlich Grün nennt, mag ihm den Eindruck machen, den wir vom Grau haben, und umfaßt das, was wir Grau, reines Roth (Rosa) und Bläulichgrün nennen, Die zweite, die er Blau nennt, mag ihm so erscheinen, wie uns ein mattes Blau oder Graublau, und umfaßt Alles, was wirklich überwiegend Blau enthält. Die dritte, die er Roth, oder, wenn sie dunkel ist, Braun nennt, mag ihm so erscheinen, wie uns ein mit mehr oder minder Grau vermischtes Gelb, und umfaßt das, was wir Gelb, Gelblichroth, Gelblichgrün und Gelblichbraun nennen.

Es ist auffallend, daß E. gerade den Namen Gelb gar nicht gebraucht; doch beweist dies nicht, daß er für diese Farbe weniger empfindlich sey, als für andere, sondern es zeigt sich darin nur, daß ihm, bei seiner mangelhaften Empfindung für Roth, die gelbe Farbe als eine hellere Schattirung der gelbrothen erscheint, daher er



Namen Roth, den er für die letztere oft hat braun  
nen, auch auf die erstere überträgt.

*Versuche mit farbigen Gläsern.* Ich legte E. eine  
farbiger Glastafel vor, die, in einigem Abstände  
Augen, gegen den hellen Himmel gehalten wurden,  
und ließ ihn dieselben nach der Farbe ordnen und be-  
nennen. Die Verwechslungen, welche er hier beging,  
waren ähnlicher Art, wie bei den Papieren. Er bezeich-  
nete mit dem Namen *Roth* die gelben, orange und ro-  
then (gelblichrothen) Gläser, so wie ein braunes und  
ein schönes, etwas gelbliches, dunkelgrünes Glas; das  
letztere fand er auch mit einem feurigen dunkelrothen  
Glas von einerlei Farbe. Er gebrauchte die Benen-  
nung *Braun* für ein braunes und ein dunkelgelbrothes  
Glas, und den Namen *Grün* für mehrere grüne und ei-  
nige unreine, in's Bräunliche und Violette ziehende ro-  
the Gläser, die er auch mit einigen wirklich grünen für  
gleich erklärte. Einige röthlichviolette wurden *bläulich-  
grün* genannt, und mit der Farbe, welche durch Zusam-  
menlegen von grünen und blauen Gläsern entstand, ei-  
nerlei gefunden. Mehrere, und zum Theil ziemlich tiefe  
bläulichgrüne Gläser erschienen ihm, gegen helle Gegen-  
stände gehalten, farblos und nur dunkel; als sie aber  
auf weißes Papier gelegt wurden, erkannte er sie für  
Grün. *Blau* nannte er die blauen und mehrere violette  
Gläser, und verwechselte Blau mit Violett in stärkerem  
Maasse als bei den Papieren. Dies mag folgenden Grund  
haben: So wie unserem Auge eine Beimischung von Grau  
in einem undurchsichtigen Pigmente viel merklicher ist,  
als eine Beimischung von farblosem Lichte in durchsichti-  
gen Farben, so wird dem Auge E's, das reines Roth  
vom farblosen Lichte nicht unterscheidet, die rothe Bei-  
mischung in den Pigmenten ebenfalls merklicher seyn  
lassen als an den Gläsern.

*Versuche mit den prismatischen Farben.* Ich ließ  
im verfinsterten Zimmer das Sonnenlicht durch eine bo-



horizontal,  $\frac{1}{4}$  Zoll breite Spalte auf ein Flintglasprisma fallen, den brechenden Winkel des Prismas nach unten gekehrt, und fing das Spectrum auf einer weißen Fläche auf.

E. nannte den violetten Theil *dunkelblau*, den blauen, bis ein wenig in's Grün hinein, *hellblau*; die Gränze zwischen Violett und Blau, wußte er nur unvollkommen zu bestimmen. Den ganzen unteren Theil des Spectrum, nämlich den größten Theil des Grün, das Gelb, Orange und Roth nannte er *roth*; der rothe Theil erschien ihm am stärksten roth, der gelbe am wenigsten. Wenn man das auf der Wand aufgefangene Spectrum durch gelbe Gläser betrachtet, so wird für das gewöhnliche Auge das Violett und bei stärkerem Gelb größtentheils auch das Blau unsichtbar, und man erblickt dann ein ziemlich kurzes Spectrum, das aus einer grünen und rothen Hälfte besteht, die durch die gelbe Mitte mit einander verbunden sind. Als E. denselben Versuch machte, erklärte er das Ganze für Roth, das in der Mitte am hellsten sey, und nach beiden Seiten dunkler werde.

Ich richtete meine Aufmerksamkeit besonders darauf, ob E's Auge für irgend einen Theil des prismatischen Lichtes eine schwächere Empfindung habe, als das gewöhnliche Auge; ich habe aber durchaus nichts entdecken können, das zu einer solchen Annahme berechtigte. Ich ließ ihn nämlich angeben, wo ihm die Gränzen des ganzen Spectrum erschienen, nicht nur mit unbewaffnetem Auge, wo er sowohl die obere, als die untere Gränze richtig angab, sondern auch mit farbigen Gläsern vor dem Auge, wo er die Gränzen immer eben so angab, wie sie mir bei einer gleichen Bewaffnung des Auges erschienen. Man wird den Grund dieser Art des Versuchs deutlicher einsehen, wenn ich weiter unten die Resultate anführe, die ich bei demselben Verfahren bei der zweiten Klasse erhielt. Als ich E. fragte, welche *Stelle des Spectrum* seinem (unbewaffneten) Auge am

hellsten erscheine, bezeichnete er das Orange und Gelb bis in's Grün hinein.

*Versuche mit Interferenzfarben.* Ich erzeugte die entoptische Figur an einer quadratischen Glasplatte. Die Reflexionsebenen der beiden schwarzen Spiegel waren rechtwinklich gegen einander, und da die  $1\frac{1}{4}$  Zoll dicke Glasplatte 9 Zoll Seite hatte, so war die Figur groß genug, um die Stellen, deren Farben angegeben werden sollten, deutlich zu bezeichnen. Ich liefs E. die Farben von dem durch die Mitte der Figur gehenden schwarzen Kreuze bis in die Mitte des die eine Ecke einnehmenden Pfauenauges angeben. Er nannte das schwarze Kreuz: dunkel, ohne Farbe; da, wo es gegen das Weiss hin in's Grau übergeht, nannte er es *blau*, und rechnete auch das Weiss (der ersten Ordnung) mit zu *blau*; von da, wo das Gelb angeht, bis an das, hier sehr schmale Roth, nannte er die Farbe *roth*; das Roth mit dem folgenden Blau (der ersten Ordnung) nannte er *blau*; das dann folgende Gelb (der zweiten Ordnung) wieder *roth*, das folgende, in's Violett neigende Roth und Blau: *blau*, und endlich das Grün, das die Mitte des Pfauenauges einnahm, wieder *roth*.

Ganz eben so beschrieb E. die Farben der ersten Ringe an der entoptischen Figur einer Kalkspathplatte. Da jedoch der objective Versuch vorzuziehen ist, so stellte ich durch den von Newton (*Opt. L. II p. IV*) beschriebenen und von dem Herzog von Chaulnes vervollkommeneten Versuch die Farbenringe auf einer weissen Fläche dar, mit einer Oeffnung von 2 bis 3 Linien Durchmesser und einem kleinen, etwas mattgeschliffenen Hohlspiegel von Glas, von 3 Fufs Brennweite. Die ziemlich farblose Mitte nannte E. *hell*; die Farben des ersten Rings, welcher nach innen bräunlich, nach aussen blau ist, gab er richtig an. Das unvollkommene Weiss, welches diesen vom zweiten Ringe trennt, nannte er einen Uebergang vom Blau in's Roth. Das Gelb des

zweiten Farbenringes bis in's Roth hinein, nannte er *roth*; das übrige Roth nebst etwas Blau bis in's Grün hinein: *blau*; das übrige Grün, das folgende schmale Gelb bis in's Roth des dritten Ringes hinein: *roth*; den übrigen Theil des Roth aber nebst dem folgenden Grün nannte er *grau*. Die folgenden Ringe zeigen nur noch Roth und Grün; es waren deren noch fünf sichtbar; von diesen sah E. den äußersten nicht mehr. An den übrigen aber bezeichnete er den äußersten Theil des Grün nebst dem darauf folgenden größten Theil Roth mit dem Namen *Roth*, den äußersten Theil des Roth aber nebst dem größten Theile des Grün mit dem Namen *Grau*, und es schienen ihm diese letzteren Ringe dunkler als die rothen, wodurch er auch wohl vorzüglich im Staude war, beide noch von einander zu unterscheiden.

Ich stellte auch noch, wie bei dem von Herschel (*Light*, §. 507) beschriebenen Versuche ein Glimmerblättchen im Polarisationsapparate auf, durch dessen verschiedene Neigung verschiedene Farben erzeugt werden konnten. Wie bei den vorhergehenden Versuchen bezeichnete E. das auf diesem Wege erzeugte Gelb mit dem Namen *Roth* und das Blau mit dem Namen *Blau*; das Roth aber, das etwas in's Violett neigte, bezeichnete er einmal als *hellblau*, ein andermal als Uebergang aus Blau in Roth.

Im Allgemeinen bestätigen diese Versuche das was sich oben aus den Papierproben ergeben hat; nur scheint, so viel man aus den falschen Benennungen entnehmen kann, sowohl bei den prismatischen, als bei den Interferenzfarben Blau mit Violett und mit einem etwas bläulichen Roth in höherem Maasse verwechselt zu werden, als bei den undurchsichtigen Pigmenten. Dieß scheint auf demselben Grunde zu beruhen, wie die ebenfalls ziemlich starke Verwechselung von Blau und Violett bei den farbigen Gläsern.

*E's Vater* verwechselt die Farben ebenfalls und stimmt

mit dem Sohne, wie dieser mir sagt, in seinen Angaben ganz überein. Der Großvater von väterlicher Seite hat diesen Fehler nicht. Unter E's Geschwistern hat nur ein Bruder diese Eigenschaft, der indess Roth und Blau stärker verwechseln soll. Auch ein Bruder des Vaters soll in hohem Grade die Farben verwechseln, darunter namentlich Roth mit Blau.

## II.

v. R., 18 Jahr alt, hat hellbraune Haare und blaue Augen; die Iris des rechten Auges hat einen größeren braunen Fleck, der in der Kindheit bei einer Krankheit entstanden seyn soll. Sein Sehvermögen ist sonst gut für Nähe und Ferne. Dafs er die Farben verwechselt, wurde von seinen Eltern schon früh bemerkt, und war ihm selbst daran auffallend, dafs er die rothen Kirschen auf den Bäumen, welche Andere durch die Farbe erkannten, nur durch die Form unterschied. Dennoch glaubte er nicht, dafs diese Unvollkommenheit seines Auges so stark sey, als sie sich bei den Versuchen fand.

*Versuche mit farbigen Papieren.* Auch bei ihm ist die auffallendste Verwechslung die von Roth und Grün. Allerdings erscheinen ihm diese beiden Farben nicht ganz gleich, und er benennt sie bei einiger Aufmerksamkeit meistens richtig, doch haben für ihn beide die grösste Aehnlichkeit mit einander, so dafs er oft zwischen einem lebhaften grünen und einem hochrothen Pigmente eben so viel und mehr Uebereinstimmung findet, als etwa zwischen dem letzteren und einem anderen Roth, das von jenem in der That (für das gewöhnliche Auge) nur wenig verschieden ist. So wurde ein helles, etwas bläuliches Grün mit reinem Rosenroth, dunkleres Bläulichgrün mit gesättigtem Carmoisin, Zinnoberroth mit lebhaftem Grasgrün als ähnlich bezeichnet. Mit Grün und Roth wird ferner auch von ihm, wie von E., Grau, oder wenn jene mehr gelblich oder bräunlich sind, Braun ver-

wechselt. Schönes Rosenroth wurde mit Aschgrau, dunkleres, in's Carmoisin gehendes, mit einem etwas bräunlichen, ziemlich dunkeln Grau fast gleich genannt. Mätes Blaugrün, vom hellsten bis zum dunkelsten, wurde mit fast reinem; nur wenig in's Bräunliche gehenden Grau sehr ähnlich gefunden; desgleichen Dunkelcarminroth mit reinem Dunkelbraun, so wie Dunkelolivengrün mit Chocoladenbraun. Ein etwas bräunliches, aber lebhaftes Gelblichgrün wurde von Gelbbraun und einem stark in's Ziegelroth gehenden Orange wenig, Braungelb von lebhaftem Orange gar nicht unterschieden. Hellere Orange wurde mit etwas grünlichem und zum Theil mit fast reinem Gelb für beinahe gleich erklärt. Schwärzliches Blaugrün wurde mit schwärzlichem Braun, auch mit unreinem, dunkeln Violett (von der Farbe des Zuckerbutterpapiers) in eine Reihe zusammengestellt. Reines Roth und Blau verwechselt v. R. nie, auch nicht wenn es hell ist, mit einander; auch lebhaftes Violett unterscheidet er ziemlich von Roth und Blau. Gewöhnlich nannte er die violetten Papiere richtig, doch fand er zuweilen zwischen hellem Blau und Violett viel Aehnlichkeit, obgleich er das Röthliche im letzteren nicht übersah; auch ein lebhaftes Dunkelviolett rechnete er zu Blau, unterschied es aber doch von den rein blauen Papieren. Beim Ordnen sämtlicher 300 Papierproben reihte er den carmoisinrothen Blättern die tief violetten und diesen wiederum die dunkelblauen an, und bemerkte bei beiden Uebergängen zwar eine deutliche, aber doch nicht sehr auffallende Abänderung des Farbentons. Mehr Annäherung noch zeigt sich in den helleren Schattirungen; denn hier wurden einerseits graulila Papiere (nebst rein grauen) zwischen die rosenrothen, und andererseits lebhaft lila zwischen blaugüne, grau blaue und zum Theil auch rein himmelblaue Papiere gelegt, und selbst die blafsblauen den rosenrothen, nur durch wenige graue oder lila Papiere vermittelt, sehr nahe gebracht, und nicht einmal

richtig unterschieden, wo die rosenrothen aufhören und die blauen anfangen, so daß man eine unvollkommene Wahrnehmung für den Contrast zwischen Roth und Blau nicht verkennen kann.

Man sieht aus diesen Angaben, daß v. R.'s Gesichtszustand mit dem E.'s die größte Aehnlichkeit hat. In der That fallen die Angaben des Einen zum Theil völlig mit denen des Andern zusammen, indem mehrere der Papierproben, welche Dieser gleich gefunden hatte, auch von Jenem als einerlei zusammengelegt wurden, die übrigen Verwechslungen Beider aber so viel Aehnlichkeit mit einander haben, daß sie in der Beschreibung nicht wohl von einander unterschieden werden können. Vollkommen gleich jedoch verhalten sich beide Individuen nicht, und zwar nicht nur dem Grade nach, indem v. R. die Farben weniger stark verwechselt, sondern auch ein wenig der Art nach; denn als Jeder von ihnen den ganzen Farbenvorrath geordnet hatte, fand sowohl v. R. an E.'s Anordnung manches auszusetzen, als auch umgekehrt. Doch zeigten eben diese Ausstellungen, daß die Verschiedenheit zwischen beiden Zuständen nur unbedeutend ist.

*Versuche mit farbigen Gläsern.* Hier unterschied v. R. die Farben viel besser als bei den Papieren. Alle grünen Gläser nannte er richtig grün, alle rothen roth, alle blauen blau. Die orangefarbigen nannte er auch gewöhnlich richtig, doch nannte er dunkles Orange auch wohl braun oder roth. Die gelben nannte er gewöhnlich orange; ein sehr helles Gelb rechnete er zu Grün. Die violetten nannte er zum Theil richtig, doch bezeichnete er ein allerdings ziemlich röthliches Violett als Rosa. Ockters noch nannte er violette Gläser blau, und fand zwischen ihnen und den blauen viel Aehnlichkeit, obgleich er, wenn er sie neben einander hielt, erkannte, daß jene röthlicher seyen.

Daß v. R. an den Gläsern die Farben wirklich



besser unterscheidet, als an den Papieren, hat seinen Grund, ohne Frage, in der viel größeren Lebhaftigkeit der ersteren. Dafs er sie besser unterscheidet als E., bestätigt, dafs sein Farbensinn weniger unvollkommen ist, als der des Letzteren. Wenn Jemand an den Gläsern solche Verwechselungen begeht, wie E. und mehrere nachher zu nennende Personen, so kann dies immer als ein Beweis angesehen werden, dafs hier die Farbenverwechslung einen sehr hohen Grad erreicht.

*Farbige Papiere durch gefärbte Gläser betrachtet.* Man kann sich nicht leicht eine grössere Ueberraschung vorstellen, als die, welche v. R. empfand, da er die von ihm als ähnlich oder gleich zusammengelegten Papierproben durch farbige Gläser betrachtete. Ich liess ihn mehrere derselben, an welchen sich die auffallendsten Verwechselungen gezeigt hatten, durch violette, blaue, grüne, gelbe, orange und rothe Gläser betrachten. Fast immer erschienen ihm hier die vorher für gleich gehaltenen Farben mehr oder weniger, und oft aufs Höchste verschieden. Wenn er z. B. ein hochrothes und ein grasgrünes Papier, die er mit blofsem Auge für fast gleich hält, durch ein rothes Glas betrachtet, so erscheint ihm begreiflich das erstere sehr hell, das letztere ganz dunkel, dagegen durch ein grünes Glas das grüne Papier viel heller erscheint, als das rothe. Ähnlich in anderen Fällen. Doch nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbe der Papiere erschien ihm so verändert, dafs er den vorher gleich benannten, jetzt verschiedene Namen gab.

Dieses vor 20 Jahren, in einem ähnlichen Falle von meinem Vater angewendete Verfahren dient nicht nur solche Personen von der Unvollkommenheit ihres Auges zu überzeugen, sondern kann auch von ihnen sehr gut gebraucht werden, um mittelbar einigermafsen zu den Unterscheidungen zu gelangen, welche das normale Auge durch den unmittelbaren Sinnesindruck bewerkt.

Mit



Mit einem oder einigen farbigen Gläsern ausgerüstet, können sie, nachdem ihnen die nöthigen Erläuterungen gegeben sind, mit etwas Ueberlegung und Uebung leicht dahin gelangen, gröbere Verstöße zu vermeiden.

In dem vorliegenden Falle zeigte sich ein rothes und ein grünes Glas hierzu am geeignetsten, indem diese, wie man nach dem Vorhergehenden leicht begreift, bei den meisten, und namentlich bei den auffallendsten Proben der vorher verwechselten Farben, dem damit bewaffneten Auge die stärksten Unterschiede zeigen. Mit Hülfe dieser beiden Gläser war v. R. nicht nur sogleich im Stande, die Fehler in den von ihm gelegten Farbenreihen zu entdecken, sondern gelangte auch sehr bald dahin, die Hauptfarben, und zum Theil sogar die gemischteren richtig zu benennen, und ich zweifle nicht, daß bei mehr Uebung sich darin ein ziemlich hoher Grad von Genauigkeit würde erreichen lassen <sup>1)</sup>.

Bei *Lampenlicht* bemerkte v. R. zwischen mehreren der am Tageslichte verwechselten Farben deutliche Unterschiede, welche ihm ganz derselben Art zu seyn schienen, wie wenn er am Tageslichte das Auge mit einem hellen orange Glase bewaffnet hatte. Bei *Spirituslicht* erschienen ihm viele der verwechselten Farben verschieden, wohl besonders durch die sehr ungleiche Helligkeit. Die Gesichtsfarbe mehrerer Personen bei demselben Lichte hatte nichts Auffallendes für ihn.

*Versuche am prismatischen Farbenbilde.* Die Versuche wurden eben so wie bei E. angestellt. v. R. <sup>2)</sup> nannte den rothen Raum *roth*, das Orange, Gelb und den grössten Theil des Grün nannte er *gelb*: einen schmalen Raum, der den obersten Theil des Grün bis ein

1) Auch bei E. wurde dieser Versuch mit gleichem Erfolge angestellt.

2) Ich muß bemerken, daß ihm die Farbenerscheinungen am Prisma aus Vorträgen ziemlich bekannt waren.

wenig in's Blau hinein umfasst, nannte er *grün*: das Blau und Violett erschienen ihm ähnlich, doch nannte er den untersten Theil des Blau: *violett*, und das Violett nebst einem Theil des Blau: *blau*. Das Roth und Grün haben für ihn viel Aehnlichkeit mit einander, besonders wenn er sie aus einigem Abstände betrachtet; diese beiden Farben ziehen sich, nach seiner Angabe, so in einander, daß sie das deutlich davon verschiedene Gelb als einen ungefähr runden Raum umgeben.

Die obere Gränze des Spectrums gab er da an, wo sich nur eben die letzte Spur von Licht befindet: auch die untere zog er da, wo mir alles Licht aufzuhören schien. Auch als er, mit farbigen Gläsern vor dem Auge, das Spectrum betrachtete, gab er die Gränzen stets so an, wie sie mir bei gleicher Bewaffnung des Auges erschienen. Als die hellste Stelle des Spectrums erschien ihm bei unbewaffnetem Auge das Gelb.

*Versuche mit Interferenzfarben.* Von den Newton'schen Farbenringen gab v. R. folgende Beschreibung: Die Mitte dunkel; dann folgt Weiß, Gelblichroth, Blau; dann ein schmales Weiß, Gelbroth, Blau; dann folgt fast bloß Weiß, fast nichts mehr vom Gelbroth, aber das Blau deutlich; dann Weiß, gar kein Gelbroth mehr und das Blau schwach; dann folgen noch mehrere schmale und schwache Kreise, abwechselnd weiß und unvollkommen bläulich.

Als die Interferenzringe objectiv mit dem matten Hohlspiegel in der oben beschriebenen Weise dargestellt wurden, bezeichnete v. R. die Farben folgendermaßen: Von der hellen Mitte aus zuerst Rosabraun, dann Schmutziggelb, Weiß, Gelbroth, mit bräunlichem Rand übergehend in Blau; dann Grün, Gelb, Blau (hierunter verstand er das Roth nebst etwas Grün und dem dazwischen enthaltenen ganz schmalen Blau); darauf Rothgelb. Die folgenden Ringe, deren ihm wie mir noch fünf bemerkbar waren, nannte er bläulich und weiß, *bläulich* den

äussersten Theil des Roth bis ziemlich tief in's Grün hinein, *weißt* aber den grössten Theil des Roth von der Gränze des Grün an. Er unterschied sie indess hauptsächlich daran, daß der als Blau bezeichnete Theil ihm etwas dunkler erschien. v. R. nannte also an diesen äussersten Ringen ungefähr den Theil bläulich, den E. grau genannt hatte, und *weiß*, den dieser als roth bezeichnete. Doch widerspricht diese ungleiche Wahl der Namen keinesweges der sonst zwischen Beiden wahrgenommenen Uebereinstimmung, sondern beweist nur die grössere Unsicherheit solcher Schlüsse, welche aus dem unrichtigen Gebrauche der Farbenbenennungen gezogen werden. Ich habe indess diese Versuche nicht unerwähnt lassen wollen, weil sie allerdings darin einen Vorzug besitzen, daß man es hier mit Farben von bekannter physikalischer Beschaffenheit zu thun hat.

v. R's Eltern — Geschwister hat er nicht — unterscheiden beide die Farben sehr gut, aber sein Großvater von mütterlicher Seite hat dieselbe Abnormität des Auges.

### III.

Als einige der Proben, an denen v. R. die auffallendsten Irrthümer begangen hatte, diesem seinem Großvater vorgelegt wurden, äusserten sich zwar beide darüber nicht ganz in einerlei Weise, doch waren von den Verwechslungen des Großvaters einige ganz, und die übrigen so nahe mit denen des Enkels übereinstimmend, daß der Zustand beider, wenn auch nicht ganz gleich, doch wenigstens höchst ähnlich ist.

### IV.

Dr. P. in M. hat hellblaue Augen und hellbraune Haare. Sein Sehvermögen ist sonst gut. Daß er die Farben nicht richtig unterscheidet, ist schon in früher Kindheit an ihm bemerkt worden. Sein Gesichtszustand

zeigt mit dem der vorhergehenden Personen größte Uebereinstimmung. In Beziehung auf den *Grad* der Verwechslungen steht er E. nicht nach, in Beziehung auf die *Art* derselben hat er mit ihm, und mehr wohl noch mit v. R. die größte Aehnlichkeit. Seine Zusammenstellungen von farbigen Papieren waren größtentheils ganz die nämlichen, welche der Letztere gemacht hatte, nur fand er, was dieser immer noch einigermaßen unterschied, gewöhnlich ganz gleich. Namentlich verwechselte er auch die helleren Schattirungen von Blau mit Lila und zum Theil mit Grau auffallender, als v. R. dies gethan hatte. Eine ziemliche Anzahl farbiger Papiere hatte er nach seiner Art geordnet. Diese Anordnung wurde von v. R. größtentheils gebilligt, indem dieser erklärte, daß dieselbe seinem Auge fast überall gemäß sey, auch da, wo er aus den ihm wahrnehmbaren kleinen Unterschieden, besonders zwischen Roth und Grün, wisse, daß das gewöhnliche Auge große Unterschiede sehe. Ueberhaupt zeigte Alles, was v. R. über Dr. P's Proben äußerte, daß beide sehr übereinstimmen, nur daß der Letztere beträchtlich stärker verwechselt. Sehr ähnlich, doch wohl nicht ganz identisch sind P's und E's Verwechslungen.

Dr. P. gebrauchte die drei Namen Roth, Gelb und Blau. In die mit dem Namen *Roth* bezeichnete Schattirung legte er Roth, Röthlichgrün und Grau bis fast in's Braun: die Farbe des Esels erklärte er, sey das, was er *Roth* nenne. Als eine andere Schattirung von Roth, und zwar als eine Mischung mit etwas Gelb, legte er Gelblichroth, dunkleres, eher gelbliches oder bräunliches Grün und verschiedenes Braun. Als *gelbe* Schattirung rechnete er: Gelb, Orange, so wie helles reines oder eher gelbliches Grün, auch helles Graubraun. Als *blaue* Schattirung: reines Blau, Violett und Bläulichgrau, wobei er indess im dunkleren Violett etwas Röthliches nicht ganz über sah.

Hier zeigt sich, daß auch ihm die rein rothe Farbe,

nebst Bläulichgrün, einen vom farblosen Lichte wenig oder gar nicht verschiedenen Eindruck macht; die blaue Farbe wird besser, aber doch auch ziemlich unvollkommen, die gelbe noch am besten, doch auch mangelhaft vom Farblosen unterschieden.

An einigen farbigen Gläsern, die ich ihm zeigte, waren seine Irrungen ganz ähnlich. Mehrere grüne Gläser nannte er grau, und verglich sie mit feinvertheilter Tusche; gelbe und orange Gläser nannte er gelb; feurig-rothes Glas nannte er dunkelgelb in's Roth gehend; ein schlechtes bräunlich-violettes Roth fand auch er, wie v. R., sehr schön roth; ein braunes Glas hielt er für unrein roth; blaue und violette Gläser verwechselte er in hohem Grade mit einander, selbst wenn die letzteren sehr röthlich waren.

Von Dr. P's Verwandten scheint Niemand an demselben Fehler zu leiden.

## V.

Hr. v. — hat braune Haare und blaue Augen. Sein Gesicht ist scharf. Die Anordnung, die er einer Anzahl farbiger Papiere gab, und seine Bemerkungen darüber zeigen, daß er mit den bisher beschriebenen Fällen ganz in einer Kategorie steht. Fast alle Blätter, die er als gleich oder sehr ähnlich zusammenstellte, kommen bei diesen in derselben Weise vor. Er gebrauchte die Namen Roth, Gelb und Blau ganz in demselben Sinne, wie Dr. P. Auch die Anordnung, welche er den Papieren gab, hat im Ganzen und im Einzelnen sehr viel Uebereinstimmung mit der, in welche Letzterer dieselben gebracht hatte, nur legte er hellere Lila, die Dr. P. sämmtlich zu Blau gegeben hatte, zum Theil ebenfalls dahin, zum Theil aber auch zu Rosenroth und Grau, worin sich abermals eine Annäherung zwischen Blau und Roth zeigt. v. R. fand an dieser Anordnung mehr als an der P's auszusetzen. Auch E. war nicht ganz mit derselben einverstanden, und bemerkte in einigen Fällen ziemlich

viel Unterschied zwischen Farben, die Hr. v. — für gleich erklärt hatte.

Hr. v. — verwechselte blaue und violette Gläser in ziemlich hohem Grade mit einander; auch orangegelbe mit hochrothen. Die blauen und violetten nannte er blau. Die Farbe der gelben, orange, rothen und grünen wußte er nicht zu benennen; sie erschienen ihm von der Farbe wie Bouteillen, von der er sich erinnerte, daß sie gewöhnlich grün genannt werde.

Mit grünen oder rothen Gläsern vor dem Auge bemerkte Hr. v. — leicht einen größeren oder geringeren Unterschied der vorher verwechselten farbigen Papiere.

## VI.

v. B., 15 Jahr alt, hat hellbraune Haare und blaue Augen. Von der Unvollkommenheit seines Farbensinns wußte er nichts; dieselbe kam durch folgenden Zufall an den Tag. B. kam dazu, als ich mit zweien der nachher zu nennenden Individuen (IX und X), welche in Beziehung auf die Art ihrer Verwechselungen zu einer anderen Klasse gehören, einige Versuche an farbigen Papieren anstellte. Er wunderte sich sehr über die Irrthümer, die Jene begingen, zeigte aber, indem er dieselben verbessern wollte, daß er sich in einem ähnlichen Falle befinde. Als ich ihn darauf die Papiere nach seiner Art ordnen ließ, wurde er nicht minder von Jenen ausgelacht, als vorher sie von ihm.

Seine Verwechselungen von Rosenroth mit Grau und von Grün mit Grau und Braun sind von denen der bisher genannten Personen nicht merklich verschieden; auch Gelb und Gelbbraun verwechselte er mit Orange in ähnlicher Weise, wenngleich sich hier eine etwas genauere Unterscheidung zeigte. Zwischen Roth und Grün bemerkte er zwar öfters ziemliche Aehnlichkeit, doch scheint er diese beiden Farben noch etwas besser als selbst v. B. zu unterscheiden. Seine Verwechselungen



von Himmelblau mit bläulichem Grau und mit Lila sind wenigstens eben so stark, als bei den bisher Genannten.

## VII.

Dr. M., practischer Arzt, hat braune Augen und dunkelbraune Haare, und ist kurzsichtig. Er sagte mir, daß er in der Bestimmung der hellen Töne von Roth und Blau unsicher sey, so daß ich glaubte, er gehöre zu der nachher folgenden zweiten Klasse. Doch unterschied er gerade diese beiden Farben in demselben Maasse von einander, wie die bisher genannten Individuen, mit denen er überhaupt in Beziehung auf die Art der Verwechselungen im Wesentlichen übereinstimmt. Doch ist er nicht nur von der Natur mit einem etwas vollkommeneren Farbensinne ausgestattet, als die meisten von diesen, sondern auch in der Erkennung der Farben geübter und mit den Mischungen derselben vertraut, indem er sich viel mit Malerei beschäftigt hat, wobei er allerdings nicht selten in der Behandlung der Farben Schwierigkeit gefunden hat.

Als er die farbigen Papiere ordnete, legte er, gleich den bisher Genannten, in die Reihe der blauen Papiere auch lila und graublau. Die Roth sind meist gut geordnet, doch mit einigen Lila und Grau untermischt. Eine Reihe Orange war richtig gelegt, doch sind auch mehrere Orange zu Braungelb und zwischen Grün und Gelb gelegt. Grün ist mit Braun und Grau, so wie mit Fleischroth vielfach und in derselben Art, wie in den vorhergehenden Fällen, vermischt, weniger mit Roth; wohl aber ist dunkles Bläulichgrün mit unreinem, etwas bräunlichem Violett verwechselt.

Mit der Anordnung, welche E. den farbigen Papieren gegeben hatte, erklärte sich Dr. M. im Allgemeinen ganz einverstanden.

Mit Hülfe grüner und rother Gläser erkannte er sehr leicht die vorher begangenen Fehler.



M—s, 17 Jahr alt, hat braune Haare und grau-blaue Augen. Er ist von kurzem und schwachem Gesichte. In seiner Kindheit hat er an einer Augenentzündung gelitten, woher sich seine Augenschwäche, aber schwerlich sein unvollkommener Farbensinn datiren mag. Den letzteren Fehler hat er, wie er mir sagte, früher nicht beachtet, bis ich, durch einen Zufall darauf aufmerksam gemacht, ihn danach fragte.

Er unterscheidet die Farben zum Theil besser als die bisher Genannten, höchstens die beiden letzten ausgenommen. In Beziehung auf die Art haben seine Verwechselungen noch immer ziemlich große Aehnlichkeit mit den bisherigen, scheinen sich aber auch einigermaßen denen der nun folgenden Beispiele der zweiten Klasse in sofern zu nähern, als sie vorzüglich die Farben betreffen, bei welchen beide Klassen am meisten übereinstimmen.

Die rothen Papiere ordnete er ziemlich richtig, indem er die gelbrothen in Rothbraun einigermaßen überführte, die Rosa aber in Carmoisin gut abstufte; ihnen ordnete er höchstens helles, bräunliches Grau oder Graulila bei, niemals aber Grün oder Blau. Einige nicht viel in's Lila fallende Rosenroth stellte er nebst Grau zu Violett. Dunkle Violett unterschied er immer gut von Roth und Blau; dagegen verwechselte er die hellen Violett mit Himmelblau wenigstens eben so stark, wie die bisher Genannten, und die Art, wie er graue und hellere violette Papiere mit den blauen, ferner graue und braune mit grünen, so wie orange mit gelben durcheinander rangirte, ist ganz derselben Art, wie in den bisherigen Fällen. Auffallend ist noch, daß er Himmelblau und Blaulichgrün sehr nahe zusammenstellte.

Im Gebrauche der Farbennamen zeigte sich M—s sehr unsicher, besonders in den hellsten, doch auch in *unreinen* dunkeln Schattirungen. Er war bei Graulila

unsicher, ob er es roth oder blau nennen sollte. Ein helles, nicht viel in's Lila gehendes Rosa legte er zwischen die grauen und lila Papiere, mit denen er die blaue Farbenreihe eröffnete. Bei einigen schönen Himmelblau war er zweifelhaft, ob sie blau oder grün zu nennen seyen. Bei einem sehr hellen bräunlichen Grau erklärte er, er wisse nicht, ob er es roth, blau oder gelb nennen solle. Ein reines, lebhaftes Hellgelb hatte er erst zu einigen Hellgrau, die von ihm grün genannt wurden, gelegt, von denen er es aber nachher, bei genauerm Ordnen, wieder wegnahm.

M—s scheint hiernach vom Blau eine ähnlich unvollkommene Empfindung zu haben, wie E., v. R. u. s. w. eben so vom Gelb, das er eher noch etwas mangelhafter erkennen mag, als die Uebrigen: dagegen hat er vom Roth einen entschiedeneren Eindruck als Jene, die gerade diese Farbe am unvollkommensten wahrnehmen, so daß die Mangelhaftigkeit des Farbensinnes sich bei ihm gleichmäßiger, als bei den anderen Individuen, auf alle drei Grundfarben, Gelb, Roth und Blau, zu erstrecken scheint.

Einige farbige Gläser, die ich ihm zeigte, unterschied und benannte er ziemlich gut.

Am prismatischen Farbenbilde zeigte sich nichts Auffallendes. Er nannte den rothen Theil *roth*, den orange und gelben *gelb*, den grünen größtentheils, bis gegen das Blau hin, *grün*, den blauen *hellblau*, den violetten *dunkelblau*. In seinen Angaben über die Gränzen des Spectrums, sowohl mit bloßem Auge, als auch bei der Bewaffnung mit einigen farbigen, namentlich blauen Gläsern, konnte nichts Unrichtiges entdeckt werden.

Unter M—s Verwandten scheint Niemand eine gleiche Eigenschaft zu haben. Ein Oheim desselben ist ein gerade in der Behandlung des Colorits ausgezeichneter Maler.

## Zweite Klasse.

Die bisher angeführten Fälle von Farbenverwechslung zeigen eine grosse Uebereinstimmung mit einander. Die nicht minder auffallenden, welche ich jetzt folgen lasse, haben eine ähnliche Uebereinstimmung *unter sich*, weit weniger aber mit den vorhergehenden.

## IX.

H., 18 Jahr alt, hat blaugraue Augen und hellbraune Haare. Seine Augen sind nicht sehr stark und etwas kurzsichtig. Dafs er die Farben nicht richtig erkennt, hat er schon als Kind daran bemerkt, dafs er die Kehrseite der blauen und rothen Spielkarten, zumal bei Licht, nicht gut unterscheiden konnte. Auch wufste er, dafs er Rosenroth mit Himmelblau und die Farbe eines braunen Pferdes mit der eines Fuchses verwechselt.

*Versuche mit farbigen Papieren.* Die rein dunkelblauen Papiere bezeichnete er immer richtig mit dem Namen *Blau*; die hellblauen nannte er zuweilen *blau*, öfter *roth*, *rosa*. Die violetten nannte er bald *roth*, bald *blau*; alle Arten rother Papiere nannte er fast immer *roth*. Für die grünen brauchte er, je nach der Verschiedenheit der Nüance, die Namen: *Braun*, *Roth*, *Orange*, auch *Gelb*, und selbst für sehr blasse den Namen *Grau*; zuweilen wandte er auch den Namen *Grün* richtig an. Orange nannte er zuweilen richtig, zuweilen *grün* oder *gelb*. Grau bezeichnete er sehr selten mit diesem Namen, gewöhnlich nannte er es *roth* oder *grün*, unreineren auch wohl *braun*.

Aus der Zusammenstellung solcher Papiere, die ihm von gleicher oder ähnlicher Farbe erschienen, ergiebt sich Folgendes: Rosenroth erscheint ihm einerlei mit Himmelblau, nicht nur wenn beide Farben hell, sondern auch wenn sie schon sehr intensiv sind. Nicht minder verwechselt er Lila mit Hellblau und Rosa. Dunkle-

res gesättigtes Blau unterscheidet er von Roth, wenigstens wenn beide Farben rein sind; höchstens legt er ein schwärzliches Blau zu Carmoisin; wohl aber verwechselt er Carmoisin mit Violett, so wie andererseits ein lebhaftes Dunkelviolett mit tiefem reinen Blau. Er legt dunkles Carminroth mit einem schwärzlichen Blaugrün zusammen, eben so helleres Bläulichgrün mit Chocoladenbraun und Fleischroth; ferner Zinnoberroth mit reinem Dunkelgrün und Braun. Er hält Ziegelroth für ganz einerlei mit Rostbraun und mit Dunkelolivengrün, und unterscheidet Zeisiggrün und Grasgrün weder von Gelbbraun noch vom lebhaftesten Orange. Gelb ist die Farbe, bei welcher er die geringsten Verwechselungen begeht, doch unterscheidet er reines Gelb kaum von solchem, das schon ziemlich in's Grün und mehr noch in's Orange, oder auch etwas in's Graue oder Bräunliche geht. Ein lebhaftes Hellgrün nannte er gelb, und stellte es mit einem schönen Gelb zusammen, von welchem es die hellere Schattirung sey. Auch er verwechselt in ähnlicher Weise, wie die Personen der ersten Klasse, Farben mit Grau. Reines Hellgrau bat für ihn die größte Aehnlichkeit mit einem etwas unreinen (hauptsächlich von etwas Gelb nicht ganz freien) Rosenroth, auch wohl, wenn es sehr blaß ist, mit einem etwas grünlichen Hellblau. Grau, das in's Lila neigt, wurde dem Rosa und Himmelblau zugeordnet: solches Grau aber, das eher in's Bräunliche fällt, wurde mit einem matten, etwas bläulichen Grün zusammengelegt.

Beachtenswerth ist folgender Umstand. Wenn man die Verwechselungen betrachtet, die H. in Beziehung auf die dunkleren rothen Pigmente begeht, so fällt es auf, daß ihm diese Farbe verhältnißmäßig dunkler erscheinen muß, als andere; denn obgleich es schwierig ist, die Helligkeit sehr verschiedener Farben mit einander zu vergleichen, so stehe ich doch nicht an, die braunen und mehr noch die grünen Papiere für entschieden dunk-

ler zu erklären, als die damit verwechselten rothen. Auch die violetten sind merklich dunkler, als die ihnen von H. gleichgestellten rothen, und ich würde auch die dunkelblauen für dunkler halten, als die mit ihnen verglichenen violetten. Bei den hellen Farben läßt sich dieß natürlich nicht so gut bemerken.

Verwechselungen von Grün und Blau kommen nicht vor. Eben so findet H. zwischen reinem oder bläulichem Roth, und solchem, das in's Gelbe fällt, einen unverkennbaren Unterschied. Noch weniger natürlich findet er eine Aehnlichkeit der gelben Farbe mit reinem Roth oder Blau.

Ich ließ H. die sämtlichen Papierproben ordnen, und dann in derselben Weise wie E. einen Theil derselben ausschleusen, so daß eine seinem Auge gewaise Farbentafel entstand. Er legte die Papiere in mehrere Schattirungen. Bei dieser Anordnung bilden die reinen (von Gelb ganz freien) rothen, die violetten und blauen Farben mit einigen blassen Grau das eine Extrem, die gelben, die in's Orange und Grasgrün schattirt sind, das andere Extrem; der Uebergang von jenem zu diesem wird durch Bläulichgrün, Bläulichgrau, Braun und Hochroth gebildet.

Als ich H. fragte, welche von diesen Farben ihm am lebhaftesten erschienen, bezeichnete er einige Blätter von tiefem, sehr reinem Blau und ein Paar lebhaftes gelbe; nächst dem ein lebhaftes, aber dunkles Gelbroth, obgleich dieses Blatt seinem Auge dunkler erscheint, als fast alle andere, die zum Theil viel dunkler sind; endlich auch noch ein feuriges Zinnoberroth, das er jedoch einem eselgrauen Papier als ziemlich ähnlich angereibt hatte.

H's Verwechselungen haben mit den bisher beschriebenen der ersten Klasse manches Aehnliche, besonders in Beziehung auf Rosenroth und Grau. Doch ist bei ihm die Verwechselung dieser beiden Farben nicht ganz

so stark, wie bei den Vorhergehenden, indem sie sich nur auf die helleren Schattirungen erstreckt, und mit reinem Grau nur ein unreines, etwas gelbliches Rosenroth verwechselt wird. Auch bei Gelb und blasser Orange stimmt H. mit den bisherigen Fällen ziemlich überein. Dagegen ist bei ihm die Aehnlichkeit des Blau mit Roth und auch mit Grau offenbar viel entschiedener, so daß dies ein charakteristisches Unterscheidungszeichen beider Klassen ausmacht. So sind auch seine Verwechslungen von Grün und Roth anderer Art, als die bisherigen, indem bei ihm das mit einem Grün verwechselte Roth immer entschieden mehr Gelb enthält und heller ist, als das, welches die bisher Genannten damit vergleichen. Diese stellen dasselbe Rosenroth, das H. einem Himmelblau sehr ähnlich findet, mit Blaulichgrün zusammen; das Grasgrün, das H. mit Orange verwechselt, vergleichen sie mit dunklem Zinnoberroth.

Vorzüglich aber erkennt man die Verschiedenheit zwischen den Wahrnehmungen der Individuen beider Klassen, wenn man die Proben des Einen dem Andern zeigt. Ich legte v. R. eine Menge der von H. zusammengestellten Proben vor. Nur bei wenigen äußerte er sich darüber ähnlich, bei keiner ganz so wie H. Nicht nur die Blau und Roth, die dieser verwechselt hatte, unterschied er deutlich und benannte sie richtig, sondern auch die Grün und Braun, Grün und Orange fand er nur wenig ähnlich, und selbst da, wo beide Individuen am meisten Aehnlichkeit haben, zeigte sich einige Verschiedenheit. Die von H. zusammengestellten Rosa und Grau erklärte v. R. zwar für ähnlich, fand aber andere, mehr bräunliche Grau, die zu jenem Rosa, und andere reivere Rosa, die zu jenem Grau besser stimmen. Ueber mehrere der von H. gemachten Verwechslungen war v. R. im höchsten Grade verwundert, und äußerte die Hoffnung, daß die seinigen nicht eben so stark seyen. Eben so fanden E. und Dr. M. die von H. gelegte Far-



benreihe unrichtig. Nicht minder aber erklärte umgekehrt H. das, was v. R. und E. als gleich oder ähnlich bezeichnet hatten, für mehr oder weniger ungleiche und oft für ganz verschiedene Farben, so daß die Verwechslungen H's von den bisher angeführten Beispielen nicht nur dem Grade, sondern auch der Art nach deutlich verschieden sind, wie dies besonders auch aus der bei VI. gegebenen Erzählung hervorgeht.

*Versuche mit farbigen Gläsern.* Hier waren die Verwechslungen nicht minder auffallend, und ganz von derselben Art, wie bei den farbigen Papieren. Blaue Gläser erklärte H. für einerlei mit violetten, selbst wenn die letzteren schon sehr stark in's Roth übergingen und beide Farben sehr intensiv waren. Ein schönes, etwas in's Bräunliche und Gelbe fallendes Dunkelgrün erschien ihm von gleicher Farbe wie ein feurigrothes Ueberfangglas<sup>1)</sup>, und ein ähnliches, dunkleres Roth fand er einerlei mit einem aus mehreren zusammengelegten Gläsern entstandenen grünlichen Braun.

*Papiere durch farbige Gläser betrachtet.* H. war durch diese Art des Versuchs nicht wenig überrascht. Auch ihm erschien, wenn sein Auge mit farbigen Gläsern bewaffnet war, nicht nur die Helligkeit, sondern auch die Farbe der Papiere so verändert, daß er den vorher gleichbenannten jetzt verschiedene Namen gab, und er war, mit Hülfe derselben, im Stande die meisten der vorher begangenen Verstöße ziemlich zu vermeiden. Am brauchbarsten zeigte sich hierzu ein nicht zu dunkles gelbrothes oder orangefarbiges Glas, indem es die rein rothen Pigmente viel heller als die damit verwechselten blauen oder violetten erscheinen läßt, und eben so die scharlach- und gelbrothen sehr hell, die braunen dunkler, die grünen noch dunkler zeigt. Von grünem Glase hat H. weniger Hülfe als die erste Klasse,

1) Dasselbe Grün hatte E. mit einem sehr ähnlichen und nur tiefer gefärbten rothen Glase für gleich erklärt.



indem jenes dunklere Grün, das er mit Roth verwechselt, ihm durch das grüne Glas nicht viel heller erscheinen kann, als dieses Roth. Der Einfluss, welchen die gewöhnlichen kobaltblauen Gläser auf die am stärksten verwechselten Farben, namentlich Roth und Blau, ausüben, ist nicht geeignet, ihm zu einer Unterscheidung derselben zu dienen, da diese Farben vielmehr bei solcher Bewaffnung selbst dem gewöhnlichen Auge einigermaßen ähnlich erscheinen.

Ich legte zwei fast ganz gleiche carmoisinrothe Papiere und ein dunkelviolettes, das für H's Auge jenen eben so gleich war, neben einander. Darauf liefs ich ihn ein violettes Glas vor das rechte Auge nehmen und so nach dem hellen Himmel sehen; als er nach einem Weilchen das Glas fortlegte, und die Papiere mit dem rechten Auge ansah, während das linke geschlossen wurde, erschien ihm das violette Papier verschieden von den beiden andern, dagegen das linke Auge, wenn das rechte geschlossen war, keinen Unterschied bemerkte. Natürlich kehrte auch in dem rechten Auge der gewöhnliche Zustand bald zurück.

*Versuche am prismatischen Farbenbilde.* Durch den Umstand, dafs die rothen Papiere H. so viel dunkler erschienen, wurde ich auf die Vermuthung geführt, dafs sein Auge vielleicht für gewisse Strahlen weniger empfindlich sey, als für andere. Es war vorzüglich dieser Umstand, welcher mich zur Anstellung der Versuche mit prismatischen Farben veranlafste.

Als das Spectrum auf die früher beschriebene Weise erzeugt war, liefs ich H. von unten herauf beschreiben, was er sah, wobei ich indess bemerken mufs, dafs ihm die Ordnung, in der die prismatischen Farben auf einander folgen, nicht unbekannt war.

Die untere Gränze des Spectrums gab er etwas höher an, als sie wirklich liegt, d. h. etwas innerhalb des Roth. Ich liefs ihn wiederholt an zwei verschiedenen

Tagen diese untere Gränze mit Bleistift umziehen; immer zog er seinen Strich an einer Stelle, die mir, obgleich sie nicht so sehr weit von der wirklichen Gränze absteht, doch schon sehr lebhaft roth erschien, und versicherte mich, er ziehe die Linie da, wo schon gar kein Roth mehr bemerkbar sey. Auch ihm ist diese Gränze nicht ganz scharf, doch viel bestimmter als die obere. Einen ganz schwachen weißlichen Schimmer, der sich noch unterhalb des Roth erstreckt, bemerkte H., und gab seine Gränze so an, wie sie auch mir erschien.

Den untersten Raum des Spectrums, bis in's Orange hinein, nannte H. *roth*. Den darüber befindlichen, nämlich einen Theil des Orange und hauptsächlich das Gelb, nannte er *orange*. Den ganzen grünen Theil des Spectrums nannte er *gelb*. Dann bezeichnete er einen ganz schmalen Raum auf der Gränze von Grün und Blau als *weißlichgrün*. Die Gränze zwischen Blau und Violett gab er sehr genau an, indem er mit dem Bleistift ganz der Rundung folgte, welche hier so auffallend ist, indem sich das Blau in der Mitte höher erstreckt, als an den Seiten. Den Raum unter dieser Gränze nannte er richtig *blau*, den über derselben *violett*, gestand mir jedoch zu, daß er für den letzteren, statt des bis dahin nie gebrauchten Wortes *Violett*, eher die Benennung *Dunkelblau* gewählt haben würde, wenn ihm nicht bekannt gewesen wäre, daß man den obersten Theil des prismatischen Farbenbildes *violett* nenne. Die obere Gränze des Violett, die freilich schwer recht scharf zu bestimmen ist, gab er ganz so an, wie sie mir erschien.

Die Namen, welche er hier den verschiedenen Theilen des Spectrums gab, stimmen im Allgemeinen mit den an den Papieren vorgekommenen Verwechslungen, wo ebenfalls Gelb mit dem Namen Orange, und Hellgrün mit dem Namen Gelb bezeichnet worden war. Auffallend ist die deutliche Wahrnehmung des Unterschiedes zwischen Blau und Violett, obgleich dieselbe wohl groß-

ten.

tentheils auf der ungleichen Helligkeit beider beruhen mag. Der wichtigste Umstand aber ist der Mangel eines Eindrucks von den äußersten rothen Strahlen. Dieser wird noch auffallender bei folgendem Versuche.

Wenn man ein kobaltblaues Glas vor das (normale) Auge nimmt, und so das auf der Wand aufgefangene Spectrum betrachtet, so wird das Orange sehr verdunkelt, und wenn das Glas etwas tief gefärbt ist, ganz schwarz. Das darunter befindliche Roth wird zwar geschwächt, bleibt aber in Gestalt eines abgetrennten rothen Ovals noch sehr sichtbar, wenn nicht etwa das Glas äußerst dunkel ist; man kann sogar die untere Gränze des Spectrums so noch etwas tiefer verfolgen, als mit dem bloßen Auge; der obere Theil des Spectrums bleibt bis zur äußersten Gränze sichtbar. Als ich H. diesen Versuch machen ließ, sah er von dem rothen Oval gar nichts, selbst wenn das blaue Glas so wenig intensiv war, daß es das Orange nicht einmal vollständig verdunkelte, und das Roth noch so hell erscheinen ließ, wie den größeren Theil des übrigen Spectrums. Ich machte ihn auf das Vorhandenseyn dieser rothen Stelle aufmerksam, und umzog sogar die Gränze derselben mit Bleistift, aber er konnte nichts davon bemerken. Ich nahm eine Anzahl Streifen, aus einer mäßig blauen Glastafel geschnitten; durch zwei derselben, die aufeinandergelegt waren, sah H. den rothen Theil des Spectrums noch, durch drei nicht mehr; mir dagegen wurde er kaum dann unsichtbar, als ich zwölf solcher Gläser vor's Auge nahm. Den oberen Theil des Spectrums vom dunkeln, an die Stelle des Orange getretenen Raume bis zur äußersten Gränze des Violett sah H., mit den blauen Gläsern bewaffnet, in derselben Ausdehnung wie ich.

Mit verschiedenen anderen farbigen Gläsern bewaffnet, gab H. die Gränzen so an, wie sie auch mir erschienen. Ich habe nicht das Mindeste bemerkt, was eine geringere Empfindlichkeit für den obersten Theil

des Spectrums verriethe; im Gegentheil konnte er hier den schwächsten Schimmer noch gut verfolgen.

Als H. das Spectrum auf der Wand mit bloßem Auge betrachtete, und ich ihn fragte, welche Stelle ihm so am hellsten erschiene, zeigte er auf die Gränze zwischen Grün und Blau. Sollte auch diese Angabe nicht sehr genau seyn, so weicht sie doch von der gewöhnlichen Wahrnehmung auffallend genug ab, um zu bestätigen, daß H's Auge für die minder brechbaren Strahlen weniger empfindlich ist, als für die brechbareren. Bei den Individuen der ersten Klasse findet dasselbe nicht statt. E., v. R. und M — s erkannten z. B. mit blauen Gläsern vor dem Auge den untersten rothen Theil eben so gut als ich, und bedurften, um denselben ganz unmerklich zu machen, einer gleichen Anzahl solcher Gläser wie ich.

*Versuche mit Interferenzfarben.* Als die Farbenringe mit dem matten Hohlspiegel im verfinsterten Zimmer erzeugt wurden, nannte H. das Schmutziggelb und Blau des ersten Ringes beide *roth*, doch von verschiedener Art. Das folgende Weiß nannte er *grün*, das folgende Gelb des zweiten Ringes nannte er richtig; das Roth desselben: *dunkelblau*; das Blau: *hellblau*; das folgende Blaugrün und Gelb richtig; das Roth des dritten Ringes: *blau*; das folgende Grün nannte er *gelb*; dagegen er das folgende Gelb *grünlich* fand; das Roth des vierten Ringes, wenigstens dessen inneren Theil, fand er *schwach blau*. Von hier an fand er die grünen Ringe *farblos*, und die rothen ebenfalls, nur dunkler, bis zum sechsten Ringe. Den siebenten rothen Ring, der mir nur noch eben erkennbar war, bemerkte er nicht.

H's Vater, der einen sehr ausgebildeten Farbensinn hat, wußte nichts von dieser Eigenschaft seines Sohnes. Seine Mutter und eine Schwester — Brüder hat er nicht — liden nicht an dieser Unvollkommenheit des Gesichts.

Eine Schwester seiner Mutter hat einen Sohn, der dieselbe Abnormität zeigt.

## X.

Dieser, M—x, ein Knabe von 9 Jahren, hat blaue Augen und ziemlich dunkle Haare. Da ich von seinem Alter weniger genaue Angaben, als von Erwachsenen erwartete, so habe ich mit ihm nur wenige Versuche angestellt, die aber hinreichen, um zu zeigen, daß seine Art, die Farben zu sehen, mit der seines Veters ganz übereinstimmt. Ich wählte nämlich aus den Papierproben diejenigen Nummern aus, an welchen H. die auffallendsten Verwechslungen begangen hatte, und mischte diesen noch einige andere bei, welche von Individuen der ersten Klasse verwechselt waren. Als ich diese Papiere, gehörig untermischt, dem M—x zur Anordnung vorlegte, beging er genau dieselben Verwechslungen, wie sein Vetter H. Dasselbe lebhafte Rosenroth mit Himmelblau, Carmoisin mit Dunkelviolet, Hellgrau mit Rosenroth, Blaugrün mit Chocoladenbraun, Ziegelroth mit Olivengrün und Rostbraun, Grasgrün mit Gelbbraun und Orange wurden von ihm zusammengelegt und für gleich oder sehr ähnlich erklärt, über welche sich H. in gleicher Weise geäußert hatte. Auch erklärten sich beide in ihren Bemerkungen über die vorliegenden Farben ganz einverstanden mit einander. Dagegen bezeugte M—x seine Verwunderung über mehrere Verwechslungen der ersten Klasse.

## XI.

N., 16 Jahr alt, hat grünlichgraue Augen und hellbraune Haare. Er sieht gut in Nähe und Ferne. Die Mangelhaftigkeit seines Farbensinnes hat er früher nicht beachtet, und ist erst ganz kürzlich durch einen Andern,

der von dem Vorkommen eines solchen Fehlers wußte, darauf aufmerksam gemacht worden.

*Versuche mit farbigen Papieren.* Ich legte ihm, gehörig durcheinander gemischt, meinen ganzen Vorrath farbiger Papiere zur Anordnung vor. Hier zeigte er durchaus die größte Uebereinstimmung mit H. Denn wenn auch die von Beiden gewählte Anordnung nicht überall die nämliche ist — wie dies bei einer so grossen Anzahl von Farben nicht einmal bei zwei Personen mit normalen Augen der Fall seyn würde — so findet doch zwischen beiden nicht nur im Ganzen eine auffallende Uebereinstimmung statt, sondern es finden sich auch unter N's Verwechslungen in allen Farben eine Menge solcher, die mit denen H's ganz einerlei sind, oder die größte Aehnlichkeit haben. Ich legte daher N. die oben erwähnte, von H. geordnete Farbentafel vor. Mit der Anordnung im Ganzen erklärte er sich vollkommen einverstanden und im Einzelnen fast ganz, indem er kaum einige höchst unbedeutende Aenderungen in der Folge der Blätter vornahm. Einige Farben, die H. für gleich erklärt hatte, fand er recht ähnlich, und umgekehrt nannte er andere sehr ähnlich, bei denen H., wenn er sie auch neben einander gelegt hatte, doch einen deutlicheren Unterschied angemerkt hatte. Dagegen fand er die von Individuen der ersten Klasse getroffene Anordnung seinem Auge nicht gemäß.

N. unterschied an den Papieren zwei Hauptgruppen; die eine umfaßt die blauen Pigmente, die von Gelb ganz freien rothen, die violetten, nebst reinem Hellgrau und solchem, das in's Blau und Lila geht; die andere die gelben, grünen, gelbrothen und braunen, wozu auch ein Paar sehr dunkle Braunviolett gerechnet waren; zwischen beiden stehen die blaugrünen, fleischrothen, bräunlich-grauen und graubraunen Farben, die sich theils der ersten, theils der zweiten Hauptgruppe anschließen.

*Auf die Frage, welche Farben ihm als die lebhaft-*



testen erschienen, bezeichnete N. ein schönes Dunkelviolett, das mit jenen blauen Papieren zusammenlag, die H. als solche genannt hatte; ferner dasselbe dunkle Gelbroth, dasselbe Zinnoberroth und eines der gelben Papiere, die H. bei derselben Frage hervorgehoben hatte; außerdem ein ziemlich dunkles, etwas gelbliches Grün.

*Versuche mit farbigen Gläsern.* Die farbigen Gläser, welche ich N., gegen den hellen Himmel gehalten, betrachten liefs, benannte er sämmtlich richtig: grün, roth, rothgelb, gelb, blau, blauroth. Nur die beiden letzten Namen verwechselte er einigemal, ohne jedoch, wenn er blaue und violette Gläser, die H. für gleich gehalten hatte, neben einander hielt, das Röhliche in den letzteren zu übersehen. Das dunkelgrüne und das feurigrothe Glas, welche H. gleich erschienen waren, fand N. wenig ähnlich, und er nannte richtig jenes grün und dieses roth. Ein schlechtes, in's Bräunliche und Violette fallendes Roth erschien ihm, wie mehreren Personen der ersten Klasse, als eine vorzüglich schöne Farbe.

Es ist auffallend, dass N., der mit H. in der Beurtheilung der farbigen Papiere fast vollkommen übereinstimmt, die gefarbtten Gläser so sehr viel besser unterscheidet, als dieser, wiewgleich er allerdings offenbar auch hier dem Unterscheidungsvermögen eines gewöhnlichen Auges längst nicht gleichkommt. Es zeigt sich hierin, dass N. den Fehler der Farbenverwechslung in geringerem Grade besitzt, als H., dessen Auge überhaupt schwächer ist, indem der Ersterer bei diesen sehr lebhaften Farbeneindrücken noch einen Unterschied empfindet, der ihm bei den nie so lebhaft leuchtenden Farben der undurchsichtigen Pigmente in gleichem oder beinahe gleichem Grade zu fehlen scheint, wie dem Letzteren.

*Farbige Papiere durch bunte Gläser betrachtet.* Mit farbigen Gläsern vor dem Auge bemerkte N. an den meisten der vorher verwechselten Papieren einen grösseren oder geringeren Unterschied. Durch ein schw.



nes, nicht sehr tief gelbrothes Glas sah er Alles sehr dunkel; ein orangefarbiges zeigte auch ihm, wie H., im Allgemeinen die grössten Unterschiede, und mittelst desselben gelangte er sehr bald dahin, die vorhin unrichtig benannten Farben mit ziemlicher Sicherheit zu bestimmen. Nur Lila und Grau sind durch dieses Hülfsmittel nicht gut zu unterscheiden.

*Bei Lampenlicht* fand N. die von H. gelegte Farhentasel, die er am Tageslicht gebilligt hatte, nicht mehr ganz passend, indem ihm die rothen Blätter heller erschienen, als die dazu gelegten grünen und blauen. Eine gleiche Wirkung wurde erlangt, als er am Tageslichte ein ziemlich helles orangefarbiges Glas vor's Auge nahm.

*Versuche am prismatischen Farbenbilde.* N. nannte das Roth und Orange des Spectrums *roth*, das Gelb bis in's Grün hinein *gelb*, das Grün richtig, das Blau und Violett *hell-* und *dunkelblau*. Wie H., gab er mit bloßem Auge die untere Gränze etwas zu hoch an. Mit blauem Glase vor dem Auge, erkannte er den unteren rothen Theil nicht mehr, wenn auch diese Glas so wenig tief gefärbt war, daß es das Orange noch nicht völlig verdunkelte. Einen gleichen Erfolg hatte ich mit einer grünen Auflösung von schwefelsaurem Kali-Chromoxyd (Chromalann). Wenn man nämlich eine Flasche mit dieser Auflösung vor das Auge nimmt, so wird (für das gewöhnliche Auge) das prismatische Gelb ausgelöscht, so daß, ähnlich wie beim kobaltblauen Glase, nur an einer höheren Stelle ein dunkler Streif quer durch das Spectrum geht. Den dadurch abgegränzten unteren rothen Theil des Spectrums sah N. nicht, als er mir noch in ziemlich lebhaftem Lichte erschien, obgleich ich ihn auf das Vorhandenseyn desselben aufmerksam machte. Als den hellsten Theil des Spectrums bezeichnete er, bei unbewaffnetem Auge, eine Stelle im Grün, näher dem Gelb, also ebenfalls zu hoch, wenn auch nicht in dem Grade, wie H.

Beide Eltern N's verwechseln die Farben nicht, auch sonst Niemand in seiner Familie.

## XII.

F., 12 Jahr alt, hat dunkelbraune Augen, schwarze Haare, und ist überhaupt vollkommen brünett. Er wußte, daß er die Farben nicht richtig benennen könne, was ich selbst auch schon vor sieben Jahren einmal an ihm beobachtet hatte.

Als ich ihn aus einer Anzahl farbiger Papiere diejenigen aussuchen ließ, die ihm gleich oder sehr ähnlich erschienen, waren seine Verwechselungen bei allen Farben so ähnlich denen H's und N's, daß die bei Jenen gegebene Beschreibung auch auf diesen Fall ganz übertragen werden kann. In der von H., gelegten Farbens- tafel nahm F. einige höchst unbedeutende Aenderungen vor, indem er die Folge einiger ihm, wie H., sehr ähnlich erscheinender Blätter nur darum etwas änderte, weil sie ihm dadurch nach der Helligkeit richtiger geordnet erschienen; im Uebrigen stimmte er jener von H. getroffenen und von N. gebilligten Anordnung ganz bei.

Ein Bruder F's, ebenfalls vollkommen brünett, hat auch die Eigenschaft, Farben zu verwechseln.

## XIII.

Unter den Papieren meines Vaters befinden sich die Angaben seiner, vor 20 Jahren angestellten Beobachtungen über Farbenwechselung an Professor A. zu N. Demselben war eine Menge Rollen mit gefärbter offener Stückseide vorgelegt worden, um die Farbe derselben anzugeben.

Er rechnete

zu *Gelb*: Gelb bis Hellorange, Braungelb, Gelbgrün, auch ein sehr helles Bläulichgrün;

zu *Orange*: Orange, Gelbgrün, Gelbbraun;

zu *Braun*: Schwarzbraun, dunkles Rothbraun und

Gelbbraun, Dunkel- und Mittelgrün, auch Dunkelroth und Dunkelviolett;

- zu *Grün*: Mittel- und Dunkelgrün, sowohl reines, als solches, das in's Gelbliche oder Bräunliche zieht; Bläulichgrün vom hellsten bis zum dunkelsten; auch Schwarzbraun, Schmutzigviolett, Fleischfarben und Rosenroth (von derselben Farbe, die er sonst unter Blau stellte); auch ein Dunkelblau war unter Grün gelegt;
- zu *Roth*: Rosenroth, Gelbroth, Bläulichroth, auch Braunroth, Rothbraun und Dunkelviolett;
- zu *Violett*: Violett, auch ganz röthliches und solches, das fast Blau zu nennen ist; auch ein Stahlgrau war zu Violett gerechnet;
- zu *Blau*: Hell- und Dunkelblau, Bläulich- und Röthlichviolett, Bläuserosenroth;
- zu *Grau*: ganz blasses Rosenroth und Blau, und ein in's Gelblichröthliche ziehendes Weiss. Ein blasses Blau wurde Silberfarb genannt.

*Weiss* und *Schwarz* wurden richtig benannt.

In gefärbten Wollen beging Prof. A. ähnliche Verwechselungen, doch irrte er hier weniger, als bei den Seiden, was höchst wahrscheinlich auf dem störenden Einflusse des Seidenglanzes beruht.

Schon diese Angaben würden hinreichen zu zeigen, daß Prof. A. zu unserer zweiten Klasse gehört. In der That aber wurden einige der von ihm als gleich zusammengestellten Seidenproben, die sich noch vorfanden, auch von H. und N. als gleich oder sehr ähnlich anerkannt, dagegen von v. R. größtentheils nicht.

Durch farbige Gläser sehend, oder bei Kerzenlicht, fand Prof. A. solche Farben ungleich, die seinem bloßen Auge bei Tage gleich erschienen waren.

Unter den hier beschriebenen Fällen von *Farbverwechselung* zeigt sich dieser Fehler in ziemlich un-

gleichem Grade. Es scheinen auch solche Fälle vorzukommen, bei denen sich etwas Aehnliches in noch geringerem Maasse zeigt, und die daher einen Uebergang zu dem normalen Zustande des Auges bilden.

## XIV.

K., 16 Jahr alt, hat blaue Augen und hellbraune Haare. Er sagte mir, daß er in der Benennung der Farben nicht vollkommen sicher sey. Er hat allerdings wohl einen unvollkommenen Farbensinn, aber viel weniger, als alle bisher Genannten; denn er ordnete die ihm vorgelegten Papierproben grösstentheils ziemlich gut, und wendete nur hauptsächlich die Namen zum Theil unrichtig oder wenigstens ungenau an. Die Benennung *Blau* gebrauchte er für alles Blau, für Hell- und Dunkelviolett, in denen er jedoch eine Beimischung von Roth nicht übersah, auch für helles Grün; dabei ordnete er die Lila-Papiere mit den grauen, besonders bläulich-grauen, nicht aber mit reinblauen durch einander. Die Benennung *Gelb* wandte er richtig an. Gelbbraun bis in's Hellchamois nannte er *rothbraun*. Orange Papiere nannte er *hellroth*; die gelblichrothen: *roth*; auch die carmoisin- und rosenrothen nannte er *roth*, *rosa*, und ordnete diese letzteren richtig. Eben so ordnete und benannte er die grünen richtig. Auch den Namen *Braun* wandte er meist richtig an; er gebrauchte denselben auch für ein in's Schwärzlichbraun fallendes Dunkelviolett. Graubraune und bräunlichgraue Papiere, die er etwas unvollkommen ordnete, nannte er *grau*.

Ich wählte 50 bis 60 farbige Papiere aus, um sie einer Anzahl von Personen vorzulegen, bei denen ich keinen Grund hatte, einen ähnlichen Fehler zu vermuthen. Die meisten unter diesen ordneten und benannten die Farben richtig, wenn auch nicht alle mit gleicher Leichtigkeit. Einige Andere zeigten im Ordnen und mehr noch im Benennen der Farben mehr oder minder

Unsicherheit, ohne jedoch solche Irrthümer zu begehen, in denen sich eine wirkliche Verwechslung ungleicher Farben zeigte. Obgleich es nun bei dieser Art von Unsicherheit nicht leicht ist zu beurtheilen, in wie weit sie physischen oder psychischen Ursachen zuzuschreiben ist, so ist doch dieselbe für denjenigen, welcher, sey es von Natur oder durch Uebung, eine grössere Sicherheit in der Erkennung der Farben besitzt, auffallend genug, um, in Verbindung mit den berichteten Fällen, auf die Vermuthung zu führen, daß derselben eine ähnliche, nur geringere Mangelhaftigkeit des Organs, wie bei den vorhergehenden Personen, zum Grunde liege.

In Fällen, wie diese letzten (XIV eingerechnet), würde durch Uebung viel zur Verbesserung des Farbensinns geschehen können. Auch in den übrigen wird dieselbe nicht ohne Einfluß seyn, jedoch nur bis zu einem gewissen Grade. Denn durch sie kann das Auge gewöhnt werden, kleine Unterschiede, die es sonst leicht übersieht, zu beachten. Daher wird z. B., wenn Grün und Roth ähnlich, aber nicht vollkommen gleich erscheint, durch Uebung dahin gelangen können, diese beiden Farben zu unterscheiden, und aus den ihm bemerkbaren kleinen Unterschieden wissen können, daß das normale Auge hier große Unterschiede sieht. Wenn dagegen, wie dies öfters der Fall ist, zwei verschiedene Farben dem fehlerhaften Auge, selbst wenn sie neben einander gehalten werden, völlig gleich erscheinen, so kann die Uebung des bloßen Auges keinen Erfolg haben, und nur durch künstliche Mittel, wie die Bewaffnung mit farbigen Gläsern, einige Hülfe gegeben werden.

#### Allgemeine Bemerkungen. !

Ich habe bei den Versuchen sorgfältig darauf geachtet, ob nicht die Individuen, welche die von uns unterschiedenen Farben verwechseln, vielleicht zuweilen *da einen Unterschied* bemerken, wo wir keinen wahr-

nehmen, was wenigstens bei denen denkbar wäre, die für gewisse Strahlen des Spectrums sich weniger empfindlich zeigen. Ich habe aber, ungeachtet der großen Anzahl von farbigen Papieren, welche gebraucht wurde, und worunter sich gewiss ähnliche Farben von ungleicher Mischung vorfinden, nichts bemerken können, was dieser Vermuthung einen hinreichenden Grund geben könnte<sup>1)</sup>. Ich habe selbst einige Farben, die gewiss ungleicher Beschaffenheit waren, in dieser Beziehung einer Prüfung unterworfen. Ein Papier mit Zinnober und ein anderes mit einer Mischung aus Carmin und Gummi gut bewalt, wurden, wie sie es wirklich waren, sowohl von N. als von v. R. höchst ähnlich gefunden. Mehr noch eigneten sich zu einem solchen Versuche durchsichtige farbige Körper, da sich deren ungleiches Verhalten am prismatischen Spectrum prüfen läßt. Ich nahm ein tiefblaues Glas und eine Auflösung von schwefelsaurem Kupferoxyd-Ammoniak, beide von so gleicher Farbe als möglich; jenes wirkt auf das Spectrum in der oben angegebenen Weise, indem es das Orange auslöscht und auch das Grün zum Theil schwächt, aber das Gelb und Roth, wenn auch geschwächt, doch noch sehr deutlich als getrennte Theile stehen läßt; die Kupferauflösung dagegen löscht den ganzen unteren Theil des Spectrums, bis in's Grün hinein, völlig aus. Diese beiden Farben gegen den hellen Himmel gehalten, wurden sowohl von N. als von E. und v. R. ganz gleich

1) Man muß sich hier nicht täuschen lassen, wenn man findet, daß solche Personen vielleicht zwei mal so verschiedene Farben völlig verschieden finden (z. B. bei Dalton: *pink* und *red*, oder die Farbe von *Geranium zonale* bei Tages- und Kerzenlicht); denn darin liegt nicht, daß sie hier größere Unterschiede empfinden, als das gewöhnliche Auge, sondern nur, daß ihnen der Unterschied verhältnißmäßig ihres sonstigen Unterscheidungsvermögens bedeutend ist, und zwar deshalb, weil er von der Beimischung einer Farbe (z. B. Gelb) herrührt, für deren Eindruck sie am meisten Empfindung haben.



gefunden. Eine grüne Auflösung von schwefelsaurem Kali-Chromoxyd löscht am Spectrum das Violett mit einem Theil des Blau und weiterhin das Gelb aus, läßt aber das Roth deutlich als getrennten Theil stehen; ein grünes Glas; jenem nicht vollkommen gleich, aber sehr ähnlich, löscht von oben herein das Violett, von unten herein das Roth bis gegen das Orange hin. Zwischen der Farbe dieser beiden Körper fanden E. und v. R. gar keinen, und N. nur einen geringen Unterschied. Schön rothe Auflösungen von Alizarin und Hämatin in Weingeist, und ein ihnen sehr ähnliches feurigrothes Glas, die jedoch auch in ihrer Wirkung auf das Spectrum keine Verschiedenheit zeigen, wurden sowohl von N. als von v. R. ganz gleich gefunden. Eben so einige grüne Kupferauflösungen und Gläser.

Als Resultat der hier im Einzelnen mitgetheilten Beobachtungen kann Folgendes angesehen werden:

*Außer solchen Personen, welche in der Bestimmung der Farben Schwierigkeit finden, ohne jedoch ungleiche Farben für gleich zu halten, kommen nicht selten solche vor, die, bald in höherem, bald in geringerem Maaße, gewisse ganz ungleiche Farben mit einander verwechseln. Aber nicht nur in Beziehung auf die Stärke, sondern auch in Beziehung auf die Art dieser Verwechselungen sind Unterschiede bemerkbar. In der letzteren Beziehung zerfallen die von mir untersuchten Individuen, kleinere Verschiedenheiten nicht gerechnet, in zwei Klassen.*

Zu der ersten Klasse gehören die unter I bis VIII beschriebenen Fälle, welche zwar in Beziehung auf den Grad der Verwechselungen ziemlich beträchtliche, aber in Beziehung auf die Art derselben nur unbedeutende Verschiedenheiten zeigen. Folgende Farben sind es, die sie mehr oder weniger mit einander verwechseln:



*Helles Orange und reines Gelb.*

*Gesättigtes Orange, helles Gelblich- oder Bräunlichgrün und Gelbbraun.*

*Reines Hellgrün, Graubraun und Fleischfarb.*

*Rosenroth, Grün (mehr bläulich als gelblich) und Grau.*

*Carmoisin, Dunkelgrün und Haarbraun.*

*Bläulichgrün und unreines Violett.*

*Lila und Blaugrau.*

*Himmelblau, Graublau und Graulila.*

Als das Wesentliche ihres Gesichtszustandes ergiebt sich Folgendes:

Sie haben einen sehr mangelhaften Sinn für den specifischen Eindruck aller Farben überhaupt; am unvollkommensten ist er für das Roth und, was damit nothwendig zusammenhängt, für das complementäre Grün, indem sie diese beiden Farben vom Grau wenig oder gar nicht unterscheiden; nächstdem für das Blau, das sie auch vom Grau ziemlich unvollkommen unterscheiden; am meisten ausgebildet pflegt ihr Sinn für das Eigenthümliche des Gelb zu seyn, doch ist ihnen auch diese Farbe viel weniger vom Farblosen verschieden, als dießs beim normalen Auge der Fall ist.

Zu der zweiten Klasse gehören die Fälle IX bis XIII. Ihr Zustand hat mit dem der ersten Klasse viel Aehnlichkeit. Auch sie erkennen Gelb noch am besten; sie unterscheiden Roth etwas besser, Blau etwas weniger vom Farblosen, vorzüglich aber Roth von Blau viel unvollkommener, als die erste Klasse. Die von ihnen verwechselten Farben sind nämlich folgende:

*Hellorange, Grünlichgelb, Braunlichgelb und reines Gelb.*

*Lebhaft Orange, Gelbbraun und Grasgrün.*

*Ziegelroth, Rostbraun und Dunkelolivengrün.*

*Zinnoberroth und Dunkelbraun.*

*Dunkelcarmünroth und Schwärzlichblaugrün.*

*Fleischroth, Graubraun und Bläulichgrün.*

*Mattes Bläulichgrün und Grau (etwas bräunlich).*

*Unreines Rosa (etwas gelblich) und reines Grau.*

*Rosenroth, Lila, Himmelblau und Grau (etwas in's Lila fallend).*

*Carmoisin und Violett.*

*Dunkelviolett und Dunkelblau.*

*Sie haben, was bei der ersten Klasse nicht der Fall ist, nur eine geschwächte Empfindung von den wenigst brechbaren Strahlen!*

Dieser letzte Umstand ist es allein oder vorzugsweise, auf welchem der Unterschied zwischen beiden Klassen beruht, denn derselbe erklärt nicht nur, warum Roth von der zweiten Klasse mit dunklerem Grün, als von der ersten verwechselt wird, sondern es lassen sich auch wohl die übrigen Unterschiede beider daraus ableiten, wenn man bedenkt, daß durch den Mangel der gelbrothen Strahlen erstlich das farblose Licht dem Blau (wenigstens dem Blau der ersten Ordnung) näher kommt, und zweitens auch Roth (wenigstens ein aus den beiden Enden des Spectrums gemischtes) näher dem Blau oder Violett. Ich habe in dieser Beziehung noch folgenden Versuch angestellt.

In der Dämmerung verschwinden bekanntlich die wenigst brechbaren Strahlen zuerst aus dem Lichte der Atmosphäre, wodurch die bekannten Aenderungen in dem Ansehen der Farben entstehen. Hier muß also, wenn der Mangel an Empfindung für jene Strahlen den Unterschied beider Klassen begründet, der Zustand der ersten Klasse in den der zweiten übergehn. Ich legte dem v. R. gegen Abend die Farbentafel E's vor, die er im Allgemeinen billigte, und die H's, die er viel unrichtiger fand. Bei einbrechender Dämmerung erschien ihm jene immer unrichtiger, und diese immer richtiger, bis er bei einem gewissen Grade der Dämmerung die letztere größtentheils gut geordnet fand, während ihm jetzt die er-

stere, besonders in Beziehung auf die Dunkelheit der Farben, unrichtig erschien. Durch einige besondere Proben habe ich mich noch namentlich davon überzeugt, daß er jetzt Himmelblau (welches in der Dämmerung auch dem Grau in der That ziemlich ähnlich wird) mit Rosenroth ganz eben so verwechselte, wie die zweite Klasse am Tageslicht. Bei noch weiter vorschreitender Dämmerung erschien ihm auch H's Tafel nicht mehr richtig, sondern die rothen Papiere, die bei Tage an ihrer Stelle zu hell waren, nunmehr zu dunkel. Bei diesem Versuche waren H. und N. (von der zweiten Klasse) zugegen. Die einbrechende Dämmerung hatte auf ihr Auge keinen merklichen Einfluß; es erschien ihnen die Farbentafel H's noch immer richtig und ungeändert, als sich auch v. R. schon mit derselben einverstanden erklärte, und sie bemerkten den Einfluß der Dämmerung, besonders durch das Dunklerwerden der rothen Papiere, erst als dieselbe so stark wurde, daß auch der Letztere dieselbe Tafel unrichtig fand.

Die Individuen der zweiten Klasse werden umgekehrt einigermaßen in den Zustand der ersten Klasse versetzt, wenn sie ein helles orangefarbiges Glas vor's Auge nehmen.

Daß mit diesen beiden Hauptklassen alle möglicherweise vorkommenden Fälle erschöpft seyn, kann natürlich nicht behauptet werden, und es wäre sehr wohl denkbar, daß es z. B. Individuen gäbe, welche das Gelb eben so wenig vom Farblosen zu unterscheiden vermöchten, als die hier beschriebenen das Roth. Indes muß ich bemerken, daß unter allen den von anderen Beobachtern angeführten Fällen ähnlicher Gesichtszustände, welche ich habe vergleichen können, kaum einige wenige sich befinden, bei welchen etwas dieser Art stattzufinden scheint, und welche nicht unter eine der beiden genannten Klassen gerechnet werden könnten, nur daß zuweilen eine Verwechselung von Grün und Blau

in höherem Grade statt zu finden scheint, als mir eine solche vorgekommen ist.

Die interessante Beschreibung, welche J. Dalton (*Memoirs of Lit. and Phil. Soc. of Manchester, Vol. V, und Edinb. Journ. of Science, No. IX*) von seinem eigenen Gesichtszustande giebt, stimmt durchgängig mit dem überein, was ich an der zweiten Klasse beobachtet habe; auch findet sich hier die Bemerkung, daß ihm der rothe Theil des prismatischen Spectrums von schwachem Lichte zu seyn scheine, übereinstimmend mit dem, was ich von den Fällen IX und XI angeführt habe <sup>1)</sup>). Dalton's Bruder und einige andere Personen, deren Farbensinn er mit dem seinigen verglichen hat, zeigten sich mit ihm übereinstimmend; so auch die Meisten derer, von denen er nur gehört hat.

Der im *Edinb. Phil. Journ. Vol. VI* beschriebene Fall von einem Hrn. Tucker gehört ebenfalls zu unserer zweiten Klasse. Dasselbe scheint mit Hrn. Scott (*Phil. Transact. LXVIII*) der Fall zu seyn.

Dr. Sommer giebt in Gräfe und Walther's Journal für Chirurgie, Bd. V, eine ausführliche Beschreibung seines eigenen Farbensinnes. Alles, was er davon anführt, stimmt mit dem überein, was ich an der zweiten Klasse gefunden habe. Dasselbe gilt von dem Zustande seines Bruders. Drei andere Personen verhielten sich wie Dr. Sommer selbst. Auch Dr. G — m scheint in dieselbe Klasse zu gehören. Von dem Letzteren wird angeführt, daß er bei einiger Dunkelheit besser sehe, als andere Personen, die ihn bei Tage an Gesichtsschärfe übertreffen. Ich vermuthe, daß dies von der Dämmerung zu verstehen ist, indem hier, wo die wenigst brechba-

1) Brewster sagt hingegen in den Briefen über die natürliche Magie (S. 44 der deutschen Uebersetzung), daß nach seiner Beobachtung Dalton das ganze Spectrum sieht, nur daß ihm der rothe Theil gelb erscheint.

baren Strahlen zuerst verschwinden, das Abnehmen des Tageslichtes den Augen der zweiten Klasse weniger empfindlich seyn muß, als denen der ersten Klasse und dem gewöhnlichen Auge.

Was Göthe (zur Farbenlehre, Bd. I §. 103) von zwei Personen erzählt, zeigt lauter solche Verwechslungen, wie sie bei unserer zweiten Klasse sich finden; eben so das, was Dr. Brandis (im ersten Bande zur Morphologie und Naturwissensch. von Göthe) von sich und einem Neffen mittheilt. Desgleichen scheinen die Fälle, die W. Nicholl (*Medico-chirurg. Trans. of London, VII*) von einem Knaben, dessen Großvater und Großonkel, und der, welchen er (ebend. IX) beschreibt, zu unserer zweiten Klasse zu gehören. Von dem Letzteren wird angeführt, daß er im Dunkeln besser sehe, als Andere, was wahrscheinlich, wie bei Dr. G—m, auf die Dämmerung zu beziehen ist. In der Salzburger medic. chirurg. Zeitung, Bd. IV, wird dreier Personen gedacht, die mit dem Letzteren übereinkommen.

Eine sehr ausführliche Beschreibung eines Falles giebt Harvey (*Edinb. Trans. X*). Man wird darin, bei genauerer Vergleichung seiner Beobachtungen, fast alle die Verwechslungen antreffen, die ich von der zweiten Klasse in Betreff der Pigmente beschrieben habe, so daß ich, obgleich Harvey nicht dieselben Folgerungen aus seinen Beobachtungen gezogen hat, doch auch diesen Fall als zur zweiten Klasse gehörig betrachte. Nur eine Angabe weicht etwas ab. Es wird nämlich angeführt, daß jener Mann, welcher Schneider war, einmal himmelblaues Tuch statt Grün zum Ausbessern eines Kleides genommen habe. Sofern auf diese Angabe, die Harvey aus der Erzählung eines Anderen entnimmt, und die nicht deutlich angiebt, ob beide Farben für ganz gleich gehalten wurden, einiges Gewicht gelegt werden darf, scheint darin eine stärkere Verwechslung von Grün und Blau, und also eine schwächere

Wahrnehmung für Gelb zu liegen, als sie mir vorgekommen ist <sup>1)</sup>). Dafs eine solche zuweilen stattfindet, scheint noch deutlicher aus den Angaben über einige andere Fälle hervorzugehen, von denen allerdings keiner hinreichend genau beschrieben ist, um eine Entscheidung über diesen Punkt zu geben.

Gall nämlich sagt (*Anat. et physiol. du syst. nerveux T. IV p. 98*), dafs Dr. Unzer zu Altona niemals Grün und Blau habe unterscheiden können. In Rozier, *Observ. sur la phys. XIII*, wird von Jemand erzählt, der durch diesen Fehler im Malen gehindert wurde. Wenn derselbe Roth statt Dunkelblau gebrauchte und Roth neben Grün setzte, so zeigt sich darin nichts von der zweiten Klasse Abweichendes; wenn er aber Gelb auf Blau (wahrscheinlich als Licht) aufsetzte, so scheint sich auch hier eine mangelhafte Empfindung für das Gelb zu verrathen. Troughton (*Brewster's Briefe über die natürl. Magie, S. 44 der Uebers.*) soll auch Grün für Blau halten, was indess vielleicht mehr nur für einen unrichtigen Gebrauch der Benennungen, als für ein wirkliches Identischsehen beider Farben zu nehmen ist. Dasselbe dürfte vielleicht auch von dem Manne gelten, von welchem Helling (*pract. Handb. der Augenkrankheiten, I, S. 1*) spricht, dem Hellblau mit Grün und Roth gleich zu seyn schien. Die ebendasselbst erwähnten Fälle von zwei jungen Leuten lassen sich nach den wenigen Bemerkungen nicht beurtheilen. Der Großvater derselben soll gar keine Farben haben unterscheiden

1) Dafs dieses Individuum sich beschwerte, dafs ihm nicht nur Gemälde, sondern auch die freie Natur ein düsteres, trübes Ansehen habe, erscheint sehr sonderbar, da man nicht einsieht, wie Jemand, der sich nie in einem anderen Gesichtszustande befunden hat, und kein Mittel hat, sich in den Zustand eines gewöhnlichen Auges zu versetzen, zu einer solchen Ansicht über einen Gegenstand kommt, über den doch immer nur ein relativer Urtheil gefällt werden kann



können, doch zeigt das, was gleich hinzugefügt wird, daß diese Aeußerung nicht im strengsten Sinne zu nehmen ist.

Die beiden Fälle, von denen Colquhoun (Fro-riep's Notizen, XXIV) Nachricht giebt, dürften mehr zur zweiten als zur ersten Klasse zu rechnen seyn, dagegen der, welchen Brewster im *Edinb. Journ. of Sc. No. VII* berichtet, so wie der in *No. XIX* desselben Journals (es wird nicht gesagt, ob beide Fälle identisch sind) zu unserer ersten Klasse zu gehören scheinen. Die Beschreibung, welche Wardrop (*Essays on the morbid anatomy of the human Eye*, 1818, II, p. 196; daraus in Meckel's Archiv für die Physiologie, V) giebt, läßt nicht entscheiden, ob die Fälle, die er vor Augen hatte, mehr der zweiten oder ersten Klasse angehören. Eben so wenig kann dies von dem in Lichtenberg's Magazin, I, erwähnten Falle entschieden werden.

Der Fall, welchen Herschel (*Light*, §. 507) beschreibt, scheint zu unserer ersten Klasse zu gehören, denn wenn gleich der Name Blau für Carmoisin und Purpurroth gebraucht ist, so folgt doch daraus, zumal bei der Natur der zum Versuch angewendeten Farben, nicht eine größere Annäherung zur zweiten Klasse, von der ihn vielmehr die Angabe ausschließt, daß keine Unempfindlichkeit für irgend einen Theil des Spectrums sich zeigte.

Vorzüglich merkwürdig ist endlich der von Huddart in den *Phil. Trans.*, LXVII, beschriebene Fall von einem Schuhmacher Harris, indem hier eine geringere Empfindlichkeit für die Farbenunterschiede stattgefunden zu haben scheint, als irgend in einem anderen bekannt gewordenen Falle. Aeußerungen, wie die, daß er Grund habe zu glauben, daß Andere etwas an den Gegenständen sehen, das ihm nicht sichtbar sey, und daß ihre Sprechweise Eigenschaften mit Bestimmtheit zu



benennen scheine, die er nur mit Zweifel und oft mit Irrthum rathen könne, beweisen bei einem verständigen Manne, wie Harris gewesen zu seyn scheint, daß hier nur noch eine Spur von Farbenunterschieden vorhanden war, obgleich er solche Unterschiede noch wahrnehmen konnte, wenn er die Farben neben einander sah. Die Verwechslungen, welche von seinem Bruder angeführt werden, sind von derselben Art, wie die, welche unseren beiden Klassen ziemlich gemeinsam sind.

So weit sich also aus den Beschreibungen urtheilen läßt, scheinen fast alle beobachteten Fälle eines solchen Gesichtsfehlers auf die eine oder die andere der von mir unterschiedenen Klassen zurückgeführt werden zu können, und es dürfte, mit Ausnahme solcher extremer Fälle, wie der zuletzt erwähnte, kaum je etwas wesentlich Verschiedenes vorkommen.

Purkinje (im encyclopädi. Wörterbuch der medic. Wissensch., herausg. v. d. Prof. d. medicin. Facultät zu Berlin, I, S. 259) rechnet vier Arten dieses Gesichtszustandes. Davon beziehen sich zwei, nämlich *Achromatopsie* und *Chromatodysopsie*, auf die *Stärke* dieses Fehlers, und bezeichnen den höchsten und den schwächsten Grad desselben <sup>1)</sup>, zwei andere aber auf die *Art* desselben. Diese werden durch die Namen *Akranoblepsie* <sup>2)</sup> und *Ancrythroblepsie* bezeichnet. Doch sind

1) Unter Achromatopsie ist das gänzliche Unvermögen, irgend Farben zu unterscheiden, verstanden, wenn anders nicht die Erzählungen dieser Art in den meisten Fällen einer unvollkommenen Beobachtung ihren Ursprung verdanken. Dahin wäre wohl nur der erwähnte Fall von Harris *Ph. Tr. LXXII*, zu rechnen; der obend. *LXXIII* erzählte Fall von Scott wenigstens nicht. Der krankhafte Zustand einer Frau, die Alles schwarz sah, wovon in Blankart *Collectanea medico-physica Cent. IV. XXVI* erzählt wird, ist wohl eine Erscheinung ganz anderer Art.

2) Der Name Akranoblepsie ist von Gütthe eingeführt, welcher

diese beiden in der That nicht merklich von einander verschieden, und die dahin gerechneten Fälle gehören sämmtlich zu unserer zweiten Klasse. Wenn nämlich die Einen Blau mit dem Namen Roth, die Anderen Roth mit dem Namen Blau bezeichnen, so folgt daraus nur, daß sowohl jene als diese Roth und Blau nicht von einander unterscheiden <sup>1)</sup>).

Die Ursache dieser Unvollkommenheit hat man, auf Grund der von Dalton bemerkten Erscheinung eines geschwächten Eindrucks vom prismatischen Roth, in einer mangelnden Empfindung für gewisse Strahlen des weißen Lichtes zu finden geglaubt. Dalton selbst (*Edinb. Journ. of Sc. IX, p. 97*) ist dieser Meinung, und vermutet, daß dieser Mangel auf einer blauen Färbung der Glasfeuchtigkeit beruhe, während Andere sie unmittelbar aus einer mangelnden Reizbarkeit der Nerven für dieses Licht ableiten, vergleichbar dem Gehör solcher Personen, die, nach Wollaston's, durch Savart wohl nicht ganz widerlegten Beobachtungen, die höchsten Töne nicht mehr wahrnehmen <sup>2)</sup>). Auch ich war durch die Beobachtungen, die ich mit H. angestellt hatte, anfangs auf diese Vermuthung geführt worden,

annimmt, daß diese Personen kein Blau, sondern statt dessen Rosenroth sehen.

1) Merkwürdig ist die Beobachtung von Purkinje (Beob. und Versuche zur Physiol. der Sinne, II, S 15), daß das gewöhnliche Auge eine ähnliche Unsicherheit zeigt, wenn die Sehaxe fixirt ist, und etwas Farbiges von der äußersten Peripherie des Gesichtsfeldes langsam hereinbewegt wird. Ich habe diesen interessanten Versuch mit ähnlichem Erfolge wiederholt, jedoch erstreckte sich diese Unsicherheit bei mir nicht so weit in das Gesichtsfeld hinein, wie Purkinje es beschreibt, und findet bei lebhaften Farben nur statt, so lange diese sich nahe dem äußersten Theile des Gesichtsfeldes befinden.

2) Brewster interpretirt seine im *Edinb. Phil. Journ. Vol. VI* und *Edinb. Journ. of Sc. No. VII* ausgesprochene Ansicht später (*Edinb. Journ. of Sc. No. XIX*) in einem andern Sinne.

habe mich jedoch nachher bei weiterer Ausführung der Versuche überzeugt, daß dieselbe unzureichend ist. Selbst bei unserer zweiten Klasse, wo wirklich ohne Zweifel eine geschwächte Empfindung für die wenigst brechbaren Strahlen vorhanden ist, sind die Verwechselungen stärker und mannigfaltiger, als daß sie aus diesem Umstande allein hergeleitet werden könnten. Es wäre wohl möglich, daß es Personen gäbe, welche eben jene geschwächte Empfindung für die mindestbrechbaren Strahlen besäßen, ohne sehr auffallende Verwechselungen zu begehen; sie würden sich nur fortwährend in einem ähnlichen Zustande befinden, wie das normale Auge in der Dämmerung. Ich habe versucht mein Auge künstlich in einen solchen Zustand zu versetzen, indem ich dasselbe längere Zeit dem Roth des Prisma's oder eines gefärbten Glases im übrigens verfinsterten Zimmer aussetzte. Wenn ich darauf Farben bei einer *äußerst* schwachen Beleuchtung betrachtete, so erschienen mir wohl einige der von H. verwechselten Farben ziemlich ähnlich, dagegen andere durchaus nicht. — Noch weniger aber, als für unsere zweite Klasse, würde eine solche Erklärung für die erste Klasse hinreichend seyn. Denn nicht nur ist hier nichts von einer ähnlichen schwächeren Empfindung für gewisse Strahlen zu bemerken, sondern selbst, wenn man eine solche annehmen wollte, würde sich dadurch nicht erklären, warum verschiedene Theile des prismatischen Farbenbildes, namentlich die grünen und rothen Strahlen, einen fast gleichen Eindruck machen, wenigstens dann gewiß nicht, wenn man der gewöhnlichen Ansicht über die Farbenzerstreuung folgt.

Wh. Nicholl's Vermuthung von einer mangelnden Empfindung für Blau (*Ann. of Phil. N. S. III*) und einige andere hin und wieder aufgestellte Ansichten halte ich für noch weniger begründet.

Ich wage nicht zu entscheiden, ob überhaupt diese *Erscheinung* auf eine weitere physikalische Erklärung

ähnlicher Art wird zurückgeführt werden können, wozu allerdings in jener geschwächten Empfindung für die wenigst brechbaren Strahlen bei einem Theile dieser Personen ein Fingerzeig zu liegen scheint, oder ob man sich nicht vielleicht wird begnügen müssen, einfach die Thatsache hinzustellen, daß der Farbensinn sich bei verschiedenen Personen auf äußerst verschiedenen Stufen der Entwicklung findet, und bei einigen äußerst unvollkommen ist, besonders in Betreff gewisser Farben. In jedem Fall aber scheint es mir zu einer naturgemäßen Auffassung des Gegenstandes erforderlich zu seyn, daß man diese Fälle nicht als vereinzelte Abnormitäten, als isolirt stehende Ausnahmen von einer allgemeinen Regel, sondern nur als extreme Fälle einer Unvollkommenheit ansehe, die in schwächerem Grade wohl noch öfter vorkommt, ohne gewöhnlich bemerkt zu werden. Von dem fast gänzlichen Mangel irgend einer Unterscheidung von Farben, wie sie bei Harris (*Phil. Tr. LXVII*) stattgefunden zu haben scheint, bis zum normalen Farbensinne müßen sich wohl alle Uebergänge finden, und in der That geben die von mir beobachteten Thatsachen allein eine ziemlich vollständige Reihe von Abstufungen stärkerer, schwächerer Verwechselungen bis zu einer bloßen Unsicherheit in der Bestimmung der Farben, und endlich bis zum gewöhnlichen Farbensinne. Wahrscheinlich sind wir alle in sehr ungleichem Grade mit dem Farbensinne ausgestattet. Obgleich es nicht unmöglich scheint, auch dies durch andere Arten des Versuchs zu prüfen, so wird doch unter gewöhnlichen Umständen eine mäßige Unvollkommenheit dieses Sinnes nicht bemerkbar seyn, wenn man nicht etwa die geschmackwidrigen Farbenzusammenstellungen in der Kleidung mancher Personen, die Eigentümlichkeiten in dem Colorit mancher Maler und dergl., einer solchen mehr physischen als psychischen Ursache zuschreiben will. Dagegen muß diese Unvollkommenheit schon einen sehr hohen Grad

erreicht haben, wenn sie sich zu solchen Beobachtungen, wie die hier mitgetheilten, eignen soll.

*Nachschrift.* Ich habe, seitdem Vorstehendes geschrieben ist, noch einen Fall zu untersuchen Gelegenheit gehabt, welcher in sofern Interesse hat, als er eines der wenigen Beispiele von dem Vorkommen einer ähnlichen Unvollkommenheit des Sehorgans beim weiblichen Geschlechte darbietet. Ich finde nur einen Fall dieser Art in den *Phil. Trans. LXVIII*, und einen zweiten, jedoch zweifelhaften, in den *Medico-chirurg. Trans. of London, IX*, erwähnt. Selbst in den Fällen, wo mehrere Glieder einer Familie an diesem Gesichtsfehler leiden, pflegen die weiblichen Verwandten davon frei zu seyn. Man kann hierin eine Bestätigung der Ansicht Gall's finden, daß das weibliche Geschlecht einen vollkommeneren Farbensinn habe, als das männliche. Zwar dienen die weiblichen Handarbeiten sehr zur Uebung des Farbensinns; allein diese Uebung würde selbst einen mäßigen Mangel dieses Sinnes nur unvollständig ersetzen, und da, wo zwei verschiedene Farben ganz gleich erscheinen, ohne Erfolg bleiben; gerade diese Handarbeiten müßten, wenn jener Mangel bei Frauenzimmern öfter vorkäme, Gelegenheit zur Entdeckung desselben geben, während derselbe bei Männern gewöhnlich viel leichter unbemerkt bleiben kann.

Die Dame, welche mir von ihrem Farbensinne nähere Kenntniß zu nehmen gestattet hat, ist z. B. bei Einkäufen genöthigt, sich in Betreff der Farben fremder Hülfe zu bedienen, obgleich bei ihr dieser Sinn weniger unvollkommen ist, als in allen den unter I bis XIII beschriebenen Fällen. Aus einigen Versuchen mit meinen farbigen Papieren ergab sich Folgendes:

Reine und lebhaftes Farben werden von ihr immer richtig erkannt und selbst nach ihren Abstufungen un-

terschieden. Nur blasse oder unreine Farben werden verwechselt, und zwar: blasses Orange mit Schwefelgelb, auch wohl lebhaftes Orange mit Braungelb; ferner mattes Bläulichgrün und blasses Grünlichblau mit Grau; blasses Rosenroth mit sehr hellem Grau; Bräunlichgrün mit Braun; Lila mit Himmelblau und Blaugrau. Sie unterscheidet lebhaftes Roth und Grün immer leicht von einander, und erklärt diese beiden Farben für ganz ungleich; aber die Unterscheidung von Rosa und Apfelgrün fordert schon einige Aufmerksamkeit. Auf den von E. und H. gelegten Farbentafeln erkannte sie die meisten, wenigstens die stärksten Unrichtigkeiten ziemlich gut. Verwechselungen, wie die, welche E. und H. an grünen und rothen Gläsern begangen hatten, erschienen ihr unbegreiflich, aber die Vergleichung eines grünen Glases mit verdünnter Tusche (vergl. IV) erschien ihr nicht unpassend. — Die von ihr begangenen Verwechselungen kommen mit den schwächsten unserer ersten Klasse überein, weniger mit denen der zweiten.

In einem ähnlichen Falle befindet sich der Vater dieser Dame, der im Allgemeinen die Farben ziemlich gut unterscheidet, und auf der von E. gelegten Farbentafel die größeren Verstöße erkannte, jedoch einigen Angaben, welche schwächere Verwechselungen betreffen, beistimmte.

Diese beiden Fälle, so wie noch ein anderer, den ich kürzlich untersucht habe, und der eine Farbenverwechselung in ähnlicher Weise, aber in noch schwächerem Grade zeigt, stehen zwischen dem unter XIV und den unter VI bis VIII beschriebenen, und füllen auf diese Weise eine Lücke aus, die hauptsächlich noch zu ergänzen war, um in meinen Beobachtungen eine vollständige Stufenfolge vom gewöhnlichen Farbensinne bis zu dem im höchsten Grade mangelhaften zu finden.



## II. Neuer Interferenzversuch.

In eine Karte mache man ein kreisrundes Loch, so groß als die Pupille des Auges. Die eine Hälfte dieses Loches bedecke man mit einem äußerst dünnen Glasblättchen (ein Glimmerblättchen würde wahrscheinlich noch besser seyn). Betrachtet man nun durch diese Oeffnung ein Spectrum, welches mittelst eines Prismas von mäßiger Dispersion gebildet worden ist, so erscheint dasselbe auf seiner ganzen Länge bedeckt mit parallelen dunkeln Strichen, ähnlich denen, die durch Absorption im Jodgas erzeugt werden.

Die Ursache dieser Erscheinung ist wahrscheinlich die, daß diejenige Hälfte des Lichts, welche durch das dünne Glasblättchen gegangen, um eine gewisse Quantität, die  $A$  heißen mag, in seinen Undulationen verzögert worden ist. Es sey nun  $L$  die Wellenlänge irgend eines Farbenstrahls, und zwar sey diese GröÙe viel kleiner als  $A$ . Betrachten wir nun die Farben nach der Reihe, so wächst  $L$  allmählig vom violetten zum rothen Ende. Der Quotient  $\frac{A}{L}$  wird also abwechselnd eine ganze Zahl, ein Bruch, wiederum eine ganze Zahl, und so fort. Ist er eine ganze Zahl, so stimmen die beiden Lichthälften in ihrer Undulationsphase überein. Liegt er aber in der Mitte zwischen zwei ganzen Zahlen, so befinden sich die beiden Lichthälften in entgegengesetzten Phasen, und daher muß die entsprechende Farbe im Spectrum gänzlich fehlen, und an ihrer Stelle eine dunkle Zone erscheinen. (Talbot, im *Phil. Magaz. Ser. III Vol. X p. 361.*)



### III. Ueber die Richtungslinien des Sehens; von Joh. Mile,

Professor an der ehemaligen Universität zu Warschau.

(Schluss.)

Bisher haben wir die Irismembran gar nicht berücksichtigt, die den grössten Theil des Augeneingangs versperrt, und nur in der Mitte für die Strahlen eine Oeffnung von etwa einer Linie im Durchmesser übrig lässt <sup>1)</sup>. Nur um in den Zeichnungen die Veränderungen im Gange der Strahlen augenfällig zu machen, lässt man gewöhnlich weit von der Augenaxe, ganz nahe der Peripherie der Cornea, die Strahlen in's Auge treten; aber in der Wirklichkeit kommen solche Strahlen nicht bis an die Retina, sondern werden von der Iris zurückgeworfen. Um den Einfluss des Schloches zu zeigen, wollen wir den Gang eines Lichtbüschels in der Augenaxe, und eines zweiten, schief unter etwa 30 Graden eintretenden, wobei wir ja hinter einander gestellte Lichter noch ziemlich deutlich erkennen, und selbst scheinbares Decken derselben wahrnehmen können, in Fig. 24 Taf. II näher betrachten. Wir sehen hier zuerst, dass die Iris mit ihrem Loche vor der Linse in einem, keine halbe Linie betragenden Abstände sich ausbreitet, wodurch also nur ihr mittelster Theil dem Durchgange der mittleren Strahlen Preis gegeben wird. In diesem Theile sind aber ihre Flächen noch wenig gegen ihre Axe gebeugt, und sie kann also auch schon deshalb die durch die grosse Refraction der Cornea hervorgebrachte Convergenz der Strahlen nicht viel vermehren.

1) Gewöhnlich erscheinen die Schlöcher grösser, weil sie durch den Meniskus der Cornea und der wässrigen Feuchtigkeit vergrößert werden

Dann sehen wir, daß nur im Augenaxen-Lichtbüschel *an* die Richtungslinie die Mitte einnimmt, daß aber je weiter der Büschel von der Augenaxe abweicht, auch seine Richtungslinie aus seiner Mitte weiter fort-rückt, so daß *xs* schon an die Peripherie des Büschels, und *zc* selbst außerhalb desselben zu liegen kommt. Die Richtungslinien können also nach den Mittelpunkt der Corneakrümmung durch das Sehloch nur noch dann gelangen, wenn sie von der Augenaxe nicht weiter als ungefähr 10 Grade wie *xs* entfernt sind. Die weiter fallenden werden von der Iris angehalten. Da wir aber Objecte ziemlich deutlich sehen, die selbst 30 Grade entfernt sind, wie oben *x*, und da wir überdiß sehen können, daß sich bei so weit abgewendetem Auge zwei Lichtflammen noch decken, wenn sie es in der Augenaxenlage noch thaten, so ergeben sich daraus zwei Schlüsse, nämlich: 1) daß der Eingang des auf die Richtungslinie *zc* fallenden Strahls oder des Richtungsstrahls in's Auge zum Sehen des Objectes *x* gar nicht nöthig ist, und 2) daß ein Theil der übrigen dieser Richtungslinie *zc* angehörenden, nämlich aus dem gemeinschaftlichen Lichtpunkt *x* (den man sich in der Figur entfernt denken muß) ausströmenden, und denselben Kegel bildenden Strahlen *b*, auf dieselbe Stelle *c* der Retina fällt, als wenn er mit der Richtungslinie *zc* gerade durch die Peripherie der Cornea und Iris hindurchfiel. Es müssen also auf der Retinastelle *c* nur Bilder von Objecten zusammenfallen, die auf der Richtungslinie *zc* liegen, und nicht etwa diejenigen, die sich auf dem Wege *bc* befinden. Freilich würde auch ein auf diesem Wege bis an's Sehloch vorgestücktes Object das Bild *c* decken, aber nur durch Beschattung.

Alles dieses kann nicht anders seyn, wenn, wie wir oben nachgewiesen haben, das Sehen der Objecte an einem fixen Orte nicht von der alleinigen Einwirkung *des Richtungsstrahls* abhängt, sondern von allen Kegel-

strahlen, die mit der Richtungslinie von einem gemeinschaftlichen Punkt ausgehen, und sich auf ihr im Auge vereinigen. In solchem Falle ist es also für den Ort der Bilder einerlei, ob man diesen oder jenen Theil der Strahlen desselben Kegels zur Retina zuläßt: Das-selbe sehen wir ja am Teleskop. Das Objectiv vereinigt die Lichtstrahlen in so viel Kegel als es Lichtpunkte giebt. Bedeckt man es mit einem Pappdeckel, in welchem ein Loch gemacht worden ist, und führt dieß Loch von einem Punkte der Peripherie des Objectivs zum entgegengesetzten durch die Mitte, so wird das durchsehende Auge dieß gar nicht gewahr, weil dadurch keine Veränderung in der Stellung der Bilder auf der Netzhaut eintritt. Auch findet man, daß die einmal sich deckenden Objecte fortwährend in Deckung bleiben; was beweist, daß ihre Vereinigungs- oder Richtungslinien nicht auf das Loch im Pappdeckel, welches bald hier, bald dorthin geschoben wird, sondern immer nur auf die Mitte des Oculars fällt. Auch hier muß augenscheinlich ein Zudecken des Pappenloches alle Bilder auf der Retina verschatten, wie es auch der Fall mit dem Augenschloche ist, welches sich in allen Stücken eben so verhält. Es kann sich dieß auch in Rücksicht der Richtungslinie  $zc$ , in welcher das Decken der Objecte stattfindet, auf der Seite befinden, und doch werden die den sich deckenden Gegenständen entsprechenden Bilder auf denselben Punkt  $c$  fallen, und das Schiefe des Weges  $zbc$  kann nicht gefühlt werden, weil überhaupt der Weg der Strahlen nicht gefühlt werden kann, wie dieß ja schon bewiesen wurde.

Vielleicht möchte man mir hier den Vorwurf machen, daß ich bei der Cornea die Abweichung der Strahlen wegen der Kugelgestalt nicht berücksichtigt habe, daß sie wegen dieser Abweichung die Strahlen nicht in einem einzigen Punkte vereinige, sondern in viele hinter einander fallende Focusse werfe. Sie ist aber gegen

ihre Peripherie abgeflacht, und soll, nach einigen Ausmessungen, eine elliptische, nach anderen eine parabolische Krümmung haben. Doch scheint mir, daß diese Abflachung nur die Folge der Befestigung der Cornea im Scleroticaloche ist. Sie scheint mir keine Abhilfe der unregelmäßigen Strahlenbrechung zu seyn, weil an dieser Stelle eben, wo die Cornea abgestumpft ist, ihre Wirkung für's Auge unnütz wird, indem die Iris hier die Strahlen aus dem Auge nach aussen zurückwirft. In dem mittleren kleinen Theil der Cornea aber, wo die Iris offen ist, diese Wirkung also nicht hindern würde, ist sie überflüssig, weil in diesem kleinen Theil alle Krümmungen mit der Kugelkrümmung fast zusammenfallen. Die Corneakrümmung kann also, obgleich kugelig, keinen sichtbar schädlichen Einfluß auf die Strahlen der der Augenaxe nahen Büschel haben, weil diese von Kegeln, deren Scheitel nicht einmal einen halben Grad aus der deutlichen Schweite haben, entstehen, und weil diese Büschel ihre Richtungsstrahlen in sich einschließen, also weniger von der Corneanormale abweichen. Da aber die Strahlen der seitlichen Büschel wie *bc* (Fig. 24 Taf. II) entfernter von ihren Richtungslinien, die sie in sich gar nicht einschließen, sich befinden, auch näher der Peripherie in die Cornea eintreten, und nachdem sie durch das Schloch gegangen sind, auch mehr durch den peripherischen Theil der Linse gehen müssen, so kann hier schon der Fall stattfinden, daß die Strahlen des Lichtpunktes ihre Richtungslinien nicht mehr in einem einzigen, sondern in vielen Punkten schneiden werden. Dies mag auch vorzüglich das Undeutliche des seitlichen Gesichtsfeldes hervorbringen, welches, wie wir schon bemerkten, als Sammelplatz aller Unvollkommenheiten der Bilderbildung, dem Gefühle als unvollkommenes Sehen im Allgemeinen erscheinen muß. Dazu muß aber vorzüglich noch dieser *Umstand beitragen*, daß, da die Richtungslinien ihren

Kreuzungspunkt fast zwei Linien vor dem Mittelpunkt des Auges haben, die Retina im seitlichen Gesichtsfelde diesem Kreuzungspunkte näher ist, als in dem mittleren Theile des Augengrundes, wodurch es geschehen muß, daß die diesen mittleren Theil mit ihren Scheiteln treffenden Lichtkegel hier zu lang werden und undeutliche Bilder geben.

Eine solche Unvollkommenheit war aber nöthig im seitlichen Gesichtsfelde, denn dadurch geschieht es nur, daß das mittlere, rein deutliche Gesichtsfeld, concentrisch, mit stufenweise immer undeutlicheren und dunkleren Zonen umgeben erscheint, ehe es sich ganz in das Unsichtbare verliert, wodurch, während der Augenbewegungen, die in's reine Gesichtsfeld kommenden Bilder, vorzüglich die hellen, nicht so einen grellen Sprung machen, wie dies der Fall seyn müßte, wenn das Gesichtsfeld bis an seine Gränze deutlich und mit einem schwarzen Rahmen umfaßt wäre. So aber treten nur stufenweise Licht und Farben auf, bis zuletzt auch die Gestalt in's mittlere Gesichtsfeld eintritt. Die Abweichung wegen der Kugelgestalt wäre also im Auge nicht aufgehoben, sondern nur im seitlichen Gesichtsfelde bemerkbar, weswegen das Auge also kein ganz vollkommenes optisches Instrument wäre. Aber, wie wir gesehen haben, ist dies nicht als etwas schädliches, sondern vielmehr nützlich für lebende Wesen zu betrachten: eine physische Unvollkommenheit wird hier also zu einer physiologischen Vollkommenheit.

Die Gegenstände werden aber, je weiter sie von der Augennaxe im Gesichtsfelde entfernt sind, nicht nur undeutlicher, sondern auch dunkler gesehen, bis ein Aufhören des Sehens durch den Mangel der Lichtstrahlen entsteht. Die Ursache davon ist aber die Lage des Schloches gegen den Lichtbüschel, weil es nämlich gegen die seitlichen Strahlen als ein sich verengernder elliptischer Ring zu betrachten ist, welcher immer mehr Strah-

len von ihnen abschneidet, bis es die zu sehr seitwärts entfernten, gegen die der Ring zur Linie wird, gar nicht hineinläßt.

Das sich Vergrößern und Verkleinern des Schloches, wie bekannt, sich nach der Menge des einfallenden Lichtes richtet, steht mit den Richtungslinien in keiner deren Lage verändern könnenden Verbindung. Es kann auf das Verschieben der Bilder auf der Retina eben so wenig Einfluß ausüben, als das Vergrößern oder Verkleinern des Loches im Pappendeckel am Teleskope es thut. Nur auf den Grad der Helligkeit kann dieß influiren, indem dadurch die Lichtkegel erweitert oder verengert werden. Geschieht dieß an Kegeln von Lichtpunkten aus der deutlichen Sehweite, so bringt es im Gefühle keine andere Veränderung, als die der Lichtintensität hervor. Ist aber der Lichtpunkt zu nahe oder sehr entfernt, so daβ er Scheiben wirft, so muß außerdem eine Veränderung in der Größe dieser Scheiben eintreten und gefühlt werden, wie dieß der folgende Versuch zeigt. Wenn man aus einem dunkeln Ort eine entfernte Lichtflamme betrachtet und ein hinter sich gehaltenes Licht langsam an die Seite vor's Auge bringt, so verkleinert sich die Lichtscheibe des entfernten Lichtes augenscheinlich deswegen, weil durch die andere nahe Lichtflamme das Schloch sich auch verkleinert, und also die Lichtkegel verengt. Aus demselben Grunde verkleinert sich der Mond, wenn man ihm aus dem früheren Dunkel geschwind zu Gesichte bekommt.

Daß aber die Scheiben nicht gleichmäßig lichte Ausbreitungen sind, sondern wie punktirt und gestreift aussehen, kann im ungleichen Brechungsvermögen der Augenmittel liegen. Facettirte Flächen müßten solche Erscheinungen hervorbringen. Das Unebenheiten auf der Cornea es vermögen, zeigt folgender Versuch. Betrachtet man vom Weiten eine Menge Lichtpunkte, z. B. viele *Lichter in einer Kirche* oder im facettirten Spiegel, so  
sieht



sieht man eben so viele punktirte und gestreifte Scheiben, die ganz gleich in ihrer Ungleichheit aussehen, indem bald in der Mitte, oder an dieser oder jener Seite grössere dunkle Lücken an allen sich zeigen. Für jedes Auge fallen aber diese Gestalten anders aus. Schliesst man jetzt ein Auge und öffnet es von Neuem, so verändert sich die Gestalt an allen Scheiben, wie mit einem Schlage; sie sehen anders aus, wie früher, aber unter sich wieder ganz gleich. Dafür ist keine andere Ursache aufzufinden, als Luftbläschen, in der Thränenschicht auf der Cornea, die, durch Augenliederbewegung verändert, auch Veränderungen in die Lichtscheiben, durch kleine Refractions-Abweichungen, hineinbringen. Dafür spricht noch dieses, daß die schwarzen grösseren Lücken rund sind, und sich nach oben bewegen, was dem Abfließen der Thränen entspricht.

Wenn die Veränderungen der Iris keinen Einfluss auf das Verschieben der Richtungslinien selbst ausüben können, so könnten sie vielleicht doch auf das Vor- und Zurückrücken der auf sie fallenden Focusse der die Bilder gebenden Lichtkegel haben, wovon aber das Accommodationsvermögen des Auges zum gleichen Deutlichsehen entfernter und naher Gegenstände innerhalb einer gewissen Gränze abhängen könnte. Dieser Gegenstand, wovon ich an einem anderen Ort (*Journal de Physiologie par Magendie*, 1826, p. 166) abhandelte, bedürfte aber einer besonderen Bearbeitung. Die dort aufgestellte Erklärung durch Diffraction des Lichts befriedigt mich selbst heute nicht. Doch kann ich mir eine Erscheinung ohne diese Annahme nicht erklären, nämlich die: daß kleine Kartenlöcher in jeder Entfernung deutliche Bilder geben, wie z. B. in dem Fall, wenn der Gegenstand, wegen der zu grossen Nähe, eine undeutliche Scheibe auf die Retina wirft, und ein Theil desselben Kegels durch ein Kartenloch ein deutliches giebt. Ohne irgend einen convergirenden Einfluss, bloß durch's



Abhalten der seitlichen, schief eintretenden Strahlen läßt sich dieß einmal nicht erklären, weil man auch deutlich sieht, wenn man das Kartenloch am Rand der Pupille hält. Selbst ein, eine Linie im Durchmesser haltendes Loch läßt uns eine zu nahe gebrachte, und deswegen undeutliche Schrift deutlicher erscheinen; das Schloch im Auge ist aber gewöhnlich nicht viel größer <sup>1)</sup>).

Wenn wir jetzt einen Rückblick auf das hier Vorgetragene werfen, so muß es, wie mir scheint, einleuchten: daß Richtungslinien des Sehens, wie sie hier aufgestellt und erklärt wurden, gar nicht das sind, was sich die früheren Verfasser als Richtungsstrahlen dachten. Unsere Richtungslinien können zwar auch mit Richtungsstrahlen zusammenfallen, aber dieß ist zum Erfolg, zum Sehen des Lichtpunktes, gar nicht nothwendig, denn es wurde gezeigt, daß sie in solchem Falle nicht immer wirklich in's Auge gelangen, wie, nach den früheren Verfassern, doch eine nothwendige Bedingung zum Sehen des dem Richtungsstrahle entsprechenden Lichtpunktes seyn sollte. Richtungslinien sind, meiner Ueberzeugung nach, das nämliche wie die mittleren Strahlen in den gewöhnlichen Linsen, die die Eigenschaft mit ihnen theilen, daß alle von den einerseits auf ihnen in verschiedenen Entfernungen liegenden Lichtpunkten gebildeten Focusse andererseits nur auf ihre Verlängerung in verschiedenen Entfernungen fallen. Deswegen geschieht das Auffangen des Lichtes des ganzen Kegels durch die Retina entweder als Punkt oder Scheibe, und erregt in ihr ein Gefühl, welches aber nur in sofern mit der Richtungslinie im Zusammenhange steht, als diese die Stelle der Retina, wo das Auffallen und Gefühlerregen geschieht, bestimmt, was wir aber nur als Stellgefühl, und nicht als Richtungsgefühl empfinden. Die eigenthümliche Richtung der Richtungsstrahlen wird also unmittelbar nicht gefühlt, sondern *durch's Denken* gefunden. Und wenn die Richtungsl-

1) Vergl. Degen's Beobachtung Ann. Bd. XXXV S. 170. P.

nien uns zum Visiren dienen, und wir sie wirklich durch die Mitte der sich deckenden Objecte im Gefühle zu ziehen scheinen, so geschieht dies nur dadurch, weil wir fühlen, daß sich dann die von den auf sie fallenden Objecten entstandenen Bilder auf der Netzhaut decken, und nicht etwa durch's Gefühl der Geradheit der das Bild und den Gegenstand verbindenden Linie, weil der krumme und gerade Weg des Lichts im Gefühle nicht unterschieden wird, aus dem Grunde, weil der Lichtweg eben so wie der Lichtgang überhaupt nicht gefühlt wird.

Die Richtungslinien fallen aber, wie es erwiesen wurde, perpendicular auf die Cornea, gehen ungebrochen gerade fort bis an die Linse, und mit Ausnahme derjenigen, die auf die Augenaxe fällt, und die gerade bis an die Retina fortgeht, werden die anderen in den Linsenflächen gebrochen, aber unbedeutend, und fallen fast auf dieselbe Stelle, als wenn sie ungebrochen fortgegangen wären. Rücksichtlich der Lage der Richtungslinien im Strahlenkegel stimme ich auch nicht mit andern Verfassern überein. Diese übertragen nämlich auf ihre Richtungsstrahlen die Eigenschaften des Augenaxenstrahls. Wie im Augenaxenkegel eben, so sollen die Richtungsstrahlen auch in einem jedweden der andern seitlichen Kegel die besondere Axe abgeben, also auf die Mitte der gemeinschaftlichen Base solcher Kegel fallen, die einige wiederum auf der Cornea, andere im Schloche, und wiederum andere auf der Linse annehmen. Wie hier aber gezeigt wurde, trifft die Richtungslinie nur im Augenaxenkegel mit dieser Axe und mit der Mitte ihres Lichtkegels zusammen, je mehr sich aber die Lichtkegel von der Augenaxe entfernen, um so mehr rücken ihre Richtungslinien immer mehr aus der Mitte nach der der Augenaxe entgegengesetzten Seite, und treten zuletzt aus dem Lichtbüschel heraus. Nach andern Verfassern sollen Richtungsstrahlen diejenigen seyn, die senkrecht

auf die Netzhaut fallen. Unsere Richtungslinien, da sie vor dem Mittelpunkte des Auges sich kreuzen, können nicht senkrecht auf die Netzhaut fallen, doch weichen sie auf dem kleinen Theil, wo die Bilder am reinsten entstehen, und der dem deutlichen Gesichtsfelde entspricht, nicht sehr davon ab. In Rücksicht der Stelle des Kreuzungspunktes der Richtungslinien weichen die Ansichten meiner Vorgänger auch sehr von der meinigen ab; denn ich habe gezeigt, daß diese nicht da liegt, wo die Augenaxe die Cornea schneidet, wie Einige, nicht in der Mitte der Iris, oder in der Mitte der Linse, wie Andere behaupten, sondern hinter der Linse im Mittelpunkte der Corneakrümmung selbst.

Vom Augengrunde abgeprallte und zurück in die Außenwelt geworfene Richtungsstrahlen, als wirkliche Lichtstrahlen, wie es Manche annahmen, kenne ich gar nicht, und wie Sehstrahlen als Gefühlsstrahlen, die da, wo sie enden, an der Retina nämlich, ihren Anfang nehmen sollten, eine Art von Geleise bildend, auf welchen das Gefühl dem Gefühlseynsollenden entgegenkomme, begreife ich auch nicht.

Die Ansichten meiner Vorgänger hinsichts der Richtungsstrahlen sind, wie aus dieser Vergleichung und den darüber vorhandenen Werken ersichtlich ist, sehr zahlreich und abweichend, oft sogar widersprechend, und größtentheils auf keine Versuche gestützt, bloße Meinungen. Es wäre also Zeit, wie mich dünkt, etwas Bestimmtes darüber auszumitteln. Meine Ansicht weicht von der der früheren Verfasser fast in allen Stücken ab. Da ich sie aber auf leicht zu wiederholende Versuche gestützt habe, da ich die Refractionsgesetze, so wie die relative Lage und die Krümmungen der lichtbrechenden Augenmedia, und auch die Analogie mit den gewöhnlichen Linsengläsern so genau, als es mir möglich war, berücksichtigt habe, so scheint mir, daß sie von den Naturforschern werde als richtig anerkannt werden.

Ich kann das eben Abgehandelte nicht schliessen, ohne noch einen Blick auf das sensible Verhältniß des bis jetzt rein physisch beleuchteten Gegenstandes zu werfen. Physische Experimente können nur Aufschluß geben über die Richtung des Strahlenganges. Es wäre aber noch nöthig zu zeigen, wie die nicht gefühlten Richtungslinien doch gleichsam die Wegweiser für den Zugang der im Raume zerstreuten Gegenstände zur Empfindung werden. Es mag mir also vergönnt seyn, hier noch einen flüchtigen Blick auf diesen Vorgang zu werfen.

Wie wir schon gezeigt haben, kann die Netzhaut nicht den Weg, nicht den Gang, mit einem Worte nicht das Woherkommen der Strahlen, sondern nur ihr Eintreffen an irgend einer Stelle fühlen. Das Element dieses Actes ist das Gefühl eines lichten Punktes, als Farbe, welche wahrscheinlich (im Sinne des heutzutage fest begründeten Undulationssystems) in Folge einer Erschütterung, die mit einer, dieser oder jener Farbe entsprechenden Geschwindigkeit stattfindet, entsteht. Solche Erschütterung kann eben so wie die Schallbewegung der Luft (von welcher wir auch nur wissen, aber nicht fühlen, daß sie eine Bewegung sey) nicht als quantitative, sondern als qualitative Veränderung, dort als Ton, hier als Farbe gefühlt werden. Aus der Annahme einer Erschütterung laßt sich auch leichter das eine Weile noch fortdauernde Lichtgefühl nach dem Wegbringen des Lichtpunktes, wie wir dies an jenem lichten Streif eines geschwind herumgedrehten Lichtpunktes sehen, erklären; denn dies kann nur eine fortdauernde Bewegung des einmal erschütterten Nervengebildes selbst, oder eigentlich des Nervenagens in diesem Gebilde seyn. Eben so wie es Nachklänge giebt, könnten auch die noch fortdauernden Lichteindrücke Nachbilder seyn. Die das Gefühl des Lichtbildes veranlassende Ursache muß, da es auch bei verschlossenen Augen gefühlt werden kann, nicht ausschließlich einem Etwas von aussen kom-

menden, sondern einem Etwas allenthalben, auch im Auge vorhandenen, zugeschrieben werden, z. B. dem Weltäther. Nach dem Undulationssysteme bestände nämlich das Sehen nur in einer oscillirenden Bewegung. Die primäre Ursache ist hier immer ein außerhalb des Auges wirklich vorhandener, aber hier auch verbleibender Körper, dessen oscillirende Bewegung nur sich weiter durch den Aether fortpflanzt, und dessen Bewegungen nur, und nicht seine Existenz, von der Retina eben so gefühlt werden, als das Ohr die Bewegung der Luft, und nicht sie selbst, also gar nichts, wenn sie stille steht, fühlt. Solche Bewegungen des Aethers, für welchen die übrige Materie, also auch das verschlossene Auge, offen bleibt, könnten sich durch viele Einflüsse spontan wiederholen, und dem Gefühle eben so, als die von äußeren Gegenständen kommenden erscheinen, also auch deren Bilder nachahmen. Druck, Elektrizität, Phantasie u. dergl. könnten also, so wie die Aetherbewegungen, Bilder hervorbringen, und man braucht nicht, um sie zu erklären, zur localen Lichtentwicklung oder Phosphorescenz, die durch nichts bewiesen ist, seine Zuflucht zu nehmen.

Gewöhnlich liegt aber der Bildempfindung der Retina eine von außen angelachte Aetherbewegung zum Grunde, und solches, außerhalb des Auges vorhandenes Ursächliche nannten wir Lichtpunkte. Die Wellengänge oder Strahlenwege dachten wir uns als Lichtlinien, die als blasse Bewegungen sich durchdringen und wirklich zusammenfallen können. In der Wirklichkeit sind aber sowohl der Lichtpunkt, als auch der Gefühlspunkt, keine mathematischen Punkte, und die Strahlen keine einfachen Linien. Ein kaum sichtbarer Gegenstand, z. B. ein ganz kleines, aber doch noch sichtbares Thierchen erscheint unserem Gefühle als ein einziger Eindruck, als ein einzelner Punkt, weil, wenn es noch etwas kleiner ist, es gar nicht gesehen wird. Unter dem Mikroskope

erkennen wir es, aber aus sehr vielen verschiedenfarbigen Theilen bestehend, die schon eine unendlich große Zahl Lichtstrahlen neben einander aussenden, welche also nicht in einem mathematischen Punkte auf die Retina, sondern in vielen Punkten neben einander in ein Bild sich vereinigen müssen, und doch bekommen wir dadurch nur einen gemischten Gesamteindruck, als einen einzigen Punkt von irgend einer Farbe. Die Retina hat also mit der Haut das gemein, daß sie, wie dieß Weber entdeckte, zwei oder mehrere, in entfernten Punkten stattfindende Eindrücke nur als einen einzigen Eindruckspunkt fühlt, und wenn auf dem menschlichen Rücken zwei, 24 Linien entfernte Eindrücke noch als einfach, auf den Finger- und Zungenspitzen aber, nur eine Linie entfernte, schon doppelt gefühlt werden, so empfindet die Retina als besondere Punkte schon solche, die einander noch weit näher stehen, in deren Zwischenraum jedoch noch eine unendlich große Zahl Lichtstrahlen Platz hat. Einen nur ungefähr  $\frac{1}{8}$  Par. Linie großen Körper, etwa einen feinen Spinnwebefaden, sieht man noch deutlich in der Entfernung von 10 Zoll, also unter einem Gesichtswinkel von einer halben Minute. Diesem entspricht ein eben so großer, umgekehrter innerer Winkel, zwischen dessen Armen das Retinabild liegt. Da aber dieses nur 7 Linien vom inneren Scheitel entfernt ist, und 7 Linien 17 Mal in 10 Zollen enthalten sind, so wird der Durchschnitt der Retinastelle, worauf vereinigte Strahlen nur als ein Punkt gefühlt werden, 17 Mal kleiner als das Spinnweb, also nur etwa  $\frac{1}{17}$  einer Linie oder  $\frac{1}{17 \cdot 10}$  eines Zolles, ausfallen. Smith hat dieß größer gefunden, und auf  $\frac{1}{2000}$  eines Zolles bestimmt; dieß würde eintreffen, wenn wir statt 10 Zoll eine deutliche Sehweite von 7 Zoll ungefähr ansetzen, in welcher Kurzsichtige auch deutlich sehen.

Weber fand die Kugeln der Netzhaut auch  $\frac{1}{2000}$  eines Zolles, und Müller (Handbuch der Physio-



logie, Bd. I S. 685) sagt: *»für die Mechanik der Empfindungen ist es interessant, dass die Grösse der Kügelchen in der Markhaut mit der Grösse eines kleinsten empfindlichen Punktes auf derselben übereinstimmt.«* Die etwanige Annahme, als wenn die Markkugeln noch besonders Licht concentrirten oder bloß als Gefühlscentra wirkten, scheint mir aber mit der Erfahrung nicht übereinzustimmen; denn in solchem Falle würde das auf der Retina sich bewegende Bild, während der gleichmäßigen Bewegung eines Lichtpunktes, bald auf ein Markkugeln, bald dazwischen kommen, und also dem Gefühle abwechselnd stärker, schwächer, und, wenn ja die Kugeln noch Licht brechen sollten, auch sonstig verändert erscheinen. Das Gefühl würde hier, wenn ich mich so ausdrücken darf, wie auf einem holprigen Wege gehen; indessen fühlen wir, dass die Bildempfindung in gleich fortschreitender Bewegung verharret, wenn draussen der entsprechende Lichtpunkt gleichfalls es thut. Dasselbe findet ja beim Hautgefühle statt. Eine zwei Zoll grosse Scheibe wird auf dem Rücken als ein Punkt gefühlt, aber daraus folgt noch nicht, dass nur unter dem Mittelpunkt derselben das fühlende Gebilde auch als ein Punkt liege; denn wäre dies der Fall, so würden wir während des Verschiebens der Scheibe nicht einen gleichmäßig drückenden Punkt fortschreitend fühlen können, sondern einen überspringenden, was doch nicht der Fall ist. Die Retina mag also ein gleichmäßiges, schichtenförmiges Gewebe mit eingesprengten Kügelchen seyn, die aber, nach Ehrenberg, als keine wesentlichen Bestandtheile der Retina zu betrachten wären, und zwischen welchen Nervenfasern oder Ehrenberg's varicöse Nervengefäße versponnen wären, deren sehr viele und von unendlich mehr Lichtwellen erschüttert werden müssen, wenn ein Gefühl des Eindrucks stattfinden soll. Denn da kleinere Gegenstände als ein Spinnfaden, etwa ein Infusionsthierchen, gar nicht ge-



sehen werden können, und doch sehr viele complicirte vielfarbige Körper sind, die noch unendlich viele Strahlen auswerfen, die an die Retina gelangen müssen, und doch kein Gefühl erregen, so folgt daraus: daß, um eine Retina so zu erschüttern, daß das Gefühl dadurch geweckt werde, es schon einer gewissen großen Zahl von Lichtstrahlen als Minimum bedarf.

Die kleinen, als punktartig und einfarbig sichtbaren Gegenstände werfen dem Auge also schon wirkliche Bilder gebende Strahlenbüschel zu, und wenn sie als Lichtpunkte erscheinen, so geschieht dies nur deswegen, weil die Netzhaut an ihrem Bilde keine Ausdehnung fühlt. Aber das gilt nur für Lichtpunkte in der deutlichen Sehweite. Aus einer näheren oder entfernteren Weite, aber besonders bei den Kurzsichtigen, fühlt die Retina die Bilder der Lichtpunkte, wie z. B. der Sterne, nicht mehr als Punkte, sondern als mehr oder weniger große minder helle Scheiben, weil sich hier, wie schon an der Fig. 3 Taf. II gezeigt wurde, dieselbe Menge Lichts auf einen größeren Theil ihrer Fläche ausbreitet. Man kann also solche ganze Lichtbüschel, die einfache Gesichtspunkte abgeben, als eine aus vielen zusammengesetzte, mit ihrer Mitte auf eine Richtungslinie fallende Welle sich denken; und das Sehen vieler Lichtpunkte in einer einzigen Richtungslinie kann nur davon herkommen, daß wieder solche Wellen von allen diesen Lichtpunkten zusammen auf eine Richtungslinie fallen, also immer nur eine einzige Stelle der Retina erschüttern, und nur ein einziges Gefühl erwecken. Viele Lichtpunkte nur an einem Orte sehen, ist also nichts anderes, als dem Eindrucke aller nur eine Retinastelle entgegenhalten, nichts anderes, als dem Auge solche Stellung geben, daß ihre besonderen Eindrücke zusammen in einen einzigen, in ein einziges Gefühl verschmelzen. Wenn man visirt oder mit dem Gewehre zielt, fühlt die Retina anfangs drei Eindrücke an drei besonderen Stellen, nämlich die Bil-

der der beiden auf dem Gewehrlauf sich befindenden Visirpunkte und das Bild des zu treffenden Zieles. Jetzt bewegt man den Gewehrlauf so lange, bis die Bilder dieser Visirpunkte in eine einzige Bildempfindung zusammenfallen, und dann bewegt man noch den Kopf nach dem schon fixirten Rohre, bis auch das dritte Bild des Zieles mit den andern im Gefühle zusammenschließt. Dann kann das Geschoss dies Ziel nicht verfehlen, weil es auf der Parallele mit der Richtungslinie und nicht weit davon fast denselben geraden Weg macht, wie das Licht selbst.

Lassen wir aus mehreren Gegenständen, aber in verschiedenen Richtungslinien, Licht auf die Retina fallen, so bekommen wir eben so viele Eindrücke, aber außer dem Gefühle dieser Eindrücke tritt hier noch ein zweites besonderes Gefühl hinzu, nämlich das Gefühl der Distanz der Eindrücke oder Bilder von einander, welche der Winkelgröße der zugehörigen Richtungslinien entspricht. Wie nämlich eine auf die Handfläche gedrückte Körperfläche, neben dem auf vielen Punkten geweckten Gefühle ihrer Existenz, uns auch noch ihre Distanz fühlen läßt, die wir auch bei verschlossenen Augen ungefähr schätzen können, eben auf dieselbe Art, nur vollkommen thut dies die Retina. In dieser Rücksicht ist das Auge nicht nur ein Licht, ein Farbensinn, sondern auch ein Tastsinn.

Das Sehen der Linien ist nur ein Fühlen sehr vieler farbiger Punkte neben einander in einer oder vielen Reihen, die in entsprechende Richtungslinien fallen, aber wegen ihrer Nähe schon in einanderheften. Das Gefühl der Distanz des Anfangs und des Endes der Reihe wird hier zum Gefühle der Länge, eben so, wie wir mit der Hand die Reihe der Punkte, wo der Druck eines aufgedruckten Lineals anfängt und aufhört, auch als Länge fühlen. Distanz- und Längen-Gefühl beruht also auf *demselben Raumgeföhle*, beim ersten werden nur die

Endpunkte gefühlt, beim zweiten empfinden wir auch die Ausfüllung zwischen diesen beiden Endpunkten. Ein Druck mit einem 2 Zoll weit geöffnieten stumpfen Zirkel auf die Hand, und auf die andere Hand mit einem ebenfalls 2 Zoll langen Stäbchen, lassen so das Gefühl derselben Raumtheilchen-Entfernung empfinden. Eben so ist es mit dem Netzhautgeföhle. Wenn wir Punkte, welche 2 Zoll von einander entfernt sind, und nebenbei einen eben so langen Strich sehen, so bekommen wir das Gefühl desselben Maasses, hier als Länge, dort als Abstandsmaass. Ob viele Linien zusammenkommen, sich kreuzen, gerade oder krumm sind, alles dies wird von der Handfläche, und noch deutlicher von der Retina geföhlt. Das Sehen der Körperflächen entsteht nur aus der Wiederholung der Punkt- und Linien-Geföhle; es ist ein Föhlen sehr vieler farbiger Punkte neben einander nach allen Flächendimensionen hin, in allen ihnen zugehörigen Richtungslinien. Das Gefühl der Entfernung der Enden vieler neben einander vorhandenen Lichtpunktreihen wird hier zum Geföhle der Ausbreitung einer Fläche, und eine, nach allen Seiten gleiche oder nichtgleiche Ausbreitung zum Geföhle der Gestalt. An der Handfläche bekommen wir das Gefühl der Grösse und Gestalt der aufgedrückten Fläche durch die Empfindung der Distanz der Ränder, und ihrer krummen Eindrucksabgien als Begrenzung. Dabei kann das Innere vom Auge leer bleiben, wie wir das schon daraus ersehen, dass das Ausdrücken des Endes eines offenen Rohrs und eines, mit einem Deckel verschlossenen auf die Hand, immer das Gefühl derselben runden Figur und derselben Grösse giebt. Eben so verhält sich das im Auge. Auch hier giebt ein Ring und eine Scheibe derselben Grösse dasselbe Gestalt- und Grösse-Geföhle.

Der ganze Vorgang des Sehens stützt sich also auf zwei Grundgeföhle. Dem Geföhle des Lichteindrucks als farbige Punkte, und dem Geföhle ihrer Distanz von einan-

der. Besondere Farbenpunkte und eine relative Entfernung von einander sind aber auch die Bedingung des Zustandekommens eines jedweden Bildes: es darf uns daher nicht verwundern, daß auf der Retina, wo farbige Eindrücke in gewisse Distanzen fallen, ein Bild entsteht. Das Retinabild, als Farbenbild, aber ist beim Sehen nur eine Nebensache. Es ist so unwesentlich als dasjenige, welches auf der Handfläche ein frisch bemalter Körper gleichzeitig mit dem Eindrucke hervorbringen würde. Das Handgefühl würde nichts davon wissen können, und nur das Auge könnte es auf der Hand sehen. Im Auge ist aber kein zweites Auge, um das Retinabild bei Lebenden zu sehen, wie dies im toten Auge möglich ist. Sehen ist also kein Sehen des Retinabildes, sondern ein Distanzgefühl der verschiedenen Eindrücke, nicht als eines Farben-, sondern als eines Eindrucksbildes, welches ein stark angedrückter Körper auch auf der Handfläche im Gefühle hinterläßt.

Wenn aber allerlei Farbenlicht bloß als Eindruck das Distanzgefühl wecken sollte, so müßte Verwechslung der Farbe auf das Abstandsgefühl keinen Einfluß ausüben können. Denn hier würden ja die verschiedenen Farbenpunkte und Linien bloß dem Gefühle als Marken, um die Abstandspunkte zu bezeichnen, dienen, wobei ihre Farbe nur Nebensache bleiben könnte. Dies ist wirklich der Fall, wie wir schon daraus sehen, daß die aus den Gemälden copirten Zeichnungen und Kupferstiche uns, in Rücksicht des Räumlichen, dieselben Gefühle geben, weil wir ja eben das Bild von zwei Farben, als gleich mit einem Bilde, welches mit einer unendlichen Zahl verschiedener Farben bedeckt ist, erkennen. Ja hier thut dies eigentlich eine einzige Farbe, die weiße, weil die schwarze nur eine Lichtnull ist. Ich trete hier nämlich der allgemeinen Meinung der Physiker gegen manchen Physiologen bei, und behaupte geradezu, daß, wo kein Licht, auch kein Sehen ist. Das

Schwarze ist also (aber nur im physischen, und nicht im gewöhnlichen Malersinne) keine Farbe, und ist unsichtbar, nur die an's Schwarze angränzenden Lichtpunkte und Linien werden gesehen. In solchen Fällen fühlt das Auge nur die Lichtpunkte über die schwarzen leeren Zwischenräume hinweg, und ihren Abstand von einander, eben so wie die Hand den Abstand zweier Zirkelspitzen über den zwischen ihnen sich befindenden leeren Raum hinweg fühlt. Wenn also die schwarzen Zeichnungen, in welchen eine einzige Farbe mit dem farblosen Raume abwechselt, und die Gemälde, wo die verschiedenen Farben diefs, aber in denselben Distanzen thun, dasselbe Gefühl geben, so muß doch wirklich das Auge kein bloßer Farbesinn, und das Abstandsgefühl hier das Wesentliche seyn.

Dem Sehen als Distanzgeföhle liegen aber, wenn auch mittelbar, die Richtungslinien zum Grunde, weil den auf ihnen stattfindenden Eindrücken, also auch ihren Winkeln, die Gröfse der Abstände auf der Retina entspricht. Sie sind das Maafgebende und so zu sagen der Meßzirkel im Auge, wie es die Finger für die Hand sind. Doch kann sich das Augengeföhle eben so wie das Handgeföhle in der richtigen Schätzung dieser Maafse einigermaßen irren. Suchen wir z. B. auf einem kleinen Dreieck die Mitte der Entfernung zwischen der Base und dem Scheitel zu treffen, so finden wir beim Nachmessen mit dem Zirkel, dafs wir ihn unrichtig und immer näher der Base ansetzen. Das breitere Feld der Base zieht also mehr unser Geföhle nach seiner Seite, als das Entgegengesetzte. Obgleich also die Richtungslinien mit einer mathematischen Sicherheit in unserem Auge begründet sind und ein sicheres Winkelmaaf abgeben, so kann sich doch das Retinageföhle im Messen der Distanz irren; was nicht anders seyn kann, da es ja diese Richtungslinien, die nur singirt sind, gar nicht fühlt.

Die Retina ist aber, so wie die Handfläche, ein die

eigene Länge und Breite selbst fühlendes Gebilde, und fühlt nur secundär das Maafs des Abstandes der von außen kommenden Eindrücke, indem es auf sie die Länge des zwischen den Eindruckspunkten eingeschlossenen Theils der eigenen Fläche überträgt. Wir halten ja auch das Auge eben so wie unsere Hand den äusseren Gegenständen vor, damit sie sich an die Retina vermittelst ihrer Richtungslinien anlegen und Eindrücke geben; die Länge des dazwischenliegenden Theiles ihrer selbst wird im Gefühle zum Abstandsmaafs dieser Eindrücke. Die Einheit dieses Maafses kann aber nur unser Körper selbst seyn, und da dieser der Gröfse nach unveränderlich, oder nur langsam veränderlich ist, so mtlissen auch seine Bruchtheile, nämlich die Handfläche- und Retinagröfse fast unveränderlich seyn, und sich so fühlen. Die Netzhaut, wie überhaupt die Haut, ist also ein sicherer und immer fast derselbe Maafsstab, weil sie immer nur eine Gröfse, nämlich nur ihre eigene Gröfse fühlen, und auch diese andere Gegenstände übertragen können.

Die Retina ist auch vom Kreuzungspunkte der Richtungslinien, welcher gleichsam einen neuen Ausgangspunkt derselben bildet, immer gleich entfernt; denn dieser stabile Kreuzungspunkt liegt immer 7 Linien vor der Retina. Daraus folgt aber, dafs gleich grofse Theile der Retinafläche, die sich als solche fühlen, auch wirklich constant, unter gleich grofsen Winkeln der Richtungslinien zutreffen. Diefs ist der nothwendige Zusammenhang des Sehens unter einem bestimmten Winkel der Richtungslinien, ohne dafs die Retina diese Richtungslinien und ihre Winkel fühlen kann.

Obgleich die Retina, so wie die übrige Haut ihre eigene absolute Gröfse fühlt, so ist es doch nur die Hand, die sich im Gefühle der absoluten Gröfse der äusseren Gegenstände nicht irrt, weil sie sie eben so *grofs, wie sie selbst ist*, zwischen den durch den Gegen-



stand berührten Stellen fühlt. Das ist aber, was den Tastsinn unserer Hände zum sichersten Sinn stempelt, und zum Corrector des Gesichtssinnes und der übrigen macht. Die Retina kommt aber nicht unmittelbar in Berührung mit den Gegenständen, sondern empfängt, nur in gewissen Distanzen neben einander, unmittelbare Eindrücke von den diesem Eindrucke entsprechenden Gegenständen, die aber auf Richtungslinien fallen, welche unter einem constanten Winkel nicht immer gleich entfernte und gleich große Gegenstände einschließen. Die Retina kann also mit ihrer absoluten Größe doch nur die relative der Gegenstände messen. Dieser Unterschied zwischen der Thätigkeit der Retina und der Handfläche hängt von dem Umstande ab, daß die Retina nur mittelbar ihre Eindrücke, die Hand aber die ihrigen unmittelbar bekommt. Doch ist es keine nothwendige Folge davon, denn die Retina könnte dabei noch absolute Größe fühlen, wie wiederum umgekehrt, wie im Auge, unter solchen Umständen die Hand die absolute Größe der Gegenstände mit ihrem Gefühle nicht empfinden könnte. Die Natur des Zwischenleiters kann dabei nicht betheiligt seyn, denn wir haben schon nachgewiesen, daß das Gefühlerregende in beiden Sinnen bloß Druck, Stoß oder Erschütterung ist, und solche Bewegungen können sich leicht durch verschiedene Zwischenleiter fortpflanzen. Also nicht diese Dinge, sondern die Divergenz der Richtungslinien ist die Ursache der Unmöglichkeit, die absolute Größe der Gegenstände zu fühlen.

Wenn die Retina flach wäre, und die Richtungslinien zu ihr normal, also unter sich parallel wären, so würde sie mit ihrer absoluten Größe auch absolute Größen der äußern Gegenstände fühlen müssen, aber auf einmal nur solche Größen, die ihre eigene nicht überschreiten, eben wie die Hand nur so einen großen Theil von äußern Gegenständen, wie sie selbst ist, auf einmal berühren und fühlen kann. In diesem Falle könnte

die Entfernung auf das Größengefühl gar keinen Einfluß haben, und die entferntesten, so wie die nächsten Gegenstände würden gleich groß gefühlt werden. Die Ausbildung eines solchen absoluten, also auch sicheren, andererseits aber nur für kleine Gegenstände möglichen Größengefühles hat die Natur hintenangesetzt, um der Retina dafür eine andere, zwar in Rücksicht der Größe sich leicht irrende, aber dafür weit ausgebreitete, und die größten Gegenstände auf einmal empfindende Fähigkeit zu geben. Dies aber wurde dadurch möglich, daß die Richtungslinien divergiren, und die Retina sich um ihren gemeinschaftlichen Kreuzungspunkt gleich entfernt, also krumm umlagert. Nur dadurch können aus dem ganzen Weltall Eindrücke nach dem Auge gelangen, aber freilich, weil es ihrer zu viele giebt, können sie auf der kleinen Retina nur eng sich einfinden, so daß auch die größten Gegenstände, wenn sie zu entfernt sind, auf ihr sich am Ende als lichte Punkte verlieren, wie dies der Fall mit ganzen Welten, jenen Lichtpunkten am Himmel ist.

Beküme die Hand ihre Eindrücke auf ähnliche Weise wie die Retina durch Vermittlung, etwa durch Stäbe, wie deren Blinde zum nämlichen Zweck sich bedienen, so müßte solche, parallel oder ausgebreitet die Hand drückend, ihr auch Eindrücke von gleich großen oder viel größeren Gegenständen heibringen. Ein Bündel paralleler Stäbe könnte an dem Gefühle der Größe und Gestalt derjenigen Fläche, worauf die anderen Enden gestützt sind, eben so wenig ändern, als es das Leder des Handschubes thut; müßte also die absolute Größe fühlen lassen. Aber ein Bündel divergirender und sich kreuzender Stäbe müßte auf der Hand Eindrücke von weit aus einander sich befindenden und von ihnen berührten Gegenständen auf einem kleinen Raum vereinigen, also viel kleinere Druckbilder geben. Je länger *solche Stäbe* wären, desto mehr müßten sie wie ein

Zis-

Zirkel an einander gebracht werden, um dieselben Gegenstände einzuschließen, aber auch der Druck ihrer anderen Enden würde auf der Hand näher an einander fallen, und ein kleineres Druckbild geben; solche müssten also eben so wie im Auge nur Gefühle der relativen Grössen geben. Eine nie anders, als durch solche divergirende Stäbe fühlende Hand würde also kein Gefühl des mit ihr selbst gleich Großen, sondern nur das Gefühl des Kleineren und des Größeren, eben wie das Auge, also nur das Gefühl der relativen Grösse, haben können.

Dieses Vermögen, absolute oder nur relative Grössen fühlen zu können, bringt aber nur der Umstand des sich Kreuzens der Leiter mit sich. dies und die davon abhängende Divergenz sind die Hauptbedingungen zur Hervorbringung desselben. Gleichermassen verhält sich die im Auge fühlende Handfläche. Das ganze schachtelförmige Gebilde vor der Netzhaut ist nur dazu bestimmt, um den Kreuzungspunkt für die tastenden Stäbe derselben, der Richtungslinien nämlich, zu fixiren, damit immer dieselbe Entfernung der Eindrücke auf der Retina denselben Winkeln dieser Richtungslinien entspreche; denn ohne diese Bedingung wäre nicht einmal ein immer dasselbe bleibendes, also auch sicheres relatives Grössengefühl möglich. Alles übrige der Augapfeleinrichtung hängt nur mit der Lichtcorrection zusammen, damit der Eindruck in der einmal fixirten Richtung am vollkommensten und mit der nöthigen Kraft geschehe.

Die Retina ist also ein ihre eigene Ausdehnung nach zwei Dimensionen fühlendes lebendiges Maass, an dem sich die Grössen der, den Gegenständen entsprechenden Eindrucksbilder auch nach zwei Dimensionen abmessen, woraus Gestaltgefühl entspringt. Das Retina- oder Schgefühl kann also nur ein Flächengefühl seyn, und doch unterscheiden wir das Nahe und Entfernte an den Gegenständen, also auch die dritte Dimension, die Tiefe

im Raume. Ja wir unterscheiden dies, sehen es aber nur als auf einer Fläche. Dafs es wirklich so ist, überzeugt uns dies, dafs wir ein gutes, etwas entferntes und passend mit seinem Umlange versterktes Gemälde für Wirklichkeit, für ein Aggregat hinter einander gestellter Gegenstände nehmen können. Hier geben uns ja nur zwei flache Gemälde, nämlich das äufsere künstliche, und das natürliche auf der Retina, doch das Gefühl besonderer und hinter einander sich befindender Gegenstände. Das Gefühl kann dies aber nur aus den Veränderungen der Gröfse, der Gestalt und der Farbe wahrnehmen, weil diese nur das ihm unmittelbar, sowohl auf dem Gemälde, wie auf der Retina das Gegebene sind. Zur Vervollständigung dieser Wahrnehmung tragen aber auch frühere Beobachtung, Controle des Tastsinns und Ueberlegung vieles bei.

Frühere Beobachtung hat uns oft wahrnehmen lassen, dafs von zwei, in einer Entfernung hinter einander gestellten Fingern unserer beiden Hände der vordere gröfser erscheint, dafs er die ganze entferntere Hand zu decken im Stande ist; wir beurtheilen also auch andere kleiner wahrgenommene Gegenstände als weiter entfernt; dies berücksichtigend, zeichnet der Maler die entfernter scheinen sollenden Gegenstände relativ kleiner. Ein mit ihren Rändern nicht gleich vom Auge abstehende Quadratfläche erscheint demselben als ungleichseitiges Viereck, ein Kreis als Ellipse u. dergl. Auf diese Art muß aber auch der Maler die wahren Gestalten verzerren, wenn er dem Gesichte das Gefühl der verschiedenen Stellungen der Dinge beibringen will. Zuletzt läfst uns auch die Verschiedenheit der Farben die relative Entfernung fühlen. Hier kommen vorzüglich Schatten und Licht in Betrachtung, die der Maler als dunklere und hellere Farbe aufträgt. Ohne dies wären erhabene, aber einfarbige Dinge, wie z. B. Basreliefs, dem Auge nur als eine weifse Fläche sichtbar, und dem

Maler nur als solche möglich darzustellen. Auch ist die Abgränzung der Farbenflächen undeutlicher, und desto mehr in einander vermischt, je entfernter sie vom Auge sind, weil die von ihnen ausgehenden Strahlenbüschel nicht mehr auf Punkte, sondern ausgebreitet, also nicht nur neben einander, sondern auch über einander, auf die Retina fallen, wodurch auch die verschiedenfarbigen Bilderränder in einander überzufließen scheinen. Dies wissen die Maler auch, und geben ihren entfernten Gegenständen undeutliche Umrisse. Ausserdem verblassen und verbläuen die Farben der zu sehr entfernten Gegenstände auch noch durch die dazwischen liegende blaue Luftschicht. Vorzüglich aber das Danebenstellen eines natürlichen, der Grösse nach bekannten Dinges hilft zur besseren Erkenntniß der Entfernungs- und Grösßenverhältnisse, weil es als Maassstab für das Uebrige dient. Maler bringen deshalb auch Menschen neben anderen Gegenständen an. Alles dies hilft uns also, die hinter einander gestellten Objecte als solche zu fühlen; nur von sehr entfernten, wo der controlirende Tastsinn nicht hinreichen würde, bleibt uns doch das Gefühl, als wenn sie auf einer Fläche wären, so scheinen uns weite Berge, Wolken und Gestirne an dem Himmelsgewölbe geheftet zu seyn. Aus allem dem aber folgt, daß das Gefühl des weniger oder mehr Entfernten, oder das Gefühl der Rauntiefe, nur indirect vom Winkel und von der Länge der Richtungslinien nur in sofern abhängt, als der Endpunkt einer Richtungslinie eben der Lichtpunkt selbst ist, und als das Bild von diesem Punkte nur in deutlicher Sehweite als Punkt, in einer immer grösseren Entfernung vom Auge aber als eine immer breitere Scheibe wahrgenommen wird, also auch die aus näheren Gegenständen gebildeten Retinabilder aus nebeneinanderliegenden Punkten rein deutlich, aus entfernten aber aus übereinanderreichenden Scheiben undeutlich und mit vermischten Farben wahrgenommen wer-

den. Wenn wir ein vom Hohlspiegel zurückgeworfenes Bild nahe, wie in der Luft schwebend, vor uns sehen, so geschieht es eben dadurch, daß die Luftkegelstrahlen, durch den Spiegel genähert, sich kreuzen, und, wie aus einem neuen, aber näheren Lichtpunkte kommend, auch kleinere Scheiben auf der Retina bilden.

Außer dem Abstand der Eindrücke, die die Retina durch den primär wahrgenommenen Abstand ihrer eigenen, diese Eindrücke empfangenden Stellen empfindet, muß sie auch noch diejenige Stelle als besondere fühlen, wo diese Eindrücke am deutlichsten geschehen, nämlich ihre Mitte selbst. Diese wird auch im Gefühle des Ganzen zum Relationspunkte, nach welchem sich das Gefühl des Abstandes der übrigen Theile des ganzen Retinabildes richtet. Diese der Augenaxenlinie entsprechende Stelle erscheint uns als die Mitte des Gesichtsfeldes, als der kleine innere Kreis des deutlichsten Sehens, der mit vielen concentrischen Rahmen, der immer minder deutlicher, zuletzt mit dem ganz Bildlosen umfaßt ist. Da wir empfinden, daß die Mitte des Gesichtsfeldes uns die Gegenstände am deutlichsten wahrnehmen läßt, so suchen wir diese auch durch Augenbewegung in diese Mitte zu bekommen. Dieß nennt man die Augenaxe nach einem Gegenstande richten. Es thun dieß aber auch Leute, die eben so wenig von einer Augenaxe, als von den Richtungslinien wissen. Im äußeren undeutlichen Gesichtsfelde stößt ihnen ein Gegenstand in dunkleren Umrissen auf, und meldet sich, so zu sagen, nur an. Das Auge wendet sich und nimmt es auf in's mittlere deutliche Gesichtsfeld. Die übrigen Gegenstände reihen sich im Gefühle um ihn, wie die durch sie afficirten Retinastellen, groß, klein, deutlich, undeutlich, mehr oder weniger zusammengedrückt, und dieß giebt das Perspectivische des Gesichtssinns, worin wir uns durch das täglich wiederholte Verbessern der Tim-



schungen am Ende recht gut finden, und nur selten wenig mehr irren.

Als Hauptresultat dieser Abhandlung glaube ich angeben zu können, daß die Richtungslinien fast gerade Linien sind, die in dem Mittelpunkte der Corneakrümmung ihren Kreuzungspunkt haben. Da aber dieser fast zwei Linien vor dem Mittelpunkte des Auges sich befindet, so können gleiche Winkel der Richtungslinien nicht gleiche Theile des Augengrundes abschneiden. Das Feld des deutlichen Sehens beschränkt sich aber nur auf einen kleinen mittleren Theil in der Retina, wo die Bogen sowohl vom Augen- als vom Corneamittelpunkte zusammenfallen; die Retina, die man nur ungefähr und selbst mit dem genauesten Winkelmaasse oft unrichtig gemessen hat, wird also den kleinen Unterschied selbst weiterhin im seitlichen Gesichtsfelde nicht fühlen können. Sehr weit von der Augenaxe ab würde es wohl der Fall seyn können, wenn hier ein Deutlichsehen überhaupt möglich wäre. Die im Augengrunde ausgebreitete Retina fühlt aber nur die Eindrücke und deren Distanzen an der Länge des Theiles ihrer selbst zwischen den durch äußere Eindrücke berührten Stellen. Da aber die Größe von dem Distanzgeföhle der Stellen ihrer eigenen Fläche immer der Distanz der Enden der Richtungslinien, auf welchen die Eindrücke von außen zu dieser Fläche ankommen, gleicht, und bei gleichen Abständen dieser Enden auf der Retina die Arme der umfassenden Richtungslinien immer unter demselben Winkel, wegen der Stabilität ihres Kreuzungspunktes, im Auge geöffnet sind, so muß hier die gefühlte Retina - Distanzgröße verschiedener Stellen ihrer Fläche und die nicht gefühlte Winkelgröße der Richtungslinien in eins zusammenfallen. Dadurch aber wird begreiflich, wie es uns scheinen kann, als fühlten wir unmittelbar den Weg der Lichtstrahlen und seine Richtung, wie auch den optischen Winkel der Rich-

tungslinien, was doch unmöglich ist. Nur durch das Nachweisen der Analogie der Retina mit der Handfläche als Tastsinn, oder eigentlich als Hautsinn (denn das, was die Hand zum Tastsinne eigentlich macht, die Bewegung, war zur Erklärung der Sache überflüssig), war diese Erklärung möglich. Freilich muß die Retina, so wie die Handfläche, durch Bewegung den Gegenständen entgegengestellt seyn, aber das Eindruck- und Distanzgefühl, aus welchem allein hier alles erklärt wurde, ist von der Bewegung unabhängig, und findet auch beim ruhenden Organe statt; ja selbst mit einer Handfläche ohne Finger würde die Analogie mit der Retina noch fortbestehen. Ich suchte also zu beweisen, daß die Retina eben so wie die Handfläche sich verhält, nämlich primär die Distanz und Länge ihrer eigenen Theile fühlend, secundär solche auf die Distanz der Eindrücke übertragend, und nachträglich erst die Größen und Entfernungen der Gegenstände empfindend, worin sich zuletzt erst auch Urtheil und Schätzung einmischt.

Es mag meiner Ansicht auch zum Beleg dienen, daß der große Physiolog Joh. Müller der Ansicht ist, daß sich die Retina nur in ihrer wahren objectiven GröÙe sieht; dabei aber auch äußert, *»daß durchaus kein Grund abzusehen sey, warum die tastende Hand etwas anderes als ihre afficirte Leiblichkeit, warum sie noch ein Etwas außer sich empfinden solle.«* Wirklich reißt sich an das hier Verhandelte nothwendig noch die Frage, wie die Retina, die alle Eindrücke, Erschütterungen nur als ein Afficirtseyn ihrer selbst, zwischen den so afficirten Stellen nur sich selbst in ihren Theilen fühlt, dieß doch außer sich auf Objecte übertragen könne, wie überhaupt das von Außenkommen der Eindrücke als wirklich von außen kommend, und das diese Eindrücke Gebende als ein wirklich draußen vorhandener Gegenstand gefühlt werde, da doch alles dieß nur das Gefühl der

Selbsteristenz in den Organen wecken kann. Ein Versuch der Beantwortung dieser Frage, die sich auf alle Sinne erstreckt, würde uns aber auf ein rein physiologisches Feld führen; und da obnehin diese Abhandlung das Maass für eine physikalische Zeitschrift schon erreicht, vielleicht selbst überschritten hat, es mir aber andererseits doch scheint, daß die Beantwortung der Frage über das Setzen des Empfundnen in die Außenwelt, das Scheiden unseres Ich vom Nichtich, nicht etwa in einer intellectuellen Thätigkeit, sondern noch in der Sphäre der Sinnlichkeit zu suchen sey, so werde ich vielleicht einen Versuch wagen, diesen Gegenstand für eine physiologische Zeitschrift zu bearbeiten.

---

#### IV. *Volta'sche Combinationen;* *von J. F. Daniell.*

(Auszug aus dem *Phil. Transact.* f. 1836, pt. I p. 107.)

---

Der Zweck dieses Aufsatzes ist, zwei Volta'sche Batterien von neuer Einrichtung kennen zu lernen, so wie eine Reihe damit angestellter Versuche zur Bestätigung von Faraday's wichtiger Entdeckung der festen chemischen Action der Elektricität.

Den ersteren dieser Apparate nennt der Verfasser *Zergliederungsbatterie* (*Dissected Battery*), weil derselbe, analog gewissen optischen Instrumenten, die verworrene Linien in regelmäßiger Anordnung erscheinen lassen, viele vereinzelte Thatsachen deutlicher macht und mit andern besser in Zusammenhang bringt. Den zweiten Apparat belegt er mit dem Namen der *constanten Batterie*, weil er den grossen Vortheil hat, seine Kraft lange Zeit unveränderlich zu erhalten.

## Zergliederungsbatterie.

Diese Batterie besteht aus zehn in die Runde gestellten Glaszellen oder Glasbechern, von der durch Fig. 1 Taf. III im Durchschnitt abgebildeten Gestalt; *abcd* ist ein solider Glasfuß, mit einer Höhlung *efgh*, die durch den Stöpsel *gh* verschlossen ist. Durch diesen Stöpsel gehen die Stiele zweier Platten *ijklmn* hinab in die Höhlung, welche durch eine Scheidewand *oo* getheilt ist in zwei Kammern, die beide Quecksilber enthalten, zur Aufnahme dieser Stiele. Diese Einrichtung erlaubt, daß die Platten ohne Schwierigkeit nach Belieben verwechselt werden können. Mittels der Drähte *p, q*, welche durch die Seitenlöcher *l, u* eintreten und ebenfalls in das Quecksilber tauchen, können die Platten entweder unter sich, oder mit den Platten anderer Zellen verknüpft werden. Den Glasfuß umfaßt eine aufgeschliffene Glasglocke (*shade*) *v, w, x, y, z, z*, die eine Zelle zur Aufnahme der Flüssigkeit bildet. Endlich wird eine graduirte Glasröhre *AB*, mittelst eines zur Seite befindlichen Trägers, so gehalten, daß sie über eine oder die andere Platte gestellt werden kann. Diese Röhre dient als Voltameter.

Fig. 2 zeigt eine zu gleichem Zweck dienende, aber weniger kostspielige Zelle. Sie ruht, mittelst ihres hervorspringenden Randes *vwxyz*, in dem Ausschnitt eines Brettes *CD*, und die Stiele der Platten gehen durch den Glasstöpsel *abcd* in die außerhalb befindlichen Quecksilbernäpfehen *op*, mittelst welcher alle nöthigen Verbindungen gemacht werden können.

Als Metalle gebraucht der Verfasser für gewöhnlich Platin und amalgamirtes Zink, in Platten von 3 Zoll Länge und 1 Zoll Breite, und als Elektrolyt verdünnte Schwefelsäure von 1027,5 spec. Gewicht, bestehend aus 100 Th. Wasser und 2½ Th. concentrirter Säure, ganz wie Faraday <sup>1)</sup>, um seine mit dessen Versuchen in

1) *Experimental-Untersuchungen*, X, 1127 (Ann. Bd. XXXVI S. 510).

Verbindung zu setzen. Diese verdünnte Säure war fast ohne örtliche Wirkung auf das Zink. Zwar bekleidete sich dieses, wenn es ganz eingetaucht war, nach einiger Zeit mit Wasserstoffbläschen, welche stark anhafteten; allein nach 24 Stunden hatte es doch nur einen sehr kleinen Bruchtheil eines Grans verloren. Wurde dagegen die Kette geschlossen, so entwickelte sich am Platin viel Wasserstoffgas, ungefähr drei Kubikzoll in einer Viertelstunde.

Zunächst zeigt nun der Verfasser, wie leicht mittelst seines Apparates einige der einfachsten, aber sehr schwer zu veranschaulichenden Gesetze der Volta'schen Batterie nachgewiesen werden können.

Er nimmt eine Zelle, geladen mit verdünnter Schwefelsäure, der etwas Salpetersäure zugesetzt worden. So lange sie ungeschlossen ist, bleibt alles in Ruhe; so wie er sie aber schließt, entwickelt sich ein mächtiger Strom Wasserstoffgas am Platin. Nun nimmt er eine zweite ganz gleiche Kette, und verbindet die beiden Zinkplatten und die beiden Platinplatten, jede unter sich. Alles bleibt ruhig, weil die beiden Ketten einander entgegenwirken. Darauf nimmt er statt der zweiten Zelle eine andere, geladen, nicht mit Schwefelsäure, sondern mit einer Lösung von Jodkalium und Stärkmehl. Auch sie wirkt der ersten entgegen; allein da diese stärker ist als sie, wird sie überwältigt. Es entsteht ein Strom, und Jod wird reichlich auf das Platin niedergeschlagen, wie es die entstehende blaue Farbe erweist. Trennt man nun die letztere Zelle von der ersten und schließt sie, so macht ihr eigener Strom das Jod durch den am Platin freiwerdenden Wasserstoff wieder verschwinden.

Hierauf schreitet Hr. D. zu den eigentlichen Versuchen, die wesentlich folgende waren:

1) Jede Zelle, bloß mit verdünnter Schwefelsäure geladen, wurde für sich geschlossen, und das am Platin entweichende Wasserstoffgas in ihrem Voltameter aufge-

fangen. Die Menge dieses Gases war, vermutlich wegen Ungleichheit in den Abständen der Platten und in der Amalgamation des Zinks, keineswegs gleich in den einzelnen Zellen, sondern bedeutend verschieden, in den beiden, die am meisten und am wenigsten gaben, fast um ein Drittel. So wie aber sämmtliche Zellen zu einer Batterie verbunden wurden, verschwanden diese Ungleichheiten; jede Zelle gab nun gleich viel Gas, aber nicht mehr als zuvor die schwächste.

2) Alle Platinplatten wurden mit einem Quecksilbernäpf verbunden, alle Zinkplatten mit einem zweiten solchen Näpf, und nun beide Näpfe in Verbindung gesetzt. Jetzt entwickelten die einzelnen Zellen wieder ungleiche Gasmengen, fast so ungleiche wie zuvor.

3) Die 10 Zellen wurden paarweise zu einfachen Ketten, und diese 5 Doppelzellen zu einer Batterie verbunden. Die Unregelmäßigkeit der Gasentwicklung war nun wieder verschwunden. In jedem der 10 Voltameter war gleich viel Gas, doch nicht ganz so viel als bei Versuch 1 in der stärksten Zelle.

4) Eine Doppelzelle wurde mit den übrigen acht einfachen Zellen zur Batterie verknüpft. Das Gas in jedem Voltameter der Doppelzelle betrug genau halb so viel als in dem Voltameter jeder einfachen Zelle.

In allen diesen Versuchen war jede Zelle eine *erzeugende* gewesen; jetzt versuchte Hr. D. auch die *Wirkung verzögernder* Zellen zu ergründen.

5) Zu dem Ende verknüpfte er sämmtliche 10 Zellen einfach zu einer Batterie, ersetzte aber in einer das Zink durch Platin. Dadurch wurde die Gasmenge auf mehr als ein Drittel zurückgeführt, genau auf die, welche sich in der verzögernden Zelle entwickelte. Als auch in einer zweiten Zelle das Zink durch Platin ersetzt wurde, betrug die, in allen Voltametern gleiche, Gasmenge nur noch ein Zehntel von der früheren. *Drei verzögernde Zellen hemmten den Strom gänzlich.*



6) Als, ohne diese Vertauschung, eine der Zellen umgekehrt gegen die übrigen neun gestellt wurde, sank in den Voltametern dieser neun Zellen die Gasmenge auf ein Viertel herab; aber noch bedeutend geringer war sie am Zink in der umgekehrten Zelle.

7) Nun wurde in jeder Zelle eine amalgamirte Zinkplatte zwischen zwei Platinplatten aufgestellt (eine *erzeugende* Platte zwischen zwei *leitenden*, wie Hr. D. sich ausdrückt), wie in Fig. 2 Taf. III angedeutet ist, und die Verbindung so gemacht, daß die beiden Platin- mit einem, und die Zinkplatte mit dem andern Quecksilbernapf communicirten <sup>1)</sup>. Als nun 10 solcher einfachen Zellen zur Batterie verbunden wurden, entwickelte sich von jeder neben dem Zink stehenden Platinplatte beinahe eben so viel Gas wie früher in gleicher Zeit von einer Platte. Durch die Verdoppelung der Platinfläche ward also nahe doppelt so viel Wasser zerlegt. Dabei entwickelte sich das Gas auch an den vom Zink abgewandten Platinflächen.

8) Als die Batterie wieder auf gewöhnliche Weise zusammengesetzt, aber statt des amalgamirten Zinks nicht amalgamirtes genommen ward, fand an diesem eine starke Wasserstoffgasentwicklung statt; aber während sie am stärksten war, entwickelte sich am Platin genau eben so viel Gas, als bei der Combination mit amalgamirtem Zink. Die örtliche Wirkung stört also die des Stromes nicht.

9) Vom Eisen (*wrought iron*), statt des amalgamirten Zinks genommen, erwartete der Verfasser eine große Wirkung, aber statt deß war sie zu seinem Erstaunen ganz Null, die Gasmenge am Platin ganz unmerkbar. Jetzt wandte er die Eisenplatten als Stellvertreter des Platins an, sie mit amalgamirten Zinkplatten combinirend, und zu seiner Verwunderung waren sie wirksamer als

1) Wenn die Zeichnung richtig, so standen zugleich die Platten jetzt halb so weit von einander entfernt wie zuvor P

Platin. Die Gasmenge in jedem Voltameter war fast doppelt so groß wie in der normalen Batterie.

10) Eine Wiederholung dieses Versuches mit frischen Eisenplatten lehrte den Verfasser, daß die früheren Eisenplatten ihre große Wirksamkeit dem Umstand verdankten, daß sie vorher mit Platin combinirt gewesen waren; denn die neuen Eisenplatten entwickelten nicht mehr Gas als die Normalplatten.

Der Verfasser schritt nun zu einer Veränderung des angewandten Elektrolyten.

11) Bis dahin war verdünnte Schwefelsäure von 1027,5 spec. Gew. angewandt; jetzt setzte er dieser, dem Volume nach, eben so viel Salpetersäure hinzu, als sie concentrirte Schwefelsäure enthielt. Die Menge des sich an den Platinplatten entwickelnden Wasserstoffgases ward dadurch bedeutend verringert und unregelmäßig gemacht; allein wenn ein Voltameter statt einer der Zellen eingeschaltet wurde, entwickelte sich darin fast drei Mal so viel Wasserstoffgas als bei der Batterie im normalen Zustand. Nach fünf Minuten war jedoch die Entwicklung auf eine ganz un wahrnehmbare Größe herabgesunken. Eine, selbst sehr kurze, Oeffnung der Kette stellte die Kraft der Batterie zum Theil wieder her. Bei vergrößertem Zusatze von Salpetersäure hörte die Wasserstoffentwicklung in einigen Zellen ganz auf, während sie in anderen gering, aber ungleich war. Die Quantität des circulirenden Stromes ward zugleich vermehrt, nahm aber bei Fortdauer der Wirkung rasch ab.

12) Um die Ursache dieser Anomalien zu entdecken, ließ Hr. D. die Batterie 30 Stunden lang wirken. Sie war nun ganz erschöpft; kaum daß sich noch in dem Voltameter Gas entwickelte. Er versah nun die Batterie mit frischen Platinplatten und schloß sie wiederum. Jetzt wirkte die Batterie fast so stark wie zuerst, verlor aber ihre Thätigkeit sehr rasch. Selbst Eisenplatten,

statt der erschöpften Platinplatten genommen, erneuten die Wirkung mit großer Kraft.

13) Vermuthend, daß die Unthätigkeit der Platten von einer Veränderung derselben herrühre, polirte er sie, machte sie rothglühend, kochte sie mit starker Kalilauge; allein ohne entscheidenden Erfolg. Kochen mit Salpeter- oder Salzsäure stellte jedoch ihre Kraft vollkommen wieder her. Bei mehrmaliger Anwendung der so gereinigten Platten und der alten Ladung mit verdünnter Schwefelsäure war die Wirkung anfangs immer sehr lebhaft, dauerte aber immer kürzer und kürzer, bis die Abnahme zuletzt fast unmittelbar erfolgte.

14) Bei Untersuchung der Platten nach dieser lang fortgesetzten Wirkung fand sich, daß sie rauh waren, und zwar in Folge einer Bekleidung mit *metallischem Zink*. Nach 18stündiger Wirksamkeit der Batterie war der Ueberzug so stark, daß er in großen Flocken abgesondert werden konnte. Dieser Ueberzug fand sich auf beiden Seiten der Platinplatten, doch hauptsächlich auf der den Zinkplatten zugewandten. Gewöhnlich war er warzenförmig, doch manchmal auch krystallinisch. Die Entstehung dieses die Wirkung der Batterie so sehr schwächenden Ueberzugs rührte offenbar davon her, daß das gebildete und von der Säure gelöste Zinkoxyd durch das an den Platinplatten entweichen wollende Wasserstoffgas im Entstehungszustande reducirt ward. Der Ueberzug vermehrt sich offenbar mit der Menge des in der Flüssigkeit gelösten Zinkoxyds, und muß daher einerseits bei einer lange gebrauchten Flüssigkeit und andererseits bei einer Batterie mit gewöhnlichem Zink, wo so viel Zink durch örtliche Wirkung aufgelöst wird, besonders mächtig werden. Der Grund, daß er bei solchen Batterien niemals wahrgenommen, liegt darin, daß er bei Oeffnung der Batterie schnell wieder aufgelöst wird (wenn die Flüssigkeit noch freie Säure enthält). —

Alle Phänomene von Ritter's secundärer Säule, die von Becquerel einer Polarität zugeschriebenen Erscheinungen, die Versuche von Marianini und von De la Rive über diesen Gegenstand können nun, schließt Hr. D., nicht länger unverständlich seyn.

15) Hr. D. hatte bemerkt, daß wenn Kupferoxyd in der Flüssigkeit gelöst war, dies in Vorzug vor dem Zinkoxyd gefällt wurde, und daß die Platten, die sich mit Kupfer überzogen hatten, eingermassen vor der Bekleidung mit Zink geschützt blieben. Er setzte daher schwefelsaures Kupferoxyd in bedeutender Menge zur sauren Flüssigkeit; allein, wiewohl das Zink amalgamirt war, fand nun doch an demselben eine örtliche Wirkung statt, stark genug, um Wasserstoffgas, wenngleich in geringer Menge, zu entwickeln, und eine Fällung von Kupfer auf das Zink zu veranlassen. Besonders geschah dies bei einfachen Ketten. — Salpetersaures Quecksilberoxyd hat diesen Nachtheil nicht; allein dafür bedeckt sich das Platin mit so viel Quecksilber, daß es bald in Tropfen davon abfällt.

Die Entfernung des Wasserstoffs, der im Entstehungszustande feste Körper auf die Platinplatten niederschlägt, verstärkt, wenn sie ohne solche Niederschläge bewirkt wird, die Batterie bedeutend. Die gute Wirkung der Salpetersäure beruht darauf, und es ist gewiß, daß nicht bloß der Sauerstoff dieser Säure dehydrogenirend wirkt <sup>1)</sup>, sondern auch ihr Stickstoff; denn es bildet sich durch ihre Gegenwart *Ammoniak*, wie durch Vermischung einer erschöpften Flüssigkeit mit kohlensaurem Natron nachzuweisen ist.

Die einzige Schwierigkeit in Faraday's Theorie von der Volta'schen Säule fand Hr. D. in der bekannten That-  
sache, daß ein Stückchen Zink oder Eisen eine viele hundert Mal größere Kupferfläche gegen chemische An-

1) Faraday's Experimental-Untersuchungen, VIII, §. 1021.

griffe schützen kann, da doch die Menge des entwickelten Wasserstoffs, welche sich über die Kupferfläche ausbreitet, mit der Menge des vom Zink oder Eisen aufgenommenen Sauerstoffs in Verhältniß stehen müsse. Um diese Schwierigkeit zu heben, stellte er folgende Versuche an.

Er nahm eine Silberplatte, 15 Zoll im Quadrat, und übergoss sie, in einer Schale liegend, mit verdünnter Schwefelsäure, der etwas schwefelsaures Kupferoxyd zugesetzt war. Dann berührte er sie in der Mitte mit der Spitze einer amalgamirten Zinkstange von  $\frac{1}{2}$  Zoll im Durchmesser. Augenblicklich bildete sich um die Berührungsstelle auf dem Silber ein runder Fleck von niedergeschlagenem Kupfer, der in wenigen Stunden bis zu einer scharf begrenzten Scheibe von 6 Zoll im Durchmesser anwuchs, ohne indeß die Kanten der Platte zu erreichen.

Zur Veränderung löthete er nun eine  $\frac{1}{2}$  Zoll lange und  $\frac{1}{8}$  Zoll dicke Stange von amalgamirtem Zink mitten auf eine Silberplatte von 8 Zoll Länge und  $5\frac{1}{2}$  Zoll Breite, und stellte diese senkrecht in eine angesäuerte Kupfervitriollösung. Der Niederschlag von Kupfer, der sogleich auf dem Silber entstand, bildete um das Zink ein Oval und schritt allmählig gleichmäßig vor. Er dehnte sich also nicht vorzugsweise nach oben aus, wie die Leichtigkeit des Wasserstoffgases, als reducirenden Mittels, hätte glauben lassen können.

Einen auffallenden Contrast damit bildet der umgekehrte Versuch. Berührt man nämlich eine in Säure gelegte amalgamirte Zinkfläche mit einem Platinstift, so entweicht Wasserstoffgas von diesem; allein die Oxydation des Zinks ist so örtlich, daß an dem Berührungspunkte bald ein Loch durch die Platte gefressen wird.

Die Ursache der vorher genannten Erscheinung setzt Hr. F. in einer großen Adhäsion (*heterogeneous adhesion*) des Wasserstoffgases zum negativen Metall, vermöge welcher es seine Elasticität verliert, und im Entstehungszu-

stande weit auf der Fläche dieses Metalles fortgeführt wird.

Zur Stütze dieser Ansicht führt er an, daß er die amalgamirten Zinkplatten folgwiese auf die Hälfte, auf ein Viertel und zuletzt auf einen bloßen Draht von  $\frac{1}{8}$  Zoll Dicke und drei Zoll Länge reducirt habe, und daß doch dabei an den Platinplatten eben so viel Gas in gleicher Zeit entwickelt worden sey, als bei der Combination mit Platten von der vollen Größe.

Dieser Adhäsion schreibt er auch zu, daß amalgamirtes Zink vor dem Angriff von verdünnter Säure geschützt bleibt, daß die daran entstehenden Wasserstoffbläschen festhaften, und daß es dagegen bei Zusatz von etwas Salpetersäure sich leicht löst, weil dann der Wasserstoff im Entstehungszustande zur Bildung von Ammoniak verwandelt wird. Endlich leitet er auch die bekannte schwammförmige Masse, welche sich bildet, wenn Quecksilber zur negativen Elektrode in einer starken Salzmaklösung gemacht wird, von dieser Adhäsion her. Er hält diese Masse für nichts als ein mechanisches Gemenge von Quecksilber und dem darin durch Adhäsion festgehaltenen Wasserstoffgas.

#### Constante Batterie.

Fig. 3 Taf. III stellt eine der zehn Zellen dieser Batterie im Durchschnitt dar; *abcd* ist ein Kupfercylinder, 6 Zoll hoch und  $3\frac{1}{4}$  Zoll weit, oben bei *ab* offen, unten aber geschlossen bis auf die Düse *ef*, die, andert-halb Zoll weit, zur Aufnahme eines Pfropfens dient, durch welchen der Glasheber *ghijk* gesteckt ist. Oben bei *ab* ist eine zweite Kupferdüse, entsprechend der am Boden, und gehalten durch zwei horizontale Arme. Vor Einsteckung des Pfropfens in die untere Düse *ef* wird durch diese ein Stück einer Ochsenurgel gezogen und an der oberen Düse *lmno* mit Zwirn fest gebunden. Nachdem diese häutige Röhre auch unten durch den ein-



gesteckten Pfropf gehörig befestigt worden, bildet sie eine innere Kammer, welche mit dem Glasheber in Gemeinschaft steht, so daß, wenn sie bis *mo* mit einer Flüssigkeit gefüllt worden ist, jeder fernere Zusatz durch die Oeffnung *k* abfließt; *pq* ist eine amalgamirte Zinkstange, 6 Zoll lang und 0,5 Zoll dick, getragen von dem Rand der oberen Düse mittelst des Holzstücks *rs*, das durch ein in ihr oberes Ende gebohrtes Loch gesteckt ist; *t* ist ein Näpfchen mit Quecksilber, mittelst welches und einer Vertiefung oben in der Zinkstange die beiden Metalle der verschiedenen Zellen durch Drähte auf verschiedene Weise mit einander in Verbindung gesetzt werden können.

Zehn solcher Zellen stehen auf einem Tisch im Kreise, die Heber nach innen gekehrt, mit ihren Oeffnungen über einem Gefäße, das zur Aufnahme der aus ihnen fließenden Flüssigkeit bestimmt ist. Ueber der inneren Kammer jeder Zelle befindet sich ein Trichter, gehalten durch einen seitwärts stehenden Träger.

Der Zweck bei Construction dieser Batterie war: 1) die Zinkfläche möglichst klein zu machen; 2) das gebildete Zinkoxyd, das für die Wirkung der Batterie so schädlich ist, zu entfernen, und 3) das am Kupfer frei werdende Wasserstoffgas ohne Fällung einer dieser Metalle verschlechternden Substanz zu absorbiren.

Zur Erreichung des ersten Zweckes wurde die amalgamirte Zinkstange so klein genommen, daß ihre Oberfläche nicht mehr als 10 Quadratzoll hielt, während die Innenfläche des Kupfercylinders beinahe 72 Quadratzoll betrug.

Um das gebildete Zinkoxyd (Zinksalz) zu entfernen, war über der inneren Kammer der Trichter befestigt, aus welchem fortwährend frische Säure in abgepaßter Menge zuströmte, während die schwerere Lösung des Zinkoxyds in demselben Maasse am Boden durch den Heber abfloß.

Um endlich das Wasserstoffgas zu absorbiren, wurde der Raum zwischen der Hautröhre und dem Cylinder mit einer Lösung von *schwefelsaurem Kupferoxyd* gefüllt.

*Diese Batterie, richtig construiert, entwickelte durchaus kein Gas, weder am Zink, noch am Kupfer, weder vor, noch nach der Schließung.* Am Kupfer erschien kein Wasserstoffgas, sondern statt dessen ein schön rother Ueberzug von reinem Kupfer, so daß also die Fläche dieses Metalles fortwährend erneut ward. So wie aber ein Voltameter mit in den Kreis eingeschlossen ward, zeigte sich darin eine sehr lebhaft Gasentwicklung. Sie war auch weit stätiger und ausdauernder als bei gewöhnlichen Batterien; allein dennoch war eine allmähige, wiewohl sehr schwache Abnahme zu spüren, wahrscheinlich weil in Folge der Fällung von Kupfer die Kupfervitriollösung verdünnter und weniger leitend wurde.

Um diesen Mangel abzuheffen, ward, wie Fig. 4 zeigt, die obere Düse *bdeg* ringförmig mit einem Siebe *acfh* umgeben, das auf dem Rande des Cylinders ruht, und mit zerstoßenem Kupfervitriol gefüllt ist. So wie nun, bei Wirkung der Batterie, die Lösung verdünnter wird, löst sich der Kupfervitriol auf, und erhält sie stets in gleicher Concentration. Dieß Mittel entsprach dem Zweck vollkommen; sechs Stunden lang erhielt sich der Strom in unveränderter Kraft. Nur in der ersten Viertelstunde war die Wirkung in der Regel etwas stärker, und zwar, weil sich durch einen Rückstand von örtlicher Wirkung etwas Wasserstoffgas am Zink entwickelte. Durch mäßiges Bewegen der Zinkstange in der Säure steigt die Wirkung momentan auf ihren ursprünglichen Betrag, sinkt aber bald auf ihre spätere Größe herab.

Wie klein diese örtliche Wirkung auf das Zink sey, zeigt Hr. D. durch einen Versuch, wobei er die Batterie, ein Voltameter mit in den Kreis gebracht, einige Zeit wirken ließ, das in dem Voltameter gesammelte *Knallgasgemisch* sorgfältig maas, und die Zinkstangen

vor und nach dem Versuche wog, um deren Verlust zu bestimmen. An Zink löste sich in der gesamten Batterie 933 Gran, oder in jeder Zelle 93,3 Gran; an Gas ward gesammelt, nach Correction wegen des Drucks, 188,48 Kubikzoll. Diese Gasmenge entspricht 56,1 Gran Zink, also waren nur 7,2 Gran Zink durch örtliche Wirkung aufgelöst. In Wirklichkeit war aber diese Menge noch geringer, da sich zeigte, daß sich von den Zinkstangen etwas Amalgam abgelöst hatte und auf den Boden der Zelle gefallen war, wo es nicht genau gesammelt werden konnte. — Für die 933 Gran aufgelösten Zinks mußten sich, da nicht eine Blase Wasserstoff an den Kupfereylindern erschien, 1665 Gran Kupfer niedergeschlagen haben, und dazu waren 5623 Gran krystallisirten Kupfervitriols erforderlich. Das niedergeschlagene Kupfer hatte übrigens eine schön rothe Farbe und warzenförmige Structur; es fand sich nicht bloß an der Innenfläche und dem Boden des Cylinders, sondern auch unten an dem Siebe, besonders überall an den Ecken.

Um die Beständigkeit der Batterie zu prüfen, wurde sie mit Schwefelsäure von 1056,2 spec. Gew. (100 Maass Wasser und  $4\frac{1}{2}$  Vitriolöl) geladen, und, nach Einschaltung eines Voltameters, geschlossen. Sie gab 3,8 Kubikzoll Gas in fünf Minuten. Hierauf wurde das Voltameter herausgenommen und die Batterie vier Stunden lang ohne dasselbe in Schließung erhalten. Nun abermals mit dem Voltameter geprüft, gab dasselbe wieder genau 3,8 Kubikzoll in fünf Minuten.

Zusatz von Salpetersäure zu der Kupfervitriollösung reducirte die Gasmenge, die sich in fünf Minuten in dem Voltameter entwickelte, auf 2,1 Kubikzoll. Zusatz von derselben Säure zu der Schwefelsäure in der inneren Kammer hob die Gasmenge anfänglich auf 4,2 Kubikzoll; allem bald sank sie auf die 3,8 Kubikzoll herab, die die Schwefelsäure für sich gab. Zusatz von Salpetersäure

zu einer der beiden Flüssigkeiten in der Säule hat also keinen Vortheil.

Der einzige Nachtheil dieser Construction ist der große Abstand des Zinks von dem Kupfer. Um ihm zu begegnen, erhöhte Hr. D. die Leitungsfähigkeit der Batterie, indem er eine Schwefelsäure von 1105,4 spec. Gew. (100 Maafs Wasser und 9 Maafs Vitriolöl) anwandte. Mit zwei verschiedenen Voltametern erhielt er nun 5,0 und 5,5 Kubikzoll Gas innerhalb fünf Minuten. Wegen des großen Verbrauchs an schwefelsaurem Kupfer zweifelt Hr. D. indess, ob die Anwendung einer so concentrirten Säure vortheilhaft sey, wenn die Wirkung lange unterhalten werden soll.

Um die Vortheilhaftigkeit seiner *constanten Batterie* zu zeigen, verglich Hr. D. sie mit einem Trogapparat, bestehend aus 10 Plattenpaaren von Wollaston'scher Einrichtung. Dieser Apparat, geladen mit einem Gemisch von 100 Maafs Wasser,  $2\frac{1}{2}$  Maafs Vitriolöl und 2 Maafs Salpetersäure, entwickelte in einem Voltameter anfänglich 2,5 Kubikzoll Gas innerhalb fünf Minuten; im Laufe seiner Wirksamkeit aber immer weniger, nach einer Stunde nur 1,3 Kubikzoll, und nach  $3^h 51'$  gar nur noch 0,03 Kubikzoll. In ihm waren thätig 32 Quadratzoll Zink und 64 Quadratzoll Kupfer (wenn beide Seiten desselben gezählt werden, wiewohl die äussere vermutlich nicht so viel als die innere wirkte). Die constante Batterie, geladen mit verdünnter Schwefelsäure von 1079,4 spec. Gew. (100 Maafs Wasser und  $6\frac{1}{2}$  Maafs Vitriolöl) entwickelte dagegen noch nach  $3^h 43'$  innerhalb fünf Minuten unausgesetzt 4,6 bis 4,8 Kubikzoll Gas, und in ihr waren wirksam  $65\frac{1}{2}$  Quadratzoll Kupfer (die Unterseite der Siebe mitgerechnet) und nur  $7\frac{1}{2}$  Quadratzoll Zink. Der Vorzug ist also offenbar auf Seite der letzteren. Diefs ging auch aus einem Versuche hervor, wo beide Apparate auf den von ihnen zu überwältigenden Widerstand geprüft wurden. Es wurden nämlich in den

Kreis einer jeden drei Voltmeter eingeschaltet. Ein Wollaston'scher Apparat mit frischen Platten gab nun in jedem dieser Voltmeter 0,32 Kubikzoll Gas in fünf Minuten, der Daniell'sche (geladen mit Schwefelsäure von 1056 spec. Gew.) dagegen 0,9 Kubikzoll.

Endlich bemerkt Hr. D. noch, daß sein Apparat Platindraht von  $\frac{1}{10}$  Zoll Dicke zum Glühen bringe und bedeutend lange darin erhalte, auch zwischen Kohlen-  
spitzen einen merkwürdig lebhaften Funken gebe.

#### V. *Nachträgliche Beobachtungen über Volta'sche Combinationen; von J. F. Daniell.*

(Auszug aus den *Phil. Transact. f.* 1836, pt. I p. 125.)

Bei seinen früheren Versuchen hatte Hr. D. bemerkt, daß Voltmeter mit großen und mit kleinen Platten gleichviel Gas in derselben Zeit entwickeln. Diesen merkwürdigen Umstand näher aufzuhellen, war der nächste Zweck seiner fortgesetzten Untersuchung. Hiebei bekam er nun das Resultat, daß, innerhalb gewisser Gränzen, weder der gegenseitige Abstand der Platinplatten im Voltmeter, noch deren Größe irgend einen Einfluß auf die an ihnen entweichende Gasmenge habe. Platten, die, bei 3 Zoll Höhe, 1 Zoll,  $\frac{2}{3}$  Zoll,  $\frac{1}{2}$  Zoll Breite hatten, so wie Drähte von  $\frac{1}{10}$  Zoll Dicke und 2 Zoll Länge gaben, ungeachtet der Verschiedenheit ihrer Größe, sämtlich 2,7 Kubikzoll Gas in fünf Minuten. Als die Drähte bis auf  $\frac{1}{4}$  Zoll ihrer Länge mit Harzkitt (Siegelack) überzogen wurden, entwickelten sich noch 2,3 Kubikzoll in derselben Zeit; und bei gänzlicher Bekleidung derselben bis auf die Spitzen, die blank gefeilt wurden, gaben sie noch 0,8 Zoll in 5 Minuten, und zugleich trieben sie das Gas mit einer gewissen Kraft von sich in die Flüssigkeit.

Diese Unabhängigkeit oder geringe Abhängigkeit der Wirkung im Voltameter von der Flächengröße steht in sonderbarem Contraste mit dem mächtigen Einfluß, den in der Batterie die Größe der Fläche des leitenden (negativen) Metalles ausübt.

Ferner fand Hr. D., daß es zur Unterhaltung der Kraft des Apparates keinesweges nöthig sey, die Säure so häufig zu erneuen. Während einer fünfständigen ununterbrochenen Schließung, ohne Erneuerung der Säure, zeigte das Voltameter bloß eine Abnahme von 2,7 auf 2,4 an.

Um zu erfahren, wie lange die Unveränderlichkeit anhalte, ließ nun Hr. D. die Batterie 24 Stunden lang geschlossen. Jetzt gab sie im Voltameter 0,3 Kubikzoll Gas in fünf Minuten, und die Flüssigkeit, die nun ein spec. Gewicht von 1,276 hatte, war vollkommen mit Zinkoxyd gesättigt, den der kleinste Tropfen verdünnter Ammoniakflüssigkeit brachte darin einen Niederschlag hervor. — Hierauf ersetzte er ungefähr ein Siebentel des Volums der Flüssigkeit durch den Trichter von oben her durch frische Säure, und sogleich stieg im Voltameter die Gasentwicklung innerhalb fünf Minuten nicht bloß auf die ursprünglichen 2,7, sondern auf 4,2 Kubikzoll, und diese Stärke behielt die Batterie, ohne fernere Erneuerung der Säure, vier Stunden lang.

Hieraus schloß Hr. D. 1) daß die Erhöhung der Leitungsfähigkeit des Elektrolyten in der Batterie großen Vortheil habe, und 2) daß die Quantität der circulirenden Kraft noch unabhängiger sey von der Flächengröße des erzeugenden Metalles (Zinks), als es bereits gezeigt worden. (Der Theil der Zinkstangen, der bei obigem Versuch von der, nothwendig auf der Salzlösung schwimmenden, Säure umgeben war, betrug nämlich nicht mehr als höchstens einen Zoll.)

Er verkürzte daher die Zinkstangen auf ein *Viertel* ihrer ursprünglichen Länge, und fand, daß dies durch-



aus keine Schwächung der Batterie nach sich zog, sobald dieselbe mit frischer Säure geladen war.

Dann bediente er sich von nun an einer Säure von 1136 spec. Gew. (8 Maafs Wasser und 1 Maafs Vitriolöl), womit er stätig 11,0 Kubikzoll Gas in fünf Minuten erhielt. Eine solche concentrirte Säure erfordert indess einige Aufsicht auf die Kupferlösung, wenn eine vollkommene Unveränderlichkeit lange erhalten werden soll, da innerhalb einer Stunde in jeder Zelle 25 Gran Zink aufgelöst werden, und dies eine Zersetzung von 154 schwefelsauren Kupferoxyds bewirkt. Desungeachtet erhält sich die Beständigkeit, ohne Erneuerung der Säure, anderthalb Stunden lang, und, wenn man hin und wieder eine Unze frischer Säure zugießt, so lange wie man will, sobald nur die Siebe hinreichend mit Kupfervitriol versehen worden.

Um zu sehen, ob eine fernere Vergrößerung der Kupferflächen einen Nutzen habe, stellte Hr. D. in mehre seiner Zellen 10 Kupferstreifen, von 1 Zoll Breite, und solcher Länge, daß sie vom Boden bis zu dem Siebe reichten, unten den Umfang und oben die Hautröhre berührten. Dadurch ward in diesen Zellen die Kupferfläche verdreifacht.

Nun wurden 5 Zellen mit Kupferstreifen verglichen mit 5 Zellen ohne dieselben. Beide Combinationen gaben gleich viel Gas in ihren Voltametern, nämlich jede 5,5 Kubzll. in 5 Minuten. Beim Vergleich von 10 Zellen der ersten Art mit 10 Zellen der letzteren gab jene Combination 8,5, diese 11,0 Kubikzoll Gas. Die Einstellung der Kupferstreifen oder die Vergrößerung der Kupferfläche hatte also keinen Nutzen.

Fünf Zellen mit Streifen, verbunden zu einer Reihe mit 5 Zellen ohne Streifen, gaben 11 Zoll Gas. Eine Zelle mit Streifen mit einer Zelle ohne Streifen zu einer einfachen Kette verbunden, und aus 10 solcher Ketten eine Batterie gebildet, gab 17 Kubikzoll Gas in fünf

Minuten oder genau doppelt so viel als die Batterie aus 10 einfachen Zellen mit Streifen.

Bei Anwendung einer Batterie von mehr als 10 Zellen hält Hr. D. es für zweckmäßig, diese Zellen nicht im Kreise, sondern in zwei Reihen neben einander zu stellen, die Heber nach innen zu kehren, und unter dieselben eine Rinne zur Aufnahme der abfließenden Säure anzubringen. Da es sich ferner gezeigt, daß die ununterbrochene Erneuerung der Säure nicht nöthig ist, ein bisweiliger Zusatz von frischer Säure die Gleichförmigkeit der Wirkung vollkommen erhält, so wird auch der beschwerliche Trichter-Apparat überflüssig. Eine solche Batterie von 20 Zellen reicht zu allen Zwecken aus. Sie macht ein 8 Zoll langes Stück von 0,01 Zoll dicken Platindraht in offener Luft rothglühend, und ist überdies eine *ökonomische Quelle des reinsten Sauerstoffgases*.

Zum Behufe der Gewinnung von Sauerstoff wird in eine Zelle statt der Zinkstange eine Platinplatte in die Hautröhre gebracht, und diese oben durch einen Pfropfen verschlossen, durch welchen eine gebogene Glasröhre zu einem Recipienten führt. Diese Zelle giebt, bei Verbindung mit den Doppelzellen zu einer Batterie, keinen Wasserstoff, da derselbe vom Kupfervitriol absorbiert wird, aber 84 Kubikzoll Sauerstoff in einer Stunde.

Nach allen diesen Versuchen, schließt Hr. D., würde, vom theoretischen Gesichtspunkt aus, die vollkommenste Volta'sche Batterie bestehen aus einer soliden Kugel von einem erzeugenden Metall (z. B. Zink), umgeben von einer hohlen Kugel aus einem leitenden Metall (z. B. Kupfer), getrennt von ihr durch eine stets erneute Schicht eines Elektrolyten und verbunden durch einen Metallaht, der durch eine Bekleidung von Glas vor dem Elektrolyten geschützt wäre. In einer solchen hypothetischen Anordnung wüchse der Widerstand des Elektrolyten direct wie seine Dicke oder wie der Abstand der beiden Kugeln, während, wenn dieser Widerstand über-

wunden würde, die Quantität der in Umlauf gesetzten Kraft wüchse wie das Quadrat des Abstands vom Mittelpunkt oder wie die Oberfläche der äusseren Kugel (P. ?). Die Zahl einer Reihe, die zur Hervorbringung des nöthigen Impulses erforderlich wäre, würde folglich nur wie der bloße Abstand wachsen, der Vortheil aber wie das Quadrat. Ein Zinkstab innerhalb eines Kupfercylinders ist wahrscheinlich in Praxis die nächste Approximation zu solch einer Anordnung; doch möchte die Gültigkeit dieser Deduction ohne Zweifel durch Abänderungen im Durchmesser des Cylinders zu prüfen seyn.

VI. *Ueber die Volta'sche Säule und über das allgemeine Gesetz für die Intensität der Ströme einer einfachen Kette und einer Säule von grosser oder kleiner Spannung; von Hrn. Pouillet<sup>2</sup>).*

(*Compt. rendus*, T. IV p. 267.)

1) Die Intensität des elektrischen Stroms einer jeden Volta'schen Säule kann durch die chemischen, die physiologischen oder physikalischen Wirkungen ihres Stroms gemessen werden. In dieser Abhandlung hat man indeß als Maass-Einheit die physikalische Wirkung dieses Stroms auf eine Magnetnadel genommen, weil diese Wirkung vor allen übrigen den Vorzug hat, augenblicklich einzutreten und mit der grössten Genauigkeit mess-

1) Wiewohl die Resultate dieser Abhandlung zum Theil nur Bestätigungen der von Ohm (*Ue. Galvanische Ketten* und Schweigg. Journ. Bd. XXXVI S. 137), entdeckten, auch von Pechner (*Maassbestimmungen über die galvanische Kette*) und früher von Pouillet selbst (*Annal. Bd. XV S. 91*) beobachteten Gesetze sind, so schien doch die unverkürzte Mittheilung derselben, schon weil sie so wenig berücksichtigt wurde sind, nicht überflüssig. P.

bar zu seyn. Allein die durch diese Maafs-Einheit gegebenen Resultate stehen nicht ausser Zusammenhang mit denen, welche man erhält, wenn man als Maafs-Einheit die chemischen oder physiologischen Wirkungen nimmt. Im Gegentheil giebt es zwischen ihnen immer eine solche Abhängigkeit, daß sich die erateren aus den letzteren herleiten lassen, und umgekehrt. Dieser Zusammenhang zwischen Wirkungen, die anscheinend so verschiedenartig und zuweilen so vollständig entgegengesetzt sind, ist ein wichtiger Punkt in der Theorie der Säule. Er erklärt das, was man bisher die Spannung der Elektrizität in dem Strom genannt hat, erklärt auch, weshalb eine Säule, welche sehr starke physikalische Wirkungen giebt, sehr schwach in ihren chemischen oder physiologischen Wirkungen seyn kann. Indefs bis dahin, wo diese Erklärungen sich aus Versuchen herleiten lassen, ist es gut zu erinnern, daß die direct mit einander verglichenen Intensitäten nichts anderes sind als die elektro-dynamischen Intensitäten oder die Intensitäten der Wirkungen auf eine unter gleiche Umstände versetzte Magnetnadel.

2) *Beschreibung der Apparate.* — Die Säulen, welche angewandt wurden, waren *Zellen Säulen* (*piles cloisonnées*), deren Erfindung man Hrn. Becquerel verdankt <sup>1)</sup>. Sie haben den großen Vorzug, daß sie ganze

1) *Annal. de chim. et de physique*, T. XXXXI p. 20. — [Die Zellen Säule des Hrn. Becquerel unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Becher-Apparat dadurch, daß die Glaskasten, welche die Plattenpaare aufnehmen, durch Goldschlägerhaut in zwei oder drei Zellen getheilt sind. Zwei Zellen, gebildet durch eine membranöse Scheidewand, wären eigentlich hinreichend; allein wegen der Zartheit der Goldschlägerhaut wendet er zwei solche Scheidewände und also drei Zellen an. Die eine dieser Zellen füllt er mit irgend einer pflanzlichen Säure oder Salzlösung, und die beiden andern (oder, falls nur zwei Zellen gebildet wurden, die zweite) mit einer andern ähnlichen Flüssigkeit. Nimmt die erste Zelle das Kupfer auf, so wird das Zink in die letzte ge-

Stunden lang mit constanter Kraft wirken, und deshalb vergleichbare Resultate geben.

Die Intensität der Ströme wurde mit zwei Apparaten gemessen, von denen ich den einen *Tangentenbussole*, und den andern *Sinusbussole* nenne.

Die *Tangentenbussole* besteht aus einem Kupferstreifen von 1<sup>m</sup>,6 Länge, 0<sup>m</sup>,02 Breite und 0<sup>m</sup>,002 Dicke, umwickelt mit Seide, und so gebogen, daß er sehr genau einen Kreis von 0<sup>m</sup>,412 Durchmesser bildet. Die beiden hervorragenden Enden des Streifens befinden sich dicht neben einander, und gehen jeder in einen Becher mit Quecksilber, wo sie den Strom aufnehmen. Der Kreis steht vertical, und in seinem Mittelpunkte hängt an einem Seidenfaden eine Magnetnadel von 5 bis 6

stellt. Die übrige Einrichtung ist wie bei den bekannten Apparaten. Als Flüssigkeiten gebraucht Hr. B. entweder zwei verschiedene Salzlösungen oder zwei Säuren. Eine gesättigte Lösung von salpetersaurem Kupferoxyd in der Zelle des Kupfers, und eine gesättigte Lösung von schwefelsaurem Zinkoxyd in der Zelle des Zinks gab ihm das Maximum des Effects — Diese Vorrichtung hat einige Aehnlichkeit mit der im vorhergehenden Aufsatz beschriebenen constanten Batterie des Hrn. Daniell. Indess würde man doch Hrn. Becquerel zu vie' Ehre anthun, wenn man ihm die Erfindung dieser Batterie zuschreiben wollte; denn erstlich ging er bei der Construction seiner Zellen säule von ganz andern Principien als Hr. Daniell aus; dann ist die salpetersaure Kupferlösung eben so wenig die geeignete Flüssigkeit in der einen Zelle, wie die schwefelsaure Zinklösung in der andern; und drittens geben die von ihm gerade mit dieser Säule angestellten Messungen keinesweges einen Beweis von der Constanz ihrer Kraft; denn die Abweichung des Galvanometers war 84° im ersten Augenblick, 72° nach 15 Minuten, und 68° nach 30 Minuten. Eine constantere Wirkung wurde erhalten, als das Kupfer von Wasser, das  $\frac{1}{10}$  Schwefelsäure enthielt, und das Zink von Wasser, das  $\frac{1}{10}$  Schwefelsäure und  $\frac{1}{10}$  Salpetersäure enthielt, umgeben war. Die Ablenkung der Nadeln betrug nun 62° im ersten Moment, 64° nach 15', und 61° nach 30'. Vermuthlich war es diese Combination, welche Hr. Pouillot anwandte. Gesagt ist darüber nichts. P.)

Centimetern Länge, welche einen 16 Centimeter langen leichten Stab (*lame*) von Holz oder Metall trägt, der als Zeiger dient, weil sich seine Enden auf dem Umfang eines getheilten Kreises bewegen. Wenn der Streifenkreis im magnetischen Meridian steht, ist die Magnetnadel auf dem Nullpunkt, und so wie ein Strom durch diesen Kreis geht, wird die Nadel nach Westen oder Osten abgelenkt, um eine Grösse, die von der Stärke des Stromes abhängt. Wenn Gleichgewicht eingetreten ist, d. h. wenn die Kraft des Erdmagnetismus, die Nadel in den Meridian zurückzuführen, gleich ist der Kraft des Stromes, sie daraus zu entfernen, so wird die Intensität des Stromes durch die Tangente der Ablenkung der Nadel gemessen.

Die *Sinusbusssole* besteht aus einem ähnlichen Kupferstreifen, der aber in Form eines Rechtecks gebogen ist. Seine grossen horizontalen Seiten messen 2 Decimeter, seine kleinen verticalen dagegen 5 bis 8 Centimeter, je nach dem Grade der Empfindlichkeit, den man erreichen will. Dieses Rechteck steht auf einem getheilten Kreis, dessen Alhidade es gewissermassen bildet, und in dem Rechteck hängt eine Magnetnadel, so dass ihr Mittelpunkt in der Verticale des Mittelpunkts vom Kreise liegt. Wenn ein Strom durch das Rechteck geht, wird die Nadel abgelenkt; allein man folgt ihr mit dem Rechteck, bis dass sie sich in dessen Verticalebene befindet, wenn sie, gehalten im Gleichgewicht zwischen der Kraft der Erde und des Stromes, stillsteht. In diesem Fall ist die Intensität des Stromes proportional dem *Sinus* der Ablenkung der Nadel.

Für sehr schwache Ströme sind die obigen beiden Bussolen statt des einfachen Streifen multiplicatorisch mit mehreren versehen.

3) *Versuche mit einem einzigen Element (einer einfachen Kette).* — Zur Bestimmung des Grades der Schwächung, den der Strom eines einzigen Elements in seiner



Intensität erfährt, wenn er genöthigt wird, durch Bogen von verschiedener Länge zu gehen, nahm ich Drähte von Kupfer, Platin, Silber, Eisen u. s. w., übersponnen mit Seide, aus einem und demselben Metallstück verfertigt, und mit vieler Sorgfalt durch den Drahtzug gezogen, so daß sie in ihrer ganzen Länge möglichst gleichen Durchmesser besaßen. Diese Drähte schnitt man in fünf Stücke von verschiedener Länge, z. B. die 1 Millm. dicken in Stücke von 5, 10, 40, 70 und 100 Meter, und die dünneren Drähte in Stücke von 0,2; 0,4; 1,2; 4,0 und 10 Meter. Mit jeder Reihe von Drähten wurden die folgenden Versuche gemacht.

Man leitete den Strom der einfachen Kette direct durch die Bussole und beobachtete die Ablenkung; hierauf zwang man den Strom nach einander durch jeden der fünf Drähte zu gehen, und beobachtete sorgfältig die entsprechenden Ablenkungen. Folgende Tafel enthält die Resultate:

Drahtlänge, hinzugesetzt dem ursprünglichen Strom oder der Länge des Elements.	Beobachtete Ablenkung.	Tangente der Ablenkung od. Intensität des Stroms.
0 Met.	61° 30'	2,100
1	35 15	0,707
2	24 00	0,445
4	13 40	0,243
8	7 30	0,132
16	3 40	0,064

Auf den ersten Blick gewahrt man keine Regelmäßigkeit in dem abnehmenden Gang der Intensität; allein man darf nicht bloß den dem ursprünglichen Bogen hinzugesetzten Draht betrachten, sondern muß diesen Bogen selbst in Rechnung ziehen. Bezeichne man die unbekannte Länge desselben mit  $x$ , und nimmt an, daß die Intensitäten des Stromes sich umgekehrt verhalten, wie die totalen Längen des Bogens, so hat man die fünf Gleichungen:

$$\begin{array}{rcl}
 \frac{x}{x+1} = \frac{707}{2100} & \text{woraus } x=0,51 \\
 \frac{x}{x+2} = \frac{445}{2100} & - & x=0,54 \\
 \frac{x}{x+4} = \frac{243}{2100} & : & x=0,52 \\
 \frac{x}{x+8} = \frac{132}{2100} & - & x=0,53 \\
 \frac{x}{x+16} = \frac{64}{200} & - & x=0,50
 \end{array}$$

Mittel  $x=0,52$ .

Diese Gleichheit der Werthe von  $x$  beweist, daß der ursprüngliche Strom gleichwerthig ist einem 0,52 Met. langen Stück des angewandten Drahts, und wirklich, wenn man berechnet, welche Ablenkungen man, in der Annahme dieses Werths von  $x$  oder dieses *Widerstandes* in der Kette selbst und im Gewinde der Bussole, beobachten würde, so erhält man folgende Tafel:

Länge der hinzugefügten Drahtstücke.	Gesamtlängen d. Bogens bei An- nahme von 0 <sup>m</sup> ,52 für die Kette	Ablenkungen		Unter- schiede.
		beobachtet.	berechnet.	
0 Met.	0 <sup>m</sup> ,52	64° 30'	64° 30'	0
1	1,52	35 15	35 32	-17'
2	2,52	24 00	23 51	+ 9
4	4,52	13 40	13 37	+ 3
8	8,52	7 30	7 18	+12
16	16,52	3 40	3 47	- 7

Die Unterschiede zwischen Beobachtung und Rechnung fallen so vollständig innerhalb der Gränze der Beobachtungsfehler, daß man das Princip der Rechnung nicht anders als für strenge richtig halten kann.

Wir fügen hier noch zwei analoge Reihen hinzu, eine gemacht mit einem Elemente *A*, und die andere mit einem Elemente *B*:

Hinzugefügte Drahtlänge.	Beobachtete Ablenkung	Tangenten der Ab- lenkung oder In- tensitäten.	Länge des Ele- ments oder Widerstands.
Element A. — Kupferdraht			
0 Met.	62°	1,880	
5	40 20'	0,849	4 <sup>m</sup> ,11
10	28 30	0,543	4 ,06
40	9 45	0,172	4 ,03
70	6 00	0,105	4 ,11
100	4 15	0,074	4 ,09

Mittel 4<sup>m</sup>,08

Element B — Voriger Kupferdraht.			
0 Met.	54° 30'	1,400	
5	24 00	0,674	4 <sup>m</sup> ,64
10	24 20	0,452	4 ,77
40	8 30	0,150	4 ,80
70	5 10	0,090	4 ,81
100	3 40	0,064	4 ,71

Mittel 4<sup>m</sup>,75

Vergleich zwischen Beobachtung und Rechnung.

Gesamtlängen	Ablenkungen.		Unterschiede.
	Beobachtet.	Berechnet.	
Plattenpaar A.			
4,08	62° 0'	62° 0'	
9,08	40 20	40 18	+ 2'
14,08	28 30	28 41	- 11
41,08	9 45	9 56	- 11
71,08	6 0	5 57	+ 3
104,08	4 15	4 14	+ 1

Plattenpaar B.			
4,75	54° 30'	54° 30'	
9,75	34 0	34 15	- 15
11,75	24 20	24 20	0
41,75	8 30	8 27	+ 3
74,75	5 10	5 6	+ 4
104,75	3 40	3 37	+ 3

Eine große Zahl anderer Reihen, gemacht mit Drähten von verschiedener Natur, führte zu demselben Resultat, d. h. zu dem allgemeinen Gesetz: *dass die Intensität des Stroms von einer einfachen Kette (einem Element) sich umgekehrt verhält, wie die wahre Länge der Kette.*

Analoge Versuche zeigten, dass der Widerstand des Elements oder die ursprüngliche Länge der Kette ausgedrückt wird durch Längen, die proportional sind dem Querschnitt und der Leitungsfähigkeit des Drahtes, welcher die scheinbare Länge der Kette bildet.

Es folgt daraus, dass die Intensität des von einem Plattenpaar erzeugten Stromes ausgedrückt wird durch die allgemeine Formel:

$$\frac{csr + cs}{csr + l},$$

worin  $c$  die Leitungsfähigkeit des Bogens der Kette,  $s$  sein Querschnitt,  $l$  seine scheinbare Länge und  $r$  der Widerstand des Elements für einen Bogen, dessen Leitungsfähigkeit und Querschnitt zur Einheit angenommen sind.

Daraus, dass die beobachtete Intensität des Stromes sich umgekehrt wie die wahre Länge der Kette verhält, kann man den wichtigen Schluss ziehen, *dass der von einer einfachen Kette erzeugte Strom einen constanten elektro-dynamischen Effect auszuüben vermag.* Denn der an der Magnethadel beobachtete Effect wird nur durch einen Bruchtheil der wahren Länge der Kette erzeugt, und wenn man die wahre Länge der Kette z. B. verzehnfacht, so wird dieser Bruch zehn Mal kleiner, während man zugleich eine zehnfach geringere Intensität erhält. Es ist also einleuchtend, dass man in beiden Fällen *gleiche Intensität* beobachten würde, wenn man unter denselben Umständen und unter denselben Bedingungen die vollen Längen der Ketten auf die *Magnethadel* einwirken lassen könnte.

Dieser Satz ist durchaus fundamental für die Theorie, weil er zeigt, daß die unbekannte Modification, welche den Strom ausmacht, einer Bewegungsgröße gleich zu achten ist, die wesentlich constant bleiben muß, wie groß auch die Masse ist, auf welche sie sich verbreitet. Wenn man demnach die beiden Pole eines Volta'schen Elementes mit einem Draht von einem Meter oder von 1000 Metern Länge verbindet, so geht in dem einen und dem anderen Falle nicht mehr und nicht weniger Elektrizität durch denselben. Die durchgehende Menge bleibt constant, und bloß von der Menge abhängig, welche das Element, oder überhaupt die Elektrizitätsquelle für sich liefert.

4) *Abgeleitete Ströme.* — Berührt man mit den beiden Enden eines Drahts zwei Punkte eines Bogens, welchen ein Strom durchläuft, so ist klar, daß an diesen beiden Punkten, welche *Ableitungspunkte* heißen mögen, eine Theilung des Stromes stattfinden wird. Ein Theil des Stromes fährt fort, wie vorhin, seinen Weg durch den Bogen zu nehmen, ein anderer aber durchläuft den angelegten Draht seiner ganzen Länge nach. Dieser letztere Theil heiße *abgeleiteter Strom*; der dagegen, welcher den alten Bogen zwischen den Ableitungsquellen durchläuft, *theilweiser Strom*; ferner heiße der Strom, welcher vor und nach den Ableitungspunkten die Kette durchläuft, *Hauptstrom*, und endlich der Strom, welcher, ehe die Ableitung gemacht wurde, durchging, *ursprünglicher Strom*.

Mittelst der *Tangentenbussole* und der *Sinusbusssole* wurden die Intensitäten des abgeleiteten, des theilweisen und des Haupt-Stromes gemessen, und dadurch folgende allgemeine Gesetze aufgefunden:

1) Sobald eine Ableitung gemacht wird, nimmt der ursprüngliche Strom an Intensität zu; also ist der Hauptstrom immer stärker als der ursprüngliche Strom.

2) Die Intensität des abgeleiteten Stromes ist proportional dem gegenseitigen Abstand der Ableitungspunkte.

3) Bei gleichem Abstände verhält sich diese Intensität umgekehrt wie der Querschnitt und die Leitungsfähigkeit desjenigen Theils vom Bogen, wo die Ableitung gemacht ist.

4) Die Summe der Intensitäten des theilweisen Stromes und des abgeleiteten Stromes ist gleich der Intensität des Hauptstroms.

Aus diesen und den vorhin aufgestellten Gesetzen ergeben sich für die Intensitäten  $x$ ,  $y$ ,  $z$  des Hauptstromes, des theilweisen und des abgeleiteten Stromes folgende Formeln:

$$\begin{aligned} x &= \frac{T(pk+1)}{pk+1-n} \\ y &= \frac{Tp k}{pk+1-n} \\ z &= \frac{T}{pk+1-n}. \end{aligned}$$

$T$  ist die Intensität des ursprünglichen Stromes;  $n$  der Bruch, der den gegenseitigen Abstand der Ableitungspunkte im Verhältniß zur gesammten Länge der Kette ausdrückt;  $k$  die Länge des Ableitungsdrabtes im Verhältniß zur gegenseitigen Entfernung der Ableitungspunkte;  $p$  das Verhältniß des Querschnitts des Hauptdrabtes zum Querschnitt des Ableitungsdrabtes, diese Querschnitte reducirt, wenn die Leitungsfähigkeit verschieden ist.

5) *Versuche mit einer Säule von sechs Elementen und allgemeine Formeln für die Intensität der Säulen.* — Sechs Elemente, wie die zu den vorigen Versuchen angewandten, wurden eingerichtet, und die Intensität und der Widerstand einer jeden einzeln auf die angegebene Art untersucht. Die folgende Tafel enthält die Resultate dieser Versuche:



No. d. Elemente.	Drahtlänge, hinzugefügt d. Elemente.	Beobachtete Ablenkungen.	Tangenten oder Intensitäten.	Wider- stände.
1.	0 <sup>m</sup>	69° 00'	2,600	0 <sup>m</sup> ,00
	5	43 20	0,943	2 ,85
	10	30 00	0,577	2 ,85
	40	11 00	0,194	3 ,20
	Mittel			2 <sup>m</sup> ,97
2.	0 <sup>m</sup>	66° 30'	2,300	0 ,00
	5	43 00	0,933	3 ,41
	10	29 40	0,570	3 ,35
	40	10 40	0,188	3 ,55
	Mittel			3 <sup>m</sup> ,44
3.	0 <sup>m</sup>	67° 40	2,434	0 ,00
	5	42 30	0,916	3 ,02
	10	29 40	0,570	3 ,05
	40	10 20	0,182	3 ,23
	Mittel			3 <sup>m</sup> ,10
4.	0 <sup>m</sup>	67° 00	2,355	0 <sup>m</sup> ,00
	5	42 30	0,909	3 ,19
	10	29 40	0,570	3 ,19
	40	10 20	0,182	3 ,35
	Mittel			3 <sup>m</sup> ,25
5.	0 <sup>m</sup>	68° 00	2,475	0 <sup>m</sup> ,00
	5	43 20	0,943	3 ,08
	10	30 30	0,589	3 ,13
	40	11 00	0,194	3 ,40
	Mittel			3 <sup>m</sup> ,21
6.	0 <sup>m</sup>	64° 00	2,050	0 <sup>m</sup> ,00
	5	41 00	0,869	3 ,68
	10	28 40	0,548	3 ,64
	40	10 00	0,176	3 ,75
	Mittel			3 <sup>m</sup> ,69.

Mithin hatten diese Elemente beinahe gleiche Kraft; nur das sechste war von merklich geringer Kraft.

Es wurden hierauf alle diese Elemente zu einer Säule von sechs Elementen vereinigt. Die Intensität dieser Säule war so groß, daß sie Platindraht von  $\frac{1}{4}$  Millimeter Dicke und 20 Centimeter Länge zum Glühen brachte.

Man ließ ihren Strom durch die Tangentenbussole gehen, und erhielt dann mit demselben Kupferdraht, der zur Untersuchung des Widerstandes der einzelnen Elemente gedient hatte, folgende Resultate:

Hinzugefügte Drahtlänge	Beobachtete Ablenkungen.	Tangenten der Ablenkungen.	Widerstände.
0	68° 30'	2,538	
5	63 20	1,991	18°,20
10	58 30	1,632	19 ,03
40	39 00	0,810	18 ,01
70	28 00	0,532	18 ,56
100	21 30	0,394	18 ,38
Mittel			18°,43.

Wenn man sechs Elemente zu einer Säule von eben so vielen Elementen an einander reht, so hat der von dem einen Element erzeugte Strom nicht bloß die Leiter des Apparates, sondern auch die fünf andern Elemente zu durchlaufen, und er muß demnach proportional der Drahtlänge, die den Widerstand dieser Elemente repräsentirt, schwächer werden. Will man also die Intensität dieses Elementes, sobald es einen Theil der Säule ausmacht, kennen lernen, so muß man sie berechnen nach der wahren Länge des neuen Bogens, welchen ihr Strom durchläuft. Gleiches gilt von den übrigen Elementen. Macht man diese Rechnungen und addirt die so berechneten individuellen Intensitäten der sechs Elemente, so findet man alle beobachteten Intensitäten wieder, sowohl

für die Säule allein, als für die verschiedenen Bogen, bestehend aus der Säule und dem 5", 10", 40", 70", oder 100" langen Draht.

Durch Verallgemeinerung dieser Resultate gelangt man zu der folgenden Formel, welche die Intensität einer Säule durch die Intensitäten ihrer einzelnen Elemente ausdrückt:

$$\frac{r_1 l_1 + r_2 l_2 + \dots + r_n l_n}{r_1 + r_2 + \dots + r_n - (n-1)a + l}$$

$r_1, r_2 \dots r_n$  sind die Widerstände der einzelnen Elemente;  $l_1, l_2 \dots l_n$  die Intensitäten derselben;  $a$  die Länge des Drahts, welche den Widerstand der Busssole vorstellt; in dem vorhergehenden Versuch war  $a=0^{\text{m}},26$ ;  $l$  die Länge des dem Bogen der Säule hinzugefügten Drahts.

Die für ein einzelnes Element bewiesenen Sätze finden demnach ihre Anwendung auch auf eine Säule von beliebig vielen Elementen, und man kann also auch mit Wahrheit sagen: *dass die Intensität einer Säule sich umgekehrt verhält wie die Länge ihres Weges (circuit) und dass eine Säule fähig ist einen constanten elektrodynamischen Effect hervorzubringen.*

Dies Resultat erklärt, was man Spannung der Säule nennt; denn wenn man ein Element mit grossen Flächen macht, dessen Intensität durch  $T$ , und dessen Widerstand durch  $R$  bezeichnet wird, und der Strom dieses Elements muss eine Länge  $l$  des vorhergehenden Drahts durchlaufen, so wird seine Intensität seyn:

$$\frac{RT}{R+l}$$

Nun wäre es leicht diesem Elemente eine so grosse Oberfläche zu geben, dass, wenn man  $l=0$  machte, seine Intensität  $T$  grösser würde als die einer Säule aus  $n$  kleineren Elementen; allein wenn man  $l$  einen selbst sehr kleinen Werth ertheilt, nimmt seine Intensität im Allgemeinen in einem ausserordentlichen Verhältnisse ab,

während die Intensität der Säule fast constant bleibt. Damit also ein Element in dieser Beziehung mit einer Säule verglichen werden könnte, müßten  $R$  und  $T$  zugleich sehr groß seyn, was durch einige sehr kräftige chemische Actionen verwirklicht werden kann, wenn man überdiß einige andere Bedingungen erfüllt.

6) *Versuche mit mehreren, Pol an Pol gereihten Elementen.* — Zur Bestimmung des Intensitätsgesetzes der Ströme mehrer Elemente, die Pol an Pol gereiht sind, und folglich ein einziges Element (eine einfache Kette) mit großer Oberfläche bilden, wurden die Elemente  $A$  und  $B$ , deren individuelle Intensitäten S. 287 angeführt sind, mit ihren gleichnamigen Polen verbunden. Die Resultate waren dann folgende:

Elemente  $A$  und  $B$  zur einfachen Kette verbunden.

Hinzugefügte Drahtlängen	Ablenkungen.	Tangenten.	Widerstände.
0 <sup>m</sup>	73° 0'	3,270	
5	45 0	1,900	2 <sup>m</sup> ,20
10	30 30	0,589	2 ,20
40	9 30	0,167	2 ,15
70	5 40	0,100	2 ,20
100	4 0	0,070	2 ,20

Mittel 2<sup>m</sup>,20.

Bei diesem Versuche muß man annehmen, daß das Element  $B$  eine Ableitung in dem Strome des Elements  $A$  mache, und daß umgekehrt  $A$  eine Ableitung in dem Strome von  $B$  hervorbringe. Mitbin ist die Intensität des Stromes, der durch die Bussole geht, die Summe beider partiellen Ströme. Berechnet man sie so nach dem im Paragraph über die abgeleiteten Ströme gegebenen Formeln (S. 290), so erhält man Resultate, die in folgender Tafel mit der Beobachtung verglichen sind:

Hinzuge- fügte Draht- länge.	Beobachtete Ablenkungen.	Tangenten.	Berechnete und durch die Summe d. partiellen Ströme gegebene Intensitäten.	Un- ter- sch.	
0"	73° 00'	3,276	$\left\{ \begin{array}{l} 1,400 \\ 1,880 \end{array} \right\}$	3,28	—3'
5	45 00	1,000	$\left\{ \begin{array}{l} 0,425 \\ 0,577 \end{array} \right\}$	1,002	—5
10	30 30	0,589	$\left\{ \begin{array}{l} 0,253 \\ 0,337 \end{array} \right\}$	0,590	—3
40	9 30	0,167	$\left\{ \begin{array}{l} 0,070 \\ 0,095 \end{array} \right\}$	0,165	+7
70	5 40	0,0992	$\left\{ \begin{array}{l} 0,0432 \\ 0,0577 \end{array} \right\}$	0,1009	—6
100	4 00	0,0700	$\left\{ \begin{array}{l} 0,0303 \\ 0,0407 \end{array} \right\}$	0,071	—3

Also auch in diesem Falle addiren und superponiren sich gewissermaßen die individuellen Ströme beider Elemente, ohne irgend eine besondere Modification zu erleiden. Diefs Resultat ist in mehr als einer Beziehung merkwürdig; denn es zeigt, daß ein Draht, der von einem Strom durchlaufen wird, noch eben so fähig ist, einen zweiten Strom aufzunehmen, selbst wenn dieser aus einer Quelle von geringerer Spannung her stammt. Diefs beweist abermals, daß die Ströme als Bewegungsgrößen angesehen werden müssen, und daß man die Elektrizitätsleiter nicht als Röhren betrachten darf, die eine Flüssigkeit durchlassen, und desto mehr Widerstand darbieten, als sie länger sind, so daß die Flüssigkeit an Geschwindigkeit oder Menge abnehme, und gezwungen sey, entweder nach der Quelle zurückzulließen oder wenigstens sich daselbst in größerer Menge anzuhäufen.

Die Versuche führen zu folgender allgemeiner Formel für die Intensität des Stroms, der von mehreren, zu einer einfachen Kette vereinigten Elementen erzeugt wird:

$$\frac{r_1 r_2 r_3 \dots r_n (l_1 + l_2 + l_3 + \dots l_n)}{r_1 r_2 r_3 \dots r_n + l (r_2 r_3 \dots r_n + r_1 r_3 \dots r_n + \dots)}$$

Für den Fall, daß alle Elemente gleiche Intensität und gleichen Widerstand darböten, würde die Formel:

$$\frac{n r^n l}{r^n + n l r^{n-1}} \quad \text{oder} \quad \frac{n r l}{r + n l}.$$

Mithin ist für  $l=0$  die Intensität  $nl$ .

Sobald man aber dem Bogen der bloßen Elemente eine Drahtlänge  $l$  hinzufügt, die dem  $n$ -fachen des Widerstandes  $r$  eines der Elemente gleichwerthig ist, wird die Intensität:

$$\frac{n l}{1 + n^2},$$

d. h. in diesem Fall nimmt sie sehr rasch mit vermehrter Anzahl der Elemente ab, so rasch, daß die Intensität eines einzigen Elements zehn Mal größer seyn würde als die Intensität einer Säule von zehn Elementen.

7) Die Gesammtheit der in dieser Abhandlung enthaltenen Versuche führt als Endergebnis zu folgenden zwei allgemeinen, und ihrer Einfachheit wegen merkwürdigen Gesetze:

1) *Eine Elektrizitätsquelle vermag einen constanten elektro-dynamischen Effect hervorzubringen, von welcher Natur und Größe auch der von ihrem Strom durchlaufene Metallbogen seyn mag.*

2) *Wenn mehre Elektrizitätsquellen vereinigt werden, so addiren und superponiren sich ihre Effecte, ohne einander zu modificiren.*

Schon sehr vervielfältigte Versuche berechtigen auch zu dem Glauben, daß eine Elektrizitätsquelle eine *constante Wärmemenge* zu erzeugen vermöge, und daß es möglich sey aus den Wärmemengen, oder aus den Mengen des geschmolzenen Eises die durch Säulen, oder durch chemische Reactionen, oder überhaupt durch Elektrizitätsquellen gelieferten *Elektrizitätsmengen* zu berechnen.



**VII. Ueber die relative Messung thermo-elektrischer Quellen und über die Elektrizitätsmengen, welche zur Zersetzung von einem Gramm Wasser, so wie zur Hervorbringung von mehr oder weniger starken Erschütterungen unter festgesetzten Umständen erforderlich sind; von Hrn. Pouillet.**

(Compt. rend. T. V p. 785 — Ein vom Verfasser gemachter Auszug der Abhandlung.)

**1) Vergleich der thermo-elektrischen mit den hydro-elektrischen Quellen.**

Alle thermo-elektrischen Quellen können unter sich verglichen werden, nach den Gesetzen, die in einer im J. 1831 der Academie übergebenen Abhandlung entwickelt sind. Alle hydro-elektrischen Quellen lassen sich mit einander vergleichen, nach den Gesetzen, die ich in einer am 20. Febr. 1837 der Academie überlieferten Abhandlung (nämlich der vorhergehenden. P.) auseinandergesetzt habe.

Es blieb noch übrig, diese beiden Arten von elektrischen Quellen, die, obwohl denselben Gesetzen unterworfen, doch in Natur und Eigenschaften so verschiedenen sind, hinsichtlich ihrer relativen Intensität mit einander zu vergleichen. Um dies zu erreichen, wählte man folgendes Verfahren an: Man disponirte auf eine zweckmäßige Weise einen Platindrath von 0,144 Millimeter Dicke und 200 Meter Länge aus einem Stück. Man bestimmte den Widerstand einer gewöhnlichen Volta'schen Säule von 12 Plattenpaaren, und leitete deren Strom durch die pyrometrische Bussole <sup>1)</sup> und

1) Annalen, Bd. XXXIX S. 567.

durch ein so lauges Stück des Platindrahts, daß die Ablenkung in der Bussole auf  $16^\circ$  zurückgeführt wurde. Die gesammte Länge der hydro-elektrischen Kette betrug nun 180 Meter Platindraht. Hierauf leitete man durch dieselbe Bussole einen thermo-elektrischen Strom, erzeugt durch eine Wismuth-Kupfer-Quelle, der, die Bussole mit begriffen, eine Länge von 21 Metern an 1 Millimet. dickem Kupferdraht durchlaufen mußte. Die Abweichung war, bei einem Temperaturunterschied von  $42^\circ,4$  C., gleichfalls  $16^\circ$ . Die Leitungsfähigkeit des Kupferdrahts dieser Kette war 6,5 gegen die des Platindrahts. Aus diesen Angaben ergibt sich leicht, daß die Intensität der hydro-elektrischen Kette 113924 Mal so groß war, als die eines Wismuth-Kupfer-Elements, das durch einen Temperatur-Unterschied von  $1^\circ$  angeregt wird, und einen 21 Meter langen Bogen von 1 Millimeter dickem Kupferdraht hat.

Dieses Verfahren kann in allen Fällen angewandt werden; nur wird es eben so verschiedene Resultate ergeben, als man verschiedene Quellen anwendet. Mit hin können alle elektrische Quellen auf eine und dieselbe Einheit zurückgeführt werden, und ich weise nach, wie sich diese Einheit ihrerseits auf die Intensität des Erdmagnetismus beziehen läßt, und wie sie (die letztere Intensität) für die Messung elektrischer Quellen eine eben so unveränderliche Einheit werden kann, als es die Grade des Thermometers für die Messung der Temperaturen sind.

## 2) Relative Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten und Metalle.

Das Leitungsvermögen der schlechtest leitenden Metalle ist immer noch so ungeheuer stark gegen das der best leitenden Flüssigkeiten, daß man noch keinen genauen Vergleich zwischen beiden hat ausstellen können, *obwohl dieser Vergleich eins der wesentlichsten Elemente*

in der Theorie der Elektrizität ausmacht. Diese Untersuchung wurde auf folgende Weise vorgenommen. Es wurde zuvörderst durch eine große Anzahl Versuche ermittelt, daß, bei Flüssigkeiten wie bei Metallen, die Leitungsfähigkeit im umgekehrten Verhältniß der Länge und im geraden des Querschnitts steht, sobald nur bei der Flüssigkeitssäule die Länge wenigstens fünf bis sechs Mal die Breite übertrifft. Daraus folgt, daß die Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten streng mit der der Metalle vergleichbar ist. Dies vorausgesetzt, wurde als Flüssigkeit eine gesättigte Auflösung von schwefelsaurem Kupferoxyd von  $15^{\circ}$  bis  $16^{\circ}$  C. Temperatur genommen, um sie mit einem 200 Meter langen Platindraht zu vergleichen. Zu dem Ende leitete man den Strom einer Säule durch die pyrometrische Bussole und durch eine Säule von Kupfervitriollösung von 1 Meter Länge und 20 Millimeter Durchmesser. Die Ablenkung betrug  $22^{\circ}$ . Hierauf leitete man denselben Strom durch einen Platindraht von solcher Länge, daß die Ablenkung wiederum  $22^{\circ}$  betrug. Es ergab sich, daß dazu der Platindraht 132 Meter lang genommen werden mußte.

Aus diesen Angaben ist leicht zu folgern, daß die Leitungsfähigkeit des Platins:

2346680

Mal so groß ist, als die der gesättigten Kupfervitriollösung<sup>1)</sup>. In Bezug auf die Leitungsfähigkeit dieser Lösung ist die des metallischen Kupfers folglich mehr als 16 Millionen, und die des Palladiums mehr als 30 Millionen.

Die Kupfervitriollösung verliert an Leitungsfähigkeit, so wie sie sich vom Sättigungspunkt entfernt, doch aber nicht sehr rasch, wie man aus nachstehender Tafel ersieht:

1) Die Zahl ist offenbar zu groß, oder vielmehr die Leitungsfähigkeit der Kupfervitriollösung zu gering geschätzt, da der Verfasser nicht auf den Widerstand des Uebergangs Rücksicht genommen hat. 2.

	Leitungsfähigkeit.
Kupfervitriollösung, gesättigt	1,00
dito, verdünnt mit 1 Vol. Wasser	0,64
dito, - - 2 - -	0,44
dito, - - 4 - -	0,31.

Immer die Leitungsfähigkeit der gesättigten Kupferlösung gleich Eins gesetzt, ist die

der gesättigten Zinkvitriollösung	0,417
des reinen Wassers	0,0025
Wasser mit 70000 Salpetersäure	0,015.

Bei den Versuchen, aus denen obige Resultate gezogen wurden, stand Kupfer in der Kupfervitriollösung, und Platin in dem reinen oder gesäuerten Wasser.

### 3) Erforderliche Elektricitätsmenge zur Zersetzung von 1 Gramm Wasser.

In einem Strome von unveränderlicher Intensität sind die circulirenden oder sich bewegenden Elektricitätsmengen offenbar proportional der Dauer der Strömung, d. h. in der doppelten Zeit bewegt sich eine doppelte Menge von Elektricität. Um zu erfahren, ob in einem solchen Strom die Elektricitätsmenge auf die Hälfte reducirt sey, wenn die elektro-magnetische Intensität desselben nur halb so groß ist, verfuhr man folgendermaßen: Man verfertigte einen Mechanismus, durch welchen die Kette sehr oft in einer Secunde geöffnet und geschlossen, der Strom also eben so oft unterbrochen und wieder hergestellt werden konnte <sup>1)</sup>. Die Dauer der Unterbrechungen war genau der Dauer der Wiederherstellungen gleich. Bei nicht sehr zahlreichen Unterbrechungen erfuhr die Bussolnadel Oscillationen; allein sobald die Unterbrechungen auf 140 bis 150 in der Secunde stiegen, blieb die Nadel unbeweglich, wie wenn ein ununterbrochener Strom auf sie einwirkte. Sie zeigte nun eine Intensität

1) Also eine Art Blütsrad (s. Annal. Bd. XXXVI S. 352).

an, genau halb so groß als die ursprüngliche. Von diesem Augenblick an blieb sie fortwährend unbeweglich, und zeigte unausgesetzt die halbe Intensität an, selbst als die Unterbrechungen auf 3000 in einer Secunde stiegen.

Wenn nun z. B. 1000 Schließungen und 1000 Unterbrechungen in der Secunde statt haben, kann man annehmen, daß die Elektrizität, welche während jeder Schließung übergeht, in zwei gleiche Theile zerfalle, von dem einer zurückgelegt wird, um während der nächsten Unterbrechung überzugehen. Man würde sonach einen continuirlichen Strom haben, bei welchem bloß in einer Secunde die Hälfte der Elektrizität des ursprünglichen Stromes überginge, und weil die von der Bussole angegebene Intensität auch nur die Hälfte der ursprünglichen Intensität ist, so ist man berechtigt anzunehmen, daß die Menge der Elektrizität proportional sey der Intensität des Stromes. Hat man also zwei Ströme, erzeugt durch irgend welche Quellen, so braucht man nur ihre relativen Intensitäten zu beobachten, um auch die Messung der sie bedingenden Elektrizitätsmengen zu haben, und weil ein und dieselbe Elektrizitätsquelle Ströme giebt, deren Intensitäten im umgekehrten Verhältniß der Länge des Bogens und im geraden Verhältniß des Querschnitts und der Leitungsfähigkeit stehen, so folgt noch daraus, daß ein und dieselbe Elektrizitätsquelle unausgesetzt veränderliche und nach diesen nämlichen Gesetzen veränderliche Elektrizitätsmengen giebt.

Um nun die Intensitäten oder *Spannungen* der Quellen unter einander zu vergleichen, nenne man *Quellen von gleicher Intensität oder gleicher Spannung* diejenigen, die innerhalb desselben Kreises Ströme von gleicher Intensität hervorbringen, und dann wird eine Quelle die doppelte oder dreifache Spannung einer anderen haben, wenn sie, in demselben Kreise, Ströme von doppelter oder dreifacher Intensität hervorbringt.

wohl verstanden, daß es sich hier um den ganzen Kreis oder die ganze Kette handelt, darin die Quelle selbst und deren Widerstand mit inbegriffen, berechnet nach dem Gesetz der Leitungsfähigkeit.

Aus diesen Definitionen folgt:

1) Daß die Spannung einer jeglichen Quelle unabhängig ist von der Größe der Elemente (Plattenpaare).

2) Daß in jeglicher Säule die Spannung immer gleich ist der Summe der Spannungen aller Quellen oder aller Elemente der Säule.

Nimmt man als Spannungseinheit die Spannung einer thermo - elektrischen Wismuth - Kupfer - Quelle bei einem Temperaturunterschied von  $100^{\circ}$  C., und als Einheit der Elektrizitätsmenge diejenige Menge, welche diese Quelle in einem Bogen von einem 20 Meter langen Kupferdraht, dessen Querschnitt und Leitungsfähigkeit zur Einheit angenommen sind, innerhalb einer Minute giebt, so folgt endlich, daß die Spannung  $T$  irgend einer Quelle, und die Elektrizitätsmenge  $Q$ , welche diese Quelle in einer Minute in Bewegung setzt, gegeben sind durch folgende Gleichungen:

$$T = \frac{20}{L'} \cdot \frac{1}{b} \cdot \frac{\sin D'}{\sin D} ; \quad Q = \frac{1}{b} \cdot \frac{\sin D'}{\sin D} .$$

Hierin ist  $D$  die Ablenkung, die durch den zur Einheit angenommenen Strom in irgend einer Busssole hervorgebracht wird.  $D'$  ist die Ablenkung, welche der zu messende Strom in irgend einer anderen Busssole hervorbringt, und das Verhältniß der Empfindlichkeit dieser Busssole zu der vorigen ist  $\frac{1}{b}$ . Endlich ist  $L'$  in

Metern die Länge des Bogens, welchen der Strom der auf ihre Spannung zu messenden Quelle zu durchlaufen hat, der Bogen ausgedrückt in Kupferdraht von dem Querschnitt 1 und der Leitungsfähigkeit 1.

Um nun die zur Zersetzung von einem Gramm Wasser erforderliche Elektrizitätsmenge zu finden, bleibt zu



beweisen, daß diese Menge constant sey, d. h. unabhängig von der Intensität des Stroms. Dieser, von Herrn Becquerel schon bei der Zersetzung des salpetersauren Kupfers aufgestellte Satz <sup>1)</sup> findet sich für Wasser bestätigt durch verschiedene Reihen von Versuchen, ähnlich der in folgender Tafel aufgestellten:

No. des Versuchs.	Flüssigkeit.	Metall der Pole		Zeit zur Entwicklung von 2 C. C. Wasserstoffgas.	Ablenkung der Nadel.	Sinus der Ablenkung oder Intensität.	Product aus d. Intensität und Zeit.
		positiver Pol.	negativer Pol.				
1	A	P	P	498"	5° 50'	0,1016	50,60
2		-	-	510	5 40	0,0987	50,34
3	B	-	-	725	4 00	0,0697	50,53
4		-	-	728	4 00	0,0697	50,74
5		-	-	919	3 10	0,0552	50,73
6	C	-	-	417	6 50	0,1190	49,62
7		-	-	423	6 45	0,1175	49,70
8		K	-	251	11 20	0,1965	49,32
9		-	-	247	11 30	0,1994	49,25
10		-	-	247	11 30	0,1994	49,25
11		Z	-	239	12 00	0,2080	49,71
12		-	-	258	11 00	0,1908	49,21
13		P	-	684	4 10	0,0724	49,50
14	D	-	-	77	40 00	0,6428	49,50

A bedeutet destillirtes Wasser mit Schwefelsäure, B dieselbe Flüssigkeit, verdünnt mit gleichem Volum destillirten Wassers, C gewöhnliches Wasser mit Schwefelsäure, D verdünnte Schwefelsäure, P Platin, K Kupfer, Z Zink.

Diese Tafel zeigt in der That, daß unter sehr verschiedenen Umständen, und bei Intensitäten, die von 1 bis 12 schwankten, die zur Entwicklung von 2 Kubikcentimeter Wasserstoffgas erforderliche Zeit beinahe constant ist; und dies beweist, daß die Elektrizitätsmenge,

1) Siehe den folgenden Aufsatz.

welche diese Wirkung hervorbrachte, ebenfalls beinahe constant ist. Zur Bestimmung des Werthes dieser Elektricitätsmenge  $Q$ :

$$\frac{1}{b} = 17,3 ; \sin D' = 0,1001 ; \sin D = 0,6510,$$

dieses giebt  $Q = 2,665$ , und da der Versuch  $20'' - 8''$  gedauert hat, so wird diese Menge  $= 22,208$ , als Einheit dabei die in einer Minute übergehende, angenommen.

Daher ist zur Entwicklung von 2 C.C. Wasserstoffgas und also zur Zersetzung von 1 Gramm Wasser eine Elektricitätsmenge erforderlich, die ausgedrückt wird durch:  
13787,

d. h. eine Menge, die 13787 Mal grösser ist als die, welche in einer Wismuth-Kupferkette von 10 Meter langem und 1 Meter dickem Kupferdraht, bei  $100^\circ$  Temperaturunterschied an den Löthstellen, in einer Minute übergeht.

Diese Zahl reicht hin, um die zu jeder anderen chemischen Zersetzung erforderliche Elektricitätsmenge auszudrücken, weil, nach dem von Hrn. Faraday entdeckten und von Hrn. Becquerel bestätigten so merkwürdigen Gesetz, die Zahlen, welche die chemischen Äquivalente der verschiedenen Substanzen vorstellen, auch die wägbaren Mengen dieser Substanzen ausdrücken, welche durch Einen Strom, und folglich durch Eine Elektricitätsmenge zersetzt werden.

4) Intensitäten, die zur Hervorbringung mehr oder weniger starker elektrischer Schläge erforderlich sind.

Die physiologischen Effecte wurden gemessen mit einer sehr empfindlichen Busssole, deren Multiplicator 240 Windungen hatte. Die Ellipse der nächsten Windungen der Nadel hatte eine grosse Axe von 10 Centimetern und eine kleine von 2 Centimetern.

Zuvörderst wurde ermittelt, dass der Strom, der von einer Hand zur andern überging, wenn beide Hände be-

rührte

näfst und in Quecksilber getaucht waren, eben so geschwächt wurde, wie wenn er einen 11 Lieues langen Kupferdraht von 1 Millimeter Dicke durchlaufen hätte, und daß der Strom, welcher an einer und derselben Hand von einem Finger zum andern, wenn diese Finger benüßt und bis zur Hälfte oder zum Drittel des ersten Gliedes in Quecksilber getaucht waren, überging, eine gleiche Schwächung erlitt, wie beim Durchgang durch ein 77 Lieues langes Stück desselben Kupferdrahts.

Hierauf verglich man die elektrischen Intensitäten, die zur Hervorbringung der schwächsten noch wahrnehmbaren Erschütterungen und der unerträglichsten erforderlich waren, und fand, daß, bei gleichbleibenden Communicationen, diese Intensitäten sich wie 1 : 18 oder 1 : 20 verhielten.

Die Eigenthümlichkeiten dieser Erschütterungen, ihre wachsende Intensität vom ersten Fingergliede bis zum Handgelenk und Ellbogen, schienen durch bloße Betrachtung der Leitungsfähigkeit und der Theilung der Elektricität zwischen den verschiedenen organischen Leitern leicht erklärlich.

Alle diese Beobachtungen lassen schließen, daß das elektrische Fluidum seine Effekte fühlbar macht, nicht vermöge der Summe der ausgeübten Actionen, sondern vermöge der Intensität der individuellen Actionen auf jede der Fibern, welche zur Aufnahme und Fortpflanzung seiner Eindrücke bestimmt sind, und daß es in dieser Beziehung auf ähnliche Art wirkt wie das Licht.

6) Untersuchung der mechanischen Bedingungen zur Bewegung der Elektricität, und daraus hervorgehendes allgemeines Princip.

In der Unmöglichkeit, hier in eine Untersuchung dieser Bedingungen einzugehen, mag es genügen, die vier dieses Princip ausdrückenden Propositionen hinzustellen.

*Proposition I.* Der Strom erzeugt sich nicht auf

eine continuirliche Weise, sondern mit Intermittenzen, deren Dauer, obwohl immer äußerst kurz, dennoch immer abhängig ist von der Spannung der Quelle, von der Länge, dem Querschnitt und der Leitungsfähigkeit der Kette.

*Proposition II.* Jede Intermittenz besteht aus zwei Perioden, eine, welche man die Periode der Decomposition oder Polarisation, und eine andere, welche man die Periode der Recomposition oder Depolarisation nennen kann.

*Proposition III.* Die Polarisation kommt in einer gegebenen und veränderlichen, doch immer ungemein kurzen Zeit zu Stande, und zwar nothwendig in der ganzen Kette bevor die Depolarisation eintreten kann. Diese Polarisation scheint eine Art Zersetzung durch Einfluß (*decomposition par influence*) zu seyn, welche auf jedes Molecül, oder allgemeiner auf jedes elektrische Element ausgeübt wird. Die Dauer der Polarisation ist, wenn die polarisirende Kraft dieselbe bleibt, proportional der Länge der Kette und der Menge der polarisirten Flüssigkeiten; sie steht aber zur Elektricitätsleitung der Kette im umgekehrten Verhältniß, und ist unabhängig von der Größe des Querschnitts derselben.

*Proposition IV.* Die Wiedierzusammensetzung ist dauerlos und gleichzeitig, d. h. sie geschieht in Bezug auf die zur Polarisation oder Zersetzung erforderlichen Zeit in einer unmeßbaren Zeit, und zwar gleichzeitig zwischen allen elektrischen Elementen der Kette, die vorher polarisirt seyn mußten.

Sobald die Wiedierzusammensetzung geschehen ist, tritt, wenn die Ursache fortwirkt, die Polarisation bei allen Elementen der Kette wieder ein, und wenn sie überall eine gleiche und den besonderen Umständen der Quelle und der Kette angemessene Stärke erlangt hat, folgt ihr abermals eine Wiedierzusammensetzung und so fort.

VIII. *Beschreibung und Gebrauch der elektromagnetischen Waage und der Säule von constanten Strömen; von Hrn. Becquerel.*

(*Compt. rend. T. IV p. 35. — Auszug.*)

Bis jetzt besitzt man nur zwei Mittel, um die Ströme hinsichtlich ihrer Intensität mit einander zu vergleichen. Das erste besteht darin, daß man eine Magnethadel in gleichem Abstände von einem Leitdrahte, den Ströme von ungleicher Intensität durchlaufen, eine gegebene Zeit lang schwingen läßt, und darauf nach der Formel für das Pendel die Intensität eines jeden Stromes berechnet. Das zweite erfordert den Gebrauch des Multiplikators.

Beide Methoden erlauben nicht die Zurückführung der Intensitäten eines Stromes auf ein gemeinsames leicht zu verschaffendes Maass, was doch immer beim Studium der Wirkung von Kräften das Ziel seyn muß.

Ich habe die elektro-magnetischen Effecte eines Stromes durch Gewichte zu vergleichen gesucht. Der dazu bestimmte Apparat hat folgende Einrichtung. Man nehme eine Probirwaage, die noch für ein Bruchtheil eines Milligramms einen Ausschlag giebt, hänge an jedes Ende des Balkens, mittelst einer senkrechten Stange, eine Schale und einen Magnetstab, mit dem Nordpol nach unten, und befestige darunter, durch ein schickliches Gestell, zwei Glasröhren von solcher Weite, daß die beiden Magnete hineintreten können, ohne die Wände zu berühren. Um jede dieser Röhren wickle man einen mit Seide besponnenen Kupferdraht, so daß zehn tausend (*dix mille*) Windungen gebildet werden. Nachdem man die Magnete in die Axe dieser Windungen gestellt hat, leite man durch dieselben einen elektrischen Strom. Betrachten wir zunächst das eine Draht-

gewinde. Klar ist, daß der Magnetstab, und damit auch der ihn tragende Arm des Waghakens sich heben oder senken wird, je nach der Richtung des Stroms. Rich- ten wir nun das zweite Gewinde so ein, daß die Be- wegung des Waghakens in gleichem Sinne geschieht, wenn der Strom den Draht durchfließt, und setzen dar- auf die beiden Gewinde mit einander in Gemeinschaft, so werden sich ihre Wirkungen auf die Magnete noth- wendig addiren <sup>1)</sup>).

Einige Beispiele werden eine Vorstellung von dem Gebrauch dieses Apparates geben. Nachdem ich eine Zink- und eine Kupferplatte, jede von 4 Quadratcenti- metern Oberfläche, genommen hatte, und mit den bei- den Gewinden in Gemeinschaft gesetzt hatte, tauchte ich sie gleichzeitig in 10 Grm. destillirten Wassers. Die Wage schlug aus, und es mußten zur Herstellung des Gleichgewichts 25 Milligrm. in eine der Schalen gelegt werden. Die Magnethadel eines in die Kette gebrach- ten Multiplikators mit kurzem Draht wurde 60° abge- lenkt. Nach Hinzufügung eines Tropfens Schwefelsäure waren 35,5 Milligrm. zur Herstellung des Gleichgewichts

1) Ich erlaube mir hierbei zu bemerken, daß Hr. Baron v. Wrede, nach einer mir in diesem Frühjahr gemachten mündlichen Mit- theilung, schon vor längerer Zeit nach ähnlichen Grundsätzen einen Multiplikator construirt hat, der manche Vorzüge vor den bisher bekannten besitzt. Dieser Multiplikator besteht aus einem an einem Faden hängenden horizontalen Holzbalken, an dessen beiden Enden, rechtwinklich gegen die Längsaxe des Balkens und ebenfalls horizontal, zwei Magnetstäbe von gleicher Stärke in entgegengesetzter Lage befestigt sind. Die Magnetstäbe, die vermöge dieser Einrichtung ein astatisches System darstellen, sind, senkrecht gegen ihre Ase, auf einem Theil ihrer Länge mit Drahtwindungen umgeben, die mit der Elektrizitätsquelle in Verbindung gesetzt wer- den. So wie durch die Drahtwindungen ein elektrischer Strom geleitet wird, schieben sich in ihnen nothwendig die Magnet- stäbe in der einen oder andern Richtung fort, und der Betrag dieser Verschiebung wird an einem Gradbogen abgelesen. Ein Vorzug dieses Multiplikators besteht darin, daß zu den Win- dungen eine nur geringe Drahtlänge erforderlich ist. P.



erforderlich. Die beiden Ströme standen also ungefähr in dem Verhältniß 1 zu 14.

Ich versuchte hierauf das Verhältniß zwischen Strömen von Säulen, die mehr oder weniger Elemente enthielten, in Gewichten zu bestimmen. Bei einer Säule aus 40 Elementen, geladen mit Wasser, das  $\frac{1}{5}$  Schwefelsäure,  $\frac{1}{10}$  Kochsalz und einige Tropfen Salpetersäure enthielt, waren 615 Milligramm zur Herstellung des Gleichgewichts erforderlich, woraus folgt, daß die Intensität dieses Stroms zu der des Stroms einer einfachen Kette in dem Verhältniß  $17\frac{1}{2} : 1$  stand.

Zur Messung thermo-elektrischer Ströme dienten ähnliche Drahtgewinde, nur daß sie hier aus zwei Lagen von Windungen bestanden. Ich machte hiervon eine Anwendung zur Messung der Temperaturen in den verschiedenen Hüllen der Flamme einer Weingeistlampe, und zwar mittelst zweier Platindrähte, die ungleichen Durchmesser hatten und mit einander verbunden waren. Die Temperaturen fanden sich gleich  $1310^{\circ},98$ ;  $913^{\circ},21$ ;  $743^{\circ},50$ .

Die in meiner Abhandlung angeführten Beispiele beweisen, wie leicht man durch Wägung die Intensität von Strömen, erzeugt durch Elektrizität von starker und schwacher Spannung, mit einander vergleichen kann.

Beabsichtigt man die fortdauernde Wirkung einer Kraft zu messen, so muß man vor allem dieser Kraft eine constante Intensität zu geben suchen. Nun ist aber der Strom einer gewöhnlichen Säule und selbst einer einfachen Kette beständigen Schwankungen ausgesetzt, die nicht gestatten, seine Wirkungsweise der Rechnung zu unterwerfen. Um diesem Uebelstande abzuheffen, haben wir eine Säule construirt, die einen Strom giebt, dessen Intensität innerhalb 24 Stunden, und selbst innerhalb 48 Stunden keine merkbare Veränderung erleidet.

Vor einigen Jahren beschrieben wir einen sehr ein-

fachen Apparat, welcher die Eigenschaft besitzt, einen Strom zu erzeugen, der in der angezeigten Zeit sich nur wenig verändert. Er besteht aus zwei Glasbechern, von denen der eine concentrirte Salpetersäure, und der andere concentrirte Kalilauge enthält. Beide Becher sind verbunden mit einander durch eine gekrümmte Glasröhre, die mit sehr feinem, mit einer Kochsalzlösung getränktem Thon gefüllt ist. In den Becher mit Alkali taucht eine Goldplatte, in den andern eine Platinplatte. Setzt man beide Platten durch einen Multiplicator in Gemeinschaft, so beobachtet man einen ziemlich starken Strom, hervorgehend aus der Einwirkung der Säure auf das Kochsalz und Kali. Die Goldplatte nimmt vom Alkali die negative Elektricität, die Platinplatte von der Säure die positive.

Um das Maximum der Effecte zu erhalten, muß man bei der Construction dieses Apparates Folgendes erwägen. Wäre es möglich, alle Elektricität, die sich bei der Verbindung einer gegebenen Menge Säure mit einer verhältnißmäßigen Menge Alkali entwickelt, in einen Strom zu verwandeln, so würde dieser Strom seinerseits alles gebildete Salz zu zersetzen vermögen. Wenn es also bei der Reaction einer Säure auf ein Alkali gelingt, einen ziemlich starken Antheil der entwickelten Elektricität aufzufangen, so erhält man einen Strom, der stark genug ist, Zersetzungen hervorzubringen.

Um diese Bedingung zum Theil zu erfüllen, nehme man zwei Platinröhren, jede an einem ihrer Enden gekrümmt, um dieses Ende in eine Glasröhre zu stecken. Eine dieser Platinröhren fülle man mit Thon, der mit Salpetersäure getränkt ist, die andere mit Thon, der mit einer Kalklösung getränkt ist, und die verbindende Glasröhre mit Thon, der mit Kochsalzlösung getränkt ist. Die unteren Enden der Platinröhren sind mit stark durchlöchernten Platindeckeln verschlossen. Die den mit Säure getränkten Thon enthaltende Röhre taucht man in Salpeter

säure, die andere in Kalilösung. Um den Uebergang der Elektricität aus dem Thon zu den Wänden der Röhren zu erleichtern, mengt man dem Thon eine gewisse Menge gepulverten Platins bei, was seine Leitungsfähigkeit erhöht.

Hierauf befestigt man Platindrähte an den Enden der gekrümmten Arme, um den Strom in die Körper zu leiten. Durch Vereinigung mehrer solcher Apparate hat man eine Säule von constanten Wirkungen.

Ein einziges dieser Elemente erfordert 8,5 Milligramm, damit die Wage nicht ausschlage. Ein in die Kette gebrachtes Galvanometer mit kurzem Draht gab zugleich eine Ablenkung von  $79^{\circ}$ . Ich zeige in meiner Abhandlung, daß die Wirkungen dieser Säule in langer Zeit nicht merklich schwanken. Diese Beständigkeit ist leicht zu erklären. Man weiß nämlich, daß die zersetzenden Metallplatten, welche einen Theil einer Volta'schen Kette ausmachen und in eine Lösung tauchen, sich so polarisiren, daß ein dem ersten entgegengesetzter Strom erzeugt wird. Die Polarisation jeder dieser Platten besteht in der Ablagerung einer Substanz, die durch den Strom zu ihrer Oberfläche geführt ist, und, was ihre Natur betrifft, von der Lage dieser Platte in Bezug auf die Enden der Säule abhängt. So lange diese Substanz mit der Platte in Berührung bleibt, giebt es einen Strom von entgegengesetzter Richtung mit dem ursprünglichen; wenn aber die Substanz von einer Flüssigkeit umgeben ist, die eine starke Verwandtschaft zu ihr hat, so verbindet sie sich mit ihr, und augenblicklich ist die Platte depolarisirt. Genau dieses geschieht in den Elementen der von uns beschriebenen Säule; das Alkali, welches zur negativen Platte geführt worden ist, verbindet sich sogleich mit der umgebenden Säure, und die auf die positive Platte abgesetzte Säure wird durch das umgebende Alkali neutralisirt.

Ich bin in einiges Detail über die elektro-chemi-

schen Effecte der Polarisation zersetzender Platten eingegangen, wenn sie zur Fortführung der Ströme dienen, die von Apparaten von constanten Strömen, bestehend aus 1, 2, 3, 4 Elementen, erzeugt werden. Ich habe hierauf das Resultat der von mir mit dem beschriebenen Apparat angestellten ersten Versuche auseinandergesetzt, um die Beziehungen zwischen den Verwandtschaften der chemischen Kräfte festzusetzen. Seit Hrn. Faraday's Entdeckungen über die Bestimmtheit und Ausdehnung der elektro-chemischen Zersetzung wissen wir, daß die chemische Kraft eines Stroms geradezu proportional ist der darin bewegten Elektricitätsmenge. Gestützt auf diesen Satz, ist es ihm geglückt, die Aequivalente der Körper zu bestimmen; allein bei seinen Versuchen hat er abgesehen von der absoluten Intensität der Kraft, die in jedem Augenblick wirkt. Diese Lücke habe ich mit meinen Apparaten auszufüllen gesucht.

Seit langer Zeit hat man beobachtet, daß diejenigen Elemente, welche mit der größten Kraft zusammenhalten, am leichtesten durch den Strom zersetzt werden, und daß die Elemente, welche sich nur vermöge einer schwachen Verwandtschaft vereinigen, am wenigsten der zersetzenden Wirkung der störenden Elektricität gehorchen. Es scheint daraus zu folgen, daß alle zusammengesetzten Körper unter dem Einfluß des Stroms vermöge der ihre Elemente verbindenden Verwandtschaftskraft zersetzt werden. Könnte man also eine Beziehung zwischen der Intensität dieser Ströme und der Affinität aufstellen, so würde man ein Mittel haben, die letzteren zu messen.

Bei Untersuchungen dieser Art muß man auf folgende Beobachtungen Faraday's Rücksicht nehmen: 1) daß die elektrischen Kräfte bestimmt sind, wie die chemische Wirkung der Elektricität; 2) daß eine bedeutende Menge von strömender Elektricität eine nur sehr geringe Menge von Substanz zersetzt; 3) daß das elektrische *Agens* bloß zur Ueberwältigung der elektro-chemischen

Kräfte angewandt wird, woraus folgt, daß die strömende Elektricität wenigstens der gleich ist, welche die getrennten Molecüle besitzen; und 4) daß die Theorie der bestimmten Proportionen mit der der elektrochemischen Verwandtschaft im vollkommenen Einklange steht, woraus sich ergibt, daß man die äquivalenten Theile der Körper als Volume betrachten kann, die gleiche Elektricitätsmengen enthalten, oder wenigstens gleiche elektrische Kräfte besitzen. Die Atome der Körper, welche in ihrer gewöhnlichen chemischen Action einander äquivalent sind, besitzen also gleiche Elektricitätsmengen vereinigt mit sich.

Folgendes sind die ersten Versuche, welche ich zur Lösung der mich beschäftigenden Aufgabe angestellt habe.

Leitet man einen unveränderlichen Strom in zwei nagleich concentrirte Lösungen eines Salzes mit reducirbarer Basis, so ist die Menge des zersetzten Salzes durchaus dieselbe in beiden Lösungen. Ich nahm 2,8 Grm. trocknen salpetersauren Kupferoxyds, löste es in 10,8 Grm. Wasser, und verdünnte eine Hälfte der Lösung mit einem gleichen Volum Wasser. Von den beiden Kupferdrähten, welche in die beiden negativen Schenkel tauchten, wog jeder 0,3365 Grm. Nach 48stündiger Dauer der Versuche wogen diese Drähte 0,36 Grm.; sie hatten also 0,0215 Grm. an Gewicht zugenommen. Die Intensität des Stroms, welche diese Wirkung gethan, ward durch 5 Milligrm. ausgedrückt.

Als die Intensität des Stroms auf die Hälfte reducirt wurde, betrug die Menge des in 48 Stunden reducirten Kupfers 0,01, d. h. halb so viel, wie im vorhergehenden Versuch.

Als derselbe Draht und dieselben Lösungen 48 Stunden lang die Wirkung eines Stromes, der 3 Milligrm. aufwog, ausgesetzt wurden, erhielt man 0,012 Milligrm. Kupfer. Vergleicht man die Menge des in beiden Versuchen reducirten Kupfers, so findet man sie genau den

Intensitäten des Stromes proportional. Ähnliche Versuche wurden mit Lösungen von salpetersaurem Silber bei verschiedenen Concentrationen dieser Lösungen und verschiedener Intensität des Stromes angestellt. Die Mengen des reducirten Metalles waren genau den Intensitäten des Stromes proportional, wenn, was eine unerlässliche Bedingung ist, die Quelle constant blieb.

Diese Resultate gehen aus den Beobachtungen des Hrn. Faraday hervor, allein zwischen seinen Resultaten und den meinigen ist der Unterschied, daß er von der absoluten Intensität des Stromes absieht, während ich sie in Rechnung nehme. In einer anderen Abhandlung werde ich die Vortheile, welche man aus der Einführung dieses neuen Elementes in die elektro-chemischen Untersuchungen ziehen kann, auseinandersetzen.

Mittelt der elektro-magnetischen Wage, und indem wir Lösungen von verschiedenen Metallen der Wirkung eines und desselben Stromes von bekannter Intensität aussetzten, haben wir zu ermitteln gesucht, in welchem Verhältniß die Mengen des reducirten Metalles stehen. Drei Lösungen, die eine von Kupfer, die zweite von Silber, und die dritte von Zink, wurden in die Kette gebracht. Die Lösungen befanden sich in U-förmigen Röhren, und jede derselben stand an der negativen Seite mit einer Platinplatte, und an der positiven Seite mit einer Platte von dem in der Flüssigkeit gelösten Metall in Berührung. Sie wurden der Wirkung eines Apparates von zwei mit Platincylindern bereiteten Gliedern ausgesetzt. Die Resultate waren folgende:

Die Intensität des Stromes hielt 5,5 Milligrm. das Gleichgewicht. Nach 24 Stunden waren gefallen an Silber 0,305, an Kupfer 0,090 und an Zink 0,0925 Milligramm. Diese Mengen verhalten sich aber zu einander wie die Atomgewichte der drei Metalle: denn man hat  $305 : 90 :: 108$  (Atomgewicht des Silbers) : 31,6 statt 31,6 (Atomgewicht des Kupfers), eben so  $305 : 92,5 ::$



108 : 32,8 statt 32,5 (Atomgewicht des Zinks, wie es Faraday gefunden). Man sieht also, daß der Apparat von constantem Strom, wenn er auch nur aus zwei Gliedern besteht, mit Hülfe der elektro-magnetischen Wage erlaubt, das Atomgewicht der Metalle zu finden, und die Metallmenge, welche einer gegebenen Stromstärke entspricht, zu bestimmen.

*Zusatz.* In dem eben erschienenen 5. Bande von Hrn. Becquerel's *Traité de l'Electricité* findet sich eine Abbildung der elektro-magnetischen Wage, welche zum besseren Verständniß der Beschreibung in Fig. 8 Taf. IV wieder gegeben ist. *ff* ist der Wagbalken, *p, p'* sind die Schalen, *a, a'* die Magnetstäbe, *cc* und *c' c'* Kupferplatten, welche die mit Draht unwundenen Glasröhren tragen, und durch die Stellschrauben *vv, v' v'* eingestellt werden.

#### IX. Bemerkung über die Theorie des Windes: von John Dalton.

Vor 44 Jahren publicirte ich (wie aus meiner Meteorologie 1793 und 1834 erschen werden kann) eine Theorie der Passatwinde etc., wie die, welche Hr. Dove bekannt gemacht hat. Sie war, wie ich später erfuhr, bereits von G. Hadley im Jahr 1735 publicirt worden. Auffallend ist es, daß die wahre Theorie so lange unbeachtet geblieben ist. (*Phil. Mag. Ser. III Vol. XI p. 390.*)

X. *Ueber die verschiedenen Theorien des Windes, als Erwiderung auf vorstehende Bemerkung: von H. W. Dove.*

Aus den von mir im März dieses Jahres herausgegebenen meteorologischen Untersuchungen entlehne ich, S. 244, folgende Stelle:

A. Theoretische Betrachtungen.

»So wie wir bei Bacon die erste Wahrnehmung der regelmäßigen Drehung des Windes fanden, so müssen wir ihn auch als den anführen, der die Momente, auf welche eine Theorie der Passate gegründet werden kann, zuerst, wenn auch nicht richtig, angedeutet hat. «Die Sache ist gewiß,« sagt er <sup>1)</sup>, »die Ursache ungewiß. Die könnte es seyn, daß die Luft wie der Himmel bewegt wird, außerhalb der Tropen gleichsam unmerklich, wegen der kleineren Kreise, innerhalb merklich, wegen der größeren Kreise, die sie beschreibt. Es könnte auch eine andere seyn, die, daß die Wärme die Luft ausdehnt und nicht an derselben Stelle läßt. Aus der Ausdehnung der Luft entsteht aber nothwendig ein Stoß auf die daneben liegende Luft, wodurch, so wie die Sonne fortrückt, jene Brize erzeugt wird. Deutlicher ist sie unter den Tropen, wo die Sonne brennender, außerhalb ist sie fast nicht merklich.« Die erste Erklärung Bacon's hat Galilaei <sup>2)</sup> in die Sprache des Copernicanischen Systems übersetzt vorgetragen: denn es war natürlich, daß das Zurückbleiben der Luft gegen die Bewegung der Erde damals zur Sprache kam

1) *Historia ventorum, Oper. ed. p. 446.*

2) *De systemate mundi dialog. 4, p. 421 ed. 1700.*

men würde, ein Argument, welches denn auch Simpli-  
cius, der Vertheidiger des alten Systems im Dialog, bei-  
bringt. Galilaei nimmt nun noch ein geringes Zurück-  
bleiben an, und erklärt dadurch den Ostwind der Tro-  
pen. Die zweite Erklärung Bacon's hat Varenius <sup>1)</sup>  
näher erörtert. Natürlich ist die Galilaei'sche An-  
sicht bald verlassen worden, und eben so wenig hat sich  
die von Descartes angedeutete und von d'Alembert <sup>2)</sup>  
ausführlich erörterte Theorie, welche dem Einflusse des  
Mondes die Erscheinung zuschreibt, Eingang verschafft.  
Mehr ist dies mit der von Halley <sup>3)</sup> vorgetragenen  
Erklärung der Fall gewesen, welche, da sie auf falschen  
Voraussetzungen beruht, wohl nur deswegen besonders  
berücksichtigt worden ist, weil Halley zugleich mit  
seiner Theorie eine Menge vortrefflicher Beobachtungen  
und Bemerkungen über die Passate mittheilte, und die  
Aufgabe selbst zuerst allgemeiner auffasste, indem er die  
Passate und die Moussons auf eine gemeinschaftliche Ur-  
sache zurückzuführen versuchte. Durch einen bei dem  
gegenseitigen Entleihen der Lehrbücher von einander  
zuletzt sehr verbreiteten Irrthum wird aber außerdem  
die richtige Theorie von Hadley <sup>4)</sup>, durch eine Na-  
mensverwechslung, fast immer unter dem Namen der  
Halley'schen vorgetragen. Bei dieser, wenigstens in  
Deutschland, sehr großen Verwirrung mag es entschul-  
digt werden, wenn ich, ehe ich zu der näheren Unter-  
suchung der Erscheinung übergehe, zunächst die Unter-  
schiede beider Theorien auseinandersetze.

1) *Geographia generalis*, t. 1 cap. 20.

2) *Reflections sur la cause générale des vents*. Berl. 1746.

3) *An historical account of the Trade-Winds and Monsoons  
observable in the seas between and near the Tropick, with an  
attempt to assign the physical cause of the said Winds*. Phil.  
Trans. 1686, p. 152.

4) *The cause of the general Trade-Wind*. Ph. Tr. 1735, 58.

Halley erklärt die Erscheinung der Passate allein durch die wärmende Wirkung der Sonne, Hadley durch dieselbe Ursache, und die unter den verschiedenen Parallelen ungleiche Rotationsgeschwindigkeit der Oberfläche der Erde. Nach Halley würde, wenn von der nördlichen und südlichen Erdhälfte das Zuströmen der Luft durch Wände verhindert würde, zwischen diesen, dem Aequator parallelen Wänden ein reiner Ost entstehen, weil bei der täglichen Bewegung der Sonne die Luft dieser nachströmt, und, da bei jeder Umdrehung sich die Wirkung wiederholt, endlich in ihrer ganzen Masse in continuirliche Bewegung geräth. Da aber in der Wirklichkeit jenes Zuströmen stattfindet, indem die Luft von beiden Seiten des Aequators nach dem Aequator, als dem überhaupt heißesten Gürtel, drängt, so wird aus dem Ost und Nord auf der Nordhälfte der Erde ein Nordost, aus dem Süd und Ost auf der Südhälfte der Erde ein Südost. Diese Ansicht erklärt also allerdings, warum der untere Passat NO. ist, keinesweges aber, warum der zurückfließende obere Strom SW. wird; sie erklärt nicht die Gegend der Windstillen zwischen beiden Passaten <sup>1)</sup>, und noch weniger die Südwinde in derselben. Sie ist auch theoretisch höchst unwahrscheinlich; denn es ist unmöglich, daß die Wirkung der Erwärmung unter dem heißesten Meridian, wenn wir sie uns als anfangend denken, so lange fortdauere, daß sie noch um 12 Uhr in der Nacht stattfinden sollte. Ist dies aber nicht der Fall (wie wir aus der geringen Entfernung, bis zu welcher Land- und Seewinde vom Ufer sich erstrecken, schließen können), so wird die heißeste Stelle in den Morgenstunden östlich liegen, also ein Westwind entstehen, ein Resultat, zu welchem auch der

1) Die Windstillen auf der sogenannten Regen- oder Donnerses bei Guinea erklärt Halley, und gewiß richtig, als entstehend zwischen dem durch Afrika abgelenkten Passat und dem weiter von der Küste unmodificirt fortwehenden SO-Passat.

Verfasser der *Recherches physiques et mathématiques sur la théorie des vents réglés*. Berl. 1746. gekommen ist. Es würden also nach Analogie aller Erscheinungen, die von der täglichen Wirkung der Sonne abhängen, zwei entgegengesetzte Wirkungen eintreten, hier ein Ostwind in den Nachmittagsstunden, und ein Westwind in den Morgenstunden.

Ganz anders ist es mit der Hadley'schen Theorie, in welcher die Ablenkung des Nord in Nordost dadurch entsteht, daß die Luft von langsamer rotirenden Punkten nach schneller sich drehenden kommt. Halley hat das Verdienst, die westlichen Winde an den äußeren Grenzen der Passate als den obern Strom anerkannt zu haben, für seine Conjectur giebt er aber nur einen empirischen Beweis <sup>1)</sup>; in Hadley's Theorie hingegen ist ihre Richtung und das Zurückkehren derselben zur Oberfläche eine mechanische Nothwendigkeit, gefordert durch die gleichbleibende Länge des Sterntages <sup>2)</sup>. Da nämlich in den unteren Schichten fortwährend weniger bewegte Massen nach Punkten, die stärker bewegt werden, strömen, so wird die Erde dieser Luft immer einen Theil dieser Bewegung durch Reibung mittheilen, und sie würde zuletzt dadurch nothwendig an Rotationsgeschwindigkeit verlieren müssen, wenn nicht die zurückströmende Luft, als SW. die Oberfläche berührend,

1) *By a kind of circulation, the NE-Trade-Wind below will be attended with a SW above, and the SE below with a NW above; that this is more than a bare conjecture, the almost instantaneous change of the Wind to the opposite Point, which is frequently found in passing the limits of the Trade-Winds, seems to assure us.*

2) *The NE. and SE-Winds within the Tropicks must be compensated by as much NW. and TW in other Parts, and generally all Winds from any one Quarter must be compensated by a contrary Wind some where or other; otherwise some Change must be produced in the motion of the Earth round its Axis.*

dieser denselben Impuls im Sinne ihrer Rotation wiedergäbe, welchen sie von der Erde erhalten hat. Diese Bemerkung Hadley's beweist, wie klar er sich des Principes seiner Theorie bewußt war, und es ist daher zu bedauern, daß er, durch unrichtige Nachrichten über die Richtung der Passate bei ihrem Begegnen verleitet, hier nicht seine Theorie consequent verfolgt hat, eine Lücke, welche neuerdings durch Basil Hall <sup>1)</sup> ergänzt worden ist.

Um die Unterschiede der verschiedenen Theorien schärfer hervortreten zu lassen, wollen wir annehmen, die Erde sey ein unter dem erwärmenden Einflusse der Sonne rotirender gerader Cylinder. Nach der Halley'schen Theorie würden die Passate noch NO. und SO. bleiben, nach der Hadley'schen hingegen, da kein Unterschied der Rotationsgeschwindigkeit vorhanden wäre, N. und S. werden, nach der älteren Galilaei'schen hingegen ein Ost entstehen. Die Passate im Sinne der Halley'schen Theorie würden auf der feststehenden Erde, um welche sich die Sonne bewegte, eben so stattfinden, als auf der um die feststehende Sonne bewegten Erde; im Sinne der Halley'schen Theorie ist ihre Richtung aber ein Beweis für die Drehung der Erde. Was aber die von Basil Hall gegebene Ergänzung betrifft, so ist sie folgende:

Da die Meridiane in der Nähe des Aequators parallel werden und in 10 Grad Entfernung von demselben sich nur wenig einander zuneigen, so wird der Unterschied der Rotationsgeschwindigkeit des Parallels von 10 Grad und des Aequators nur gering seyn. Bezeichnet man nämlich die letztere mit 1000, so erhält man folgende Verhältnisse:

Brei-

3) *The Trade-Winds in Fragments of Voyages and Travels second Series, Vol. I p. 163. Lond. 1832.*



Breite	0°	10°	20°	30°	40°
Rotationsgeschwindigkeit	1000	985	940	866	766
Unterschied		15	45	74	100

Breite.	50°	60°	70°	80°	90°
Rotationsgeschwindigkeit	643	500	342	174	0
Unterschied	123	143	158	168	174

Es ist also klar, daß wenn die Luft sich unter 10° Breite langsam nach dem Aequator hin bewegt, sie durch die Berührung mit dem Boden fast vollkommen die Rotationsgeschwindigkeit desselben annehmen wird. Strömten beide Passate von da an, wo sie entstehen, bis da, wo sie aufhören, mit gleicher Geschwindigkeit fort, so würde die östliche Ablenkung durch Summiren von immer kleiner werdenden Größen beständig wachsen, der Passat also von den Wendekreisen an nach dem Aequator hin aus N. in NO. und zuletzt in Ost übergehen. Da aber da, wo die Luft aufsteigt, die Passate einander entgegengehend sich gegenseitig stauen, so wird dies nicht der Fall seyn, und wir werden daher erwarten müssen, in der Nähe des Aequators den in größerer Entfernung von demselben bereits fast östlich gewordenen NO-Passat in eine mehr nördliche Richtung übergehen zu sehen, eben so den SO-Passat in eine mehr südliche. Dies wird natürlich in noch höherem Grade der Fall seyn, wenn ein Passat die Linie wirklich überschreitet, in welchem Falle der SO. aus S. in SW., der NO. aus N. in NW. übergehen wird. Aber auch die so berühmte Hadley'sche Theorie trifft noch der Vorwurf, daß sie nur Rechenschaft von den Windverhältnissen der Tropen giebt, daß sie dort als bedingendes Element das anerkennt, was theilweise in noch höherem Grade außerhalb der Tropen vorhanden ist. Indem wir die Aufgabe ganz allgemein behandelten, fanden wir, daß die Erscheinung der Passate und Moussons nur die speciellsten Fälle des Grundphänomens darstellt, welches wir „das Drehungsgesetz“ genannt haben. Wenn in

dieser Beziehung die Ableitung desselben als der Versuch einer allgemeineren Windtheorie angesehen werden kann, so darf wohl nicht erst bevorwortet werden, daß dieser Versuch auf einem Gebiete, wo es fast ganz an Vorarbeiten fehlte, nicht darauf Anspruch macht, der Totalität der Erscheinungen in ihrem Detail zu genügen.“

Wenn die eben angeführte Stelle, so wie die Vorrede desselben Buches einerseits zeigt, daß, weit entfernt Hadley's Verdienste mit Stillschweigen zu übergehen, ich mich vielmehr bemüht habe, sie im Gegensatz anderer Untersuchungen in das rechte Licht zu stellen, so beweist sie andererseits auch augenscheinlich, daß es mir nicht einfallen konnte, eine Theorie der *Passate* geben zu wollen, da eine *allgemeine* Theorie eben nicht bloß von den Erscheinungen der Tropen, sondern von den Windverhältnissen aller Zonen Rechenschaft zu geben hat <sup>1)</sup>. Meine Theorie hat mit der Hadley'schen das gemein oder vielmehr von ihr entlehnt, daß sie die unter verschiedenen Breiten verschiedene Rotationsgeschwin-

1) In der Abhandlung, auf welche Dalton sich bezieht, diese Annalen, Bd. XXXVI S. 351, heißt es ausdrücklich „die in dieser Abhandlung entwickelte Ansicht über die Windverhältnisse der gemäßigten Zone bestritt, wenn ich nicht irre, den gegen die Theorie der *Passate* erhobenen Einwurf, daß der Einfluß der Rotation der Erde dort nicht so bedeutend seyn könne, weil er in höheren Breiten noch stärker seyn müsse als zwischen den Tropen. Der Einwurf ist in der That keiner; denn ich glaube gezeigt zu haben, daß das, was verlangt wird, wirklich existirt.“ Wenn ich Hadley hier nicht nenne, was mir in einem wissenschaftlichen Journal, wo man das Bekannte als bekannt vorauszusetzen gewohnt ist, durchaus unnöthig schien, so nicht man doch unmittelbar, daß keine andere Theorie als die seinige gemeint seyn kann. Daß aber Hadley nicht seine Theorie über andere Gegenden ausgedehnt hat, als Halley, ist eben so bekannt, und in diesem Sinne sagte ich, wie so auch meine Worte beweisen, daß seit 150 Jahren kein Schritt weiter zu einer allgemeinen Lösung der Aufgabe geschehen sey.

digkeit als wesentliches Moment bei der Betrachtung der Luftströme geltend macht, sie unterscheidet sich aber von derselben dadurch, daß sie ein zweites Moment einführt, das nämlich, daß *vorher ruhende Luftmassen als sich in Bewegung setzend betrachtet* werden, oder mit anderen Worten, daß eine Größe als *veränderlich* eingeführt wird, welche Hadley als constant betrachtet hat. Niemand hat, um an ein bekanntes Beispiel zu erinnern, als Fresnel das Gesetz der Brechung für alle doppeltbrechenden Krystalle gab, demselben den Vorwurf gemacht, daß er sich das Huyghens'sche Gesetz als seine Entdeckung aneignen wolle, weil, wenn die nach 3 auf einander senkrechten Richtungen verschiedene Elasticität des Mediums nach zwei Richtungen gleichgesetzt wird, seine Wellenfläche in das Ellipsoid von Huyghens sich verwandelt. Hier war aber eben so der specielle Fall lange vorher bekannt und erörtert. Wer durch Betrachtung eines solchen Falles ein Eigenthumsrecht auf den allgemeinen geltend machen will, muß wenigstens auf die Resultate hinweisen, zu welchen dieser führen kann. Dies ist aber hier so wenig geschehen, daß weder in der Abhandlung von Hadley noch in den *Meteorological Essays* von Dalton auch nur eine Andeutung von dem Drehungsgesetz sich findet.

Da Hadley's Abhandlung, als in den *Philosophical Transactions* befindlich, allgemein zugänglich ist, von dem Werke von Dalton aber hauptsächlich nur die in Gilbert's Annalen gegebenen Auszüge allgemeiner bekannt sind, so mögen die auf die Windverhältnisse der gemäßigten Zone bezüglichen Worte Dalton's hier eine Stelle finden (1793 und 1831 ganz identisch):

*Thatsachen.* 1) Die Winde in der nördlichen gemäßigten Zone sind veränderlich, aber am häufigsten der SW. und W., und der NO. und O.

2) In den nördlichen und zweifelsohne auch in den

südlichen, gemäßigten und kalten Zonen sind die Winde stürmischer im Winter als im Sommer.

*Theorie.* Nach dem, was über die Passate gesagt wurde, könnte man vermuthen, daß die Winde in der nördlichen gemäßigten Zone unten zwischen N. und O., oben zwischen S. und W. seyn müssen, fast so regelmäßig wie die Passate. Bedenken wir aber die Veränderung der Jahreszeiten, die verschiedene Wärmecapacität des Landes und Wassers, die Interferenz und entgegengesetzte Richtung jener beiden Hauptströme, von denen der eine nach einem Centralpunkt strebt, der andere von diesem ausgeht, so könnte man voraussehen, daß in den gemäßigten und kalten Zonen gar nichts Regelmäßiges sich finden werde. Dessen ungeachtet zeigen die Beobachtungen, daß die Winde in unserer Zone größtentheils mit der Richtung eines jener Ströme übereinkommen, d. h. daß sie irgendwo zwischen N. und O., anderswo zwischen S. und W. fallen, und daß Winde anderer Richtungen zufällige Varietäten, besonders bei unbeständigem Wetter, sind."

Wäre Dalton des wahren Grundes dieser Erscheinungen sich bewußt gewesen, so würden sich diese "zufällige Varietäten" in "nothwendige Folgen des Drehungsgesetzes" verwandelt haben, welches er aber nicht gekannt zu haben scheint. Das Vorhandenseyn zweier, unsere Witterungsverhältnisse beherrschender Luftströme, welche ich aus meinen, in Königsberg angestellten Beobachtungen schloß, mag sich in seinen einfachsten Bestimmungen aber wohl jedem unbefangenen Beobachter dargeboten haben; denn Howard nennt jene Winde so bezeichnend: die wahren Moussons unserer Gegenden, und Aristoteles, der in der Meteorologie schon die regelmäßige Winddrehung mit der Sonne erwähnt, sagt in der Politik: gewöhnlich glaubt man, daß es nur zwei Staatsverfassungen giebt, wie es von den Winden ge-

sagt wird: die nördlichen nämlich und die südlichen, die anderen aber nur Abschweifungen derselben.

Da ich mir bewußt bin, nie absichtlich das verschwiegen zu haben, was in Beziehung auf Gegenstände, die ich untersuchte, bereits von Anderen bekannt gemacht worden war, so habe ich geglaubt, den Verdacht von mir abwenden zu dürfen, als suchte ich mich in das Besitzthum eines Mannes zu drängen, der zu hoch steht, um von meinem Lobe oder von meinem Tadel erreicht zu werden.

# **XI. Ueber die Oxydation der Metalle in der atmosphärischen Luft;**

*von P. A. von Bonsdorff.*

(Schluß der Abhandl. Bd. XXXXI S. 293) <sup>1)</sup>).

## **Z i n k.**

**D**ass Zink seinen metallischen Glanz in der Luft schnell verliert und sich mit einer hell weisgrauen Oberfläche

1) In jener ersten Hälfte der Abhandlung sind folgende Fehler zu berücksichtigen:

S. 297 Z. 1 soll es heißen: geschützt vor der Feuchtigkeit der äußeren Luft.

S. 297 Z. 4 statt Chlorkalium l. Chlorcalcium.

S. 298 Z. 12 st. enthält l. enthielt.

S. 299 Z. 2 st. Kohlensäure l. Kohlensäuregas.

S. 300 Z. 8 st. eingestellt l. angestellt.

S. 300 Z. 24 st. 1, 3 und 5 l. 1, 3 und 5.

S. 305 in der Anmerk. st. oben l. hier.

S. 311 Z. 2 st. nothwendig l. nothwendige.

Auch ist noch zu bemerken, daß die Königl. Academie zu Stockholm, aus deren Schriften diese Abhandlung entnommen ist, dieselbe mit dem Lindholm'schen Preise (einer goldenen Medaille) gekrönt hat.

P.

bedeckt, ist eine allgemein bekannte Thatsache; doch scheinen die Chemiker von der Entstehung und der Natur dieses Ueberzugs oder dieser Oxydation keine genaue Kenntniss gehabt zu haben. Berzelius hält dieses Product für ein Suboxyd, andere Chemiker sehen es als ein Oxyd an. Folgendes möchte die Natur desselben näher beleuchten:

Metallisches Zink mit blanker Oberfläche hält sich in trockner Luft ohne alle Veränderung, aber in die Wasserglocke gebracht, läuft es gewöhnlich nach einiger Zeit an, verliert stellenweise seinen Glanz, und wird nach und nach mit einer matten, weifsgrauen Oberfläche bedeckt. Doch eine nähere Untersuchung derjenigen Umstände, unter denen diese Oxydation stattfindet, haben gezeigt, dass Wassertheilchen, durch eine Temperaturerniedrigung in flüssiger Form auf das Metall gefällt, eigentlich durch Bildung von Oxydhydrat, diese Oxydation hervorbringen <sup>1</sup>), und dass Zink in einer mit Wassergas gesättigten kohlenstofffreien Atmosphäre sich ohne alle Veränderung erhält. — Um jedoch diejemigen Beobachtungen, worauf sich dieses Factum gründet, deutlich auseinanderzusetzen, bin ich genöthigt mich von meinem Hauptgegenstand etwas zu entfernen, und kürzlich einer andern Forschung zu erwähnen, zu der ich, bei meinen Beobachtungen über das Verhalten der Metalle gegen Luft und Wasser, geleitet worden bin, und worüber ich in einer besonderen Abhandlung umständlicher Bericht zu erstatten gedenke <sup>2</sup>).

Werden verschiedene Metalle einer mit Wassergas

1) Falls übrigens das Wasser noch vollkommen frei von Kohlensäure ist.

2) Der Hauptinhalt derselben, den ich auf der Versammlung der deutschen Naturforscher in Stuttgart 1834 mitgetheilt, findet sich in dem über diese Versammlung erschienenen Bericht, und in einigen andern periodischen Schriften. Eine vollständige Uebersicht davon ist in das *L'Institut* für 1835, No. 96, aufgenommen.



gesättigten Atmosphäre ausgesetzt, die durch eine langsam entstandene Abkühlung einen Theil ihres Wassers in Form von Thau fallen läßt, so setzt sich dieser nicht gleichförmig auf alle Metalle ab, sondern die in der nämlichen Luft sich oxydirenden Metalle werden allein mit Wassertropfen bedeckt, während die übrigen sich nicht oxydirenden Metalle frei davon bleiben. So z. B. bedecken sich Arsenik und Blei, nachdem sie erst suboxydirt sind, mit Thautropfen, während Kupfer und Silber vollkommen trocken bleiben. — Ist eins der letztgenannten Metalle allein der feuchten Luft, bei deren Abkühlung, ausgesetzt, so wird es natürlicherweise auch mit Thau bedeckt, ist aber eins der erstgenannten oxydirbaren Metalle gegenwärtig so nimmt bloß dieses den Thau auf; und also kann auf diese Weise das eine Metall gewissermaßen das andere vor den gefällten Wasserdünsten schützen, wenn es in eine gewisse beschränkte Entfernung von dem andern gestellt worden ist. Verschiedene, über dieses Phänomen angestellte Beobachtungen scheinen mir anzuzeigen, daß die Elektrizität hierbei eine bedeutende Rolle spiele.

Demgemäß wurden zwei Metalle so zusammengelgt, daß sie einen kleinen galvanischen Apparat ausmachten; dergleichen Apparate wurden von verschiedenen Metallen construirt, und darnach in die Wasserglocke gebracht, in welcher die Luft, durch Sonnenschein erwärmt, eine größere Quantität Wassertheilchen auflösen, und bei allmählicher Abnahme der Wärme als Thau absetzen mußte. Das Resultat von diesem Versuche war, daß das elektro-negative Metall immer, besonders in der Nähe des elektro-positiven, die Thautropfen anzieht, während das letztgenannte Metall vollkommen trocken bleibt. Besteht der galvanische Apparat z. B. aus Silber und Kupfer, so bekommt das Silber die Thautropfen, das Kupfer nicht; ist hinwiederum der Apparat von Kupfer und Zink, so wird allein das Kupfer mit

Thau befeuchtet. — Aus diesen Versuchen scheint hervorzugehen, daß der Wasserdunst, der durch Abkühlung aus der Atmosphäre gefällt wird, eine freie positive Elektrizität enthalten muß, und daß diese freie Elektrizität die Ursache ist, daß der Thau sich auf die oben erwähnten Körper fällt, daß ferner die auf der Oberfläche oxydirten Metalle, z. B. Blei, Arsenik, eine Art von galvanischer Kette bilden, in welcher die oxydirte Fläche das elektro-negative Element ausmacht, weshalb denn, bei dem erstgenannten Versuche mit oxydirbaren und nicht oxydirbaren Metallen, die Elektrizität die Ursache wäre, daß ein oxydirtes Metall, z. B. ein angelautenes Stück Blei, mit Thau bedeckt wird, während ein Stück Kupfer frei davon bleibt.

Ich kehre jetzt zu dem Verhalten des Zinks in feuchter Luft zurück. Wenn man auf diese Weise ein Stück polirten Zinks (z. B. ein in Würfelform gegossenes Stück, wie ich bei meinen Versuchen angewandt habe) auf ein Uhrglas unter die Wasserglocke stellt, und auf rund herum gestellte Uhrgläser mehrere mit Suboxyd angelautene Bleistücke legt, so nehmen die oxydirten Bleistücke, sobald eine Temperatur-Erniedrigung erfolgt, allen niedergeschlagenen Thau auf, und das Zinkstück bleibt trocken. Mit einer solchen Vorrichtung habe ich, in einer Zeit von 2 bis 3 Wochen, einen Zinkwürfel vollkommen vor Thau geschützt gehalten, und zugleich dabei gefunden, daß das Metall sich ohne Oxydation und mit seinem vollen metallischen Glanz erhalten hat, besonders auf eine entscheidende Weise an den senkrechten Flächen, welche natürlicherweise vollkommener vor dem Thau geschützt werden konnten.

Dem Endzweck noch mehr entsprechend ist folgender kleiner Apparat, welchen ich später construirt habe. Eine Glasscheibe, z. B. 1½ Zoll in Quadrat, wird mit einer, ungefähr 6 Zoll langen und beinahe 1 Zoll breiten angelautenen Bleischeibe, aus gewöhnlichem Roll-

blei geschnitten, solchergestalt umgeben, daß die Bleischeibe an vier Stellen in einem rechten Winkel, mit einer Seite von  $1\frac{1}{2}$  Zoll zwischen jedem Winkel, gebogen wird, wodurch sie gleichsam ein auf zwei Seiten offenes Parallelepiped bildet, auf dessen Boden oder Unterseite die Glasscheibe eingepaßt ist. Der Zinkwürfel, ungefähr von der Größe eines Kubikzolls, wird dann so eingeschoben, daß er mitten auf der Glasscheibe, ungefähr  $\frac{1}{4}$  Zoll von der, auf den drei übrigen Seiten befindlichen, gebogenen Bleischeibe zu liegen kommt, und der ganze Apparat wird auf einer passenden Unterlage in die Wasserglocke gestellt. Hiedurch ist folglich der Zinkwürfel, besonders auch auf der oberen horizontalen Fläche, vor allem Thau geschützt, und dabei doch von der feuchten Luft umgeben, worin er sich mit vollem metallischen Glanz erhält <sup>1)</sup>.

Kann dagegen die Kohlensäure, unter Mitwirkung der Luft und des Wassergases, zugleich auf das Zink einwirken, so verliert das Metall sehr schnell seinen Glanz und wird mit einer weißen erdigen Substanz bedeckt. Folgender Versuch hat dieses Verhalten auf eine entscheidende Weise dargelegt. Der oben beschriebene Thauapparat, auf einen passenden Träger von Glas gestellt, wurde auf eine ebene Glasscheibe gebracht, und mit einer größeren tubulirten Glasglocke, die vorher an ihrer inneren Seite mit Wasserdampf beschlagen war, bedeckt, alsdann ihr unterer Rand, mit Talg bestrichen, vollkommen luftdicht gemacht, und kohlen-saures Gas ungefähr zu einem Hundertel von dem Gehalt der Glocke durch die Tubulatur eingegossen, welche darauf verschlo-

1) Da destillirtes Wasser gewöhnlich eine Spur von Kohlensäure enthält, auch die Luft nicht frei davon ist, so ist es nöthig eine kleine Portion Aetzkalk auf einem Uhrglase unter die Glocke zu stellen. Auf diese Art habe ich den Zinkwürfel, ohne das geringste Anlaufen, mehrere Monate unter der Wasserglocke erhalten.

sen wurde. Der Wasserdampf vertheilte sich bald in der Glocke und gab der Luft ihren vollen Wassergehalt.

Das Resultat dieses Versuchs war, daß das Zink in einigen Tagen seinen Metallglanz verlor, und sich mit einer feinen, weissen, erdartigen Substanz bedeckte, ohne Zweifel einem Hydrocarbonat von Zinkoxyd, wovon weiter unten mehr. Wurde der Zinkwürfel auf die nämliche Weise in eine Wasserglocke gestellt, worin kohlensaures Gas in etwas grösserer Quantität eingeleitet wurde, so waren die Flächen der Metalle schon am andern Tage durch Oxydation stark angegriffen.

Diese Versuche scheinen daher schon erwiesen zu haben, daß dasjenige Anlaufen, welches das Zink in der Luft gewöhnlich erleidet, nicht bloß von der Einwirkung des Wassergases, sondern auch von der Kohlensäure, nebst der des Sauerstoffs herrührt; damit aber kein Zweifel übrig bliebe, ward noch folgender Versuch angestellt: Eine Zinkplatte, die ungefähr vor einem Jahre rein geschleutert und nachher angelauten war, wurde in kleine Stücke zerschnitten, und in eine kleine tubulirte Flasche gebracht, woraus eine zwei Mal knieförmig gebogene Röhre in ein Cylinderglas, welches eine klare Auflösung von Bleioxyd in Wasser (s. Bd. 41 S. 307) enthielt und mit einem nicht ganz schliessenden Pfropfen bedeckt war. Als mit Wasser verdünnte Schwefelsäure in die tubulirte Flasche gegossen wurde, fing das Bleioxydwasser in wenigen Augenblicken mit der dem Hydrocarbonat eigenen, gleichsam fettglänzenden Fällung an unklar zu werden, und zeigte daher, daß hier Kohlensäure entwickelt wurde. Als die Bleioxyd-Auflösung nach einer Weile, nachdem natürlicherweise die auf der Oberfläche befindliche Substanz als verschwunden angesehen werden mußte, gegen eine frische zweite Auflösung umgetauscht ward, entstand keine deutlich bemerkbare Fällung mehr, wiewohl das entwickelte Was-

Sauerstoffgas durch seinen Geruch die gewöhnliche Anwesenheit des kohlehaltigen Stoffes anzeigte. Daraus ergibt sich also klar, daß die weißgraue Oberfläche auf dem metallischen Zink kein Suboxyd ist, auch kein Oxyd, sondern kohlensaures Zinkoxyd, oder eigentlich eine Verbindung von Hydrat mit Carbonat, wie sogleich näher gezeigt werden soll.

Läßt man ein frisches Stück Zink mit lufthaltigem Wasser in flüssiger Gestalt einige Zeit in Berührung, so bildet sich Zinkoxydhydrat, dies nimmt bald Kohlensäure aus der Luft auf, und so entsteht ein Hydrocarbonat. Um das Hydrat rein zu erhalten, muß die Kohlensäure ausgeschlossen werden. Wenn auf solche Weise Zink, z. B. in geschnittene Streifen von einer gut polirten Platte, spiralförmig gebogen, so daß es auf einem beschränkten Raum eine große Fläche darbietet, in eine Flasche mit Wasser gebracht, und dann die Mündung mit dem oben beschriebenen, die Kohlensäure abhalten-ten, Pfropfen verschlossen wird, so findet man nach Verlauf mehrerer Monate Zinkoxydhydrat, in Form von kleinen Nadeln oder einer weichen Wolle, auf der Oberfläche des Zinks abgesetzt, und meistens flockenweise zu kleinen kugeligen oder warzenförmigen Gestalten zusammengruppirt. — Eine Untersuchung dieses, in einer Glocke über Schwefelsäure getrockneten Hydrats hat eine gleiche Zusammensetzung ergeben, als die vorher bekannte, auf anderem Wege erhaltene Verbindung von Wasser mit Zinkoxyd, nämlich 93 Th. Zinkoxyd und 7 Th. Wasser.

Setzt man eine Spirale von Zink, in einem offenen Gefäße mit Wasser übergossen, dem freien Zutritt der Luft aus, so bedeckt sie sich nach Verlauf von mehreren Wochen oder Monaten, besonders nachdem das Wasser verdampft ist, mit einem rauhen, weißen Pulver, welches Kohlensäure, Wasser und Zinkoxyd in demselben Verhältnisse enthält, als die natürlich vor-

kommende, von Smithson analysirte Verbindung, d. h. es ist ein Carbonat mit einem Hydrat verbunden. Die Analyse des auf oben erwähnte Weise gebildeten Pulvers, mit 0,5 Gran angestellt, gab nämlich auf 100 Th.:

Zinkoxyd	71,25
Kohlensäure	14,19
Wasser	14,56 <sup>1)</sup> .

Zuletzt mag noch, als Resultat eines angestellten Versuches, angeführt werden, daß Zink, auch längere Zeit (Jahre lang) unter luftfreiem Wasser aufbewahrt, nicht die mindeste Veränderung erleidet, auch nicht das Wasser zersetzt. Die Angabe, daß Zink bei gewöhnlicher Temperatur das Wasser zersetze und sich allmählig Wasserstoffgas entwickle, ist daher ungegründet <sup>2)</sup>.

### E i s e n.

Wiewohl das Eisen im Allgemeinen für schnell oxydirbar angesehen wird, so erhält sich doch dieses Metall ganz unverändert, nicht bloß in einer trocknen, sondern auch in einer mit Wassergas gesättigten atmosphärischen Luft; und damit eine Oxydation zur Bildung des Oxydhydrats entstehen soll, müssen nothwendig, außer dem Sauerstoff der Luft und dem Wasser in Form von Gas, noch andere Ursachen mitwirken.

Bringt man Eisen, als Feilspäne oder in Form von polirten ebenen Stücken, in die Wasserglocke, und in die Nähe derselben ein angelaufenes Bleistück, das den dann und wann abgesetzten Thau aufnimmt, so entsteht, auch innerhalb einer längeren Zeit, z. B. von mehreren Monaten, nicht die geringste Spur von Oxydhydrat, auch keine wasserfreie Oxydation, sondern das Metall behält seinen reinen Glanz unverändert. Und Bemerkenswerth

1) Das natürliche Zinkhydrocarbonat, d. h. die Zinkbläthe, besteht aus 71,5 Zinkoxyd, 13,5 kohlensäure und 15 Wasser.

2) Siehe Geiger's Handbuch der Pharmacia, Bd. I S. 617.



ist es hiebei, daß, wenn sogar durch eine schneller entstandene Abkühlung das Blei nicht vermag das Eisen vor dem Thau zu schützen, sondern dieser in Form kleiner Tropfen auf das Eisen sich niederschlägt, doch schwerlich ein Oxydhydrat entsteht, bevor der Thau wieder verdunstet.

Durch diese Beobachtung und die allgemein bekannte Erfahrung, daß Eisen in einer feuchten Atmosphäre sehr schnell rostet, wurde ich veranlaßt folgende Versuche anzustellen:

Zwei eben geschnittene und polirte Eisenstäbe (etwa 5 bis 6 Zoll lang) wurden in Holzstücke eingefast, neben ihnen, in einem Abstand von  $\frac{1}{4}$  Zoll, etwas längere Bleistücke befestigt, und so in einen Keller gebracht, wo sie vom December bis Juli, also acht Monate, verwahrt wurden. Nach Verlauf dieser Zeit fand sich, daß das eine Eisenstück sich vollkommen ohne alle Oxydation gehalten, das zweite Stück aber, neben einem in ihm befindlichen Riss, innerhalb dessen sich natürlicherweise ein Ueberzug von *Oxydum ferroso-ferricum* verborgen befand, einen geringen Beschlag von Oxydhydrat bekommen, sonst aber auch seinen vollen Metallglanz behalten hatte. Vergleichungshalber wurden Eisenstücke, die mit einem gewöhnlichen schwarzen Anlauf von *Oxydum ferroso ferricum* bedeckt waren, in die Wasserglocke gebracht, wo sich dann nach einer ganz kurzen Zeit Oxydhydrat auf der Oberfläche absetzte.

Diese durch mehrmals wiederholte Versuche bestätigten Resultate, verglichen mit dem was oben über die Fällung der Thautropfen auf oxydirte Metalle gesagt worden ist, scheinen mir daher überzeugend zu beweisen, daß das Rosten von Eisen mit metallischer Oberfläche, wenn es in einer mit Wassergas gesättigten, sonst aber reinen, Atmosphäre geschieht, von der in den Rissen und Sprüngen befindlichen Oxydschicht herührt, indem durch eine elektrische Aeußerung zwischen

dem oxydirten und dem reinen Eisen sich die Wassertropfen in Form von Thau um und auf die oxydirten Punkte, als elektro-negativ, sich absetzen, und von da aus die Bildung des Hydrats auch auf das blanke Eisen bewirken.

Außer dieser von der Wirkung der Elektricität hergeleiteten Ursache scheinen aber auch gewisse materielle Stoffe, wenn sie in sehr geringer Menge in der Luft vorhanden sind, dazu beitragen zu können, daß das Eisen mit einer Kruste oder mit Flecken von Rost bedeckt wird, die, wenn sie auch nicht immer ein vollkommen reines Hydrat enthalten sollten, doch als solche sich dem Auge darstellen. Folgende Versuche sind in dieser Absicht angestellt worden:

1) Unter einer Glasglocke, die auf der inneren Seite mit Wasserdunst beschlagen war, wurden auf eine ebene Glasscheibe zwei Weingläser mit darauf liegenden Uhrgläsern gestellt. Auf das eine Glas wurde ein Stück reinen polirten Eisens gebracht, auf das andere eine höchst unbedeutende Portion gepulverten Schwefeleisens und dicht daneben ein Tropfen verdünnter Schwefelsäure. Die Glocke wurde luftdicht verschlossen, und durch eine kleine Bewegung der Glasscheibe die Schwefelsäure mit dem Schwefeleisen in Berührung gebracht, wodurch sich also Schwefelwasserstoffgas entwickeln mußte. — Das Resultat davon war, daß das Eisen erstens bald mit einer schwarzgrauen Farbe anlief, und daß nach einigen Tagen ein rostähnlicher Beschlag auf der Oberfläche sich bildete, wie auch Flecke davon überall auf der unteren Seite.

2) Ein anderer Versuch wurde in einer ähnlichen Vorrichtung mit einem polirten Eisenstück angestellt, so, daß dasselbe in der feuchten Atmosphäre von einer unbedeutenden Portion Chlorgas umgeben war, das auf gleiche Weise durch einen Tropfen verdünnter Schwefelsäure, in Berührung mit gepulvertem Kochsalz und Braunstein,

entwickelt wurde. Das Resultat war auch hier, daß das Eisen sich sehr bald mit Rostflecken bedeckte.

3) Ein Versuch mit einem Stück Eisen, das auf ähnliche Weise der Salzsäure ausgesetzt ward, gab ein gleiches Resultat.

4) Ein analoger Versuch wurde mit einem Tropfen Essigsäure oder gewöhnlichem Essig, welcher, von einem Stück Filtrirpapier aufgesogen, sogleich auf das eine Uhrglas unter der Glocke gebracht wurde. Innerhalb weniger Stunden hatte das Eisen überall Punkte von Rost erhalten, die nach 24 Stunden in bedeutender Menge zugenommen hatten. Bisweilen gelingt es, das man solchergestalt eine schöne Krystallisation von Oxydhydrat bekommt, welches sich kreuzweise auf der Oberfläche des Eisens bildet.

5) Ein Stück polirtes Eisen, das, wie das Zink in dem oben beschriebenen Versuch, unter dem kleinen Thauapparat einer mit Kohlensäure gemischten Luft ausgesetzt wurde, schien kein zuverlässiges Resultat darüber zu geben, ob oder in wiefern die Kohlensäure auf vollkommen reines metallisches Eisen irgend eine Bildung von Oxydhydrat zu bewirken vermöge. Ich wenigstens werde das Resultat, bis genauere Versuche es sicherer feststellen, für verneinend halten <sup>1)</sup>).

6) Ammoniakgas, unter den nämlichen Umständen auf ein Stück Eisen wirkend, gab ebenfalls ein verneinendes Resultat.

Aus diesen verschiedenen Versuchen und dem was vorher angeführt worden ist, wird man daher als erwiesen ansehen können, daß das Rosten des Eisens, welches so oft in bewohnten Zimmern und bei verschiede-

1) Spätere Versuche haben vollkommen sicher gezeigt, daß unter diesen Bedingungen durchaus keine Oxydation oder Bildung des Hydrats stattfindet. — Das Experiment wurde mehrere Wochen fortgesetzt.

nen Einrichtungen des gewöhnlichen Lebens vorkommt, keinesweges von der Feuchtigkeit der Luft, wenn diese auch bis zum Maximum gebracht wäre, entsteht, sondern in Folge oxydirtter Punkte an Rissen und Unebenheiten in der Masse des Eisens, welche, vermöge einer Aeufserung der Contact-Elektricität, durch wechselseitige Einwirkung des reinen und des oxydirten Metalls, als elektro-negativ, Wasserdünste aus der Luft in liquider Form niederschlagen, und solchergestalt die Bildung des Oxydhydrats befördern; dafs ausserdem verschiedene, in der Luft zufälligerweise entwickelte gasförmige Körper, z. B. Schwefelwasserstoffgas, flüchtige Säuren, so wie besonders Essigsäure, nebst mehreren anderen Stoffen, unter Mitwirkung des Wassergases in der Luft, das Rosten des Eisens hervorbringen, bisweilen vielleicht als secundäres oder tertiäres <sup>1)</sup> Product, bisweilen vielleicht blofs als Resultat einer disponirenden (katalytischen) Wirkung des fremden Körpers.

#### C a d m i u m.

Wiewohl dieses Metall selten vorkommt und die Einwirkung der Atmosphäre auf dasselbe auch selten in Betracht kommen kann, so verdient doch bemerkt zu werden, dafs Cadmium in einer mit Wassergas gesättigten Atmosphäre sich unverändert hält, und im lufthaltigen Wasser mit einem hell weifsgrauen Pulver bedeckt wird, das aller Wahrscheinlichkeit nach ein Hydrat ist. Dafs ausserdem die weifsgraue Substanz, mit der sich Cadmium in der Luft mit der Zeit überzieht, Kohlensäure enthält, habe ich, durch Reaction auf Bleioxyd-

was-

1) Z. B. bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoffgas bildet sich natürlicherweise erst Schwefeleisen, welches sich bald an schwefelsaures Salz oxydirt, dieses zersetzt sich nachher und läßt basisches schwefelsaures Eisenoxyd als einen rostförmigen Beschlag zurück.

wasser, auf die beim Zink angegebene Weise auch gefunden.

### K u p f e r.

Dasselbe erleidet keine Veränderung in einer mit Feuchtigkeit gesättigten atmosphärischen Luft; auch in lufthaltigem Wasser von flüssiger Gestalt scheint Kupfer kaum, oder wenigstens äusserst schwach, eine Oxydation zu erleiden. Eine Wassermasse von mehreren Zoll Höhe, worin einige Spiralen von Kupfer gelegt und mit Papier bedeckt waren, ward mehrere Monate hindurch in gewöhnlicher Temperatur bis zu gänzlicher Eintrocknung stehen gelassen. Das Metall fand sich auf dem grössten Theil seiner Oberfläche rein und blank, bloß nach unten zu zeigte sich ein schwacher schwarzgrauer Umlauf. Dünnes Kupferblech, das zum Theil in Wasser tauchte, zum Theil aus dessen Oberfläche hervorragte, und unter einer Glocke einer mit Kohlensäure vermischten Luft ausgesetzt ward, erhielt nach Verlauf mehrerer Wochen einen schwarzgrauen Anlauf, und auch in geringerer Quantität einen bläulichgrünen Beschlag. — Dieses alles scheint zu beweisen, daß feuchte Luft ohne alle Einwirkung auf metallisches Kupfer ist, und daß lufthaltiges Wasser in flüssiger Gestalt auch von geringem oder keinem Einflusse sey, wenn nicht Kohlensäure, vielleicht auch andere flüchtige Körper zugleich einwirken.

Die Resultate der vorstehenden Untersuchung möchten zuletzt kürzlich in folgende Hauptpunkte zusammengefaßt werden können.

1) Kein Metall oxydirt sich bei gewöhnlicher Temperatur in einer vollkommen trocknen atmosphärischen Luft.

2) In einer mit Feuchtigkeit gesättigten Luft oxydiren sich von den bekannteren oder allgemeiner vorkommenden Metallen bloß Arsenik und Blei. Die Oxydation wird durch Wärme erleichtert, und die Producte davon

sind Suboxyde. Weder Zink noch Eisen können unter diesen Umständen oxydirt werden.

3) In einer feuchten Luft, die zugleich Kohlensäure enthält, läuft das Zink an, und bedeckt sich mit einer kohlensaures Zinkoxyd enthaltenden Substanz. Der gewöhnliche weißgraue Beschlag auf dem erwähnten Metalle ist weder Suboxyd, noch Oxyd, sondern ein Hydrocarbonat von Zinkoxyd.

4) In Berührung mit Wasser in flüssiger Gestalt, unter Einwirkung der atmosphärischen, aber kohlen säurefreien Luft bilden sich im Allgemeinen Oxydhydrate von Wismuth, Blei, Zink und Eisen. Auf Wismuth aber bildet sich außerdem unter verschiedenen Umständen auch ein schwarzgraues Suboxyd (?) und ein gelbes Oxyd, und auf Blei in besonderen Fällen ein Suboxyd und ein rothes Superoxyd.

5) Auf Arsenik bildet sich unter den eben erwähnten Verhältnissen, oder bei Einwirkung von Luft mit Wasser in flüssiger Gestalt (die Kohlensäure mag ausgeschlossen seyn oder nicht) immer *arsenichte Säure*.

6) Das Eisen, welches mit reiner metallischer Oberfläche in einer mit Feuchtigkeit gesättigten Luft sich vollkommen ohne Oxydation hält, erlangt doch, unter diesen Umständen, an Rissen und anderen oxydirten Punkten, leicht Flecke von Oxydhydrat, und zwar vermöge einer elektrischen Action zwischen dem oxydirten und reinen Metalle. Außerdem bringen auch fremde, in sehr kleinen Quantitäten in der Luft befindliche Substanzen, z. B. Schwefelwasserstoff, Essigsäure, Chlor u. s. w. sehr schnell den Rost hervor.

7) Die Kohlensäure in der Luft bewirkt, unter Einwirkung zugleich von Wasser in flüssiger Gestalt, die Bildung der Hydrocarbonate von Blei, Zink und Wismuth. Ist das Blei vorher suboxydirt, so entsteht weder ein Hydrat noch ein Hydrocarbonat.



**XII. Ueber Antimon-Wasserstoffgas und die davon abhängige Unsicherheit des neuerlich von James Marsh entdeckten Verfahrens zur Entdeckung des Arseniks in mehreren wichtigen Fällen; von C. H. Pfaff in Kiel.**

Die chemischen Lehrbücher haben bis jetzt das Daseyn einer gasförmigen Verbindung des Antimons mit dem Wasserstoff gänzlich ignorirt. In den neuesten derselben von Gmelin, Berzelius u. A. findet sich nur eine ganz kurze und als zweifelhaft hingestellte Angabe einer starren Verbindung des Antimons mit dem Wasserstoff zu einer Art von Hydrure, wenn nämlich in dem Kreise einer Volta'schen Säule Antimon als negativer Zuleiter in Anwendung gebracht wird. Ein Zufall führte mich zu der Entdeckung, daß es ein dem *Arsenik-Wasserstoffgase* ganz ähnliches *Antimon-Wasserstoffgas* giebt. Die große Aehnlichkeit des Antimons mit dem *Arsenik* und *Phosphor*, welche beide mit dem Wasserstoff gasförmige Verbindungen eingehen, hätte längst darauf leiten sollen.

Als ich in dem 2. Hefte des XXIII. Bandes der *Annalen der Pharmacie* den höchst interessanten Aufsatz von James Marsh mit den lehrreichen Zusätzen von J. Liebig: Beschreibung eines Verfahrens u. s. w., S. 207, gelesen <sup>1)</sup>, war ich sehr begierig durch eigene Versuche mich von der Richtigkeit dieses so eleganten und einfachen Verfahrens, das Arsenik zu entdecken, zu überzeugen. Es wurden daher, ganz nach der Methode von Marsh, Versuche mit weißem Arsenik, mit Arseniksäure, mit Fowler's Tropfen, mit Gemengen von weißem Arsenik und verschiedenen Nahrungsmitteln, Getränken und

1) Vergl. das vorige Heft, S. 159.

thierischen Flüssigkeiten angestellt, und die Resultate ganz so erhalten, wie James Marsh und J. Liebig sie angeben. Meine Ueberraschung war groß, als ich fast verschwindende Quantitäten von weißem Arsenik die bestimmten schwarzen oder grauschwarzen Flecken von metallischem Arsenik auf eine Porcellanfläche absetzen sah. Es wurde gerade in meinem Laboratorium *Brechweinstein*, nach der in der *Pharmacopoea Sleswico-holsatica* vorgeschriebenen Methode aus Salpeter, Schwefelspießglanz, englischer Schwefelsäure und gereinigtem Weinstein durch Krystallisation bereitet. Die Krystalle waren sehr gut ausgefallen, vollkommen weiß, und durch wiederholte Krystallisation erhalten. Ich wollte diesen Brechweinstein auf einen etwaigen Hinterhalt von weißem Arsenik prüfen, der aber nach der Art der Bereitung (der Brechweinstein war nämlich vor der letzten Krystallisation nur in 14 Theilen Wasser aufgelöst worden) und nach der Reinheit der dazu angewandten Materialien nicht darin zu erwarten war. Durch einen vorläufigen Versuch hatte ich mich von der vollkommenen Reinheit der angewandten Schwefelsäure und des gewalzten Zinks überzeugt, denn das mit demselben erhaltene Wasserstoffgas setzte auch nicht die leiseste Spur eines schwarzen Fleckes an eine Porcellanfläche ab. Es wurde zu dem Gasentbindungsapparate, der mit einer hinlänglich langen, in eine feine Spitze ausgehenden Glasröhre versehen war, eine große Quantität von der Auflösung des Brechweinsteins hinzugegan. Wie groß war aber mein Erstaunen, als ganz dieselben, nur wenig glänzenden metallischen Flecken an jeder Stelle der Porcellanfläche, welche von der Flamme getroffen wurden, sich ansetzten, gerade so, wie wenn ich eine Auflösung von weißem Arsenik hinzugegossen hätte. Auch setzte sich in einer, oben und unten offenen, unten etwas erweiterten Glasröhre, welche über die Flamme gehalten wurde, ein ähnlicher weißer Auszug, wie wenn es arsenige Säure

wäre, ab. Nur zeigte sich der wesentliche Unterschied von dem Versuche mit weißem Arsenik, daß nichts von Knoblauchgeruch zu bemerken war.

Ich sah immer wieder in Liebig's Zusätzen nach, und fand allerdings, daß derselbe vor den Täuschungen warnte, zu welchen *alle schweren Metalle*, namentlich auch das Antimon, Veranlassung geben könnten, indem, seiner Meinung nach, unendlich feine Tröpfchen von den Auflösungen jener Metalle mit fortgerissen werden, deren Metalloxyde sich dann in der Flamme des Wasserstoffgases reduciren. Indessen bemerkt er an einem andern Orte, daß der Arsenikanflug nicht zu verwechseln sey mit den schwarzen, scharf abgegränzten *Punkten* und Flecken, welche von Eisen und andern Metallen, sich bei dem starken Ausbrausen der Säure an die Porcellanscheibe ansetzen. Vollkommen zuverlässig soll aber vollends, nach S. 223, die Methode werden, wenn man das Wasserstoffgas durch eine 1 Linie weite, hinlänglich lange Glasröhre streichen lasse, und etwa zwei Zoll von der Spitze die Röhre durch eine Weingeistflamme zum Glühen bringe, wo sich dann das Arsenikmetall *ausserhalb* der glühenden Stelle als schwarzer *metallisch glänzender Ueberzug* an die Glasfläche anlege, während die fremden Metalle sich innerhalb der glühenden Stelle reduciren, und als schwarze Ringe anlegen, welche sich nicht so wie das Arsenik durch eine *schwache Glühhitze* wegtreiben lassen.

Zur Prüfung dieser Angabe und zur weiteren Aufklärung der oben beschriebenen Phänomene wurden nun mehrere Entzündungsapparate mit solchen rechtwinklich in eine horizontale Richtung gebogenen, in eine feine Spitze ausgehenden Glasröhren eingerichtet. Der Versuch mit weißem Arsenik gab vollkommen das angegebene Resultat. An der Stelle, wo die Weingeistflamme auf die Glasröhre wirkte, und dieselbe in Glühen versetzte, zeigte sich *kein* Anflug, dagegen auf beiden Seiten derselben

an der oberen Glaswand ein sehr bestimmter Anflug von metallisch glänzendem Arsenikmetall. Wurde die Weingeistflamme auf denselben gerichtet (nachdem die Röhre aus dem Entbindungsapparate herausgenommen war), so konnte er weggetrieben werden, und verwandelte sich zum Theil in einen weißen Anflug.

Derselbe Versuch wurde nun mit einer Auflösung von *Brechweinstein* wiederholt. Die Schwefelsäure schlägt aus derselben einen ziemlich reichlichen weißen Bodensatz nieder, der durch Umschütteln zur Suspension gebracht wurde. *Alles verhielt sich auf gleiche Weise wie beim weißen Arsenik.* Zu beiden Seiten der durch die Weingeistflamme glühend gemachten Stelle zeigte sich der metallischglänzende Anflug, der nur etwas heller weißglänzend, als der im vorigen Versuche von Arsenik herrührende war, er konnte auf gleiche Weise durch die Weingeistflamme weggetrieben werden, und verwandelte sich zum Theil in einen Anflug von weißem Oxyd.

Es wurde mit aller Vorsicht aus *Chlorspießglanz* Algarothpulver bereitet, dasselbe in den Gasentwicklungsapparat gebracht und wohl umgeschüttelt. Alle Erscheinungen verhielten sich auf gleiche Weise wie beim Brechweinstein. Es war nun kein Zweifel mehr übrig, daß diese Erscheinungen, die gänzlich denen vom Arsenik gleich waren, nicht von diesem, sondern von ganz ähnlicher Verbindung des Antimons mit dem Wasserstoffe, vom Antimon-Wasserstoffgase herrührten. Andere Proben, die mit den empfindlichsten Reagentien angestellt wurden, bewiesen überdies, daß sowohl der angewandte Brechweinstein als das Algarothpulver von jedem Hinterhalte an Arsenik frei waren.

#### Antimon-Wasserstoffgas.

Man erhält es am leichtesten und reinsten, wenn man in einem Gas-Entbindungsapparate zu verdünnter Schwefelsäure eine Auflösung von Brechweinstein oder

auch reines Antimonoxyd bringt, und dann einen Streifen von gewalztem Zink, an den Kork der Entbindungsröhre befestigt, hineinbringt oder auch nur hineinwirft. Ist die Gasentbindung nicht stürmisch, so bleibt die Gasentbindungsröhre in ihrer ganzen Ausdehnung ganz ungetrübt, nichts setzt sich in derselben ab, und an mechanisch fortgerissenen Tröpfchen der Auflösung ist nicht zu denken. Das übergehende Antimon-Wasserstoffgas ist so klar und farblos wie reines Wasserstoffgas. Dasselbe nähert sich in vielen Eigenschaften dem Arsenik-Wasserstoffgas.

1) Eine erste merkwürdige Eigenschaft desselben, worin es ganz mit dem Arsenik-Wasserstoffgase (und auch dem überzeugenden Gase) übereinkommt, ist, daß es durch Glühhitze in seine Bestandtheile zersetzt wird, und sich dann das Antimon an kalte Stellen als metallischer Anflug mit seinem eigenthümlichen Glanze absetzt. Wird die Flamme des durch eine horizontale Glasröhre gebenden Wasserstoffgases, noch ehe diese durch eine Weingeistlampe glühend gemacht wird, an eine Porcellauscheibe hingeleitet, so ist der schwarze runde Fleck, der an jeder davon getroffenen Stelle entsteht, ohne metallischen Glanz mit einem mehr hellgrünen Ringe umgeben, dagegen zeigen die Flecken den schönsten metallischen Glanz, wenn die Glasröhre, während die vorn brennende Flamme gegen die Porcellauscheibe stößt, zugleich einige Zolle davon durch eine Weingeistlampe glühend gemacht wird, wobei sich zugleich in der Röhre der metallische Anflug absetzt. Beim Arsenik-Wasserstoffgase zeigen sich die Flecken auch dann metallisch-glänzend, wenn die Glasröhre nicht glühend gemacht wird. Doch ist diese Verschiedenheit nicht charakteristisch genug, da bei verändertem Verhältnisse des Arsens die Flecken auch wohl nur schwarz, ohne allen metallischen Glanz erscheinen.

2) Das Antimon-Wasserstoffgas hat keinen von dem-

jenigen des gewöhnlichen Wasserstoffgases, das durch Zink mit Schwefelsäure bereitet wird, merklich abweichenden Geruch. Etwas *Knoblauchartiges* konnte ich durchaus darin nicht entdecken. Auch die Flamme desselben zeigte keinen auffallenden Geruch.

3) Die Flamme des Antimon-Wasserstoffgases ist von intensiv weißem etwas gelblichem Lichte.

4) Wird das Antimon-Wasserstoffgas über wohl ausgekochtem destillirten Wasser aufgefangen, und in Flaschen, die einen Theil des letzteren enthalten, aufbewahrt, so zersetzt es sich allmählig, gerade so wie das Arsenik-Wasserstoffgas, es scheidet sich immer mehr Antimon aus, wodurch das Wasser schwarz gefärbt wird. Die Entfärbung des dunkeln Wassers durch Königswasser, und der Kermes-Niederschlag aus dieser Auflösung durch Hydrothion-Ammoniak zeigt das Daseyn des Antimons auf das Bestimmteste an. Je mehr das Antimon-Wasserstoffgas mit gewöhnlichem Wasserstoffgase gemengt ist, um so länger dauert es, ehe die Färbung des Wassers auffallend wird, die dann auch wohl nur bräunlichgelb erscheint.

5) Auf eine Auflösung von Quecksilberchlorid (Aetzsublimat) wirkt das Antimon-Wasserstoffgas sehr ähnlich wie das Arsenik-Wasserstoffgas. An der unteren Oeffnung der Gasentbindungsröhre bemerkt man bald ein schwarzes Häutchen, das aber in dem reichlichen weißen Niederschlage verschwindet. Dieser Niederschlag zeigte sich bei der Analyse als ein Gemenge von Antimonoxyd und Calomel.

6) Eine Auflösung von salpetersaurem Silber wird durch Antimon-Wasserstoffgas reichlich schwarz getrübt und gefällt.

7) *Schwefelsaure Kupferauflösung*, durch welche das Antimon-Wasserstoffgas geleitet wurde, wurde nicht zersetzt. Dies war nicht anders zu erwarten, da bekanntlich das Antimon nicht das Kupfer, sondern um-



gekehrt, das Kupfer das Antimon aus seinen Auflösungen niederschlägt.

B) Chlor zu dem Antimon-Wasserstoffgase durch eine Schicht Wasser, über welche sich dasselbe in einer Flasche befand, geleitet, brachte zu meiner Verwunderung keine merkliche Reaction damit hervor. Das Wasser färbte sich bloß nach einiger Zeit (als das Gemenge unter einem schwarzen Mantel ruhig hingestellt war) etwas gelb.

Die Empfindlichkeit der Methode von James Marsh für das Antimon geht oft so weit wie für das Arsenik.

Es wurde nun ein halber Gran Brechweinstein in fünf Quentchen Wasser aufgelöst, und ein Quentchen verdünnter Schwefelsäure hinzugesetzt, wodurch die Flüssigkeit etwas opalsirend wurde. Es wurden nun einige Stückchen gewalzten Zinks hineingeworfen, und, wie oben, eine horizontale Gasentbindungsröhre aufgesetzt. Wurde das Gas entzündet und die Flamme gegen eine Porcellanfläche geleitet, so zeigten sich sogleich die bestimmten schwarzen, mit einem silbergrauen Ringe eingefassten Flecken. Wurde nun die Röhre einige Zolle von der Spitze durch eine Weingeistflamme glühend gemacht, so legte sich an die obere Fläche der Glasröhre, auf beiden Seiten der geglühten Stelle, der schöne metallischglänzende Anflug ab, die schwarzen Flecken der Flamme an der Porcellanscheibe blieben aber dann aus; wurde die Weingeistflamme entfernt, so erschienen sogleich wieder die schwarzen Flecken. Selbst  $\frac{1}{8}$  Gran Brechweinstein konnte auf diese Weise noch entdeckt werden. Dafs hiebei an mechanisch fortgerissene kleinste Theilchen der Auflösung nicht zu denken sey, bedarf wohl nach allem Bisherigen keine weitere Auseinandersetzung, wird aber auch schon dadurch hinlänglich widerlegt, dafs wenn man in das Gasentbindungsgefäfs eine Auflösung von Eisenchlorür, schwefelsaurem Eisen, essigsaurem Blei, schwefelsaurem Kupfer u. s. w. bringt, sich

von allen obigen Erscheinungen *Nichts* zeigt. Wie zweideutig in manchen Fällen das von James Marsh angegebene Verfahren, eine kleine Quantität Arsenik zu entdecken, durch das so ganz ähnliche Verhalten des Antimon-Wasserstoffgases wird, leuchtet von selbst ein. Namentlich wird es auf diese Art ganz unmöglich die Verunreinigung des Spießglanzes, des Schwefelapießglanzes, des Brechweinsteins und anderer Spießglanzpräparate auszumitteln<sup>1)</sup>. Hr. Liebig sagt zwar, man habe in Rücksicht auf die beiden ersteren nichts nöthig, als dieselben durch Salpetersäure zu oxydiren, aus der salpetersauren Flüssigkeit durch Erhitzen mit Salzsäure alle salpetrige Säure zu verjagen, und dann die Flüssigkeit in einen Apparat von J. Marsh zu bringen, wo das Resultat nicht zweifelhaft bleiben werde. Ich behandelte auf diese Weise ein nach J. Liebig's Methode, durch dreimaliges Schmelzen mit kohlensaurem Natron und Schwefelantimon, vollkommen gereinigtes Spießglanzmetall, erhielt aber die schwarzen Flecken gerade so, wie wenn die Salpetersäure Arsenik aufgelöst hätte. *Sie hingen aber lediglich von dem in der Salpetersäure aufgelösten reinen Spießglanz ab.* Wir sind also abermals gezwungen in allen Fällen, wo Spießglanz auf Arsenik zu prüfen ist, die alten Methoden zu Hülfe zu nehmen, und etwa auch unseren Geruchssinn, der aber nie sicher leiten kann.

*Resultate.* 1) Es giebt eine wahre chemische gasförmige Verbindung zwischen Antimon und Wasserstoff, ein wahres *Antimon-Wasserstoffgas*.

2) Dasselbe kommt in den meisten seiner Eigenschaften mit dem Arsenik-Wasserstoffgase überein.

3) Wo Antimon zugleich mit Arsenik vorkommt, ist es unmöglich nach dem von James Marsh angegebenen Verfahren das Arsenik mit Sicherheit auszumitteln, da das Antimonwasserstoffgas ganz ähn-

1) Also ist auch Serullax's frühere Angabe, daß alles Antimon arsenikhaltig sey, unrichtig. P.

liche Erscheinungen wie das Arsenik-Wasserstoffgas zeigt <sup>1</sup>).

### XIII. Ueber die Zusammensetzung der Zuckersäure; von H. Hefs.

(Vom Verfasser mitgetheilt aus dem *Bulletin scientifique* der Petersburger Academie.)

Die Säure, welche man durch Behandlung von Zucker oder Stärkmehl mit zwei Theilen Salpetersäure erhält, ist von Schöele entdeckt. Später ist sie der Gegenstand mehrer Untersuchungen gewesen. Hr. Guérin-Varry unter andern hat sie aus  $C^4H^6O^6$  zusammengesetzt gefunden, und *acide oxalhydrique* genannt. Prof. Erdmann in Leipzig behauptet, diese Säure sey isomer mit der Weinsäure und verwandle sich nach einiger Zeit in dieselbe. Hr. Erdmann glaubt das gewöhnliche weinsaure Kali erhalten zu haben.

Als ich die Säure nach Hrn. Erdmann's Methode bereitete, erhielt ich mit ihr Salze, die ganz andere Resultate gaben. Es ist jedoch leicht, durch Hinzufügung von Kali zu der, aus der Behandlung des Zuckers mit

- 1) Vorstehender Aufsatz bestätigt die Erfahrungen, welche Herr Lewis Thompson im *Phil. Magaz. Mus* 1837, p. 353, bekannt gemacht hat. Hr. Th. bereitet das Antimon-Wasserstoffgas durch Auflösung einer durch Zusammenachmelzung bereiteten Legirung aus gleichen Theilen Antimon und Zink in verdünnter Schwefelsäure, bemerkt indess, daß schon ein einziger Gran Brechweinstein, bei Auflösung in verdünnter Schwefelsäure, mit Zink ein hinlänglich mit Antimon beladenes Wasserstoffgas liefere, um das Daseyn dieses Metalls, nach Anzündung des Gases, durch Ablagerung einer schwarzen Kruste auf eine über die Flamme gehaltene Porcellanplatte erkennen zu lassen. Auch er hebt die hieraus entspringende Mischlichkeit der Marsh'schen Probe auf Arsenik hervor, und fügt noch hinzu, daß, bei Anwesenheit von Antimon, selbst das Schwefelwasserstoffgas und das schwefelsaure kupfer-Ammoniak trüglich werden. In den Eigenschaften des Gases, die er indess nur kurz berührt, stimmt Hr. Th. mit dem geehrten Verfasser des obigen Aufsatzes. P.

Salpetersäure entstehenden, indess noch sauren, Flüssigkeit ein Salz zu erhalten, welches sich in kaltem Wasser wenig, in heissem weit mehr löst. Wenn man dieses Salz, nachdem es durch wiederholte Krystallisation gereinigt ist, erhitzt, so schwillt es stark auf: durch Calcination giebt es eine Menge von  $K_2CO_3$ , welche an  $K$  18,66 Procent vom Salz enthält, während der Weinstein 24,97 giebt. Durch Verbrennung dieses Salzes in Sauerstoff erhielt ich von 1,01 Grm. Salz:

0,982 Kohlensäure und 0,338 Wasser.

Eine kleine Portion Kohle entging der Verbrennung, da sie vom kohlensauren Kali eingehüllt ward; indess war sie nicht beträchtlich genug, um einen Fehler zu veranlassen.

Dividirt man die Menge der erhaltenen Kohlensäure durch die mit dem Kali verbunden gebliebene, welche 1 At. vorstellt, so hat man  $\frac{0,982}{0,091} = 10,7$ . Offenbar ist also 11 die richtige Zahl, und das Salz enthält mithin 12 At. Kohle. Da nun ein Theil des in Carbonat umgewandelten Salzes genau hinreicht, um einen dem ersten gleichen Theil dieses Salzes zu sättigen, so folgt, dass das zerlegte Salz zwei Atome Säure auf ein Atom Basis enthält, und dass jedes Atom Säure sechs Atome Kohle einschliesst.

Berechnet man dies Resultat, so bekommt man für die Zusammensetzung des analysirten Salzes:

Kali	18,66
Kohle	28,52
Wasserstoff	3,60
Sauerstoff	49,22
	<hr/> 100,00.

Eine abermalige Analyse mit 1,6 von einer besonders bereiteten Portion des Salzes gab 1,513 Kohlen-  
säure und 0,519 Wasser.

Allein  $1,513 \text{ C} = 0,418359 \text{ C}$ . Fügt man hierzu die  $0,038987$  des kohlensauren Kali, so hat man  $0,557346$  oder  $28,58$  Procent Kohle.

$0,519 \text{ Wasser} = 0,057667$  oder  $3,604$  Proc. Wasserstoff.

Da das Salz ein saures ist, so enthielt es wahrscheinlich  $1 \text{ At. Wasser}$ . Geht man von der Menge des im Kali enthaltenen Sauerstoffs aus, so findet man  $1 \text{ Atom Wasser} = 3,567 \text{ Proc}$ . Dividirt man aber die ganze Menge Wasserstoff durch die in einem Atom Wasser enthaltene Menge, so erhält man die Zahl  $9$ . Daraus folgt, daß das zerlegte Salz zusammengesetzt war nach der Formel  $\text{K} + 2\text{C}^{\text{H}}\text{O} + \text{Aq}$ , welche giebt:

	Gefunden.	Berechnet.
Kali	18,660	18,91
Kohle	28,520	29,14
Wasserstoff	3,206	3,20
Wasser	3,567	3,60
Sauerstoff	46,047	44,85
	100,00	100,00.

Um das wasserfreie Salz zu zerlegen, kochte ich das saure Salz mit einem Ueberschuss von Bleioxyd. Das Bleisalz, wohl gewaschen und getrocknet, enthielt  $23,81$  Proc. Säure. Allein  $2,73 \text{ Grm. Salz}$ , die  $0,6508$  Säure enthalten, gaben bei der Analyse  $0,876$  Kohlensäure und  $0,247$  Wasser; dieß giebt:

	Gefunden.	Berechnet.	Atome.	
Kohle	37,21	37,94	6	458,61
Wasserstoff	4,21	4,13	8	49,92
Sauerstoff	58,58	57,93	7	700,00
	100,00	100,00	$1 \text{ At.} =$	$1208,56.$

Diese Säure hat also die nämliche Zusammensetzung wie die wasserfreie Schleimsäure. Bekanntlich erhält man

indess nach den gewöhnlichen Processen zur Schleimsäure  $\equiv C^6 H^{10} O^4$ , eine Formel, die von Berzelius aufgestellt und von andern Chemikern bestätigt ist. Ueberdies wissen wir, dass diese Säure, wenn man ihre Lösung abdampft, unlöslich wird. Hr. Malaguti hat gezeigt, dass sie durch diese Umwandlung ihr Sättigungsvermögen nicht verändert und dabei kein Wasser abgiebt. Daraus folgt, dass die Zuckersäure nicht aus einer Zersetzung der Schleimsäure entspringt.

Allein wenn Gummi  $\equiv C^{12} H^{22} O^{11}$ , so ist wasserfreier Zucker  $\equiv C^{12} H^{20} O^{10}$ . Durch Behandlung mit Salpetersäure bekommt man aus Gummi  $\equiv C^6 H^{10} O^4$  und aus Zucker  $C^6 H^8 O^7$ .

Zwischen den beiden Producten herrscht also der nämliche Unterschied wie zwischen den ursprünglichen Substanzen. Nun wissen wir andererseits durch die von den HH. Liebig und Pelouze bestätigten Versuche des Hrn. Frémy, dass man bei der Aetherbildung ein Atom Wasser aus der Zusammensetzung der Schleimsäure abcheiden kann. Diese Thatsache beweist, wie mir scheint, dass die organischen Substanzen ein Atom Wasser enthalten können, zwar als Wasser, aber inniger gebunden als das sogenannte salinische Wasser. Vielleicht ist die Zeit nicht mehr sehr fern, wo wir, durch eine genauere Kenntniss dieses Verbindungszustandes, im Stande seyn werden, Gummi in Rohrzucker zu verwandeln.

---

XIV. *Bemerkungen zu dem Aufsatz des Hrn. Prof. Fechner über die Kniepresse. Aus einem Schreiben des Hrn. Prof. Schubarth an den Herausgeber.*

---

— In dem 7. Stück Ihrer höchst schätzbaren Annalen der Physik etc. ist ein Aufsatz des Hrn. Prof. Fechner



abgedruckt »über die Kniepresse,« welcher mir zu folgenden Zeilen Veranlassung gegeben. Der Hr. Verfasser führt Seite 501 an, daß das Princip der Kniepresse in späteren Zeiten fast ganz vergessen worden sey. Wollaston allein habe eine solche Presse construirt und angewendet, später der Inspector Fuchs in Leipzig, welchem ein Patent für die preuss. Monarchie erteilt worden sey. Ferner: eine nähere Betrachtung der Wirkung dieses Principis habe noch nicht stattgefunden.«

In diesen Behauptungen des Hrn. Prof. Fechner waltet ein Irrthum ob, wie ich sogleich darthun werde.

- 1) Das Princip der Kniepresse ist seit mindestens 20 Jahren bei Buchdruckerpressen angewendet worden. Namentlich haben Medhurst, Stanhope, Ruthven, Aymer theils in Verbindung mit der Schraube, theils, und vornämlich, als Ersatzmittel der Schraube, wie in der Columbian-prefs, das Princip des zusammengesetzten Hebels angewendet. Man sehe hieüber einen Aufsatz in Silliman's American Journ. 1821, Mai; *Encyclop. britann.* von Rees; eine Zusammenstellung in den Verhandlungen des Vereins z. Beförder. d. Gewerbleißes in Preussen, Jahrg. 1823, S. 54.
- 2) In jenem Aufsatz im American Journal (Verhandl. S. 63 und 70) finden sich theoretische Betrachtungen über die Wirkungsweise des zusammengesetzten Hebels sowohl vom Prof. Fischer in Hartford, als auch vom O. L. R. D. Eytelwein, welche also beide dem Hrn. Referenten unbekannt geblieben seyn müssen.
- 3) Das Princip ist auch seit längerer Zeit bei Prägewerken in Anwendung gekommen. 1811 ist in Petersburg die Beschreibung einer solchen von Nevodomski erfundenen Maschine, wie sie im dortigen Münzhötel existirt, in französischer Sprache bekannt gemacht worden. Hr. Uhlhorn in Gre-

venbroich, Regierungsbezirk Düsseldorf, hat, ohne Kenntniß von dieser Prägemaschine zu besitzen, solche für die Münzwerkstätten von Berlin und Düsseldorf, ingleichen für auswärtige Anstalten angefertigt (vergl. Verhandl. S. 64 und 65) <sup>1)</sup>).

- 4) Wenn endlich angeführt ist, der Hr. Fuchs habe ein Patent auf eine Kniepresse erhalten, so ist dies dahin zu modificiren, daß demselben unterm 16. Febr. 1832 ein Patent ertheilt worden ist auf eine Presse mit zusammengesetztem Hebel und *veränderlichen Stützpunkten in ihrer ganzen Zusammensetzung, ohne Jemand in der Anwendung der einzelnen bekannten Theile, allein oder in anderen Zusammensetzungen, zu beschränken.*

Hieraus leuchtet ein, daß sich das Patent auf die Anwendung des zusammengesetzten Hebels (Kniepresse) *an sich* nicht bezieht, diese Vorrichtung wird als bekannt vorausgesetzt, sondern nur auf die Combination des zusammengesetzten Hebels mit *veränderlichen Stützpunkten*. Es ist daher auch die Kniepresse, wie sie z. B. zum Siegeln angewendet wird, nicht in's Patent eingeschlossen; auf sie bezieht sich das Patent in keiner Weise. Ich halte es daher für nöthig, hierauf ganz besonders aufmerksam zu machen.

Berlin, 8. Nov. 1837.

- 1) Auch für Oelpressen ist das Princip des zusammengesetzten Hebels in Amerika vor länger als 12 Jahren bereits angewendet worden.

---

I. *Ueber die Bildung des Kalkspaths und Arragonits; von Gustav Rose <sup>1)</sup>*.

---

Dafs Kalkspath und Arragonit bei ihrer verschiedenen Krystallform dieselbe chemische Zusammensetzung besitzen, also *heteromorphe* oder *isomerische* Körper sind, ist schon seit längerer Zeit angenommen, und wird durch die im Folgenden angeführten Versuche aufser allen Zweifel gesetzt; doch waren die Bedingungen, unter denen sich diese Substanzen bilden, noch gänzlich unbekannt. Nach den bisherigen Beobachtungen schien es sogar, als ob beide unter sehr ähnlichen Umständen entstanden, da sich anscheinend beide sowohl auf nassem als auf trockenem Wege bilden <sup>2)</sup>. Der Umstand indessen, dafs der Tropfstein, der sich noch jetzt in den Kalksteinhöhlen absetzt, Kalkspath, der Karlsbader Sprudelstein dagegen Arragonit ist, brachten mich auf den Gedanken, dafs die Entstehung des Kalkspaths und Arragonits vielleicht eine Wirkung der verschiedenen Temperatur sey, bei welcher sich die Krystalle der kohlensauren Kalkerde bilden, und veranlafste mich, einige Versuche zur Aufklärung dieses Gegenstandes anzustellen.

1) Krystallform der kohlensauren Kalkerde auf nassem Wege.

Wenn man eine Auflösung von kohlensaurer Kalkerde in kohlensaurem Wasser in einem offenen Glase

1) Vorgelesen in der Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse der Academie der Wissenschaften zu Berlin, am 16. Oct. 1837

2) Vergl. Poggendorff's Annalen, Bd. XXI S. 57.

Poggendorff's Annal. Bd. XXXXII.

bei der gewöhnlichen Temperatur mehrere Wochen stehen läßt, so entweicht bekanntlich nach und nach alle Kohlensäure, und es setzt sich die kohlensaure Kalkerde in feinen mikroskopischen Krystallen theils an den Wänden des Glases, theils auf der Oberfläche der Auflösung als Salzhaute ab <sup>1)</sup>). Diese letzteren sind immer am deutlichsten, und werden, wenn man die Kohlensäure durch Bedeckung des Glases mit einer Glasplatte nur langsam entweichen läßt, zuweilen so groß, daß man ihre Form nicht allein mit bloßen Augen erkennen, sondern auch ihre Winkel mittelst des Reflexionsgoniometers messen kann. Die Krystalle sind *Kalkspath* und haben immer die Form des Hauptrhomboëders des Kalkspaths; gewöhnlich sind sie auch an den Enden durch die gerade angesetzte Endfläche abgestumpft.

Eben so erhält man auch Kalkspath, wenn man eine Auflösung von Chlorcalcium mit kohlensaurem Ammoniak oder mit anderen kohlensauren Alkalien bei der gewöhnlichen Temperatur der Luft versetzt. Der Niederschlag, der dadurch entsteht, ist anfangs sehr voluminös und flockig, und behält auch diese Beschaffenheit bei, wenn man ihn bald nach der Fällung filtrirt, ausläßt und trocknet. Läßt man ihn dagegen einige Zeit ruhig stehen, so fällt er nach und nach zusammen und wird körnig. Betrachtet man den ersten lockeren Niederschlag unter dem Mikroskop, so sieht man nur kleine undurchsichtige Körner, die bei sehr starker Vergrößerung oft als solche Ringe erscheinen, vollkommen von

1) Da es ohne größere Apparate schwer hält, sich eine solche Auflösung von kohlensaurer Kalkerde zu verschaffen, so wandte ich mich deshalb an den Hrn Hofrath Soltmann, der mit seiner gewohnten Zuverlässigkeit in seiner Fabrik für künstliche Mineralwässer mir sogleich eine solche Auflösung bereiten und eine große Menge damit gefüllter Flaschen ausstellen ließ, womit ich diese und die in dem Folgenden erwähnten Versuche anstellen konnte, und wofür ich hiermit auch öffentlich meinen Dank aussprechen nicht unterlassen kann.

der Art, wie sie Ehrenberg <sup>1)</sup> bei der Kreide beschrieben hat; der körnig gewordene Niederschlag erscheint dagegen als aus lauter kleinen, scharfbegrenzten, durchsichtigen, vollkommen deutlichen Rhomboëdern bestehend, die, wie die durch Verdunstung erhaltenen Krystalle, sichtlich Hauptrhomböeder des Kalkspaths sind.

Das specifische Gewicht des flockigen Niederschlages fand ich 2,716; das der Kreide 2,720; das des körnigen Niederschlages 2,719 <sup>2)</sup>. Das specifische Gewicht des flockigen Niederschlages ist hiernach wohl etwas geringer als das des körnigen Niederschlages und der Kreide; doch rührt dieser Umstand nur daher, daß das specifische Gewicht des flockigen Niederschlages genommen wurde, nachdem er schon getrocknet war, in welchem Fall es leicht zu gering ausfällt <sup>3)</sup>. Auf jeden Fall ist

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XXXIX S. 105.

2) Bendant gibt das specifische Gewicht des pulverförmigen Kalkspaths noch etwas höher, nämlich = 2,723, an. (Poggendorff's Annalen, Bd. XIV S. 485.)

3) Die Methode, deren ich mich bei der Wägung dieser, wie der übrigen pulverförmigen Körper bediente, die in dieser Abhandlung erwähnt sind, besteht in Folgendem. Das Pulver wurde zuerst in einem größeren Becherglase mit Wasser gemengt, und sodann in ein kleines cylindrisches Glas von etwa einem Zoll Größe gethan, das oben umgebogene Ränder hat, um mittelst eines Haars an den unter der Waagschale befindlichen Haken gehängt werden zu können. Das Glas mit dem Pulver wurde nun erst im Wasser gewogen, dann in ein Wasserbad gestellt, und das Pulver darin zur Trocknis abgedampft und nun wieder gewogen. Auf diese Weise verliert man nichts von dem Pulver; dagegen ein Verlust davon schwerlich vermieden werden kann, wenn man den Versuch umgekehrt macht, und das Pulver zuerst im trocknen Zustande, und dann im Wasser wiegt. Dennoch habe ich das specifische Gewicht eines Niederschlages, der unmittelbar, nachdem er gefällt und ausgesüßt war, in Wasser getragen wurde, meistens etwas höher gefunden, als wenn der Niederschlag erst ausgetrocknet und dann mit Wasser gemengt wurde, selbst wenn ich ihn nun in dem Wasser kochte

der Unterschied zu gering, um durch eine Verschiedenheit in der chemischen Zusammensetzung, welche man wohl bei diesem flockigen Niederschlage angenommen hat, erklärt werden zu können. Man kann demnach wohl annehmen, daß das specifische Gewicht aller dieser Körper, und folglich auch ihre chemische Zusammensetzung gleich sey. Sie unterscheiden sich nur dadurch, daß die kohlensaure Kalkerde sich in dem flockigen Niederschlage, wie in der Kreide, mit der ersteren unter dem Mikroskope betrachtet, ganz übereinstimmt, in einem nur undeutlich krystallinischen Zustand, in dem körnigen Niederschlage dagegen in einem deutlich krystallinischen Zustand, der sich erst später aus dem undeutlich krystallinischen bildet, befindet. Daß aber die Kreide von derselben Beschaffenheit ist, wie die kohlensaure Kalkerde unmittelbar nach der Fällung, ist ein Resultat, was auch in geognostischer Hinsicht vielleicht nicht ohne Interesse ist.

Nach den angegebenen Methoden erhält man also nur Kalkapath; wenn man dagegen die Auflösung von kohlensaurer Kalkerde in kohlensaurem Wasser im Wasserbade zur Trockniss abdunstet, so erhält man ein lockeres krystallinisches Pulver, das, unter dem Mikroskope

was wahrscheinlich daher rührt, daß das Pulver im letzteren Falle bei der Mischung mit Wasser doch nicht ganz frei von kleinen Luftblasen bleibt. Das specifische Gewicht eines eben gefüllten Niederschlages habe ich aber immer ganz übereinstimmend mit dem gefunden, was man erhält, wenn man sich zur Bestimmung desselben kleiner Krystalle bedient; daher es nothwendig scheint, das specifische Gewicht von pulverförmigen Körpern, wo es angeht, immer auf diese Weise zu bestimmen. Auch Beudant fand (in der citirten Abhandlung) das specifische Gewicht eines Körpers im pulverförmigen Zustand immer etwas niedriger als in kleinen Krystallen, was wahrscheinlich auch dem angegebenen Umstand zuzuschreiben ist, doch hat Beudant nicht angegeben, auf welche Weise er das specifische Gewicht der pulverförmigen Körper bestimmt hat.



betrachtet, grösstentheils als eine Zusammenhäufung von deutlichen Krystallen erscheint, die unverkennbar die Form des *Arragonits* haben. Sie erscheinen gewöhnlich als etwas bauchige sechseckige Säulen, oder als sehr spitze sechseckige Doppelpyramiden, wie manche Krystalle des *Saphirs*; zuweilen aber auch als einfache Pyramiden, so dass sie also an den beiden Enden verschieden krystallisirt sind.

Auf eine gleiche Weise erhält man nun auch *Arragonit*, wenn man eine kochendheisse Auflösung von *Chlorcalcium* mit heissem kohlensauren *Ammoniak* präcipitirt. Die Krystalle, aus welchen ein solcher Niederschlag, mit dem Mikroskop untersucht, besteht, sind kleiner, als die, welche man durch die Abdampfung erhält, dennoch aber ganz deutlich. Sie erscheinen in diesem Falle sehr häufig als Drillingkrystalle, indem von der Mitte eines säulenförmigen Krystalles zwei andere divergirend auslaufen.

Nach beiden Methoden ist es indessen schwer den *Arragonit* rein zu erhalten, denn gewöhnlich findet sich zwischen den säulenförmigen Krystallen desselben immer eine mehr oder weniger grosse Menge von *Kalkspathrhomboëdern* eingemengt. Diese Einmischung von *Kalkspath* findet besonders dann statt, wenn man *Arragonit* durch Abdampfung darstellt, und ist hier auch leicht erklärlich, weil schon die Kohlensäure entweicht, ehe die Auflösung diejenige hohe Temperatur erreicht hat, bei der allein sich nur der *Arragonit* bilden kann, und der dadurch entstehende Niederschlag nothwendig die Form des *Kalkspaths* annehmen muss. Dabei fällt denn auch das spec. Gew. des so gewonnenen *Arragonits* niedriger als das des reinen aus. Ich dampfte 12 Quart einer Auflösung von kohlensaurer Kalkerde in einem grossen Wasserbade zur Trockniss ab, verstümmte aber, die Salzhaut, die sich zuerst bildete und wahrscheinlich ganz aus *Kalkspath* bestanden hat, im Anfang abzunehmen, sondern schabte, nachdem alle Flüssigkeit verdunstet war, den

ganzen Absatz mit einem Kartenblatte von den Wänden des Wasserbades zusammen, wodurch er unter einander gemengt wurde. Das specifische Gewicht einer Probe von diesem so gewonnenen Arragonite betrug daher nur 2,803. Um den Arragonit rein zu erhalten, nahm ich eine Auflösung von kohlensaurer Kalkerde, die schon einige Zeit an der Luft gestanden, und aus der sich daher schon ein Niederschlag gebildet hatte. Die Auflösung wurde filtrirt, dann in geringer Menge nach und nach in ein Gefäß mit kochendem Wasser gegossen und nun zur Trockniss abgedampft. Das specifische Gewicht dieses Absatzes betrug 2,836. Er war demnach etwas reiner als der vorige, dennoch aber mit vielem Kalkspath gemengt.

Ein solches Gemenge von Arragonit und Kalkspath erhält man nun auch bei der Fällung einer heißen Auflösung von Chlorcalcium durch kohlensaures Ammoniak, wiewohl in diesem Fall gewöhnlich der Niederschlag noch reinerer Arragonit ist, als bei der Abdampfungsmethode. Ich habe die Bereitung durch Präcipitation mehrfach abgeändert, concentrirtere oder verdünntere Auflösungen genommen, größere oder kleinere Mengen von kohlensaurem Ammoniak und Chlornatrium vermischt. Ich erhielt auch mehrmals bei Versuchen mit kleinen Quantitäten einen Niederschlag, der, unter dem Mikroskop untersucht, völlig reiner Arragonit war; wenn ich aber auf dieselbe Weise eine größere Quantität bereiten wollte, um eine hinreichende Menge zur Bestimmung des specifischen Gewichtes zu haben, so fanden sich bei dieser stets Einmengungen von Kalkspath.

Es giebt indessen eine ganz einfache Methode, ganz reinen Arragonit zu erhalten, die ich zufällig erst versuchte, nachdem ich die anderen alle angestellt hatte, und die darin besteht, nicht sowohl, wie ich früher gethan hatte, die heiße Auflösung von kohlensaurem Ammoniak in die heiße Chlorcalciumauflösung, sondern um-

gekehrt die letztere in die erstere zu tragen. Man erhält auf diese Weise einen überaus lockeren Niederschlag, der, unter dem Mikroskope betrachtet, aus noch kleineren Krystallen besteht, wie der bei den früheren Fällungen erhaltene, aber sich durchaus frei von eingemengten Rhomboëdern von Kalkspath zeigt. Das beweist auch schon sein hohes specifisches Gewicht, welches nach einem angestellten Versuche 2,919 beträgt. Das specifische Gewicht eines einzelnen durchsichtigen Arragonitkrystalls von Bibu in Böhmen fand ich 2,945 <sup>1)</sup>. Bendant giebt das des pulverförmigen Arragonites zu 2,9466 an.

Um den durch Fällung erhaltenen Arragonit unverändert aufzubewahren, muß man ihn bald darauf aussüßsen und trocknen. Läßt man ihn nach der Fällung unter der darüberstehenden Flüssigkeit einige Zeit stehen, so ändert sich der Arragonit merkwürdigerweise nach und nach ganz in Kalkspath um. Acht Tage sind dazu schon ganz hinreichend. Es bilden sich kleine Rhomboëder, die unter dem Mikroskope vollkommen deutlich sind, und oft noch so reihenförmig zusammengruppirt sind, daß ihre Zusammengruppirung ähnliche Säulen bildet, wie die gewesen sind, woraus sie entstanden. Aber diese Umänderung findet, wenngleich viel langsamer, auch schon statt, wenn man die frischgefallten Krystalle unter reinem Wasser aufbewahrt. Diefs beobachtete ich bei dem Niederschlage von ganz reinem Arragonit, dessen specifisches Gewicht untersucht wurde. Der Rest war in einem Gefäße aufbewahrt, worin ich ihn gleich vom Filtrum, auf welchem er ausgesüßt war, gespült hatte, in der Absicht, von einem Theile desselben noch einmal das specifische Gewicht zu bestimmen, was aber zufälligerweise erst nach 8 Tagen geschehen konnte. Das specifische Gewicht, welches ich nun fand, betrug aber

1) Breithaupt (Vollständige Charakteristik des Mineralsystems, S. 65) giebt das spec. Gew. eines solchen Arragonits zu 2,937 bis 2,938 an, was offenbar zu niedrig ist.

nur 2,909. Da ich voraussetzte, daß bei dieser Wägung vielleicht ein Irrthum vorgefallen seyn möchte, bestimmte ich den Tag darauf das specifische Gewicht noch von einer zweiten, und am dritten Tage von einer dritten Menge, fand aber nun noch geringere Zahlen, am zweiten Tage nämlich 2,883, und am dritten 2,891. Als ich darauf den Arragonit unter dem Mikroskop untersuchte, fand ich ganz deutliche Rhomboëder unter den feinen Krystallen des Arragonits, wodurch nun die Ursache des geringeren spec. Gewichts erklärt war.

So leicht indessen diese Umwandlung des Arragonits und Kalkspaths vor sich geht, so geschieht sie doch nur, wenn der Arragonit frisch gefällt ist. Hat man ihn erst ausgetrocknet, so bleibt er ganz unverändert, wenn man ihn nun von Neuem mit Wasser oder kohlensaurem Ammoniak übergießt und Wochen lang damit stehen läßt. Eben so veränderte sich auch natürlicher Arragonit, den ich zu einem feinen Pulver rieb und auf gleiche Weise behandelte, nicht im Mindesten.

## 2) Krystallisation der kohlensauren Kalkerde auf trockenem Wege.

Die kohlensanre Kalkerde kann bekanntlich bei großer Hitze unter starkem Druck zum Schmelzen gebracht werden, und krystallisirt dann beim Erkalten wieder. James Hall hat diese Versuche angestellt, und wahrscheinlich hat ein ähnlicher Proceß bei der Bildung der Erdrinde häufig statt gefunden, da wohl sämmtlicher Marmor auf diese Weise entstanden ist. Die geschmolzene Kalkerde bildet bei ihrer Krystallisation aber immer Kalkspath, dessen drei Spaltungsflächen in den größeren Körnern des Marmors noch vollkommen deutlich sind. Arragonit entsteht auf diese Weise nie; zwar ist derselbe in den Spalten und Höhlungen der früher offenbar in feurigem Fluß gewesen Gebirgsarten, wie in dem Basalte, eine sehr gewöhnliche Erscheinung, aber hier hat

sich der Arragonit offenbar durch Infiltration einer Auflösung von kohlensaurer Kalkerde gebildet, die durch den noch heißen Basalt erhitzt worden ist, und daher, wie aus dem Vorigen folgt, die kohlensaure Kalkerde als Arragonit abgesetzt hat.

Auch kann der Arragonit bei einer größeren Hitze gar nicht bestehen; denn wenn man die Stücke von größeren Arragonitkrystallen einer schwachen Rothglühhitze aussetzt, etwa in einer Glasröhre über der Spirituslampe, so blähen sie sich auf, wie Berzelius gezeigt hat, und zerfallen in ein weißes, undurchsichtiges, gröbliches Pulver. Eine Veränderung in der chemischen Zusammensetzung geht bei der nur wenig hohen Temperatur, in der das Zerfallen des Arragonits stattfindet, gar nicht vor sich; es entwickelt sich dabei keine Gasart, wie dies Mitscherlich <sup>1)</sup> untersucht hat, und es findet dabei überhaupt fast keine Gewichtsveränderung statt, wie ich mich durch eigene Versuche überzeugt habe; denn 1,721 Gramm kleiner Bruchstücke von Arragonitkrystallen von Bilin, in Böhmen, wogen nach dem Glühen noch 1,717 Gramm, und 1,9115 Gramm bei einem anderen Versuche 1,9090. Der kleine Gewichtsverlust von 0,23 Proc. in dem einen, und von 0,13 Proc. in dem anderen Falle rührt nur von etwas Decrepitationswasser her, dessen Entweichen beim Glühen sich durch das Zerspringen einiger Stücke kund thut.

Zur Erklärung dieser Erscheinung hat schon Haidinger <sup>2)</sup> die Meinung aufgestellt, daß sie einer Umänderung des Kalkspath in Arragonit, die in der höheren Temperatur vor sich gehe, zuzuschreiben sey, und daß das Zerfallen des Kalkspathes daher rühre, daß der kohlensaure Kalk als Arragonit ein höheres specifisches Gewicht habe, als der Kalkspath, und daher ei

1) Poggendorff's Annalen, Bd XXI S. 157.

2) Poggendorff's Annalen, Bd XI S. 177.

nen kleineren Raum einnehme, als dieser. So allgemein diese Meinung seit dieser Zeit auch angenommen ist, so ist sie doch eigentlich noch nicht bewiesen worden, daher ich es für nöthig fand, noch einige Versuche in dieser Rücksicht anzustellen. Ich glühte deshalb Krystallbruchstücke von Arragonit von Balin, nachdem ich sie vorher gewogen hatte, wog das zerfallene Pulver wieder, um mich zu überzeugen, ob keine Kohlensäure entwichen sey, und nahm nun das specifische Gewicht des Pulvers. Ich fand es so in drei Versuchen, die stets mit verschiedenen Massen angestellt waren: 2,703, 2,704 und 2,709. Bei dem letzteren Versuche war das Pulver zuvor einige Zeit gekocht worden. Man kann hiernach wohl mit Sicherheit annehmen, daß der Arragonit in einer schwachen Rothglühhitze sich in Kalkspath umändert; denn wenngleich die gefundenen Zahlen etwas niedriger sind, als die, welche man erhält, wenn man das specifische Gewicht von kleinen Kalkspathkrystallen nimmt, so hat dieß wohl in dem oben angeführten Umstande seinen Grund.

Das Zerfallen des Arragonits in einer schwachen Rothglühhitze ist bei größeren Krystallen sehr deutlich, und eine überaus auffallende Erscheinung: es findet aber nur bei größeren, nicht bei sehr kleinen Krystallen und bei faserigen Massen statt. Der Karlsbader Sprudelstein verliert beim Glühen seine Durchsichtigkeit, zerfällt aber nicht, und eben so wenig zerfallen die kleinen Arragonitkrystalle, die auf den Zacken der Steiermärkschen Eisenbluthe sitzen, und die mikroskopischen Krystalle des künstlich dargestellten Arragonits.

Betrachtet man das Pulver, welches man durch das Zerfallen größerer Arragonitkrystalle erhält, unter dem Mikroskop, so erscheint es als ganz unregelmäßige Bruchstücke, die noch vollkommen durchsichtig, aber voller Sprünge und Risse sind. Die kleinen Krystalle der



Steiermärkschen Eisenblüthe behalten bei der Durchsichtigkeit auch ihre Form, erscheinen aber im Innern voller Risse, und haben an den Seiten Sprünge, die oft weit aufklaffen. Von den mikroskopischen Krystallen des künstlichen Arragonits bekommen nur die grösseren einige Risse, die kleinen erscheinen völlig unverändert, und von derselben Durchsichtigkeit und Form. Dennoch hat sich die Masse ganz in Kalkspath umgeändert, wie die Untersuchung des specifischen Gewichtes beweist. Das durch Abdampfung im Wasserbade erhaltene Gemenge von Arragonit und Kalkspath, dessen specifisches Gewicht ich bei einem Versuche zu 2,803 befunden hatte, wurde, um sicher zu seyn, daß sich alles umändere, (weil man hier die Umänderung nicht, wie bei grösseren Arragonitkrystallen, sehen kann), in einem Platinliegel einer starken Hitze ausgesetzt. Hierbei werde ein Theil der kohlensauren Kalkerde schon kausticirt, dieser aber sogleich durch Auflösung in vielem Wasser, und durch Decantiren des Wassers und Ausfüssen des Pulvers entfernt. Unter dem Mikroskope betrachtet, waren die grösseren Arragonitkrystalle auf die angegebene Weise rissig geworden. Ich fand nun das specifische Gewicht der so behandelten Masse 2,700, wie das des geglähten Arragonits. Dieser Umstand beweist, daß bei den kleinen Arragonitkrystallen die kleinsten Theilchen sich ausdehnen und umlegen können, ohne daß dabei die Form des Krystalls verloren geht; es sind

- 1) Besser ist es daher, die Glühung in einer Glasröhre vorzunehmen, die in der Mitte zu einer Kugel ausgeblasen ist, und während der Glühung kohlensäure über den Arragonit streichen zu lassen. Um sich zu überzeugen, ob bei dem Glühen des Arragonits sich etwas von der Masse kausticirt habe, genügt es nicht, nach der Hinzufügung von Wasser, zu sehen, ob das getrocknete Lackmuspapier gebläuet werde; denn auch die unzersetzte kohlensaure Kalkerde bringt stets dieselbe Wirkung hervor, wenn man sie pulvert und mit Wasser übergießt.

die vollkommensten Asterkrystalle des Kalkspaths in der Form des Arragonits. Vielleicht wäre es auch nicht unmöglich, grössere Krystalle in solche Asterkrystalle zu verwandeln, wenn man die Arragonitkrystalle einer sehr langsam zunehmenden Hitze aussetzte.

Die *Resultate* der in dem Angeführten angestellten Versuche sind also:

- 1) Dafs auf nassem Wege sich sowohl Kalkspath als Arragonit, und ersterer bei einer geringeren, letzterer bei einer höheren Temperatur, auf trockenem Wege aber nur Kalkspath bildet.
- 2) Dafs die kohlensaure Kalkerde unmittelbar nach der Fällung aus einer kalten Auflösung sich in einem undeutlich-krystallinischen Zustande befindet, der mit der Kreide übereinkommt, aus welchem erst später der deutlich-krystallinische Zustand hervorgeht.
- 3) Dafs sich Arragonit sehr leicht in Kalkspath umändert, auf nassem Wege, wenn man den durch Fällung dargestellten Arragonit unter Wasser oder einer Auflösung von kohlensaurem Ammoniak stehen läßt; auf trockenem Wege, wenn man den Arragonit einer schwachen Rothglühhitze aussetzt, wobei die grofsen Krystalle zu einem gröblichen Pulver zerfallen, kleine Krystalle aber dabei ihre Form behalten und Asterkrystalle bilden.

Ferner folgt daraus, dafs man die Entstehung des Arragonits nicht der geringen Menge von kohlensaurer Strontianerde, die der natürlich vorkommende Arragonit meistens enthält, zuschreiben kann, wie häufig geschehen ist. Diefs folgt zwar schon daraus, dafs es Arragonit giebt, der gar keine kohlensaure Strontianerde enthält, wird aber vollkommen dadurch bewiesen, dafs man künstlich mit Leichtigkeit den Arragonit ganz ohne

einen solchen Gehalt von Strontianerde darstellen kann. Ich habe absichtlich die Auflösung von Chlorcalcium mit einer kleinen Menge einer Auflösung von Chlorstrontium versetzt, aber bei der Fällung mit kohlensaurem Ammoniak in der gewöhnlichen Temperatur nur Kalkspathkrystalle wahrnehmen können.

Die Form des Arragonits findet sich auch bei dem Witherit, dem Strontianit und dem Weißbleierz oder der neutralen kohlensauren Baryterde, Strontianerde und dem kohlensauren Bleioxyde, doch ist es mir nicht gelungen, diese Substanzen durch die bei der kohlensauren Kalkerde angeführten Methoden in der zweiten rhomboëdrischen Form darzustellen.

Wenn man kohlensaure Baryterde in Chlorwasserstoffsäure auflöst, und die Auflösung mit kohlensaurem Ammoniak fällt, so erhält man, die Auflösung mag kalt oder heiß gewesen seyn, einen Niederschlag, der, unter dem Mikroskope betrachtet, aus sehr deutlichen Arragonit-ähnlichen Krystallen besteht.

Wenn man kohlensaure Strontianerde auf eine gleiche Weise behandelt, so erkennt man in dem Niederschlage aus der heißen Auflösung unter dem Mikroskope sehr deutliche Arragonit-ähnliche Krystalle; der Niederschlag aus der kalten Auflösung erscheint als zusammengehaufte Kügelchen, die keine bestimmte Form erkennen lassen.

Bei dem kohlensauren Bleioxyde war der Fall umgekehrt, hier gab der Niederschlag aus einer kalten Auflösung Arragonit-ähnliche Krystalle (die indessen doch viel kleiner und undeutlicher, als bei der kohlensauren Baryt- und Strontianerde waren); der Niederschlag aus einer heißen Auflösung eine undurchsichtige und unerkennbare Masse. Wahrscheinlich erhält man aber auch wohl aus der kalten Auflösung der salzsauren Strontianerde und der heißen Auflösung des salzsauren Bleioxyda be-

stimmbare Krystalle, wenn man die günstigsten Umstände, unter denen die Krystalle sich bilden, herausprobt, die aber hiernach wahrscheinlich immer die Form des Arragonits haben werden. Daher erklärt es sich auch, daß eine kleine Beimengung von kohlensaurer Strontianerde wohl öfters in dem Arragonit, nie aber in dem Kalkspath vorkommt, wenigstens bis jetzt nicht darin gefunden ist, wenn auch Kalkspath und Strontianit neben und mit einander verwachsen vorkommen. Eben so wenig findet man in dem Kalkspath auch kohlensaure Baryterde, sondern diese bildet mit Kalkspath ein Doppelsalz, den Barytocalcit, der hiernach offenbar eine Verbindung von 1 Atom Kalkspath mit 1 Atom Witherit ist. Nur von dem kohlensauren Bleioxyde findet sich zuweilen in dem Kalkspath eine kleine Beimengung, wie eine solche Verbindung Johnston, unter dem Namen Plumbocalcit, beschrieben hat.

Glückte es mir nicht, die letzteren kohlensauren Salze, die nur in der Form des Arragonits vorkommen, in der Form des Kalkspathes darzustellen, so gelang es mir doch, ein nur in der Form des Kalkspathes und gewöhnlich in dessen Verbindung vorkommendes kohlensaures Salz in der Arragonitform zu erhalten: dieß ist die neutrale kohlensaure Talkerde. Dampft man nämlich eine Auflösung derselben in kohlensaurem Wasser im Wasserbade zur Trockniss ab, so erhält man ein krystallinisches Pulver, das unter dem Mikroskope noch größere Arragonit-ähnliche Krystalle zeigt, als man bei der Abdampfung einer Auflösung von kohlensaurer Talkerde erhält. Sie finden sich aber in diesem Pulver nicht allein, sondern kommen mit den excentrisch-strahligen Kugeln vor, die Fritzsche <sup>1)</sup> beschrieben, und von denen er bewiesen hat, daß sie der Magnesia alba angehören; dennoch erwähne ich der ersteren, da es das erste Mal

1) Pogg. Ann. Bd XXVII S 304.

ist, daß man die neutrale kohlensaure Talkerde im wasserfreien Zustande dargestellt hat.

Ich habe indessen allen diesen letzteren Körpern noch nicht die Aufmerksamkeit schenken können, die sie verdienen. Es bleibt hier noch ein weites Feld zu neuen Versuchen eröffnet.

## II. Untersuchungen über die Einwirkung des Ammoniaks auf die Chloride und Oxyde des Quecksilbers; von Robert Kane.

(Auszug aus einem von dem Verfasser mitgetheilten Abzug der Abhandlung in den *Transact. of the Royal Irish Academy, Vol. XVII*)

### I. Wirkung des Ammoniaks auf Quecksilberchlorid.

Man kann das Ammoniak auf zweierlei Art auf Sublimat einwirken lassen, gasförmig auf das trockne Chlorid, oder gelöst auf das ebenfalls gelöste Chlorid. Der erste Fall ist von Grouvelle und Rose untersucht <sup>1)</sup>, der zweite von Fourcroy <sup>2)</sup>, Hennell <sup>3)</sup>, Guibourt <sup>4)</sup>, Soubeiran <sup>5)</sup> und C. G. Mitscherlich <sup>6)</sup>; dieser letztere Fall, bei dem bekanntlich der Mercurius praecipitatus albus entsteht, ist es allein, den der Verfasser für nothwendig hielt, einer neuen Untersuchung

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XX S. 158.

2) *Journal de l'Ecole polytechn.* Vol. VI p. 312.

3) *Quarterly Journal of Science*, Vol. XVIII p. 201.

4) *Journ. de Pharm.* Vol. VI.

5) *Journ. de Pharm.* Vol. XII p. 24. — *Annal. de chim.* Vol. XXXVI p. 220.

6) Poggendorff's Annalen, Bd. IX S. 410 (auch Bd. XVI S. 41).

zu unterwerfen, da die Resultate der bisherigen Versuche so sehr von einander abweichen.

### 1) Vom weissen Quecksilberpräcipitat.

Wenn einer Sublimatlösung Ammoniakflüssigkeit hinzugesetzt wird, entsteht bekanntlich ein Niederschlag. Anfangs ist derselbe milchweiss, sehr flockig, nur langsam sich absetzend, fast wie Thonerde aussehend. Wird er mit sehr heissem Wasser bereitet, oder wird er stark ausgewaschen, so verliert er seine weisse Farbe und nimmt eine gelbliche an. Durch Kochen mit der Flüssigkeit wird er sogar schon in wenigen Minuten vollkommen zersetzt, und in ein citrongelbes, sehr schweres und körniges Pulver umgewandelt.

An sich ist das weisse Präcipitat ganz unlöslich in Wasser; seine Auflöslichkeit ist nur scheinbar, und wird durch eine Zersetzung bedingt. In einer Glasröhre erhitzt, wird es schon unter Rothgluth zersetzt; Ammoniak und Stickgas, nebst etwas Wasser, entweichen und Calomel sublimirt, meistens geschwärzt durch etwas Ammoniak, von dem es jedoch leicht befreit werden kann.

In Salpeter- oder Chlorwasserstoffsäure löst es sich leicht; mit Kali, Natron, Kalk oder Baryt gemischt, wird Ammoniak entwickelt und die Masse gelblich, doch ist die Zersetzung, und bei jedem Ueberschuss von Alkali, die Austreibung des Ammoniaks niemals vollständig.

Wird zu ihm eine Lösung von Jodkalium hinzugesetzt, so schlägt sich rothes Quecksilberjodid nieder, viel Ammoniak entweicht, und die Flüssigkeit enthält freies Kali. Schwefelbariumlösung wirkt ähnlich, entwickelt alles Ammoniak und fällt alles Quecksilber als Bisulfuret.

Um das weisse Präcipitat ganz rein zu erhalten, muss man folgendermassen verfahren. Zu einer kalten Sublimatlösung giesse man Ammoniakflüssigkeit bis zu schwachem Ueberschuss, filtrire und lasse möglichst viel von der Flüssigkeit ablaufen, ehe man zu waschen beginnt.



ginat. Nun wasche man es mit kaltem Wasser aus, aber mit nicht mehr als eben zur Entfernung der ursprünglichen Flüssigkeit nöthig ist, denn selbst kaltes Wasser, in Ueberschuss angewandt, zersetzt den Niederschlag zum Theil und raubt ihm seine milchweisse Farbe. Auf diese Weise erhält man ein ganz reines, zur Analyse anwendbares Product.

Die Analyse geschah nun folgendermassen:

A. 100 Gran Sublimat wurden in kaltem Wasser gelöst, die Lösung durch Ammoniak bis zu geringem Ueberschuss gefällt, und der Niederschlag, der alles Quecksilber enthält, auf ein gewogenes Filter gebracht, mit kaltem Wasser gewaschen, getrocknet und gewogen. Die zurückgebliebene Flüssigkeit und das Waschwasser, welche einen Theil des Chlors als Salmiak enthalten, wurden mit Salpetersäure angesäuert und mit Silberlösung gefällt, das entstandene Chlorid auf ein gewogenes Filter gebracht und gewägt. So fanden sich:

Versuch:	1.	2.	3.	4.	5.	Mittel.
Niederschlag	91,3	92,4	92,9	95,4	93,4	93,1
Chlor in der Flüssigkeit	12,9	13,3	13,15	12,7	12,95	13,0

100 Gran Sublimat enthalten aber 74,09 Quecksilber und 25,91 Chlor, folglich enthält die Flüssigkeit gerade die Hälfte von dem Chlor des Sublimats, und mithin sind in dem weissen Präcipitat:

	In 93,1 Th.	In 100 Th.
Quecksilber	74,09	79,57
Chlor	12,91	13,87

B. Wird weisses Präcipitat erbitzt, so bekommt man Calomel, Gase und Wasser. Diese Thatsache, welche das oben gefundene Verhältniß von Quecksilber und Chlor bestätigt, wurde folgendermassen benutzt. Die Kugel einer kleinen tarirten Retorte wurde zur Wägung

mit weißem Präcipitat gefüllt, dieses gewogen, die Kugel erhitzt, die Röhre so warm erhalten, daß sich darin kein Wasser absetzen konnte, und dem Verluste von Calomel möglichst vorgebeugt. Nach vollständiger Sublimation war der Calomel immer durch freies Ammoniak geschwärzt, liefs man aber die Röhre erkalten und Luft hinzutreten, so erhielt man ihn bei abermaliger Erhitzung vollkommen weiß. Aus dem Gewichtsverlust ergab sich dann die Menge der verflüchtigten Bestandtheile, und folglich auch die des zurückgebliebenen Calomels. So wurden erhalten:

Versuch.	Präcipitat.	Calomel.	Calomel in 100 Th.
1	20,42	18,93	92,80
2	19,42	18,07	92,53
3	12,14	11,28	92,91
4	14,71	13,79	93,68.

100 Präcipitat enthalten hiernach 92,98 Calomel, worin 79,14 Quecksilber und 13,84 Chlor.

C. Der Quecksilbergehalt wurde auf gewöhnliche Weise bestimmt, nämlich das Präcipitat in Salzsäure gelöst, mit Zinnchlorürlösung gefällt und das Quecksilber in der Kälte getrocknet. 100 Präcipitat gaben einmal 77,3, ein anderes Mal 78,1, im Mittel also 77,7.

D. 105,4 Präcipitat wurden in Salzsäure gelöst, mit dem 4fachen Volum an Wasser verdünnt, durch Schwefelwasserstoffgas das Quecksilber als Schwefelquecksilber gefällt, und aus der abfiltrirten Flüssigkeit und den Waschwässern der Salmiak durch Eintrocknen dargestellt. So wurden gefunden:

95,23 Schwefelquecksilber,

enthaltend 82,17 Quecks. u. 13,06 Schwefel

23,59 Salmiak, enthaltend 16,04 Salzs. u. 7,55 Ammon.

also in 100 Th. weißen Präcipitats: 77,96 Quecksilber und 7,16 Ammoniak.

E. Das Ammoniak wurde noch auf zweierlei Weise

bestimmt, durch Fällung des Quecksilbers, ein Mal mit Schwefelbarium, und das andere Mal mit Jodkalium, Erhitzung der Flüssigkeit, Auffangung des Ammoniaks in einer Vorlage mit Salzsäure, und Eintrocknung. So wurden erhalten:

im ersten Fall 21,57 Salm., d. h. 14,85 Salzs. u. 6,72 Amm.  
 - zweiten - 19,83 - - - 13,50 - - 6,33 -

Die Methode *D* verdient indess den Vorzug. Kali oder Kalk können nicht angewandt werden, da sie nur die Hälfte des Ammoniaks abscheiden.

*F.* In allen bisherigen Angaben über die Zusammensetzung des weissen Präcipitats wird Sauerstoff als ein Bestandtheil angeführt, und zwar in solcher Menge, dass er hinreichen würde das Quecksilber in Oxyd zu verwandeln. Nachstehende Versuche werden indess zeigen, dass es keinen Sauerstoff enthält. Wenn man weisses Präcipitat erhitzt, bekommt man Ammoniak, Stickgas, Wasser und Calomel, aber niemals freien Sauerstoff. Aller Sauerstoff müsste demnach Wasser auf Kosten des Ammoniaks gebildet haben, und sich durch Auffangung und Wägung dieses Wassers bestimmen lassen.

Daher wurde in ein Retörtchen von 0,2 bis 0,3 Kubikzoll Inhalt und 2 Zoll langem Halse eine gewogene Menge Präcipitat gebracht, dasselbe mit einer gewogenen Rohre von trockenem Kalk oder geschmolzenem Aetzkali verbunden, und von letzterer eine enge Röhre in eine Quecksilberwanne geleitet. Nun wurde das Retörtchen erhitzt, der Calomel sublimirt, das Wasser in die Trockenröhre getrieben und die Gase mit Beachtung des Baro- und Thermometerstandes über der Wanne aufgefangen.

Auf diese Weise wurden aus 20,47 Gran Präcipitat erhalten: Calomel 19,14 Gran, Wasser 0,14 Gran und Gas 4,24 Kubikzoll. Das Gas bestand aus 0,23 Kubikzoll im Apparate zurückgebliebener Luft, 1,34 Kubikzoll (0,401 Gran) Stickgas, und, durch Absorption von Wasser bestimmt, 2,67 Kubikzoll (0,488 Gran) Ammoniak,

wozu noch das zu addiren, welches beim Calomel blieb und ihn schwarz färbte. Nun aber gaben 100 Präcipitat, wie früher gezeigt, 92,29 Calomel: die 20,47 würden also gegeben: 19,135, und diese 0,305 Ammoniak aufgenommen haben.

Die Resultate dieses Versuches sind also, zusammengestellt mit einem zweiten ähnlichen, worüber das Detail nicht mitgetheilt ist, folgende:

Aus Präcipitat	20,472	12,14
erhalten Calomel	19,135	11,280
- Stickgas	0,404	0,310
- Ammoniak	0,793	0,470
- Wasser	0,140	0,080.

Um alles Ammoniak zu erhalten, muß noch das Stickgas auf Ammoniak berechnet werden. Diefs erhebt die Ammoniakmenge im

1. Versuch auf 1,282 oder 6,26 Procent
2. - - 0,845 - 6,96 -

Der Wassergehalt in diesen und zwei anderen Versuchen beträgt:

Versuch.	Präcipitat.	Wasser.	Wasser in Proc.
1	20,47	0,14	0,684
2	12,14	0,08	0,659
3	22,21	0,22	0,990
4	19,42	0,00	0,000

also im Mittel 0,583 Proc., oder so wenig, daß man ihn als rein hygrometrisch betrachten kann.

Das Endresultat wäre also, daß 100 Quecksilberpräcipitat bei der Zersetzung lieferten:

Quecksilber (A, B, C, D)	78,60
Chlor (A, B)	13,85
Ammoniak (D, E, F)	6,77
Wasser (F)	0,58
Verlust	0,20.


Der Verfasser discutirt nun die vor ihm von ande

ren Chemikern angestellten Analysen, zeigt das Ungewöhnliche derselben, und sucht nun seine eigenen Resultate zu deuten.

Aus dem Verhalten des Oxamids, Benzamids u. s. w., bemerkt derselbe, folgt, daß bei Einwirkung des Ammoniaks auf ein Oxyd, Wasser und eine Verbindung von  $N_2 H_4$  mit der Basis des Oxydes entstehen. Angenommen, daß Aehnliches bei der Bildung des weissen Präcipitats geschähe (d. h. das Ammoniak einen Theil seines Wasserstoffs an das Chlor eines Theils vom Quecksilberchlorid zur Bildung von Chlorwasserstoffsäure abträte), würde man die Formel aufstellen:



d. h. das Präcipitat als eine Verbindung von *Quecksilberchlorid* und *Quecksilberamid* ansehen können. Der Verfasser hält diese Ansicht für die wahrscheinlichste, theils wegen der Unnachweisbarkeit des Sauerstoffs, theils wegen der Zersetzbarkeit des Präcipitats durch Jodkalium, die gleichfalls für die Abwesenheit von oxydirtem Quecksilber spricht (da Quecksilberoxyd nicht von Jodkalium zersetzt wird); doch meint er, es sey auch nicht ganz unmöglich, daß sich die gefundenen Resultate durch die Formel:



ausdrücken lassen. Die Zusammensetzung in 100 wäre dann:

nach der ersten Formel		nach der zweiten	
2Hg	= 79.73	2Hg	= 77.00
2Cl	= 13.93	2Cl	= 13.45
$N_2 H_4$	= 6.34	O	= 3.04
		$N_2 H_4$	= 6.51.

2) Von dem durch Wirkung des Wassers auf weißes Präcipitat gebildeten Pulver.

Weißes Präcipitat in Wasser gekocht, verwandelt sich in ein zersiggelbes, schnell niederfallendes Pulver, welches, rasch getrocknet, körnig aussieht. Es ist nicht ganz unlöslich in Wasser, giebt bei Erhitzung Ammoniak, Stickgas und Wasser, und später ein Gemenge von Calomel und metallischem Quecksilber <sup>1)</sup>. In Salz- und Salpetersäure löst es sich schnell; von Alkalien scheint es, außer einer leichten Farbenveränderung, keine Wirkung zu erliden, und mit Jodkalium digerirt, wird es, unter Entweichung von Ammoniak, braun.

Die Zusammensetzung dieses gelben Pulvers wurde auf folgende Weise ermittelt:

A. 100 Grn. Sublimat wurden in Wasser gelöst und mit Ammoniak in Ueberschuß versetzt, dann das Ganze gekocht, bis das weiße Präcipitat in das gelbe Pulver verwandelt war, und nun erst filtrirt und die Menge des Products gewagt. Die Flüssigkeit und das Waschwasser wurden, nach Ansäuerung mit Salpetersäure, durch Silberlösung gefällt, und das Chlorid bestimmt. In der Flüssigkeit war nur eine sehr geringe Spur von Quecksilber nachzuweisen. So wurden erhalten:

Versuch.	Gelbes Pulver.	Chlor in der Flüssigkeit.
1	83,5	19,25
2	83,3	18,50
2	84,7	18,90
Mittel	83,83	18,89.

Da nun der Sublimat in 100 enthält: 74,09 Quecksilber und 25,91 Chlor, so sind ihm drei Viertel seines Chlors entzogen worden, und das letzte Viertel mit allem Quecksilber findet sich im gelben Pulver. Dieses enthält demnach:

1) Daß diese Zersetzung bis zur Bildung eines rothen Quecksilberoxyds gehen könne, wie überall angegeben wird, konnte der Verfasser nicht bestätigen.



in 83,83 Theilen. in 100 Theilen.

Quecksilber	74,09	89,391
Chlor	6,18	8,374.

B. Schon fertiges Präcipitat mit Wasser gekocht, giebt ebenfalls das gelbe Pulver, und eine Flüssigkeit, die nur Salmiak enthält. Auf eben genannte Weise verfahren, gaben 100 Präcipitat:

Versuch.	Gelbes Pulver.	Chlor in der Flüssigkeit.
1	90,00	5,93
2	88,50	6,50
3	90,30	6,40
Mittel	89,60	6,29.

Allein 100 Präcipitat enthalten 78,60 Quecksilber und 13,83 Chlor, folglich enthält das gelbe Pulver:

	in 89,60 Th.	in 100 Th.
Quecksilber	78,60	87,95
Chlor	7,56	8,44.

C. 100 Präcipitat, bis zur vollständigen Zersetzung mit Wasser gekocht, gaben 91,15 gelbes Pulver, und, nach Eintrocknung der Flüssigkeit, 10,23 Salmiak; letztere bestehen aus 6,76 Chlor, 0,19 Wasserstoff und 3,28 Ammoniak, folglich ist die Zusammensetzung des gelben Pulvers:

Quecksilber	86,23
Chlor	7,77
Ammoniak	3,83.

D. Wie schon erwähnt, zersetzt sich das gelbe Pulver in der Hitze in Ammoniak, Stickgas, Wasser, Calomel und Quecksilber. Wenn man diese Zersetzung in einer Retorte vornimmt und sorgfältig verfährt, so kann man Calomel und Quecksilber ohne Verlust sublimiren, während die Gase davon gehen. Auf diese Weise gaben:

Versuch.	Gelbes Pulver.	Calomel u. Quecksilber.	In 100 Th.
1	14,30	13,37	93,50
2	19,65	18,53	94,30
3	23,72	22,35	94,22
			Mittel 94,01.

Hieraus lassen sich die Mengen von Chlor und Quecksilber im sublimirten Rückstand berechnen. Ist nämlich  $x =$  der Menge des Chlors,  $y =$  der des Quecksilbers,  $a =$  dem Atomgewicht des Chlors und  $b =$  dem Atomgewicht des Quecksilbers, so hat man:

$$x + y = 94,01$$

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{2b} \text{ anderen Versuchen zufolge,}$$

und hieraus:

$$y = \frac{2b \times 94,01}{a + 2b}.$$

Dies giebt für 100 gelbes Pulver die Bestandtheile 86,46 Quecksilber und 7,55 Chlor.

E. 103,28 gelben Pulvers wurden in Salzsäure gelöst, die verdünnte Lösung mit Schwefelwasserstoff ausgefällt, das Schwefelquecksilber bestimmt, die Flüssigkeit eingetrocknet und der zurückbleibende Salmiak gewogen.

So fanden sich 103,71 Schwefelquecksilber (bestehend aus 14,22 Schwefel und 89,49 Quecksilber) und 12,86 Salmiak, bestehend aus 8,50 Chlor, 0,24 Wasserstoff und 4,12 Ammoniak.

Hienach enthält das gelbe Pulver:

	in 103,28.	In 100.
Quecksilber	89,49	85,00
Ammoniak	4,12	3,91.

Die verschiedenen Methoden haben also gegeben:


Methode.	Quecksilber.	Chlor.	Ammoniak.
<i>A</i>	88,381	8,374	
<i>B</i>	87,95	8,44	
<i>C</i>	86,23	7,77	3,83
<i>D</i>	86,46	7,55	
<i>E</i>	85,00		3,91.

Die Zusammensetzung des gelben Pulvers ist sodann:

	nach dem Mittel aus allen Versuchen.	nach Versuch <i>C</i> .
Quecksilber	86,80	86,23
Chlor	8,03	7,77
Ammoniak	3,87	3,83
Sauerstoff und Verlust	1,30	2,17
	<hr/> 100,00	<hr/> 100,00.

Die Resultate des Versuches *C* dürften der Wahrheit näher kommen als das Gesamtmittel, da bei *A* und *B*, wegen nicht völliger Unlöslichkeit, eine kleine Menge des Pulvers, etwa 1 bis 2 Proc., verloren ging, und dadurch die Menge des Chlors und Quecksilbers zu groß ausfiel.

Was die Entstehung des gelben Pulvers aus dem weissen Präcipitat betrifft, so würde sie, wenn man für letzteres die Formel  $\text{HgCl}_2 + \text{HgO} \cdot \text{N}_2\text{H}_4$  annimmt, gemäß der Formel vor sich gehen <sup>1)</sup>:




d. h. 2 Atome weissen Präcipitats und 1 Atom Wasser würden zerfallen in 1 At. Salmiak ( $\text{Cl}_2\text{N}_2\text{H}_4$ ) und 1 At. des gelben Pulvers ( $\text{HgCl}_2 + \text{Hg}_2\text{O}_3 \cdot \text{N}_2\text{H}_4$ ). Hiernach würde letzteres in 100 bestehen aus:

1) Bei dieser theoretischen Erörterung sind wir in der Darstellung, obwohl nicht im Sinne, vom Verfasser etwas abgewichen.


Quecksilber	64,12
Chlor	7,36
Ammoniak	3,56
Sauerstoff	4,96.

Diese Verhältnisse weichen aber zu sehr von den beobachteten ab, als daß sie annehmbar seyn könnten.

Weit besser stimmen die Resultate, wenn man für das weiße Präcipitat die Formel  $\text{Hg Cl}_2 + \text{Hg N}_2 \text{H}_4$  zum Grunde legt. Dann hat man:



d. h. 2 At. Präcipitat und 2 At. Wasser zerfallen in 1 At. Salmiak und 1 At. des gelben Pulvers



Letzteres würde dann in 100 bestehen aus:

Quecksilber	85,72
Chlor	7,18
Amidogen	3,12
Sauerstoff	3,38.

Nach beiden Formeln würde das weiße Präcipitat, übereinstimmend mit der Erfahrung, die Hälfte seines Chlors und seines Stickstoffs zur Bildung von Salmiak hergeben; allein nur die letztere giebt für das gelbe Pulver eine mit der Erfahrung übereinstimmende Zusammensetzung. Nach ihr würde es 3,63 Procent Salmiak liefern <sup>1)</sup>).

### 3) Von der Wirkung eines Ueberschusses von Alkalien auf das weiße Präcipitat.


In diesem Abschnitt zeigt der Verfasser, daß ein Ueberschuß von Ammoniak keine eigenthümliche Wirkung auf das Quecksilberchlorid ausübt, nämlich in der Kälte nur weißes Präcipitat, und beim Kochen nur das

1) Nach beiden Formeln ist übrigens das gelbe Pulver zu betrachten als eine Verbindung von 1 At. weißem Präcipitat mit 2 At. Quecksilberoxyd.

ehen untersuchte gelbe Pulver erzeugt, daß ferner Kali, welches, wie S. 371 erwähnt, aus dem Präcipitate nur die Hälfte des daraus entstehen könnenden Ammoniaks abscheidet, ebenfalls nur dieses gelbe Pulver bildet. Das mit Kali dargestellte Pulver ist zwar, wegen irgend einer Beimischung, heller von Farbe als das mit reinem Wasser bereitete, hat aber sonst gleiche Eigenschaften mit ihm, giebt nämlich bei Erhitzung Ammoniak, Stickgas und ein Sublimat von metallischem Quecksilber und Calomel, und verpufft bei schneller Erhitzung stärker als das reinere gelbe Pulver. Auch hat es dieselbe Zusammensetzung. 66,83 desselben in Salzsäure gelöst und die verdünnte Lösung mit Schwefelwasserstoffgas gefällt, gaben 67,70 Schwefelquecksilber, worin 58,42 Quecksilber. Aus der abfiltrirten und eingetrockneten Flüssigkeit wurden 6,58 Salniak erhalten, entsprechend 4,35 Chlor, 0,12 Wasserstoff und 2,11 Ammoniak. Diese Resultate kommen der für das gelbe Pulver gefundenen Formel  $\text{HgCl}_2 + 2\text{HgO} + \text{HgN}_2\text{H}_4$ , nach welcher dasselbe in 66,83 enthalten würde: Quecksilber 57,30, Chlor 5,00, Amidogen 2,28 und Sauerstoff 2,25, so nahe, daß die Identität als erwiesen anzusehen ist.

Die Angaben von Fourcroy, Grouvelle, Guibourt und Dumas, daß sich, bei Einwirkung von überschüssigem Ammoniak, ein Quecksilberammoniak bilde, sind demnach nicht richtig.

Rose und Grouvelle haben gezeigt <sup>1)</sup>, daß, wenn man trocknes Ammoniak über geschmolzenes Sublimat streichen läßt, eine weiße Masse aus einem Atom von jedem erzeugt wird. Diese Masse, in Wasser gelöst, zerfällt in weißes Präcipitat und Alembrothsaltz, wie aus folgender Formel erhellt:



1) Was Hr. Kono bestätigt fand.

## II. Von der Wirkung der Ammoniakflüssigkeit auf Quecksilberchlorür.

Uebergießt man Calomel, gleichviel ob sublimirten oder präcipitirten, mit Ammoniakflüssigkeit, so wird die Masse augenblicklich schwarz, und bleibt es unverändert auch bei langem Kochen. So lange das Pulver feucht ist, bleibt es fast ganz schwarz, während des Trocknens wird es aber heller, und ganz getrocknet ist es fast dunkelgrau; wiederum befeuchtet, wird es aber aufs Neue schwarz; der Luft ausgesetzt oder mäßig erhitzt, verändert es sich nicht, auch verliert es nichts an Farbe oder Gewicht, wenn es in einem Platintiegel auf dem Sandbade einige Stunden lang in der Temperatur 180° F. erhalten wird. Mit Wasser gekocht, scheint es keine Zersetzung zu erleiden. In einer Glasröhre erhitzt, giebt es erst eine Spur Wasser nebst viel Stickgas und Ammoniak, dann sublimirt Calomel nebst metallischem Quecksilber, und zuletzt tritt jenes Erglühen ein, das man bei so vielen Substanzen beobachtet.

Die Analyse dieses Körpers wurde auf folgende Art bewerkstelligt.

A Calomel wurde einige Minuten lang mit Ammoniakflüssigkeit in grossem Ueberschuss gekocht, das schwarze Pulver abfiltrirt, und aus der abgesonderten Flüssigkeit, nach deren Sättigung mit Salpetersäure, das Chlor durch Silber bestimmt.

I. 148,15 Cal. gab. 141,92 schwarz. Pulv. u. 44,14 Chlorsilb.

II. 153,36 - - 146,71 - - - 44,03 -

Aus bekannter Zusammensetzung des Calomels (der 14,863 Proc. Chlor enthält) ergeben sich hienach für das schwarze Pulver in 100:

	I.	II.	Mittel.
Quecksilber	86,85	86,98	86,91
Chlor	7,76	8,15	7,95
Andere Bestandtheile	3,39	2,67	3,14.



**B.** 101,37 Gran des schwarzen Pulvers mit starker Salzsäure gekocht und eine Lösung von Zinnchlorür hinzugefügt, gaben 89,39 Gran oder 88,18 Proc. Quecksilber. Diese Bestimmung muß zu niedrig seyn, wie nothwendig die früheren des Quecksilbers und Chlors zu hoch.

**C.** Schwarzes Pulver wurde in verdünntem Königswasser gelöst, und die Lösung durch Schwefelwasserstoff ausgefällt. Das Schwefelquecksilber enthielt indess beigemengten Schwefel. Es wurde daher in Salpetersäure aufgelöst, der Schwefel abfiltrirt, und die Flüssigkeit zur gänzlichen Befreiung von Chlor und freier Salpetersäure eingedampft. Nun wurde die Flüssigkeit abermals mit Schwefelwasserstoffgas gefällt. 51,42 Gran des Pulvers gaben so 52,39 Gran völlig schwarzen Schwefelquecksilbers, entsprechend 45,20 Gran oder 87,90 Proc. Quecksilber.

**D.** In einer Flasche mit gebogener Röhre, die in Salzsäure tauchte, wurden 66,43 Gran schwarzen Pulvers so lange mit einer Jodkaliumlösung gekocht, bis das Ammoniak ganz, und das Wasser zur Hälfte übergegangen war <sup>1)</sup>. Die Flüssigkeit in der Vorlage, abgedampft, gab 6,96 Gran oder 3,36 Proc. Salmiak.


Hienach wurden in 100 erhalten:

Versuch.	Quecksilber.	Chlor.	Ammoniak.	Verlust.
<i>A</i>	88,91	7,95		
<i>B</i>	88,18			
<i>C</i>	87,90			
<i>D</i>			3,36	
Mittel	88,33	7,95	3,36	0,36.

1) Kali zerlegte das Pulver nur unvollständig; auch Destillation mit starker Salzsäure, zum Behufe einer Umwandlung in metallisches Quecksilber, Sublimat und Salmiak, erwies sich zur Bestimmung des Ammoniaks unzureichend.

Offenbar ist also das schwarze Pulver ein dem weissen Präcipitat entsprechend zusammengesetzter Körper. Das wässrige Ammoniak entzieht dem Calomel die Hälfte des Chlors zur Bildung von Chlorwasserstoffsäure, und zwar entweder durch Zersetzung von Wasser, oder durch Zersetzung von Ammoniak. Im ersten Fall würde sich Quecksilberoxyd bilden und damit ein Theil des Ammoniaks verbinden, im letzten Fall ein Amid von niedriger Stufe entstehen, in beiden Fällen aber noch Calomel ( $\text{HgCl}$ ) in die Verbindung eintreten. Die Formel für den Körper wäre

im ersten Fall:



im zweiten Fall:



und die procentische Zusammensetzung:

	im ersten Fall.		im zweiten Fall.
Quecksilber	87,00	Quecksilber	88,72
Chlor	7,59	Chlor	7,74
Sauerstoff	1,73	Amidogen	3,54
Ammoniak	3,68		<hr/> 100,00.
	<hr/> 100,00		

Nach der ersten Formel würde der Calomel 97,84, nach der zweiten 95,95 Proc. des schwarzen Pulvers geben. Die Versuche in A gaben 95,79 und 95,66 Proc. Letztere Formel stimmt also mit der Erfahrung, und giebt daher einen ferneren Beweis für die Annahme eines Amids.

Aus Obigem folgt, dass Hennel's Angabe, nach welcher das schwarze Pulver aus 96 Proc. Quecksilber und 4 Proc. Sauerstoff bestehen soll, ganz unrichtig ist.

### III. Von der Wirkung des Ammoniaks auf Quecksilberoxyd.

Da das Product dieser Verbindung, das mit Verpuffungsvermögen begabte Quecksilberammoniak, für die Theorie der Ammoniakverbindungen von großer Wichtigkeit ist, so verwandte der Verfasser auf die Darstellung und Zerlegung desselben eine ganz besondere Sorgfalt.

Zur Darstellung desselben wurde eine Sublimatlösung mit Kali gefällt, und der gehörig ausgesüßte Niederschlag in wässriges Ammoniak eingetragen und einige Tage damit in Berührung gelassen. Die Farbe desselben wurde nun um vieles heller, aber niemals ganz weiß, wie Fourcroy und Thénard ihn erhalten haben wollen, sondern immer mit einem Stich in's Gelbe. Andere Portionen frisch gefällten Oxyds wurden einige Minuten lang mit Ammoniakflüssigkeit gekocht, bis jede Farbenveränderung aufhörte. Alle diese Producte hatten dieselbe Farbe und dieselben Eigenschaften, daher sie auch ohne Unterschied zu den folgenden Analysen angewandt wurden.

Erhitzt, giebt dießs Ammoniuret viel Ammoniak und Stickgas, auch reichlich Wasser; der Rückstand ist dunkelroth, wie Quecksilberoxyd, nimmt aber beim Erkalten wieder eine weißliche Farbe an. Sichtlich ist er noch unzersetztes Ammoniuret, welches eben, wie andere Quecksilberverbindungen, in der Hitze roth wird, und beim Erkalten seine ursprüngliche Farbe wieder annimmt. Die Zersetzung ist offenbar kein bloßes Zerfallen in Ammoniak und Quecksilber, sondern vom Anfange bis zu Ende entweichen Wasser, Ammoniak, Stickstoff, Sauerstoff und metallisches Quecksilber. Auf glühende Kohle geschüttet, verpufft es, aber schwächer als Knallgold. In Salpeter- oder Salzsäure löst es sich leicht.

Die Zerlegung wurde einfach folgendermaßen bewirkt.

**A.** Das Ammoniuret wurde in Salzsäure gelöst, die Lösung durch Schwefelwasserstoffgas gefällt, das Schwefelquecksilber abgesondert, die filtrirte Flüssigkeit eingetrocknet und der Salmiak bestimmt.

- I. 72,07 Amm. gab. 70,06 Schwefelquecks. u. 9,21 Salmiak  
 II. 67,57 - - 65,37 - - 8,15 -

Ist das Quecksilber als Oxyd im Ammoniuret, so sind hienach die Resultate in 100:

	I.	II.
Quecksilber	83,90	83,48
Sauerstoff	6,63	6,59
Ammoniak	4,07	3,86
Wasser und Verlust	5,40	6,07.

**B.** 52,22 Gr. in Salzsäure gelöst und mit Zinnchlorür versetzt, gaben 43,74 Gran oder 83,76 Proc. metallischen Quecksilbers.

**C.** Zur, wenigstens angenäherten, Bestimmung des Wassers wurde das Ammoniuret in einem Retörtchen von hartem Glase, dessen enger und langer Hals in eine mit Kali gefüllte Röhre führte, bis zur Rothgluth erhitzt, so daß das Wasser an das Kali treten, das Quecksilber aber im Retortenbalse bleiben mußte.

12,38 Ammoniuret gaben 10,35 Quecksilber, 0,67 Wasser und 1,36 Gase als Verlust; die letzteren bestehen aus Sauerstoff und Ammoniak. Berücksichtigt man diese, so sind nach diesem Versuche die Bestandtheile in 100:


Quecksilber	83,62
Sauerstoff	6,60
Ammoniak	4,39
Wasser	5,39.

Das Mittel aus diesen vier Versuchen giebt für die Zusammensetzung des Ammoniurets in 100:


Queck-

		Berechnet.
Quecksilber	83,68	83,72
Sauerstoff	6,60	6,60
Ammoniak	4,10	4,72
Wasser	5,62	4,98.

Der berechneten Zusammensetzung, die, wie man sieht, sehr gut mit der beobachteten übereinstimmt, liegt zum Grunde die Formel:



die, in der Annahme, daß der Stickstoff als Amid in die Verbindung eingehe, sich auch so schreiben läßt:



wodurch die Anordnung der Elemente der für das weiße Präcipitat angenommenen analog wird<sup>1)</sup>.

### III. Beitrag zur näheren Kenntniss der Zusammensetzung des weißen Quecksilberpräcipitats und einiger anderen analogen Quecksilberverbindungen; von C. Ullgren.

(K. Vetensk. Acad. Handling. för 1836.)

Eine neuerlich von Kane mit *Mercurius praecipitatus albus* oder sogenanntem Quecksilberoxydsalmiak angestellte Untersuchung, welche zum Zweck hatte, die Zusammensetzung dieses Körpers näher zu bestimmen, und die Ursachen des Widerspruchs in den früher von verschiedenen Chemikern darüber gelieferten Angaben aus-

1) Guibouret's Analyse, die einzige über diesen Körper vorhandene, gedenkt des Wassers mit keinem Worte, obwohl dasselbe gewiss wesentlich ist. Ihr Resultat wurde der Formel:



entsprechen.

zumitteln, hat mir, da auch durch sie die Frage noch nicht vollständig entschieden zu seyn schien, Veranlassung zu einigen Versuchen gegeben, welche ich das ausgezeichnete Glück hatte grösstentheils in dem Laboratorium und unter der Leitung des Hrn. Freiherrn v. Berzelius ausführen zu können, und welche ich hiemit wage, dem Urtheile der Königl. Academie der Wissenschaften vorzulegen.'

Bei der Genauigkeit, welche die analytischen Methoden zur quantitativen Bestimmung von Chlor und Quecksilber, den Hauptbestandtheilen des Präcipitats, darbieten, ist es wunderbar, daß die vielen Chemiker, welche einer nach dem andern die Zusammensetzung dieses Körpers auszumitteln gesucht haben, nicht früher sich bemühten, die Ursache der geringen Uebereinstimmung ihrer analytischen Resultate aufzufinden. Erst C. G. Mitscherlich richtete die Aufmerksamkeit hierauf, und zeigte, daß das Präcipitat vom Wasser zersetzt werde und eine basischere Verbindung bilde. Dadurch war denn die Ursache der Verschiedenheit in den Resultaten der übrigen Chemiker aufgedeckt.

Robert Kane, welcher die Analyse des *Mercurius praecipitatus* und einiger ähnlichen Verbindungen von Chlor und Quecksilber zuletzt wiederholte, hat sich das Verdienst erworben, die Zusammensetzung des Präcipitats am richtigsten bestimmt, und das Verhalten desselben zu Wasser und Alkalien vollständiger als bisher kennen gelehrt zu haben. Seine Analysen, welche mit großer Genauigkeit angestellt zu seyn scheinen, stimmen am nächsten mit denen von C. G. Mitscherlich und Guibourt, weichen aber doch von beiden ab, hinlänglich beweisend, daß die Zusammensetzung des Präcipitats nicht so seyn kann, wie sie sich aus deren Analysen ergibt, oder wenigstens nicht die, welche nach Mitscherlich's Resultaten angenommen und bisher durch die Formel  $\text{NH}^4\text{Cl} + 2\text{Hg}$  ausgedrückt wurde. Zum



leichteren Vergleich der Ansichten über die Zusammensetzung des Präcipitats, zu denen Mitscherlich's und Kane's Versuche Anlaß geben, glaube ich hier das Resultat der Analysen beider Chemiker anführen zu müssen:

Mitscherlich erhielt von 100 Th. weissen Präcipitats:

Quecksilber	76,19
Chlor	13,82
Ammoniak	7,10
Sauerstoff	3,01.

Nach der Formel  $\text{NH}^4\text{Cl} + 2\text{Hg}$  müßten 100 Th. enthalten:

Quecksilber	74,43
Chlor	13,01
Ammoniak	6,31
Sauerstoff	5,68.

Kane fand:

Quecksilber	78,60
Chlor	13,65
Ammoniak	6,77
Hygroskop. Wasser	} 0,78
Sauerstoff u. Verlust	

Keine dieser Analysen berechtigt also, das weisse Präcipitat als bestehend aus 1 At. Salmiak und 2 At. Quecksilberoxyd anzusehen. Dagegen stimmt Mitscherlich's Analyse näher mit der Formel  $\text{HgCl} + \text{HgNH}^2$ , nach welcher erhalten werden müßten:

Quecksilber	77,00
Chlor	13,45
Ammoniak	6,51
Sauerstoff	3,04.

Gegen diese Ansicht spricht aber wieder der Umstand, daß Kane bei mehrfach wiederholten Analysen eine so geringe Menge Sauerstoff erhalten hat, daß man denselben nur mit geringer Wahrscheinlichkeit als we-

entlichen Bestandtheil des Präcipitats ansehen kann. Auf diesen Umstand hat auch Kane mit Recht großes Gewicht gelegt, und zugleich, darauf gestützt, der Ansicht den Vorzug gegeben, daß das Präcipitat kein Quecksilberoxyd enthalte, sondern eine Verbindung von Quecksilberoxyd und Quecksilberamid sey, unter *Amid* den Körper verstanden, welcher in das Benzamid, 2 At. Oxamid u. s. w. eingeht, und aus 1 At. Stickstoff und Wasserstoff besteht.

Nach der letzteren Ansicht, d. h. nach der Ansicht, daß das Präcipitat  $= \text{HCl} + \text{HgNH}_2$  wäre, müßten 100 Th. desselben geben:

Quecksilber	79,73
Chlor	13,93
Ammoniak	6,73 = 6,34 Amid.

Mit dieser Formel stimmt Kane's Analyse auf eine befriedigende Weise, und noch mehr, wenn man, wegen der, obwohl höchst geringen, Menge Wasser, welche beim Versuche erhalten wurde, sich den Argwohn erlaubt, daß das zur Analyse angewandte Präcipitat nicht vollständig getrocknet war, was natürlicherweise auf die Menge der bei der Analyse erhaltenen Producte, besonders des Quecksilbers, verringernd einwirken mußte.

Kane's Versuche geben der Vorstellung, daß Quecksilberamid mit Quecksilberchlorid im Präcipitat vereinigt sey, viele Wahrscheinlichkeit; allein bei einer Frage von so delicateser Natur kann diese Ansicht nicht eher für gültig erachtet werden, als bis die Abwesenheit des Sauerstoffs in der Verbindung vollständig durch Versuche erwiesen ist. Kane hat dergleichen Versuche nicht angestellt, sondern die Bestätigung seiner Ansicht künftigen Untersuchungen über das Verhalten anderer Metalle zum Ammoniak überlassen. Klar ist indess, daß solche Untersuchungen, auch wenn sie mit der von Kane angewandten Sorgsamkeit angestellt würden, doch leicht Zweifel übrig lassen könnten, besonders weil, ich glaube,

keins der übrigen Metalle sich besser als das Quecksilber zur Entscheidung dieser Frage eignet. Ist dagegen die Frage durch Versuche mit einem solchen Metalle, welches in diesem Falle als sichere Resultate liefernd angetreten werden kann, entschieden worden, so dient hernach die Analogie als Richtschnur zur Beurtheilung des Verhaltens anderer Metalle, bei denen der Versuch nicht mit Sicherheit entscheiden kann.

Die von mir mit dem Präcipitat angestellten Versuche hatten also die Absicht zu entscheiden, ob dasselbe Sauerstoff enthalte oder nicht. Ich bin dabei von dem Gesichtspunkt ausgegangen, daß, wenn das Präcipitat Quecksilberchlorid verbunden mit Quecksilberoxydammoniak enthalte, bei Hinüberleitung von trockenem Chlorwasserstoffgase über dasselbe, Wasser und folglich flüssige Salzsäure gebildet werden müsse, daß dagegen, wenn das Präcipitat Quecksilberchlorid verbunden mit Quecksilberamid enthalte, weder Wasser noch flüssige Salzsäure entstehen könne. Die Wägung des Rückstands giebt überdies eine Controle, weil man nach der Ammoniakformel einen geringeren Rückstand als nach der Amidformel erhalten muß.

Da, nach Kane's Erfahrung, das weiße Präcipitat vom kalten Wasser allmähig und vom warmen Wasser ganz schnell in eine basische Verbindung verwandelt wird, so habe ich es mir angelegen seyn lassen, zur Analyse ein von dieser Einmischung freies Präcipitat zu erhalten. Ich habe daher das Präcipitat im unvollkommen ausgewaschenen Zustande, also noch verunreinigt mit Salmiak, angewandt; diese Verunreinigung konnte keinen andern Einfluss auf das Resultat ausüben, als daß er den Verlust unbedeutend größer machte, als er sonst gewesen seyn würde.

Das Präcipitat legte ich in eine von zwei Kugeln, geblasen aus einem Glasrohr, welches so gebogen war, daß die Kugeln in eine Schale mit Wasser getaucht

werden konnten. Während der Erhitzung wurde mittelst eines Blasebalgs über Chlorcalcium getrocknete Luft durch die Kugeln geleitet. Als das Präcipitat nichts mehr an Gewicht verlor, wurde es zur Analyse gewogen und darauf einem Strom von trockenem Chlorwasserstoffgas ausgesetzt, nachdem zuvor die Feuchtigkeit, welche es möglicherweise beim Wägen absorbiert haben könnte, durch erneutes Einblasen von trockner Luft ausgetrieben worden war. Während das Chlorwasserstoffgas, welches aus umkrystallisiertem und geschmolzenem Chlornatrium mit destillirter Schwefelsäure entwickelt worden war, durchströmte, wurde das Präcipitat erhitzt, anfangs nur bis  $100^{\circ}$ , indess fast eine Stunde lang, dann aber allmählig stärker, bis die Masse vollkommen gelassen war; sie bildete eine durchsichtige Flüssigkeit, welche aus Quecksilberchlorid und Salmiak bestand. Beachtet man beim Erhitzen diese Vorsicht nicht, so geschieht es leicht, daß Theile vom Präcipitat, welche nahe an den Wänden der Kugel liegen und die Hitze am schnellsten bekommen, zersetzt werden, ehe das Chlorwasserstoffgas die Masse durchdrungen hat; das Präcipitat wird dann an diesen Stellen gelb und verwandelt sich in Calomel, wie wenn es für sich erhitzt wird. Während der Operation bildete sich eine höchst geringe Menge eines Sublimats, welcher Salmiak und Quecksilberchlorid enthielt, aber keine Spur von flüssiger Salzsäure konnte entdeckt werden. Nachdem hinlänglich Chlorwasserstoffgas durchgeleitet worden, wurde das überflüssige Gas durch trockne Luft ausgetrieben, und darauf die Glasröhre mit den Kugeln gewägt.

I.	Gewicht des Präcipitats nach Trocknung im Wasserbade	= 0,807
	Gewicht des Products nach Hinüberlei- tung von Chlorwasserstoffgas	= 1,029
II.	Gewicht des Präcipitats	= 1,350
	Gewicht des Products	= 1,736.

Bei dem ersten Versuch hätte, nach der Amidformel, 1,038 Rückstand erhalten werden müssen, denn:

$$\frac{(\text{HgCl} + \text{HgNH}^2)}{3176,289} : \frac{(\text{HgCl} + \text{HgNH}^2) + 2\text{ClH}}{4066,549} = 0,807 : x$$

$$x = 1,038;$$

während nach der Ammoniakformel der Rückstand hätte 1,0027 wiegen müssen, denn:

$$\frac{(\text{HgCl} + \text{HgNH}^1)}{3288,76} : \frac{(\text{HgCl} + \text{HgNH}^1) - 100 + \text{Cl} + \text{HCl}}{4086,549} = 0,807 : x = 1,0027.$$

Bei dem letzteren Versuch hätte der Rückstand wiegen müssen, nach der Amidformel: 1,747, nach der Ammoniakformel aber nur 1,687.

Hieraus folgt nun deutlich, daß das Präcipitat keinen Sauerstoff enthält. Aber es bleiben noch anderweitige Fragen in Betreff der Zusammensetzung des Präcipitats zu beantworten übrig. Bekanntlich absorbiert der Calomel Ammoniakgas, und bildet damit eine Verbindung, welche auf 1 Atom Quecksilberchlorür 1 Doppelatom Ammoniak enthält. Dieser Körper ist schwarz und zerfällt wieder in Calomel und Ammoniak, wenn man ihn entweder an der Luft liegen läßt oder gelinde erhitzt. Nun fragt sich: Ist das Präcipitat eine mit diesem Körper isomerische Verbindung, und hat es seine größere Beständigkeit und seine Verschiedenheit in den Eigenschaften seiner Bildungsweise zu denken.

Wäre dieß der Fall, so müßte erstlich, damit sich ein solcher sauerstofffreier Körper aus Quecksilberchlorid und Ammoniakflüssigkeit bilden könnte, nothwendig Stickgas entwickelt werden, weil in diesem Fall ein Theil des Ammoniaks seinen ganzen Wasserstoffgehalt an einen anderen Theil Ammoniak abgeben müßte, zur Bildung des Ammoniums, welches sich mit dem Chlor der Hälfte des Quecksilberchlorids verbände. Allein bei der Bildung des Präcipitats, nach der bekannten Methode, entwickelt sich durchaus kein Stickgas; die Entstehung

desselben muß also unwiderleglich darauf beruhen, daß 2 Atome Ammoniak 1 Atom Ammonium bilden, und dieses sich mit dem halben Chlorgehalt von 2 At. Quecksilberchlorid zu Salmiak vereinigt, worauf 1 At. Amid übrig bleibt, welches sich mit dem rückständigen Quecksilber und Chlor zu Quecksilberchlorämid verbindet, oder, was wahrscheinlicher ist, zu einer basischen Verbindung von Quecksilberchlorid und Quecksilberamidid. Zweitens müßte, wenn man Chlorwasserstoffgas über Präcipitat leitet, Calomel übrig bleiben; allein dies geschieht nicht, wie schon erwähnt, sondern der Rückstand, welcher in der Hitze flüssig ist (was beim Calomel nicht der Fall seyn könnte), löst sich in Wasser und ist Quecksilberchlorid, wie es seyn muß, wenn das Präcipitat eine Verbindung von Quecksilberchlorid und Quecksilberamidid ist.

Die andere Frage, welche aufgeworfen werden könnte, wäre die: Ob nicht das Präcipitat im Bildungszustande Quecksilberoxydammoniak enthielte, und dieses erst beim Trocknen bei 100° zerstört wurde, in der Weise, daß 1 Atom Wasser sich bildete und fortginge, während das Quecksilberamidid-Chlorid zurückbliebe. Aber auch dieses ist nicht der Fall, weil das Präcipitat, welches unter der Luftpumpe vollständig ausgetrocknet worden ist, nichts verliert, wenn es bis 100° erhitzt wird. Aus den eben angeführten Thatsachen möchte es wohl vollständig bewiesen seyn, daß das weiße Präcipitat wirklich Amid enthält, dessen Gegenwart bisher nur hypothetisch war.


Ein dem Präcipitat analoger Körper, welcher Quecksilberchlorür enthält, bildet sich, wenn Calomel eine Weile mit Aetzammoniak erhitzt wird. Noch feucht ist er schwarz, wird aber beim Trocknen schwarzgrau. Auch über diesen Körper, dessen procentische Zusammensetzung von Kane bestimmt worden, habe ich Salzsäuregas geleitet, auf die beim Präcipitat genannte Weise. Das Gas wurde bei etwa 50° C. mit Leichtigkeit absor-



birt, und die Masse wurde weiß. Gegen Ende der Operation wurde die Temperatur allmählig erhöht, bis sich Calomel anfang zu sublimiren; von flüssiger Salzsäure konnte keine Spur entdeckt werden.

1,407 von dem im Wasserbade getrockneten schwarzgrauen Körper gaben nach Hin- überleitung von trockenem Salzsäuregas	1,633
Nach der Amidformel hätten erhalten wer- den müssen	1,631
Nach der Ammoniakformel	1,571

Die Zusammensetzung dieses Körpers ist also:



womit auch das Resultat von Kane's Analyse so nahe wie möglich übereinstimmt.

Ich erwähnte zuvor, daß das Präcipitat durch Behandlung mit Wasser zersetzt wird in Salmiak und eine basischere Verbindung, welche, nach Kane's Versuchen, halb so viel Chlor und doppelt so viel Quecksilber als das Präcipitat, und, wie dieser, Stickstoff und Wasserstoff enthält. Ungeachtet nun alle Wahrscheinlichkeit in der Vorstellung liegt, daß der Stickstoff und Wasserstoff hier, wie beim Präcipitat, als Amid, und nicht als Ammoniak vorhanden sind, weil im letzteren Falle die Entstehung des besagten Körpers auf entgegengesetzten Verwandtschaftsäußerungen, als die der Bildung des Präcipitats zum Grunde liegenden, beruhen müßte, so habe ich doch geglaubt, dies durch directe Versuche entscheiden zu müssen, sowohl wegen des Interesses, welches die sichere Kenntniß der Zusammensetzung dieses Körpers an sich besitzt, als auch wegen der daraus fließenden Anleitung zur richtigern Beurtheilung der Zusammensetzung verschiedener basischen Quecksilber-Sauerstoffsalze, die man bisher für ammoniakhaltig angesehen hat. Ich werde daher ein Paar einfache Versuche anführen, welche ich hoffe für hinlänglich beweisend beach-

tet werden, daß Wasserstoff und Stickstoff als Amid in den besagten Körper eintreten.

1) Der gelbe Körper, welcher durch Behandlung des Präcipitats mit Wasser erhalten wird, wurde bis  $90^{\circ}$  oder  $100^{\circ}$  C. erhitzt, in einer Flasche mit dem ersten Hydrat der Salpetersäure, welches im Wasserbade zuvor von aller salpetrigen Säure befreit worden war, und noch warm darauf gegossen wurde. Nachdem die Einwirkung eine Weile gedauert hatte, fing eine reichliche Entwicklung von salpetriger Säure an. Daß die rothen Dämpfe nicht von einer Zersetzung der concentrirten Salpetersäure mit dem gebildeten salpetersauren Ammoniak herrührten, davon überzeugte ich mich dadurch, daß eine Quantität trocknen salpetersauren Ammoniaks fast eben so groß als die zum Versuch genommene Menge Quecksilbersalz, nach halbstündlicher Erwärmung mit concentrirter Salpetersäure im Wasserbade, nur den Geruch nach salpetriger Säure gab, aber keine rothen Dämpfe; auf dieselbe Weise behandelte ich krystallisirtes Quecksilberchlorid mit Salpetersäure, ohne aber Geruch oder Dämpfe von salpetriger Säure entdecken zu können.

2) Oxydbasisches Quecksilberchlorid,  $\text{HgCl} + 3\text{Hg}$ , welches, wie die Formel zeigt, dieselbe Anzahl Quecksilber- und Chloratome enthält, wie der gelbe Körper, und welches durch Kochen von Quecksilberoxyd mit Ueberschuß von Quecksilberchlorid erhalten war, wurde, nach vorheriger Trocknung bei  $100^{\circ}$  C., bis zu einer Temperatur von etwa  $150^{\circ}$  C. in einem Strom von trockenem Ammoniakgas erhitzt. Dabei bildeten sich Wasser und ein gelber Körper von ganz gleichem Ansehen mit dem, welcher durch Zersetzung des Präcipitats mit Wasser oder Alkali entsteht. Auch stimmte er in den Eigenschaften mit ihm überein. Behandelt mit einer Lösung von Aetzkali, entwickelte er auch kein Ammoniak, selbst nicht bei Erhitzung. Dieses Verhalten steht in voll-

kommener Uebereinstimmung mit dem Resultat des hier angeführten Versuchs; denn aus demselben erhellt, daß die Verwandtschaft des Wasserstoffs zum Sauerstoff, zur Wasserbildung, und die des Quecksilbers zum Amid größer ist als die Verwandtschaft des Quecksilbers zum Sauerstoff; deshalb erfolgt auch bei Zusatz von Kali keine Wasserzersetzung, ohne welche hier wiederum kein Ammoniak entwickelt werden kann. Dagegen entwickelt der Körper Ammoniak mit KS, sich in Schwefelquecksilber verwandelnd, und mit Salpetersäure giebt er rothe Dämpfe aus. Die salpetrige Säure hat also in diesen beiden Versuchen auf keine andere Weise entstehen können, als durch die Gegenwart von metallischem Quecksilber, welches sich auf Kosten der Salpetersäure oxydirte. Nachdem der Versuch solchergestalt gezeigt, daß metallisches Quecksilber in der Verbindung vorhanden, ist auch zugleich bewiesen, daß Wasserstoff und Stickstoff als Amid darin enthalten sind, aus Gründen, die durch die Betrachtung der Zusammensetzung des Präcipitats, aus welchem der gelbe Körper entsprungen, Jedem ohne besondere Auseinandersetzung deutlich seyn müssen.

Nachdem der Versuch nunmehr handgreiflich ergeben, daß das Quecksilberamidid in Verbindung mit Quecksilberoxyd existiren kann, muß ungezwungen die Vermuthung entstehen, daß die, durch Einwirkung des Ammoniaks auf das salpetersaure Quecksilberoxydul und Oxyd entstehenden basischen Verbindungen von ganz analoger Beschaffenheit wie die hier beschriebenen sind. Wie bekannt, hat C. G. Mitscherlich, welcher die meisten dieser Verbindungen untersuchte, sie als zusammengesetzt aus wasserfreiem salpetersauren Ammoniak ( $\text{NH}_4\text{N}$ ) und Oxydul oder Oxyd betrachtet. Allein die Unwahrscheinlichkeit, daß sich, bei Gegenwart von Wasser, wasserfreies Ammoniak Salz bilde, oder, wenn wir diese Verbindungen als zum Theil basisch von Ammoniak betrach-


ten, daß das Begehren von  $\text{NH}^3$ , als Substitut für Quecksilberoxyd oder Oxydul in ein basisches schwerlösliches Salz einzutreten, größer sey als dessen Verwandtschaft zum Wasser, wenn solches zugegen ist, um damit Ammoniumoxyd zu bilden, und sich sodann mit der Säure oder dem Oxyd zu verbinden, was nach der Theorie geschehen müßte, spricht überdiß dafür, daß diese Verbindungen eher Amid als Ammoniak enthalten, nachdem wir nämlich durch die Analyse wissen, daß sie kein Wasser enthalten, und folglich auch kein Ammoniumoxyd.

Ich habe indess keine Versuche mit diesen salpetersauren Salzen angestellt, aus Furcht, die anwesende Salpetersäure möchte durch ihre Einwirkung auf die anzuwendenden Reagenzien zu verwickelten Resultaten Anlaß geben. Statt dessen habe ich den Versuch mit einem basisch schwefelsauren Salz angestellt, welches nach der Analyse 4 At. Quecksilber und 1 At. Schwefelsäure enthält. Dieses Salz bekommt man durch Behandlung von neutralem schwefelsauren Quecksilberoxyd mit kitzendem Ammoniak, in Gestalt einer weißen Masse, welche frisch gefälltem Zinnoxid gleicht, und nach dem Trocknen sich etwas in's Gelbe zieht. Dasselbe Salz entsteht, wenn man die abfiltrirte Flüssigkeit, welche Ueberschuß an Ammoniak enthält, langsam abdunsten läßt oder mit Wasser fällt, oder endlich, wenn man *Turpethum minerale* ( $\text{Hg}^2\text{S}$ ) in der Wärme mit schwefelsaurem Ammoniak behandelt, bis der Rückstand weiß ist. Im letztgenannten Fall beruht die Bildung der basischen Verbindung auf der Eigenschaft des schwefelsauren Quecksilberoxyds, mit schwefelsaurem Ammoniak ein lösliches Salz zu geben, so daß bei dieser Gelegenheit aus 2 At.  $\text{Hg}^2\text{S}$  und 3 At.  $\text{NH}^4\text{S}$  entstehen 1 At.  $(\text{HgS} + 2\text{Hg} + \text{HgNH}^2) + 2\text{At.}(\text{HgS} + \text{NH}^4\text{S})$ . Ein weniger basisches Salz habe ich nicht darstellen gekonnt, falls es sich

nicht bei Hinleitung von Ammoniakgas über trocknes schwefelsaures Quecksilberoxyd bildet, wobei die Masse grau wird, ohne dafs Wasser entsteht, was zu beweisen scheint, dafs eine dem *Mercurius praecipitatus* analoge Verbindung neben schwefelsaurem Ammoniumoxyd erzeugt wird. Das basisch schwefelsaure Salz entwickelte Ammoniak mit K.S., aber nicht mit Aetzkohlauge; ein Verhalten, welches bei allen bisher bekannten Quecksilberniedersalzen, die 4 At. Metall enthalten, sich darbietet. Um das Salz auf Amid zu prüfen, leitete ich, während es im Wasserbade erhitzt wurde, schwefelsaures Gas darüber, in der Absicht, es dadurch in schwelligsaures Quecksilberoxydul zu verwandeln, und das Gewicht des Products zu bestimmen, das natürlich verschieden seyn mußte, je nachdem das Salz Amid oder Ammoniak enthielt. Allein im Laufe dieser Operation wurde auch ein Theil des gebildeten Oxydulsalzes reducirt, so dafs auf diese Weise kein Resultat erhalten wurde. Als dagegen das Salz auf zuvor genannte Weise mit concentrirter Salpetersäure behandelt wurde, entwickelten sich rothe Dämpfe von salpetriger Säure, und in der Lösung fand sich Ammoniak. Hieraus und aus den beim gelben Körper angeführten Gründen folgt, dafs auch dieses Sauerstoffsalz Amid enthält, und dafs dessen Formel ist:  $\pm \text{HgS} + 2\text{Hg} + \text{HgNH}^2$ . Das Resultat der Einwirkung von Salpetersäure auf diese Art Salze halte ich für so entscheidend, dafs ich mich jedes Versuchs zur quantitativen Bestimmung der in ihnen enthaltenen Menge von Stickstoff und Wasserstoff überheben zu können glaubte. Ich habe die Untersuchung nicht auf ähnliche, mit anderen Säuren gebildete Quecksilbersalze ausgedehnt, weil die von mir bei dem oben beschriebenen Salze erhaltenen Resultate mit grosser Wahrscheinlichkeit als gültig für alle ähnliche, durch Einwirkung von Ammoniakflüchtigkeit entstehende Quecksilbersalze angesehen werden können. Ich habe mich daher mit dem allgemeinen Re-

sultat begnügt, besonders da meine Untersuchung nur darauf abzielte, ein solches zu erhalten.

Ob endlich die angeführten Verbindungen als Doppelsalze betrachtet werden müssen oder als basische Salze, worin das Quecksilberamidid ganz oder zum Theil das Oxyd ersetzt, muß noch unentschieden bleiben. Indess dürfte, meiner Meinung nach, der Ansicht, zufolge welcher die Quecksilberamid-Verbindungen basische Salze sind, bis weiteres der Vorzug gelassen werden, da nach der anderen Vorstellungsweise alle die Salze, welche 3 Atome Quecksilber enthalten, z. B. die meisten von denen, welche neuerlich Harff mit Pflanzensäure darstellte, und welche, obwohl durch Versuche nicht erwiesen ist, daß sie Amid enthalten, mit aller Wahrscheinlichkeit als analog den zuvor beschriebenen Salzen angesehen werden können, Doppelverbindungen seyn würden von einem neutralen Sauerstoffsalz und einem sauerstoffbasischen Amidsalz, oder umgekehrt, z. B.:



— ein Verbindungsverhältniß, das wenigstens bisher ungewöhnlich ist <sup>1)</sup>.

1) Schließlich sey hier bemerkt, daß Berzelius in seinem neuesten Jahresberichte, bei Gelegenheit der Auführung von Kane's und Ullgren's Untersuchungen, den Vorschlag macht, dem Körper  $\text{NH}^+$  den Namen *Amid* zu lassen (also nicht *Amidogen* zu nennen, wie Kane gethan), die Verbindungen desselben aber, die den Chlorüren und Chloriden entsprechen, *Amidür* und *Amidid* zu nennen.



IV. *Beiträge zur organischen Chemie;*  
*von C. Löwig.*

Einwirkung des Kaliums auf Weingeist<sup>1)</sup>.

Wird Kalium mit wasserfreiem Weingeist in Berührung gebracht, so findet sogleich eine starke Entwicklung von Wasserstoffgas statt. Die Einwirkung des Kaliums ist mit beträchtlicher Wärmeentwicklung verbunden, weshalb der Apparat, in welchem der Versuch vorgenommen wird, kalt gehalten werden muß. Hat man nach und nach so viel Kalium mit dem Weingeist in Berührung gebracht, daß kein Gas mehr entweicht, so erhält man nach dem Erkalten eine weiße krystallinische Masse; diese schmilzt schon in ganz gelinder Wärme, und wird sie bis auf 60° bis 80° erwärmt, so verflüchtigt sich eine nicht unbedeutende Quantität Weingeist. Diese krystallinische Verbindung läßt sich daher als zusammengesetzt aus einer organischen Verbindung mit Kali und unzersetztem Weingeist betrachten. Erhält man, selbst bei einer Temperatur, bei welcher sich die Kaliverbindung zu zersetzen beginnt, keinen Weingeist mehr, so kann man dieselbe für rein betrachten. In diesem Zustande erscheint die Kaliverbindung als eine weiße, sehr lockere, geruchlose, stark ätzende Masse, welche

1) Die Versuche, welche den Gegenstand gegenwärtiger Abhandlung ausmachen, sind von mir schon vor 7 bis 8 Monaten angestellt worden. Schon im Juli habe ich die Resultate Gmelin in Heidelberg, so wie mehreren Gelehrten in Berlin mitgetheilt. Erst von Hrn. Mohr in Coblenz erfuhr ich, daß auch Liebig im Julihefte der *Annalen* Einges über die Einwirkung des Kaliums auf Weingeist mitgetheilt habe, und die neue Verbindung als Aetherkali betrachte. Jedoch war im November das Juliheft in Zürich noch nicht angekommen.

bei einer gewissen Temperatur schmilzt, und noch höher erhitzt, sich unter Entwicklung von brennbarem Gase und Zurücklassung einer schwarzen, pyrophorischen, litzenden Masse vollständig zerlegt. Wird die reine Kaliverbindung mit etwas Wasser zusammengebracht, so zersetzt sie sich augenblicklich, unter Bildung von Weingeist und Kalihydrat. Setzt man dieselbe einige Zeit der Luft aus, so färbt sie sich gelb, und liefert dann, bei der Destillation mit Phosphorsäure, eine nicht unbedeutende Menge Essigsäure. Zersetzt man Weingeist mit Kalium, und fügt man sogleich nach beendigter Reaction etwas Phosphorsäure zur rückständigen Flüssigkeit, so bleibt nach dem Abdampfen reines phosphorsaures Kali, und es verdunstet nichts anderes als wässriger Weingeist.

Die mitgetheilten Erscheinungen treten aber nur dann auf die angegebene Weise ein, wenn die Versuche so schnell als möglich beendigt werden. Je länger sie dauern, je länger nämlich der noch unzersetzte Weingeist mit der neugebildeten Kaliverbindung in Berührung bleibt, desto verwickelter werden dieselben. Die Masse färbt sich dann gelb, es bildet sich Essigsäure, wahrscheinlich Aldehydharz etc. Auch ist eine vollständige Abhaltung der Luft und die Anwendung von vollkommen wasserfreiem Weingeist nothwendige Bedingung zur Darstellung der reinen Kaliverbindung. Ist diese vollständig vom Weingeist getrennt, so kann man sie lange unverändert aufbewahren. Bringt man sie nach mehreren Wochen mit Wasser in Berührung, so erhält man, außer Weingeist und Kali, kein anderes Product.

#### Zusammensetzung und Natur der Kaliverbindung.

Eine Elementaranalyse lässt sich mit der Verbindung nicht vornehmen, weil das Kali eine genaue Bestimmung der Kohlensäure nicht zulässt. Die Zusammensetzung kann aber auf rein theoretischem Wege ermittelt

teit werden. Die Menge des Wasserstoffs, welche durch die Einwirkung des Kaliums frei wird, muss sich nämlich zum Sauerstoff, welcher mit dem Kalium in Verbindung geht, verhalten wie im Wasser, weil die Kaliverbindung, mit Wasser zusammengebracht, wieder Weingeist liefert, was nur durch Wasseraufnahme erfolgen kann. Es entsteht nun die Frage: Entzieht das Kalium dem Weingeist ein oder zwei Atome Sauerstoff? Wird zuerst angenommen, das Kalium entziehe dem Weingeist zwei Atome Sauerstoff, so muss eine Verbindung von Kohlenwasserstoff mit Kali erhalten werden, und diese Verbindung wird, wenn sie einer trocknen Destillation bei sorgfältig abgehaltener Luft unterworfen wird, einen Rückstand, bestehend aus Kohle und reinem Kali, hinterlassen müssen. Nimmt aber das Kalium aus dem Weingeist nur ein Atom Sauerstoff auf, so wird die gebildete Kaliverbindung, bei abgehaltener Luft zerstört, einen Rückstand geben müssen, der ausser Kohle und Kali auch kohlen-saures Kali enthält. Letzteres findet nun in der That auch statt. Ich habe die Zersetzung der Verbindung auf die Weise vorgenommen, dass ich durch den Apparat, in welchem dieselbe vorgenommen, während der ganzen Dauer der Operation trocknes Wasserstoffgas leitete. Zugleich war die Einrichtung getroffen, dass die Säure, durch welche die Kohlensäure abgeschieden wurde, mit der zersetzten Masse in Berührung gebracht werden konnte, ohne den Apparat zu öffnen. Die Menge Kohlensäure, welche sich bei diesem Versuche entwickelte, war nicht unbedeutend.

Zwei Ansichten über die Art, wie die Bestandtheile im Weingeist unter einander verbunden seyn können, haben sich in neuerer Zeit geltend gemacht, welche beide gleich viele Gründe für und gegen sich haben. Nach der einen ist der Weingeist das Hydrat des Äthyloxyds (Äthers), nach der andern 'das Doppel-Hydrat eines eigenthümlichen Kohlenwasserstoffs. Fragt man: Spricht

das Verhalten des Kalium zum Weingeist zu Gunsten der einen oder andern Ansicht, so muß diese Frage, wie eine kurze Betrachtung zeigen wird, mit Nein beantwortet werden.

Nehmen wir zuerst an, der Weingeist sey das Hydrat des Aethers, und der Aether selbst ein Oxyd, so ist die Erklärung des Vorgangs folgende: das Kalium zersetzt das Hydratwasser, es entweicht Wasserstoffgas unter gleichzeitiger Bildung von Kali, welches sich mit dem frei gewordenen Aether verbindet. Die Kaliverbindung ist demnach Aetherkali, in welchem der Aether die Stelle des Wassers im Kalihydrat vertritt. Kommt dieses Aetherkali mit Wasser zusammen, so nehmen Kali und Aether Wasser auf, wodurch Kalihydrat und Weingeist gebildet werden.

Huldigt man aber der Ansicht, der Weingeist sey das Doppel-Hydrat von Kohlenwasserstoff, so kann man entweder annehmen, das Kalium zersetze 1 Atom Wasser und das gebildete Kali vereinige sich mit dem zweiten Atom zu Kalihydrat, welches mit dem Kohlenwasserstoff in Verbindung geht, oder man betrachtet die Kaliverbindung als bestehend aus 1 Atom Kali, 1 Atom Kohlenwasserstoff und 1 Atom Wasser, und läßt es dahingestellt, ob das Wasser mit dem Kali oder dem Kohlenwasserstoff verbunden sey. Man wird gegen diese Ansicht zwar einwenden, daß das Kalium auf den Aether nicht einwirke, was doch nothwendig stattfinden müsse, wenn der Aether und der Weingeist Hydrate desselben Kohlenwasserstoffs wären. Dagegen aber läßt sich erinnern, daß wasserfreies Kali mit dem Kohlenwasserstoff keine Verbindung bilden kann, überhaupt zum Bestehen einer solchen 1 At. Wasser nöthig ist, daher auch keine Zersetzung erfolgen kann. Es könnte nämlich zwischen dem Kalium und Aether dasselbe Verhalten eintreten, wie zwischen dem Kupfer und anderen Metallen, und dem ersten Hydrate der Salpetersäure.

Man hat viel Gewicht auf die Zersetzung des Weingeistes durch Fluorborgas in Aether, Boraxsäure und Fluospathsäure gelegt. Man glaubt diese Zerlegung spreche direct zu Gunsten der ersteren Ansicht, weil der Aether durch diesen Körper nicht zerlegt wird. Dieses Verhalten läßt sich aber auch zum Vortheil der anderen Meinung auslegen. Der Weingeist löst nämlich das Fluorborgas in sehr großer Menge auf, der Aether aber nicht. Leitet man dieses Gas in Aether, so steigen die Blasen sogleich durch denselben; deshalb ist auch keine Zersetzung möglich.

Man hat ferner angeführt, das ölbildende Gas gebe mit Wasser weder Weingeist noch Aether, und die Verbindung desselben mit Chlor bestehe nicht aus ölbildendem Gase und Chlor, sondern aus Chlorwasserstoff und Chloraldehyden. Abgesehen davon, daß aus dem Umstande, daß aus Wasser und ölbildendem Gase weder Weingeist noch Aether gebildet wird, nichts gefolgert werden kann, so ist es übrigens gar nicht nöthig, ölbildendes Gas im Weingeist anzunehmen, weil eben so gut ein anderer Kohlenwasserstoff substituirt werden kann; und aus der Zersetzung der holländischen Flüssigkeit durch Kali läßt sich nicht folgern, daß dieselbe schon vor der Zersetzung aus Chlorwasserstoff und Chloraldehyden zusammengesetzt war; denn diese Körper lassen sich auch sehr gut als Zersetzungsproducte, bedingt durch die Einwirkung des Kalis, betrachten.

Das Verhalten des Kaliums zum Weingeist beweist direct, daß derselbe ein Hydrat von Aether ist. Ob aber der Aether gleichfalls ein Hydrat oder ob er ein Oxyd sey, darüber giebt dieses Verhalten keinen Aufschluß.

Verhalten der zusammengesetzten Aetherarten zum Kalium.

Es schien mir interessant zu untersuchen, ob das Kalium die Verbindungen des Aethers mit den Säuren auf ähnliche Weise zersetze, wie der Weingeist, ob dasselbe nämlich, wie bei dem letzteren auf das Wasser, bei der ersteren auf die Säure einwirke. Die Versuche, die ich in dieser Beziehung mit dem Essigäther, Ameisenäther, Kleeäther und einigen anderen vorgenommen habe, haben diese Ansicht vollkommen bestätigt. Es zeigen sich bei diesen Zersetzungen sehr interessante Erscheinungen, von denen ich bei einer anderen Gelegenheit sprechen werde. Auch einige Wasserstoffnaphten habe ich mit Kalium in Berührung gebracht. Auf die Schwefelwasserstoffnaphta wirkt dasselbe bei der gewöhnlichen Temperatur nicht ein; dagegen entzieht es der Chlorwasserstoffnaphta das Chlor, und zwar ohne Entwicklung von *Wasserstoffgas*. Vielleicht lässt sich aus diesem Verhalten und aus der Einwirkung des Kaliums auf Holzgeist und Aceton etwas zu Gunsten der Aethyltheorie ableiten.

Einwirkung des Kaliums auf Holzgeist.

Viele Untersuchungen, welche seit einigen Jahren im Gebiete der organischen Chemie von einigen Chemikern vorgenommen wurden, sind in der Absicht angestellt, eine Analogie zwischen dem Weingeist und einigen anderen bekannten organischen Verbindungen nachzuweisen. Die Bemühungen dieser Chemiker sind nicht unbelohnt geblieben; denn bereits besitzen wir einen Holzweingeist, Aethylweingeist, Acetonweingeist, Indigweingeist etc.

Die Untersuchungen von Dumas und Peligot über den Holzgeist haben dargethan, dass dieser Körper in der That in seinen Verbindungs- und Zersetzungs-Erscheinungen auf eine auffallende Weise mit dem Weingeist



übereinkommt, und als ein wirklicher Alkohol angesehen werden kann. Die Untersuchungen dieser Chemiker wurden namentlich von Kane und Gregory theils wiederholt, theils erweitert, und die Resultate, welche dieselben erhielten, haben die theoretischen Ansichten von Dumas und Peligot über die Natur des Holzgeistes bestätigt. Sind wir auch nicht im Stande die Anordnung der kleinsten Theilchen, aus welchen eine chemische Verbindung besteht, direct in denselben zu erkennen, so werden wir doch keinen Augenblick im Zweifel seyn, die Frage, ob im Kalihydrat dieselbe Anordnung der kleinsten Theile stattfindet, wie im Natronhydrat, mit Ja zu beantworten. Eine vernünftige Einwendung gegen diese Ansicht wird sicher nicht gemacht werden, denn alle Verbindungs- und Zersetzungs-Verhältnisse, welche die eine dieser Substanzen darbietet, zeigt ganz sicher auch die andere. Bei Betrachtung der Verbindungsart der Elemente in den organischen Körpern, müssen wir so viel als möglich von den bekannten Gesetzen und Erscheinungen ausgehen, welche uns die unorganische Chemie gelehrt und gezeigt haben. Bei Betrachtung der organischen Verbindungen, in welchen die Atomverhältnisse viel complicirter sind, wie bei den unorganischen, wird der Phantasie immer mehr Spielraum gegeben bleiben, in Betreff der Verbindungsart der Elemente, wie bei den letzteren. Aber es unterliegt keinem Zweifel, daß immer mehr Mittel aufgefunden werden, durch welche, wenn es sich darum handelt, in verschiedenen organischen Verbindungen gleiche Verbindungsverhältnisse der Elemente anzunehmen, diese ausgemittelt werden kann.

Handelt es sich darum, in der organischen Chemie Verbindungen, sey auch die absolute oder relative Anzahl der Atome verschieden, als analog zusammengesetzt zu betrachten, soll z. B. nachgewiesen werden, daß zwei organische Verbindungen in demselben Verhältnisse zusammen stehen, wie Kalihydrat und Natronhydrat, so muß

natürlich untersucht werden, ob gewisse einfache Reagentien, mit beiden Verbindungen zusammengebracht, gleiche Zersetzungs-Erscheinungen hervorbringen. Ist dies nicht der Fall, so hört alle Analogie von selbst auf.

Das Verhalten des Kaliums zum Weingeist ist so bezeichnend, daß man wohl, wie schon angedeutet wurde, über die Frage: ob derselbe ein Hydrat des Aethers sey, nicht in Zweifel seyn kann. Man kann durch das Kalium dem Weingeist 1 Atom Wasser entziehen, und fügt man zu der dadurch entstandenen Verbindung wieder 1 Atom Wasser, so erhält man wieder Weingeist. Ist nun in der That der Holzgeist eine dem Weingeist analoge Verbindung, d. h. ist er gleichfalls ein Hydrat eines eigentümlichen Aethers, so muß er, mit Kalium zusammengebracht, Wasserstoffgas entwickeln, wie der Weingeist. Die Versuche, welche ich nun beschreiben werde, zeigen aber, daß sich Holzgeist und Weingeist ganz verschieden zum Kalium verhalten.

Der Holzgeist, den ich zu meinen Versuchen angewandt, besitzt alle Eigenschaften, welche Dumas und Peligot von demselben angeben. Er hat ein spec. Gewicht von 0,797, kocht constant bei  $+66^{\circ},5$ , und mischt sich mit Wasser in allen Verhältnissen. Das Verhalten zu Chlorcalcium zeigte auch, daß er keinen Mesit enthält; denn eine concentrirte Lösung desselben in dem Holzgeist veranlaßte keine Ausscheidung von Mesit; und ich bin auch überzeugt, daß die französischen Chemiker ihre Untersuchungen mit einem mesitfreien Holzgeist angestellt haben.

Ich erhielt den reinen Holzgeist durch oftmalige Destillation des rohen Holzgeistes (der wir in großer Quantität zu Goboto steht) über Aetzkalk. Um ihn ganz zu entwässern fand ich für nöthig denselben zuletzt einige Male mit Chlorcalcium zu behandeln. Die Entwässerung muß in der Destillation einer gesättigten Lösung bestehen. Die Ausbeute ist zwar gering, weil eine nicht

unbedeutende Menge mit dem Chlorcalcium verbunden bleibt.

Bringt man den wasserfreien Holzgeist mit Kalium in Berührung, so findet augenblicklich eine sehr lebhafte Reaction statt. Die Erhitzung ist so bedeutend, daß der Holzgeist in lebhaftes Sieden kommt. Um die Einwirkung etwas zu vermindern, muß man den Apparat möglichst kalt zu erhalten suchen, und Gefäße mit sehr langem und engem Halse wählen, damit der Holzgeist zur Verdichtung wieder Gelegenheit finde. Bei der Einwirkung des Kaliums auf den Holzgeist wird aber keine Spur irgend eines Gases entwickelt. Zeigt sich solches, so kann man fest überzeugt seyn, daß der Holzgeist noch Wasser enthält. Während der Reaction des Kaliums, welche in einer raschen Oxydation desselben besteht, färbt sich die Flüssigkeit gelb. Hat man nach und nach so viel Kalium zum Holzgeist gebracht, daß keine Wirkung mehr stattfindet, so kühlt sich die Masse ab, und es bleibt ein syrupsdicker Brei von stark alkalischer und ätzender Reaction. Wird dieselbe mit Wasser in Berührung gebracht, so erhält man eine stark alkalische, gelb gefärbte wässrige Lösung, auf welcher ein ebenfalls gelb gefärbter öliger Körper schwimmt. Durch mehrmaliges Schütteln mit Wasser und darauf folgender Destillation über gebranntem Kalk erhält man die ölige Substanz fast wasserklar. Sie ist leichter als Wasser, besitzt einen durchdringenden Geruch und Geschmack nach Pfeffermünzöl, und verbrennt mit einer stark rufenden Flamme. Der Siedpunkt liegt anfangs etwas über  $100^{\circ}$ , steigt aber bei fortwährendem Kochen weit über  $200^{\circ}$ . Das anfangs dünnflüssige Destillat wird etwas dicker, und zwar in dem Verhältniß als der Siedpunkt steigt.

0,560 Grm. des zuerst Ueberdestillirten lieferten.

1 205 Grm. Kohlensäure = 0,33319 Kohle

0,160 - Wasser = 0,05111 Wasserstoff.

100 Theile enthalten demnach:

Kohlenstoff	66,638
Wasserstoff	10,227
Sauerstoff	23,135
	<hr/> 100,000

was beiläufig der Formel  $C_{10}H_{10}O_3$  entsprechen würde.

Von dem zuletzt Uebergegangenen lieferten:

1) 0,330 Grm.:

0,970 Grm. Kohlensäure	0,27044 Kohle
0,305 - Wasser	0,03388 Wasserstoff

folglich in 100 Theilen:

Kohlenstoff	80,940
Wasserstoff	10,270
Sauerstoff	8,790
	<hr/> 100,000

2) 0,350 Grm.:

1,030 Grm. Kohlensäure	0,28480 Kohle
0,310 - Wasser	0,03444 Wasserstoff

in 100 Theilen:

Kohlenstoff	81,372
Wasserstoff	9,842
Sauerstoff	8,786
	<hr/> 100,000

was der Formel  $C_8H_{12}O$  entspricht.

Es ist gewiss, daß durch das Kalium nur ein Theil Holzgeist zersetzt wird, und der unzersetzt gebliebene Theil mit dem zersetzten ein Gemenge bildet. Dafür spricht auch der nicht constante Siedpunkt des Oeles. Um jedoch ein richtiges Urtheil über die Einwirkung des Kaliums auf den Holzgeist fällen zu können, muß auch die gelbe Substanz untersucht werden, welche gleichzeitig entsteht, und welche, zum Theil wenigstens, mit dem gebildeten Kali in Verbindung bleibt. Vor der Hand

suchte ich nur die Frage zu beantworten: ob überhaupt die Erscheinungen, welche eintreten, wenn Kalium mit dem Holzgeist in Berührung kommt, mit denen übereinstimmen, welche beim Weingeist beobachtet werden? welche Frage, nach dem Mitgetheilten, mit Bestimmtheit verneint werden muß.

Verhalten des schwefelsauren und klee-sauren Holzäthers zu wässrigen Alkalien.

Das abweichende Verhalten in der Einwirkung des Kaliums auf Holzgeist und Weingeist veranlaßte mich, einige Untersuchungen von Dumas und Peligot über den Holzgeist zu wiederholen. Vor allen Dingen wollte ich mich überzeugen, ob die Verbindungen des sogenannten Holzäthers mit Säuren bei ihrer Zersetzung durch wässrige Alkalien in der That wieder Holzgeist liefern. Ich habe gefunden, daß die Verbindungen, welche die genannten Chemiker in ihrer Abhandlung über den Holzgeist beschreiben, sehr leicht nach den gegebenen Vorschriften dargestellt werden können, und die Beschreibung der physikalischen Eigenschaften derselben muß wirklich meisterhaft genannt werden.

Zur Prüfung der neuen Theorie über die Natur des Holzgeistes wählte ich den neutralen schwefelsauren Holzäther und den klee-sauren Holzäther, zwei Verbindungen, welche wegen der Leichtigkeit, mit der sie sich zerlegen, besonders dazu geeignet sind.

Aber schon bei der Darstellung der schwefelsauren Verbindung überzeugt man sich, daß die Zersetzung, welche der Holzgeist durch die Schwefelsäure erleidet, ganz und gar verschieden ist von der des Weingeistes. Es ist bekannt, daß eine verhältnißmäßig nur geringe Menge Schwefelsäure nöthig ist, um, bei gehöriger Vorrichtung, eine größere Quantität Weingeist in Aether und Wasser zu verwandeln. Es ist ferner eine bekannte Sache, daß, wenn eine überwiegende Menge Schwefel-

säure mit Weingeist erbitzt wird, eine vollständige Zersetzung des Weingeistes erfolgt, und, ausser schwelliger Säure, noch Kohlensäure, Wasser, ölbildendes Gas, schwefelsaures Weinöl etc. gebildet werden. Diese Substanzen aber stehen zum Weingeist in einem ganz andern Verhältnisse, als der Aether und das Wasser; sie sind nämlich entstanden in Folge einer gänzlichen Zerstörung des Weingeistes.

Um sowohl den reinen als schwefelsauren Holzäther darzustellen, destilliren Dumas und Peligot 1 Theil Holzgeist mit 8 bis 10 Theilen Schwefelsäure. Erbitzt man ein solches Gemenge, so entwickelt sich augenblicklich eine große Menge schwelliger Säure. Gleichzeitig entstehen Kohlensäure, verschiedene brennbare Gase, Wasser, Essigsäure und der schwefelsaure Holzäther. Man gewinnt sogleich die Ueberzeugung, daß bei diesem Processe eine vollständige Zerstörung des Holzgeistes stattfindet, auf ähnliche Weise, als wenn Holz mit Schwefelsäure gekocht wird, und man begreift kaum, wie diese Erscheinungen in eine Parallele mit denen gesetzt werden konnten, welche der Weingeist darbietet, wenn er unter Einfluß der Schwefelsäure in Aether und Wasser zerfällt.

Bringt man den gereinigten, neutralen, schwefelsauren Holzäther mit einer alkalischen Flüssigkeit zusammen, so wird derselbe, und besonders beim Erwärmen, sogleich zersetzt. Bei dieser Zersetzung bildet sich aber kein *Holzäther*, sondern eine eigenthümliche ätherische, angenehm süß schmeckende Flüssigkeit, welche man durch Destillation leicht rein erhalten kann. Dieser Körper weicht aber in allen seinen Eigenschaften so sehr vom Holzgeist ab, daß eine Verwechslung mit demselben gar nicht möglich ist. Eben so wenig, wie durch Behandlung des schwefelsauren Holzäthers mit Kali, konnte durch gleiche Zersetzung der klee-sauren Verbindung Holzgeist gewonnen werden. Ich habe einige Unzen klee-sauren



Holzäther, welcher sich leicht in großer Menge darstellen läßt, mit Kali behandelt, aber keine Spur Holzgeist auffinden können. Diese Verbindungen verhalten sich ungefähr zum Holzgeist, wie das schwefelsaure Weinöl zum Weingeist. Aehnliche Verbindungen lassen sich erhalten durch Erhitzen vieler organischer Verbindungen mit einer überwiegenden Menge Schwefelsäure. Mit gegenwärtiger Abhandlung wollte ich einzig und allein nur den Chemikern einige Mittel angeben, durch welche sie leicht die Dumas'sche Theorie über die Natur des Holzgeistes zu prüfen im Stande sind. Ich lasse daher diesen Gegenstand auf sich beruhen, und um so mehr, weil den Hrn. Dumas und Peligot eine Wiederholung und allenfalsige Berichtigung ihrer Versuche unter allen Chemikern am meisten am Herzen liegen muß, und dies mit Gewißheit von denselben erwartet werden darf.

#### Verhalten des Kaliums zum Aceton.

Nach einer vorläufigen Nachricht von Kane soll auch das Aceton ein wirklicher Weingeist seyn, und sich zu dem gewöhnlichen Alkohol verhalten, wie, nach Dumas, der Holzgeist.

Behandelt man das reine Aceton mit Kalium, so beobachtet man ganz dieselben Erscheinungen, wie beim Holzgeist angegeben wurde. Das Kalium wird augenblicklich oxydirt, unter bedeutender Wärmeentwicklung und ohne Entwicklung einer permanent elastischen Flüssigkeit. Das gebildete Kali verbindet sich mit dem reducirten Aceton zu einer schwach gelb gefärbten syrupsdicken Masse von stark alkalischen Eigenschaften. Durch Behandlung mit Wasser und Destillation mit Kalk erhält man gleichfalls ein schwer flüchtiges Oel, welches leichter ist als Wasser, und den Geruch und Geschmack von Pfeffermünzöl besitzt. Wird dasselbe für sich destillirt, so erhält man anfangs ein dünnflüssiges Destillat, später aber wird es so dickflüssig, daß es kaum aus dem

Retortenbalse theist. Dieser dickflüssige Theil ist ein Kohlenwasserstoff, welcher der Formel  $\text{CH}_4$  entspricht; der dünnflüssige hingegen enthält eine nicht unbedeutende Menge Sauerstoff, und ist ohne Zweifel ein Gemenge von Aceton mit dem bezeichneten Kohlenwasserstoffe. Dieser kann als das Radical des Acetons betrachtet werden, das Aceton selbst als  $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}$ . Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, daß Verbindungen vorkommen, welche dieselben Zersetzungs- und Verbindungs-Verhältnisse darbieten, wie der Weingeist. Eine solche Verbindung ist vielleicht das Aldehyd. Seine Zusammensetzung und seine Bildung entspricht nämlich ganz der Formel  $(\text{C}_2\text{H}_6)\text{O} + \text{H}_2\text{O}$ . Man kann sich sogar vorstellen, das Aceton und der Holzgeist seyen wirkliche Aetherarten solcher eigenthümlicher Weingeiste, von denen der des Aceton z. B. aus  $(\text{C}_2\text{H}_6)\text{O} + \text{H}_2\text{O}$  zusammengesetzt wäre.

Nach dem Verhalten des Acetons und Holzgeistes zum Kalium müssen diese Verbindungen als Oxyde angesehen werden. Nach dieser Hypothese würde sodann auch der Aether ein Oxyd seyn. Daß der Aether durch Kalium nicht zerlegt wird, steht dieser Hypothese nicht entgegen, weil angenommen werden kann, der Kohlenwasserstoff des Aethers bilde mit Kali keine Verbindung, während der des Acetons eine solche eingeht. Diese Hypothese hat vielleicht mehr für sich, als die, nach welcher das Aceton als ein Weingeist betrachtet wird. So lange aber kein dem Aceton (als Aether gedacht) entsprechender Weingeist bekannt ist, besitzt dieselbe keinen Werth.

#### Ueber das Valeron.

Valeron nenne ich eine ätherische Flüssigkeit, welche man erhält, wenn reine Baldriansäure mit einem Ueberschuß von Kalk einer trocknen Destillation unterworfen wird. Die Baldriansäure zersetzt sich bei vor-

sichtigem Erhitzen in Kohlensäure, welche mit dem Kalk verbunden bleibt, und in Valeron. Durch Rectification über gebrannten Kalk, erhält man dasselbe vollkommen rein. Das Valeron stellt eine farblose, sehr dünnflüssige Flüssigkeit dar, von angenehmem ätherischen Geruch, welcher etwas an Baldriansäure erinnert. Der Geschmack ist kühlend ätherisch. Es siedet im Wasserbade weit unter dem Siedpunkte des Wassers. Das Valeron ist leichter als Wasser, und in demselben unlöslich; dagegen mischt es sich mit Weingeist und Aether. Es ist vollkommen neutral und verbrennt mit einer stark rufenden Flamme:

0,455 Grm. Valeron lieferte:

1,250 Grm. Kohlensäure	0,34563 Kohle
0,510 - Wasser	0,05666 Wasserstoff

100 Theile enthalten demnach:

Kohlenstoff	75,75
Wasserstoff	12,15
Sauerstoff	11,90
	<hr/> 100,00.

0,450 Grm. Valeron lieferten:

1,220 Grm. Kohlensäure	0,33734 Kohle
0,500 - Wasser	0,0555 Wasserstoff

100 Theile demnach:

Kohlenstoff	74,96
Wasserstoff	12,35
Sauerstoff	12,69
	<hr/> 100,00.

Diese Resultate entsprechen folgenden Atom-Verhältnissen:

9 Atome Kohlenstoff	55,08	76,41
18 - Wasserstoff	9,02	12,48
1 - Sauerstoff	8,00	11,11
1 Atom Valeron	<hr/> 72,08	<hr/> 100,00.

Rechnet man nun zu  $C_6H_{10}O$  1 Atom Kohlensäure, so erhält man  $C_{10}H_{10}O_3$ , welches der Formel von 1 Atom wasserfreier Baldriansäure entspricht. Das Valeron entsteht demnach aus der Baldriansäure, wie das Aceton aus der Essigsäure.

#### Verhalten des Kaliums zum Valeron.

Behandelt man Valeron mit Kalium, so zeigen sich wieder dieselben Erscheinungen, wie beim Aceton. Nur ist die Einwirkung minder heftig. Die blortige Flüssigkeit, welche man durch Reduction des Valerons erhält, kommt in ihren Eigenschaften vollkommen mit dem reducirten Aceton überein. Man kann daher Aceton und Valeron als verschiedene Oxyde desselben Radicals betrachten.

Bezeichnet man nämlich Valeron mit  $(C_6H_{10})+O$   
so ist das Aceton  $(C_3H_6)+O,$

Das gleiche Verhalten des Holzgeistes, Acetons und Valerons zum Kalium, und die gleiche Entstehung des Acetons und Valerons aus Essigsäure und Baldriansäure giebt zu der Vermuthung Veranlassung, daß auch der Holzgeist seine Entstehung einer organischen Säure verdanke, welche zum Holzgeist sich verhält, wie die Essigsäure zum Aceton.

Wir kennen bis jetzt eine große Reihe organischer Säuren, welche 3 Atome Sauerstoff enthalten. Bei der trocknen Destillation mit Aetzkalk zersetzen sich dieselben, nach den vorliegenden Erfahrungen, in Kohlensäure, welche mit dem Kalk verbunden bleibt, und in einen flüchtigen, meistens flüssigen Körper; dieser ist entweder sauerstofffrei oder sauerstoffhaltig. Im ersteren Fall wird, wie zum Beispiel bei der Benzoësäure, zugleich noch 1 Atom Wasser zerlegt, was im letzteren, wie bei der Essigsäure, nicht der Fall ist. Zu den Säuren, welche einen sauerstoffhaltigen Körper liefern, gehört auch die Buttersäure. Der letztere hat viele Aehnlichkeit mit

dem Valeron. Dagegen liefern einige Fettsäuren ein sauerstofffreies Destillat, so namentlich Stearinsäure und Oelsäure. Zwar enthalten das Stearon und Oleon, nach den Untersuchungen Bussy's, ebenfalls Sauerstoff. Nach den Untersuchungen aber, welche Hr. Morin aus Genf in meinem Laboratorium vorgenommen hat, sind diese Verbindungen sauerstofffrei, und bestehen aus  $\text{C}_2\text{H}_2$ . Diese Verschiedenheit in der Zersetzung dieser Säure steht sicher mit der eigenthümlichen Zusammensetzung derselben im Zusammenhang. Es wäre überhaupt zu wünschen, daß ganze Reihen von organischen Verbindungen, welche in gewissen Beziehungen mit einander übereinkommen, durch ein und dasselbe Reagenz zersetzt, und die Zersetzungsproducte von einem etwas allgemeinen Standpunkte aus betrachtet würden; so z. B. alle organische Säuren, welche 3 Atome Sauerstoff enthalten, durch Kalk zerlegt, und allein nur beobachtet würden, welche sauerstofffrei und welche sauerstoffhaltige Verbindungen liefern. Durch solche Untersuchungen würde oft der Wissenschaft ein größser Gewinn erwachsen, als durch die genaueste Untersuchung einer einzeln stehenden Beobachtung. Diese Ideen haben mich bei gegenwärtiger Arbeit geleitet, was ich bei Beurtheilung derselben zu berücksichtigen bitte. Daß die mitgetheilten Beobachtungen reichlichen Stoff zu ferneren Untersuchungen darbieten, glaube ich nicht versichern zu dürfen.]

#### V. Ueber das wasserfreie schweflichtsaure Ammoniak; von Heinrich Rose.

Bei den Versuchen, die ich vor einiger Zeit mit dem wasserfreien schweflichtsauren Ammoniak anstellte, liefs ich beide Gasarten, das Ammoniak- und das Schweflichtsäure-Gas, im gut getrockneten Zustande, in ein gut ge-

trocknetes, geräumiges Gefäß treten, welches erkaltet wurde, und in welchem die Vereinigung stattfand. Ich sorgte dafür, daß stets Ammoniakgas in einem großen Ueberschuß vorhanden war, was durch den Geruch erkannt wurde, den das überschüssig ausströmende Gas zeigte. Ich verschloß das Gefäß, nachdem sich eine hinreichende, nicht zu große Menge des gelben schweflichtsauren Ammoniaks gebildet hatte, und ich befürchtete, daß die Gasarten nicht mehr von der größten Trockenheit entwickelt wurden. Dieser Vorsicht wegen bereitete ich nie eine bedeutende Quantität der Substanz bei einer Operation.

Ich habe schon früher bemerkt, daß sich hierbei nur ein gelblicher Körper bildet, den ich früher, wenn auch nicht krystallisirt, doch krystallinisch erhielt. Wenn keine Feuchtigkeit zugegen ist, erzeugt sich nichts von einer weißen Substanz, wohl aber verwandelt sich die gelbe Substanz sehr leicht in eine weiße, wenn der Zutritt der Luft nicht ganz vollkommen abgehalten wird.

Durch spätere Versuche überzeuete ich mich, daß die gelbe Substanz wirklich in kleinen Krystallen erhalten werden kann, wenn beide Gasarten über Quecksilber verbunden werden, und eine der beiden im Ueberschuß vorhanden ist. Die Form dieser Krystalle zu bestimmen, ist nicht gut möglich, da sie nur durch Glas beobachtet werden können.

Ich hatte früher keine quantitative Untersuchung des erhaltenen Salzes angestellt, sie für überflüssig haltend, da ich von der Meinung ausging, daß 2 Volume des Ammoniaks mit 1 Vol. der flüchtigen Säure sich verbinden müßten.

Bei einigen oberflächlichen Untersuchungen überzeuete ich mich indessen, daß immer Ammoniakgas weniger als in dem angeführten Verhältnisse absorbiert würde, *wenn auch beide Gase lange mit einander in Berührung waren, und als ich Ammoniakgas zu einem großen Ueberschuß*



schuß von schweflichtsaurem Gase treten liefs, fand ich durch mehrere Versuche, daß beide Gase sich zu gleichen Volumen verbinden könnten \*).

Ich überzeugte mich ferner, daß ein solches erhaltenes wasserfreies saures schweflichtsaures Ammoniak sich in seinen Eigenschaften und in seinem Verhalten gegen Reagentien gar nicht von dem unterscheidet, bei dessen Bereitung ein Uebermaafs von Ammoniakgas angewandt wurde, und daß in beiden die schweflichte Säure langsamer durch die Länge der Zeit, schneller aber durch Einwirkung gewisser Reagentien in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zerfällt.

Es schien mir deshalb zu wahrscheinlich, daß, wegen der Aehnlichkeit hinsichtlich des äusseren Aussehens und hinsichtlich der Eigenschaften, beide Verbindungen von derselben Zusammensetzung seyn müssen. Ich stellte deshalb Versuche darüber an, die ich früher anzustellen unterlassen hatte.

Ich fand, daß in der That beide Gase sich nur nach gleichen Volumen verbinden, wenn auch Ammoniakgas im Uebermaafs vorhanden ist. Das Nähere der Versuche, bei denen stets ein sehr bedeutendes Volum von Ammoniakgas mit sehr geringen Volumen von schweflichtsaurem Gase zusammengebracht und immer lange Zeit in Berührung gelassen wurden, ist Folgendes:

I.	43,75 Vol. schweflichts Gas verband. sich mit 46,5 Vol. Ammoniakg.
II.	28,75 - - - - - 26,9 - - -
III.	30 - - - - - 29,5 - - -

Es ergibt sich aus diesen und aus früher bekannt gemachten Versuchen, daß sich unter allen Umständen schweflichtsaures und Ammoniakgas nur zu gleichen Volumen verbinden, und daß das wasserfreie schweflichtsaure Ammoniak nur im sauren Zustande dargestellt werden könne \*).


1) Poggendorff's Annalen, Bd. XXXIII S. 236.

2) Wenn zwei Gasarten, die sich mit großer Schnelligkeit zu ein-  
Poggendorff's Annal. Bd. XXXIII.

Die nächste Veranlassung zur Bekanntmachung dieser Bemerkungen ist ein in den *Comptes rendus* der Pariser Academie (zweites Semester 1837, No. 10 S. 393) abgedrucktes Schreiben des Hrn. Forchhammer in Kopenhagen, in welchem er zu beweisen sucht, daß bei der Verbindung vom trocknen Ammoniak- und schweflichtsaurem Gase sich wasserhaltiges schwefelsaures Ammoniak und ein Schwefelamid bilde. Er bemerkt, daß beide sich unabhängig von einander, das eine von weißer, das andere von orangengelber Farbe, absetzen, und sucht seine Ansicht durch eine quantitative Bestimmung des Schwefelsäuregehaltes zu bekräftigen, indem er aus einer gewogenen Menge der Substanz, nach Auflösung in Wasser und Behandlung mit Chlorbaryumauflösung, die Hälfte der schwefelsauren Baryterde erhielt, als die betrug, welche durch Chlorbaryumauflösung gefüllt wurde, nachdem eine andere gewogene Menge des Körpers mit Chlor behandelt worden war. (Die Mengen der Schwefelsäure verhielten sich wie 8,84 : 18,20.) Hr. Forchhammer fand ferner die Auflösung der Substanz immer alkalisch. Nach ihm bilden sich aus 2 Atomen des schwef-

neten festen Körper verbinden, über Quecksilber mit einander vermischt werden, so steigt das Quecksilber in der Röhre, in welcher die Mischung geschieht, so rasch, daß viele Gasblasen an den Wänden der Röhre haften bleiben, die nur mit Schwierigkeit und nie vollständig davon getrennt werden können. Dies ist die Ursache, daß wenn ein kleines gemessenes Volum der einen Gasart zu einem gemessenen großen der anderen Gasart gemischt wird, der Rückstand fast immer ein geringeres Volum hat, als er eigentlich haben sollte. Deshalb ist bei zweien der oben angeführten Versuche das Volumen des absorbirten Ammoniakgases gegen das des schweflichtsauren Gases scheinbar etwas geringer ausgefallen. Aber aus derselben Ursache hat bei meinen früheren Versuchen, wo umgekehrt kleine gemessene Mengen von Ammoniakgas zu einem großen Volumen von schweflichtsaurem Gase gesetzt wurden, sich das Volumen des absorbirten schweflichtsauren Gases geringer als das des absorbirten Ammoniakgases gezeigt.

lichtsauren Ammoniake 1 Atom wasserhaltiges schwefelsaures Ammoniak (schwefelsaures Ammoniumoxyd) und 1 Atom Schwefelamid, nämlich:



Ich habe schon oben angeführt, daß, wenn ich große Vorsicht beobachtete und alle Feuchtigkeit vermied, ich durch Vereinigung des Ammoniak- und des schweflichtsauren Gases nur einen gelben krystallinischen, nicht gleichzeitig einen weißen Körper erhalten konnte. Man kann dies besser wahrnehmen, wenn man beide trockne Gase über Quecksilber, und nicht in einem Ballon zusammenzutreten läßt. Der krystallinische Zustand deutet auf einen Körper nach bestimmter Zusammensetzung. Nun ist zwar in vielen Fällen erlaubt, sich, wenn ein zusammengesetzter Körper durch Einfluß von Reagentien in gewisse Bestandtheile zerfällt, ihn sich aus diesen zusammengesetzt vorzustellen, und so könnte man sich in dem wasserfreien schweflichtsauren Ammoniak ein Schwefelamid denken, das bei seiner Auflösung in Wasser basisch unterschweflichtsaures Ammoniak bilden würde. Da indessen das wasserfreie schweflichtsaure Ammoniak eine saure Verbindung ist, so müßte man sie sich aus einem Schwefelamid und Schwefelsäurehydrat zusammengesetzt vorstellen, denn  $\text{NH}^3 + 2\text{S} = \text{SH} + \text{NH}^2\text{S}$ , eine Verbindung, die bei ihrer Auflösung in Wasser nicht alkalisch reagiren kann, wie ich dies auch nicht fand; es müßte denn seyn, daß das Gefäß, in welchem der Körper sich gebildet hatte, und in welchem er in Wasser aufgelöst wurde, mit sehr vielen freiem Ammoniakgas angefüllt war. Ich habe in meiner früheren Abhandlung angeführt, daß die Auflösung der Substanz, wenn zu derselben ein Uebermaas von Ammoniakgas angewandt wurde, wo also das Gefäß damit noch angefüllt war, frisch bereitet zwar das Lackmuspapier nicht röthet; daß

dies indessen der Fall sey, wenn sie einige Zeit in verschlossenen Gefäßen aufbewahrt worden ist.

Ich habe in meiner früheren Abhandlung absichtlich nicht die Gegenwart eines Schwefelamids im wasserfreien schweflichtsauren Ammoniak angenommen. Mich bewogen dazu mehrere Gründe. Ein Schwefelamid  $\text{NH}^2\text{S}$  würde durch Aufnahme von Wasser basisch unterschweflichtsaures Ammoniak bilden. Bis jetzt indessen kennen wir keine basische, sondern nur neutrale unterschweflichtsaure Salze, und dann entsprechen die bekannten Amide, wie das Oxamid und das Benzamid, nur neutralen Ammoniaksalzen. Weit mehr indessen als diese Ansicht, auf welche man vielleicht nur wenig Gewicht zu legen braucht, bestimmte mich der Umstand, daß man die schweflichte Säure aus dem wasserfreien schweflichtsauren Ammoniak auf Kali übertragen könne, und daß sie in der Verbindung mit Kali unter gewissen Umständen noch die von gewöhnlicher schweflichter Säure verschiedene Eigenschaft, durch gewisse Reagentien in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zu zerfallen, beibehalten könne.

Ich halte die Entdeckung der Amide für eine der wichtigsten, wodurch in neuerer Zeit die Chemie bereichert worden ist. Aber gerade deshalb ist es ratsam, streng nur das für ein Amid zu erklären, was ohne Zweifel und Anfechtung dafür erkannt werden kann. Nichts schadet der Verbreitung einer folgereichen Entdeckung mehr, als eine zu voreilige Anwendung derselben.

Ich nahm daher an und beharre dabei, daß die schweflichte Säure im wasserfreien Salze eine isomerische Modification der gewöhnlichen schweflichten Säure sey, und daß es nicht das ganze Salz ist, dessen Auflösung mit der des wasserhaltigen sauren schweflichtsauren Ammoniaks als isomerisch zu betrachten sey. Ich zeigte, daß wenn die schweflichte Säure im wasserfreien Salze in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure

zerfällt, in beiden Säuren gleich viel Schwefel enthalten seyn müsse, was auch Hr. Forchhammer durch den oben angeführten Versuch bestätigt hat.

Dals die schweflichte Säure im wasserfreien Salze durch Einwirkung von Chlorbaryum sogleich in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zerfällt, und daher sogleich die ganze Menge der schwefelsauren Baryterde, die durch erstere gebildet werden kann, sich ausscheidet, während das wasserfreie Salz in seiner Auflösung längere Zeit sich in seiner isomerischen Modification erhält, erfolgt durch die prädisponirende Verwandtschaft der Baryterde zu der sich ausscheidenden oder bildenden Schwefelsäure. Aus demselben Grunde zeigt die Auflösung des salpetersauren Silberoxyds und anderer Metalloxydsalze, welche in der frisch bereiteten Auflösung des wasserfreien Salzes Schwefelmetalle abscheiden, etwas ganz Aehnliches, während andere Reagentien erst in einer längere Zeit aufbewahrten Auflösung die Umwandlung der schweflichten Säure in Schwefelsäure und unterschweflichte Säure anzeigen. Uebrigens erhielt Herr Forchhammer durch Chlorbaryum nicht genau die Hälfte des Schwefels der Verbindung in der schwefelsauren Baryterde, sondern etwas weniger, eben so wie ich bei der Untersuchung das aus einer frisch bereiteten Auflösung des wasserfreien Salzes durch salpetersaure Silberoxydauflösung ausgeschiedene Schwefelsilber reicher an Silber fand, als das gewöhnliche Schwefelsilber, weil gewiss noch nicht die ganze Menge der schweflichten Säure sich vollständig in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure verwandelt, und ein Theil derselben, wie gewöhnliche schweflichte Säure, metallisches Silber aus dem Silbersalze ausgeschieden hatte, das, mit dem Schwefelsilber gemengt, gefällt wurde.

Was diese meine Ansicht von der Natur des wasserfreien schweflichtsauren Ammoniaks mir ferner noch wahrscheinlich macht, ist der Umstand, dals es mit ge-

glückt ist, eine der schweflichten Säure entsprechende Chlorstufe des Schwefels,  $S + Cl^2$ , aufzufinden, welche mit einigen Chlormetallen krystallisirbare Verbindungen bilden kann, in welchen, durch Behandlung mit Wasser, dieses Schwefelchlorid, wie die schweflichte Säure im wasserfreien schwelichtsauen Ammoniak, in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zerfällt. In einem der nächsten Hefte dieser Annalen werde ich ausführlicher darüber handeln.

VI. *Einige Untersuchungen über die Farbe, welche das Laub verschiedener Baumgattungen im Herbste vor dem Abfallen annimmt;*

von J. Berzelius.

(Mitgetheilt vom Verfasser aus den *K. V. Academiens Handlingar* f. 1837.)

Es ist ganz gewöhnlich, daß im Herbst, nach einfallendem Frost, das Laub verschiedener Baumarten gelb wird und eine reine citrongelbe Farbe annimmt. Unsere Birken sind dadurch vor den meisten Waldbäumen ausgezeichnet; allein auch die Ulmen, Espen, Linden, Ahorne, Birn- und Apfelbäume erleiden dieselbe Veränderung. Das Blatt der Eiche dagegen wird nicht gelb, sondern braun. Bei dem frühzeitigen starken Frost, welcher im verwichenen Herbst eintrat, war diese Farbenveränderung stärker als ich sie sonst gesehen habe. Indefs fand ich sie nicht bei der Erle und Zwergbirke (*Betula Alnus* und *incana*). Bei verschiedenen anderen Bäumen und Sträuchern, z. B. beim Vogelbeerbaum, Kirschbaum, *Cornus sanguinea*, Berberitzenstrauch, Stachelbeerstrauch u. a. m., wird dabei das Laub theils ganz roth und oft sehr schön gefärbt, theils gelb gemischt mit roth. Schon verschiedene



Chemiker haben hierüber Versuche angestellt, aber Resultate daraus gezogen, die von einander abweichen; dießs veranlaßte mich, dem Gegenstande meine Aufmerksamkeit zu widmen.

Die ausführlichsten Versuche hierüber sind von Macaire-Prinsep angestellt (*Ann. de chim. et de phys. T. XXXVIII p. 415*)<sup>1)</sup>. Er leitet die grüne, gelbe und rothe Farbe der Blätter von einem einzigen Farbstoffe ab, der, seiner Meinung nach, durch Einwirkung von Reagentien aus einer Farbenstufe in die andere umgewandelt werden kann, und der demgemäß *Chromule* von ihm genannt wird. Schon Leopold Gmelin (dessen Handbuch, Bd. II S. 633) hat gezeigt, daß es ihm nicht geglückt sey, das Blattgrün auf die von Macaire angegebene Weise durch Säuren in Gelb zu verwandeln, und das Blattgelb durch Alkalien wieder auf Grün zurückzuführen.

Auch meine Versuche zeigen, daß Macaire's Resultate unrichtig sind, daß das Blattgrün, welches mit schön grüner Farbe in concentrirter Salzsäure löslich ist, sich nicht auf einem bekannten künstlichen Weg in Blattgelb umwandeln läßt; daß letzteres nicht in Blattgrün zurückgeführt werden kann, und daß das Blattroth, obwohl es mit Alkalien ein Grün giebt, etwas ganz anderes ist als eine veränderte Art von Blattgrün.

#### Blattgelb (*Xanthophyll*).

Unter Blattgelb verstehe ich den gelben Stoff, von dem das Herbstlaub seine gelbe Farbe hat. Um es zu erhalten, bediente ich mich eines rein gelben Laubes von *Pyrus communis*, aus dem Grunde, weil es bei diesem Baume ein reineres Gelb als bei anderen besitzt und noch bis zu den Blattstielen gelb ist. Als ich fand, daß die Farbe des Laubes während des Trocknens braun wurde, wandte ich frisch abgepflücktes an. Dießs wurde in ein Glasgefäß gebracht und mit Alkohol von 0,633

<sup>1)</sup> *Annalen*, Bd. XIV S. 516.

spec. Gew. übergossen, so daß es ganz davon bedeckt ward, und, nach dem Verschluss des Gefäßes, nur sehr wenig Luft zurückblieb. Auf diese Weise wurde es drei Tage an einer mäßig warmen Stelle stehen gelassen. Der Alkohol hatte sich weit dunkler gefärbt als das Laub, welches jetzt bleich war. Die alkoholische Lösung wurde abgegossen und das Gefäß eine Weile umgestülpt, um den Alkohol abträufeln zu lassen. Während des wurde das Laub in der Flasche braun, ganz wie wenn es an der Luft getrocknet wird. Daß dies eine Einwirkung der Luft war, die nach der Einwirkung des Alkohols die Oberhaut des Laubes durchdrang, erhellt daraus, daß diejenigen Blätter, welche plattgedrückt an der Innenseite des Glases saßen und nicht von der Luft getroffen wurden, an dieser Seite ihre Farbe behielten. Es wurde frischer Alkohol aufgegossen; dieser zog mehr Blattgelb aus, wirkte aber nicht auf die braune Farbe. Nach 48 Stunden wieder abgegossen, war er etwas blässer gelb. Der Alkohol wurde nun zu vier Fünfteln abdestillirt und langsam erkalten gelassen; dabei setzte sich ein gelber körniger Stoff zu Boden. Dieser wurde auf ein Filtrum gebracht und die abfiltrirte, noch gelbe Flüssigkeit abdestillirt, bis nur das Wasser übrig blieb, welches der Alkohol aus den Blättern gezogen hatte. Die zurückbleibende Flüssigkeit bedeckte sich mit einer farblosen gallertigen Masse, welche abgeschieden wurde. Die Flüssigkeit war braun und enthielt Extractivstoff, worin sich bald ein dunkelbrauner Absatz bildete, während die eigenthümliche Farbe der Flüssigkeit dunkler wurde.

Sowohl der körnige gelbe Stoff, welcher sich zuerst absetzt, als auch der, welcher sich späterhin auf der Oberfläche der Flüssigkeit ausscheidet, macht den größten Theil des Blattgelbs aus, verunreinigt mit möglichst wenig Harz und Fett. Diese sind schwer vollkommen abzuschneiden. Sowohl die gelbe körnige, als auch die zusammengeschmolzene Masse hatte die Consistenz

von Butter und liefs sich mit dem Finger ausstreichen. Eine schwache Aetzkalkilauge, mit der sie in gelinder Wärme behandelt wurde, zog etwas Fett in Gestalt von fetten Säuren nebst etwas Blattgelb aus. Diese wurde durch Säuren gefällt. Schwaches Aetzammoniak zog die fetten Säuren aus, welche sich farblos fällen liefsen. Eine Lösung des gelben Stoffes in Alkohol wurde mit einer Lösung von essigsaurem Bleioxyd in Alkohol vermischt; dabei entstand erst ein weifser, aber sodann ein bräunlicher Niederschlag; das Gelb blieb ungefällt. Dieser Niederschlag war ganz gering und zeigte einige fremde Einmengungen von Pflanzensäuren, Harz oder Extractivstoff. Die Lösung wurde vom Blei durch etwas Salzsäure befreit, mit etwas Wasser versetzt und der Alkohol abdestillirt; dabei schied sich auf der zurückbleibenden, schwach weingeistigen Flüssigkeit das Blattgelb aus.

So gereinigt, hat das Blattgelb folgende Eigenschaften: Es ist ein dunkelgelbes Fett von schmieriger Consistenz, schmilzt zwischen  $40^{\circ}$  und  $50^{\circ}$  C., und wird beim Erkalten durchsichtig. Bei trockner Destillation giebt es ein bräunliches, starres Fett und hinterläfs Kohle. Es löst sich nicht in Wasser, aber das geschmolzene durchsichtige wird im Wasser undurchsichtig, blafs gelb, und scheint darin aufzuschwellen, wie wenn es sich mit Wasser vereinigte. Es löst sich mit rein gelber Farbe, aber nicht besonders reichlich, in Alkohol. Vom Wasser wird diese Lösung in Form einer gelben Milch gefällt, welche, sobald es nicht frei ist von Harz oder Fett, nicht klar wird, sondern eine gelbe Emulsion bleibt, auch wenn der Alkohol in der Wärme verdunstet ist. In diesem Zustande blafst es leicht aus und wird farblos, wenn es einige Zeit vom Sonnenlicht getroffen wird. Ist das angewandte Blattgelb aus einem noch Blattgrün enthaltenden Laub bereitet, so hat es einen Stich in's Grüne, sonst ist es schneeweifs. Vom Aether wird das Blattgelb in allen Verhältnissen gelöst. Von concentrirter Schwefelsäure wird das Blattgelb augenblicklich braun.

die Säure löst wenig davon. Von ätzendem Kali wird das Blattgelb in geringer Menge gelöst. Die Lösung ist gelb und wird leicht vom Licht gebleicht. Durch Säuren wird das Blattgelb wieder mit gelber Farbe gefällt, und zeigt in diesem Zustande keine Eigenschaften einer fetten Säure. Ätzendes Ammoniak löst weniger davon auf als ätzendes Kali. Kohlensäure Alkalien lösen es nicht in der Kälte, färben sich aber etwas dadurch beim Kochen.

Aus diesen Versuchen könnte man schließen, das Blattgelb sey ein Mittelding zwischen Harz und fettem Oel, dem letzteren ähnlicher als dem Harz; indess unterscheidet es sich von den fetten Oelen durch sein Unvermögen zur Seifenbildung.

Da das Blattgrün verschwindet, in dem Maasse als das Blatt gelb wird, so dürfte es klar seyn, daß der gelbe Farbstoff sich auf Kosten des grünen bildet, durch einen veränderten organischen Proceß in dem vom Frost angegriffenen Laub. Worin diese Veränderung bestehe, kann noch nicht vermuthet werden. Es ist nicht gelungen, wie Macaire angiebt, durch längere Einwirkung von Alkali, aus Blattgelb wieder Blattgrün herzustellen.

Es bleibt nun noch übrig Einiges zu sagen über die braune Farbe des Laubes und einen fetten Stoff von eigener Natur, welchen ich im Birnlaub gefunden habe, und welcher möglicherweise nicht im Laube aller Bäume enthalten ist. Das mit kaltem Alkohol ausgezogene braune Laub wurde mit Alkohol gekocht. Die Flüssigkeit, welche einen Stich in's Gelbe hatte, wurde kochendheiß durch Leinwand filtrirt. Beim Erkalten setzte sich eine Menge gelatindöser Klumpen ab, welche auf ein leinernes Filtrum gebracht und mit kaltem Alkohol gewaschen wurden, bis alle gelbe Mutterlauge durchgegangen war, was sehr langsam ging. Nach dem Trocknen glich die Masse der Kreide, war aber sanft anzufühlen wie Talkerde. *Dieser Stoff gehört offenbar zu derselben Klasse von*

Körpern, wie das Blattgelb. Es ist ein nicht verseifbares, starres, farbloses Fett, welches bei etwa 73° C. schmilzt, und, bei Abhaltung der Luft, sich unverändert überdestilliren läßt. Es brennt mit leuchtender Flamme. Es löst sich gar nicht in Wasser, erfordert bei 15° C. 425 Th. kalten Alkohols von 0,833 zur Lösung, löst sich aber weit reichlicher in kochendem, so daß die Lösung beim Erkalten geseht, wie gekochte Stärke. In kaltem Aether ist er auch sehr wenig löslich, doch weit mehr als in Alkohol. Von ätzendem Kali wird er nicht gelöst.

Die alkoholische Lösung, aus der sich dieser fette Stoff abgesetzt hat, hinterläßt bei Destillation ein Gemenge von demselben Fett mit Blattgelb, welches durch kalten Alkohol daraus ausgezogen werden kann. Es ist klar, daß etwas von diesem starren Fette dem Blattgelb in der Lösung gefolgt seyn, und also das Blattgelb, von dem ich in dem Vorhergehenden sprach, damit unreinigt seyn muß.

Die braune Farbe des Blattes wird nicht durch Kochen mit Alkohol vermindert, und darin fand sich nichts von dem braunen Farbstoff ausgezogen. Nun versuchte ich, sie mit einer verdünnten Lauge von ätzendem Kali auszu ziehen. Diese farbte sich tief braun und enthielt viel Extract-Absatz aufgelöst; aber die braune Farbe des Laubes blieb dieselbe, und konnte nicht durch frische Kalilauge geschwächt werden. Hieraus scheint es, als erlitte der Holzstoff im Laube einen wahren Färbungsproceß auf Kosten des Extractivstoffs, wenn dieser von der Luft getroffen wird, und Gelegenheit erhält, Absatz zu bilden, welcher sich dann mit dem Holzstoff verbindet, ungefähr auf dieselbe Weise, wie ein Stück Zeug, das in eine Lösung von reducirtem Indig eingetaucht worden, sich blau färbt in dem Augenblick, als darin auf Kosten der Luft Indigblau gebildet wird. Vergebens suchte ich durch Schwefelwasserstoffgas, welches das ausgezogene

braune Laub ein Paar Monate lang umgab, die braune Farbe zu reduciren.

#### Blattroth.

Alle Bäume und Sträucher, auf welchen ich rothes Laub gefunden habe, sind solche, die rothe Früchte tragen. Ich kann jedoch nicht die Möglichkeit bestreiten, daß es auch andere gebe. Zu dieser Bemerkung wurde ich dadurch geleitet, daß bei neben einander stehenden Hecken von Stachelbeeren, von denen die einen dunkelrothe und die andere grüne Beeren tragen, nach einem und demselben Nachtfroste, das Laub der ersteren schön dunkelroth, das der letzteren aber blaß citronengelb geworden war. Hienach schien es mir der Untersuchung werth, ob nicht die rothe Blattfarbe einerley sey mit dem Beerenroth. Unglücklicherweise konnte ich diesen Vergleich der Farben nicht bei der rothen Stachelbeere machen, da deren Zeit schon vorüber war, sondern ich mußte dazu den Farbstoff aus dem aufbewahrten Saft von schwarzen Johannisbeeren (*Ribes nigrum*) und Kirschen wählen. Dabei muß ich indess besonders bemerken, daß das Laub der schwarzen Johannisbeere sich nicht röthet.

Ich sammelte rothe Johannisbeerblätter, und las zum Versuche solche aus, die sichtbar kein Grün mehr zeigten, sondern bis zu den Blattstielen und auf der Unterseite, welche ihre Farbe zuletzt verändert, tief dunkelroth waren. Diese wurden zuerst mit Alkohol von 0,833 behandelt. Die Flüssigkeit war rothgelb. Gemischt mit etwas Wasser, und abdestillirt, bis nur Wasser zurückgeblieben war, schied sich ein Gemenge von Blattgrün, Harz, Blattgelb u. s. w. aus, und die Lösung war tief roth, jedoch mit einem Stich in's Braune. Diese wurde filtrirt und tropfenweis mit einer Lösung von essigsauerm Bleioxyd vermischt. Jeder einfallende Tropfen gab *sogleich einen schön grasgrünen Niederschlag*, welcher



nach dem Umschütteln schmutzig graubraun wurde. Ich fuhr mit dem Zusatz von Bleilösung fort, bis die grüne Farbe des Niederschlags sich nicht mehr änderte. Hierbei bildete sich eine Bleiverbindung des Farbstoffs, welche durch andere in der Lösung befindliche Stoffe, nämlich Pflanzensäuren, Extractivstoff, dessen Absatz u. s. w. sogleich wieder zersetzt wurde; nachdem diese, zugleich mit etwas Farbstoff, abgeschieden worden, wurde die Flüssigkeit filtrirt und der Farbstoff ausgefällt. Als das Bleisalz keinen Niederschlag mehr gab, hatte die Flüssigkeit ihre Farbe noch nicht ganz verloren, sondern war grün. Sie wurde filtrirt und das Durchgegangene mit Bleiessig versetzt, welcher jedoch nichts fällte; allein nach Eindunstung bis zur Hälfte entstand ein gelblichgrüner Niederschlag und die Flüssigkeit war gelb. Diese beiden Niederschläge wurden, jeder für sich, wohl ausgewaschen, darauf mit Wasser angerührt und durch Schwefelwasserstoff zersetzt. Beide gaben schön rothe Lösungen, welche, nach Eindunstung bei gelinder Wärme, einen schön dunkelrothen, glänzenden, durchsichtigen Rückstand lieferten. Dieser Rückstand hinterließ bei Auflösung sowohl in Wasser als in wasserfreiem Alkohol einen rothbraunen, pulverförmigen Stoff, der sich auf Kosten des Farbstoffs an der Luft gebildet hatte. Als die Lösung wieder über Schwefelsäure im luftleeren Raum abgedunstet wurde, entstand nur eine Spur dieses pulverförmigen Stoffs.

Einige Versuche mit Kirschlaub gaben denselben Farbstoff, aber in geringer Menge und zum Theil schon im Blatte verwandelt in diesen rothbraunen Absatz.

Das Blattroth hat folglich keinen Charakter von Blattgrün oder Blattgelb. Es ist ein extractartiger, in Wasser und Alkohol leicht löslicher, in Aether unlöslicher rother Farbstoff, welcher, wie die Extracte, an der Luft zersetzt wird und seinen Absatz giebt; aber dieser Absatz ist etwas löslich in Wasser und hat eine nicht un-

angenehm braunrothe Farbe. Die große Leichtigkeit, mit der sich dieser Farbstoff an der Luft zersetzt, hinderte mich an einer genaueren Untersuchung seiner Eigenschaften und seiner Zusammensetzung. Er ist elektronegativ und verbindet sich mit Alkalien und Salzbasen. Seine Verbindungen haben eine schöne grasgrüne Farbe. Dadurch scheint Macaire's Irrthum in Betreff dieses Stoffs erklärlich; denn wenn man ein roth gewordenes Blatt in eine alkalische Flüssigkeit taucht, so wird es wieder grün, aber nicht von wieder hergestelltem Blattgrün, sondern dadurch, daß das Blattroth mit dem Alkali eine grüne Verbindung giebt, welche das Wasser endlich auszieht. Wenn man ein so wieder grün gemachtes Blatt in eine verdünnte Säure taucht, so wird es abermals roth, aber gewöhnlich von einem andern Farbenton; dagegen wird ein vom Blattgrün gefärbtes Blatt niemals roth durch Säuren.

Es ist eine allgemeine Meinung, daß die rothe Farbe der Blätter, Blumen und Beeren eigentlich blau und nur durch Einwirkung einer Säure roth geworden sey: eine Meinung, zu der man wohl dadurch geführt worden ist, daß die meisten blauen Pflanzenfarben durch Säuren roth und durch Alkalien grün gefärbt werden. Es ist mir indess nicht geglückt, ein Blau daraus darzustellen. Als eine rothe Lösung mit kleinen, zu ihrer Sättigung unzulänglichen Mengen Kalkhydrat vermischt wurde, so entstand zuerst ein geringer brauner Niederschlag von aufgelöstem Absatz, sodann ein grüner, der zu Boden sank und die Flüssigkeit roth zurückließ. Der grüne Niederschlag war die neutrale Verbindung des Farbstoffs mit der Kalkerde, und die rothe Lösung enthielt auch eine Kalkverbindung, entsprechend einem sauren Salz. Wäre diese rothe Farbe ein von fremden Säuren gerötheter blauer Farbstoff, so würde sich das Blau in der Lösung gezeigt haben: allein als mehr und mehr Kalkhydrat zugesetzt wurde, so blieb das schwächere Roth

mit vermehrtem grünen Niederschlag, und endlich wurde auch die Flüssigkeit grün. Wenn Blattroth mit einem Alkali oder einer alkalischen Erde gesättigt ist, so verwandelt es sich im Laufe einiger Stunden, und noch schneller in der Wärme, in einen braunrothen Absatz, welcher auch ohne Gegenwart einer Base auf Kosten der Luft gebildet wird. Dieser Körper ist weit beständiger und bestimmt mehr elektro-negativ. Aus concentrirten Lösungen seiner Verbindungen mit Basen wird er durch Säuren gefällt, jedoch nicht gänzlich.

Blattroth, aufgelöst in wasserfreiem Alkohol, liefs sich in halbgefüllten Flaschen mehre Monate lang unzersetzt aufbewahren.

*Beerenroth aus dem Saft von Ribes rubrum.* Der Saft dieser Beeren hat bekanntlich eine schön dunkelrothe Farbe. Wird er mit essigsaurem Bleioxyd vermischt, so entsteht darin ein schön himmelblauer Niederschlag, welcher eine Verbindung von citronensaurem Bleioxyd mit Farbstoff ist. Führt man mit dem Zusatz von Bleisalz fort, so lange noch etwas niederfällt, so bleibt endlich eine von den fremden Säuren befreite Portion Beerenroth in der Flüssigkeit, welche, nach Sättigung der freien Essigsäure mit Bleiessig, sich durch diesen mit grüner Farbe ausfällen läfst. Wahrscheinlich hat man den blauen Niederschlag mit Bleizucker als einen Beweis angesehen, dafs das Roth in dem Saft nur ein durch Säuren geröthetes Blau sey. Wird der so erhaltene blaue Niederschlag durch Schwefelwasserstoffgas zersetzt, so erhält man eine rothe Flüssigkeit, welche Citronensäure, Apfelsäure und Farbstoff, vermuthlich in chemischer Verbindung mit den Säuren, enthält. Setzt man kohlensauren Kalk hinzu, zur Sättigung der Säuren, so fällt citronensaurer Kalk nieder, während äpfelsaurer Kalk in Lösung bleibt. Setzt man dann, in kleinen Portionen, Kalkerdehydrat hinzu, so löset sich äpfelsaurer Kalk niederschlagen, und darauf kann der Ueherrest der Äpfel-

säure durch essigsäures Bleioxyd gefällt werden. Et, was Farbstoff folgt diesem mit; allein das Meiste bleibt in der Lösung, und man hört mit dem Zusatz von Bleilösung auf, wenn der Niederschlag grün ist und sich so erhält. Man filtrirt nun und schlägt den Farbstoff durch essigsäures Bleioxyd nieder. Dieser Niederschlag ist grün, indess nicht grasgrün, wie der vom Blattroth, sondern blaugrün; aber er ist gar nicht dem gleich, welcher, nach Ausfällung der Säuren aus dem Saft, durch Fällung mit dem Bleisalz erhalten wird, und zeigt, daß die blaue Farbe nur der Verbindung des citronensauren Blei angehört. Ich weiß nicht, ob auch das äpfelsaure Bleioxyd sich so mit dem Farbstoff verbinde; denn dieses Salz kann aus dem blauen Niederschlag ausgekocht werden, und schießt aus der erhaltenden Flüssigkeit farblos an.

Der blaugrüne Niederschlag, welcher, nach Abscheidung der Säuren durch essigsäures Bleioxyd, direct aus dem Saft erhalten wird, giebt, zersetzt durch Schwefelwasserstoff, eine schöne dunkelrothe Flüssigkeit, welche, im Wasserbade eingetrocknet, ein dunkelrothes Extract hinterläßt, aus welchem wasserfreier Alkohol den Farbstoff auszieht, mit Hinterlassung einer braunen Masse, welche aus dem Absatz des Farbstoffs und aus Pectin besteht. Wird er in Etwas kaustischen Ammoniaks aufgelöst und mit ein wenig Essigsäure vermischt, so gelatinirt das Pectin, obwohl gefärbt von etwas Absatz. Der aus den gefüllten Bleisalzen erhaltene Farbstoff hinterläßt bei Wiederauflösung in wasserfreiem Alkohol nur Absatz. Nach Verdunstung des Alkohols über Schwefelsäure oder Chlorecalcium im luftleeren Raume erhält man den Farbstoff rein.

Er bildet nun ein durchsichtiges dunkelrothes Extract, das in Wasser und Alkohol in jedem Verhältnisse löslich ist, unlöslich aber in Aether. Seine Farbe zieht sich *indess etwas mehr in's Purpurrothe* als die Farbe des  
Blatt-

**Blattröth von *Ribes Grossularia*.** Seine Auflösung in Wasser giebt, beim Eintrocknen im Wasserbade, einen braunrothen Absatz von ganz gleichem Verhalten mit dem aus Blattröth. Mit Alkalien und farblosen Salzbasen giebt er grüne Verbindungen, aber deren grüne Farbe zieht sich etwas in Blau und ist nicht grasgrün, wie beim Blattröth. Die Verbindungen mit Alkalien und alkalischen Erden absorbiren sehr schnell Sauerstoff aus der Luft, und bilden die Verbindung der Absatzfarbe mit Basen, aber die Bleioxydverbindung kann ohne Veränderung getrocknet werden. Zur Hälfte mit Kalkerde gesättigt, wird das Beerenroth nicht blau, sondern verhält sich ganz so, wie ich vom Blattröth angeführt habe.

Auf gleiche Weise habe ich den Farbstoff des Kirschsafts untersucht, und ihn ganz gleich mit dem aus schwarzen Johannisbeeren gefunden.

Die beste Weise zur Abscheidung des Beerenroth ist gewiss die, dass man erst durch kohlensauren Kalk die Citronensäure fällt, sodann mit Bleizucker die Aepfelsäure und einen Theil des Farbstoffs, um sicher zu seyn, dass die Aepfelsäure ganz ausgefällt sey; zu dem Ende setzt man etwas Bleiessig hinzu, filtrirt und fällt sodann mit Bleizucker aus, so lange noch ein grüner Niederschlag entsteht. Diesen wäscht man, zersetzt ihn durch Schwefelwasserstoffgas, verdunstet im luftleeren Raume, löst in Alkohol und hebt den Farbstoff in dieser Auflösung auf.

Aus diesen Versuchen folgt, dass die Farbe der gerötheten Blätter von gleicher Art ist mit der der rothen Beeren und Früchte, und dass die Blätter keinen so allgemeinen Farbstoff enthalten, als das von Macaire Priasep erdachte Chromule, welches durch Einwirkung verschiedener Reagentien soll aus Grün in Gelb und Roth verwandelt, und sodann wieder in Blattgrün zurückgeführt werden können.

VII. *Verschiedene Folgerungen aus dem specifischen Gewicht der Gase organischer Verbindungen; von J. J. Berzelius.*

(Aus dessen Jahresbericht, No. 18 p. 213 des Originals.)

Die zuerst von Dumas eingeführten und sodann von Mitscherlich und anderen Chemikern fortgesetzten Untersuchungen über das specifische Gewicht unbeständiger Gase führen zu ganz wichtigen Aufschlüssen über die atomistische Zusammensetzung der Körper. Ich habe hierüber in Betreff der Essigsäure, Ameisensäure und der Aetherarten verschiedene Rechnungen angestellt, und will hier meine Resultate mittheilen. Diese Resultate sind meinen Vorgängern entgangen, weil sie ihre Aufmerksamkeit nur auf die Volume der elementaren Bestandtheile richteten, und die Volume der zusammengesetzten Körper, welche als solche die gewogene Verbindung bilden, nicht speciell in Rechnung nahmen.

So hat man das spec. Gewicht des *Essigäthers*, welches = 3,0634, berechnet aus dem Gewicht der Volume der einzelnen Atome, und dadurch erhalten:

$$\begin{array}{rcl}
 4 \text{ Vol. Kohlengas} & = & 6,7424 \text{ 1)} \\
 16 \text{ - Wasserstoffgas} & = & 1,1009 \\
 4 \text{ - Sauerstoffgas} & = & 4,4104 \\
 \hline
 & & 12,2536.
 \end{array}$$

Diese Summe, durch 4 dividirt, giebt 3,0634. Man ist nun bei der Bemerkung stehen geblieben, daß die Bestandtheile von 28 auf 4 verdichtet seyen, ohne da-

1) Das spec. Gew. des Kohlengases = 0,8129 aus dem Kohlenoxydgase hergeleitet, in der Annahme, daß dasselbe, ohne Verdichtung, aus 1 Vol. Sauerstoff und 1 Vol. Kohlen gas bestehe.



bei den wahrscheinlichen Schluss zu ziehen, daß von diesen vier Volumen zwei Essigsäure und zwei Aether, in Gasform, vereinigt ohne Condensation seyn könnten. Aus dem Folgenden wird man ersehen, zu welchem Resultate die Folgerung hieraus führt.

Der *Aether* wiegt in Gasform 2,5809. Nun machen:

4 Vol. Kohlen gas	= 3,3712
10 - Wasserstoff gas	= 0,6880
1 - Sauerstoff gas	= 1,1026
	<hr/> 5,1618.

Die Hälfte hiervon ist 2,5809. Hieraus hat man geschlossen, daß 15 Vol. zu 2 Vol. verdichtet seyen; aber von diesen ist das eine offenbar Sauerstoffgas. Hierbei ist nun der Fall möglich, daß das Aethergas auf 1 Vol. Sauerstoffgas enthält entweder 1 Vol. Aether radical oder 2 Vol. desselben, verdichtet mit dem 1 Vol. Sauerstoffgas von 3 auf 2. Was wirklich der Fall sey, kann durch das specifische Gewicht des *Salzsäure-Aethers* entschieden werden.

Wenn der Aether als ein Oxyd betrachtet wird, so ist bekanntlich sein Radical  $= C^4 H^{10}$ , für welches wir den von Liebig eingeführten Namen *Aethyl* anwenden wollen. Der Salzsäure-Aether ist dann eine Verbindung von Chlor mit Aethyl, ein *Aethylchlorür*  $= C^4 H^{10} + Cl$ . Was vom Radical in dieser Verbindung mit 2 Vol. Chlorgas vereinigt ist, entspricht dem im Oxyd mit 1 Vol. Sauerstoffgas Verbundenen, gemäß den gewöhnlichen und allgemein bekannten Verhältnissen. Das spec. Gewicht des Aethylchlorürs ist  $= 2,2319$ . Es besteht aus:

4 Vol. Kohlen gas	= 3,3712
10 - Wasserstoff gas	= 0,6880
2 - Chlorgas	= 1,8807
	<hr/> 6,9319

was, durch 4 dividirt, 2,2319 giebt. Diese 16 Vol. ha

ben sich folglich zu 4 verdichtet, von denen 2 Chlor sind. Man kann also mit Recht annehmen, daß die Verdichtung bei den Bestandtheilen des Aethyls stattgefunden habe, daß diese von 14 Vol. zu 2 verdichtet worden seyen. Das Aethyl muß dann wiegen:

$$\begin{array}{rcl} 1 \text{ Vol. Kohlengas} & = & 3,3712 \\ 10 \text{ - Wasserstoffgas} & = & 0,6890 \\ \hline & & 4,0592. \end{array}$$

Hieraus folgt, daß 1 Vol. Aethylgas halb so viel wiegt,

$$\begin{array}{rcl} & \text{also} & = 2,0296 \\ \text{hiez u } \frac{1}{2} \text{ Vol. Sauerstoffgas} & = & 0,5513 \\ \hline & \text{giebt} & 2,5809 \end{array}$$

als spezifisches Gewicht des Aethergases. Daraus folgt unbestreitbar, daß 1 Vol. Aethergas aus 1 Vol. Aethylgas und  $\frac{1}{2}$  Vol. Sauerstoffgas besteht, daß also das Aethylgas demselben Gesetze folgt, wie der Wasserstoff oder Stickstoff bei Verbindung mit Sauerstoff, und der Sauerstoff bei Verbindung mit Kohle, daß nämlich 2 Volume des ersteren sich mit 1 Vol. des letzteren verbinden, verdichtet von 3 auf 2. Wir finden also bei den zusammengesetzten organischen Radicals dasselbe einfache Naturgesetz, dem die einfachen unorganischen gehorchen. — Es folgt daraus ferner, daß der Aether besteht aus 1 Doppelatom des Radicals und 1 At. Sauerstoff  
 $= 2C^2H^5 + O$  oder  $C^2H^5O$ .

Das summarische Resultat für das *Aethyloxid* (Aether) ist also folgendes: 1 Vol Aethylgas besteht aus 2 Vol. Kohlengas und 5 Vol. Wasserstoffgas, verdichtet von 7 zu 1. Es wiegt 2,0296, und verbindet sich, ohne Volumsveränderung, mit  $\frac{1}{2}$  Vol. Sauerstoffgas zu 1 Vol. Aethergas und mit 1 Volum Chlorgas zu 2 Volum Aethylchlorür.

Versuchen wir nun die Anwendung hiervon auf die

*Essigsäure* zu machen. Ein Volum *Essigäther* wiegt, wie wir schon bemerkt, 3,0634, und seine Bestandtheile sind verdichtet von 28 : 4. Diese Verbindung enthält 4 Vol. Sauerstoff, von denen 1 Vol. dem Aethyloxyd angehört, und, wie wir gesehen, 2 Vol. Aethergas entspricht. Die übrigen 2 Volume müssen also Essigsäuregas ausmachen, wenn nämlich, wie wir zu vermuthen allen Grund haben, das gasförmige essigsäure Aethyloxyd 1 Vol. Base und 1 Vol. Säure unverdichtet enthält, was wirklich der Fall ist, wie wir weiterhin sehen werden. Dann besteht es aus:

$\frac{1}{2}$ Vol. Aethyloxydgas	= 1,29015
$\frac{1}{2}$ - Essigsäuregas	= 1,77295
1 - essigz. Aethyloxyd	= 3,06340.

Daraus ergibt sich das Gewicht von 1 Vol. Essigsäure = 3,5459; allein die Essigsäure besteht aus:

4 Vol. Kohlengas	= 3,3712
6 - Wasserstoffgas	= 0,1128
3 - Sauerstoffgas	= 3,3078
	7,0918.

Die Hälfte hiervon ist 3,5459. Die 13 Vol. sind also verdichtet zu 2, und enthalten, was auch aus der bekannten procentischen Zusammensetzung der Essigsäure folgt,  $1\frac{1}{2}$  Vol. Sauerstoffgas. Ueber das Volumenverhältniß des Radicals giebt diese Bestimmung übrigens keine Sicherheit. Es kann ein halbes oder ein ganzes Volum seyn: wir werden nun sehen, daß es ein ganzes Volumen ist.

Im letzten Jahresbericht, pag. 311, erwähnte ich Regnault's Entdeckung von Verbindungen des Essigsäure Radicals, welches wir *Acetyl* nennen wollen, mit (Chlor und Brom<sup>1)</sup>). Das spec. Gewicht des Acetylchlorürs, in Gasform, fand er = 2,166 und die Zusam-

1) S. Annalen, Bd. XXXVII S. 77

mensetzung desselben  $= C^2 H^2 + Cl$ . Dies macht in Gasform:

4 Vol. Kohlengas	$= 3,3712$
6 Vol. Wasserstoffgas	$= 0,1128$
2 Vol. Chlorgas	$= 4,8807$
	<hr/>
	8,6647

was, durch 4 dividirt, 2,16617 giebt. Darin haben sich also 12 Volume verdichtet zu 4. Von diesen sind 2 Chlor. Die übrigen 2 müssen also Acetylgas seyn, aber  $8,6647 - 4,8807 = 3,7840$ , wovon die Hälfte das Gewicht eines Volums Acetyl  $= 1,8920$ . Wenn nun 1 Vol. Essigsäure enthält:

1 Vol. Acetyl	$= 1,8920$
$1\frac{1}{2}$ - Sauerstoffgas	$= 1,6539$

so wiegt 1 Vol. Essigsäure  $= 3,5459$

ganz wie oben gefunden. Daraus folgt dann klar, daß die Essigsäure aus 2 At. Radical und 3 At. Sauerstoff  $= C^2 H^2 + 3O$  besteht, und daß diese Bestandtheile in Gasform von 5 auf 2 verdichtet sind. Aus dem Acetylbromür, dessen spec. Gewicht auch bestimmt wurde, er giebt sich dasselbe Resultat.

Wenden wir nun diese Bestimmung auf das von Liebig entdeckte *Aldehyd* an. Als Gas hat es das spec. Gewicht  $= 1,532$ , und nach der Analyse und nach einigen Voraussetzungen über seine Zusammensetzung kann es als  $C^2 H^2 O + H$ , d. h. als Acetyloxydhydrat angesehen werden. Vereinigen sich:

	2 Vol. Acetylgas	$= 3,7840$
mit	1 - Sauerstoffgas	$= 1,1026$
zu	2 - Aldehyd	$= 4,8866$
	<hr/>	
so wiegt	1 - Acetyloxyd	$= 2,4433$
hiez u	1 - Wassergas	$= 0,6201$
	<hr/>	
bilden	2 - Aldehydgas	$= 3,0634$

also 1 Vol. Aldehydgas wiegt 1,5317, und besteht aus  $\frac{1}{4}$  Vol. Acetyloxyd und  $\frac{1}{4}$  Vol. Wasser <sup>1)</sup>). Diese Resultate, obwohl mit den angeführten theoretischen Ansichten übereinstimmend, beweisen sie doch nicht, denn andere Gesichtspunkte, unter welchen das Aldehyd betrachtet werden kann, leiten zu gleich annehmblichen Gewichtes-Uebereinstimmungen. Da aber das Acetyl in seinem Verhalten ungefähr denselben Gesetzen zu folgen scheint, wie der Stickstoff und der Phosphor, so schien mir klar, daß bei dem Aldehyd, dem niedrigsten Oxydationsgrade des Phosphors ähnlich, eine *unteracetylige Säure* gesucht werden müsse, und daß das *Acetyl-Ammoniak* nichts anderes sey als *unteracetyligsaures Ammoniumoxyd*. Das Aldehyd müßte demnach mit Kalium Wasserstoffgas entwickeln und *unteracetyligsaures Kali* geben.

Diese Ideen theilte ich dem sinnreichen Entdecker des Aldehyds mit, welcher sie prüfte und mir folgende Angabe übersandte: »Wenn Kalium gelinde in Aldehyd erwärmt wird, so entsteht, unter starker Wasserstoffgas-Entwicklung, eine syrupdicke Flüssigkeit, welche, im luft-leeren Raume eingetrocknet, ein weißes Salz hinterläßt, welches sich an der Luft nicht bräunt, schwach alkalisch schmeckt und mit Säuren Aldehyd liefert. Es ist *unteracetyligsaures Kali*.« — Erst nach dieser Thatsache ist die Natur des Aldehyds richtig erkannt; sie giebt einen sicheren Grund für die ganze übrige Lehre vom Acetyl und dessen Verbindungen.

Die numerischen Bestimmungen, welche ich hier vorlege, gewähren sicher keine unterhaltende Lectüre; allein

1) Als eine nicht unbedeutende Bestätigung der Richtigkeit der angeführten Data verdient bemerkt zu werden, daß das Acetyloxydhydrat dieselbe procentische Zusammensetzung wie das acetylsaure Aethyloxyd (Essigäther), aber nur die halbe Anzahl einfacher Atome besitzt, und deshalb auch in Gasform nur ein halb so großes specifisches Gewicht als letzteres.

die Wichtigkeit solcher Betrachtungen ist so groß, daß ich kein Bedenken trage, die Leser noch mit einigen zu beschweren, ungeachtet, nachdem das Verfahren zum Gebrauch der specifischen Gewichte einmal angegeben ist, ein Jeder selbst diese Bestimmungen machen kann. Ich betrachte zunächst den *Arzneisäuredampf* und die interessante Reihe von Aetherarten, die Dumas und Peligot vom *Holzgeist* erhalten haben (Jahresbericht, 1835, S. 373. — Annalen, Bd. XXXVI S. 88).

Dumas und Peligot haben gefunden, daß 1 Vol. des neuen Aethers, den sie *Methylenhydrat* heißen, und ich, an der angeführten Stelle, *Holzäther* nannte, hier aber *Methyloxyd* nennen will, aus  $C^2 H^6 O$  besteht, und isomer ist mit Alkohol, dessen spec. Gewicht 1,6005 er auch in Gasform besitzt. Er besteht also aus:

2 Vol. Kohlengas	= 1,6856
6 - Wasserstoffgas	= 0,4128
1 - Sauerstoffgas	= 1,1026
	<hr/>
	3,2010

wovon die Hälfte = 1,6005. Er enthält folglich, wie das Aethyloxyd, die Hälfte seines Volums an Sauerstoffgas. Ob das Uebrige  $\frac{1}{2}$  oder 1 Vol. sey, kann aus dieser einzigen Thatsache nicht entschieden werden, aber es ergibt sich aus dem spec. Gewicht des *Methylchlorürs*, welches = 1,7418. Aus der Analyse ist bekannt, daß der Chlorgehalt desselben  $\frac{1}{2}$  Vol. Chlor entspricht. Zieht man dessen Gewicht = 1,22017 ab von dem des Chlorürgases, so bleibt für die andere Hälfte des Volums 0,52173, was für 1 Vol. Chlor oder für  $\frac{1}{2}$  Vol. Sauerstoffgas (die einander äquivalent sind) verdoppelt werden muß. Dies macht für

	1 Vol. Methylgas	= 1,0492
hiez	$\frac{1}{2}$ - Sauerstoffgas	= 0,5513
geht	1 - Methyloxyd	<hr/>
		= 1,6005



ganz übereinstimmend mit dem Versuch. Daraus folgt weiter, daß das Methyloxyd aus 1 At. Methyl und 1 At. Sauerstoff  $= \text{CH}^3 + \text{O}$  besteht, und folglich analog wie das Aethyloxyd zusammengesetzt ist; daß im Methyl 1 Vol. Kohlengas und 3 Vol. Wasserstoffgas von 4 auf 1 verdichtet sind, und daß 2 Vol. desselben sich mit 1 Vol. Sauerstoffgas verbinden zu 2 Vol. Methyloxydgas.

Dumas und Peligot fanden das Gewicht von 1 Vol. ameisen-sauren Methyloxyds  $= 2,064$ ; in dieser Menge finden sich 0,80033 Methyloxyd, was genau das Gewicht von  $\frac{1}{2}$  Vol. ausmacht. Der Rückstand 1,28277 muß dann das Gewicht von  $\frac{1}{2}$  Vol. *Ameisensäure* seyn. Diese Säure besteht aus:

2 Vol. Kohlengas	$= 1,6956$
2 Vol. Wasserstoffgas	$= 0,1376$
3 Vol. Sauerstoffgas	$= 3,3078$
	<hr/>
	5,1310.

Wenn diese 7 Vol. zu 2 Vol. verdichtet sind, so wiegt 1 Vol. Ameisensäure 2,5655, wovon die Hälfte 1,28275 nahe gleich ist dem, was das Gewicht des ameisen-sauren Methyloxydgases gegeben hat.

Ein Volum Ameisensäure enthält also  $1\frac{1}{2}$  Volum Sauerstoffgas. Aus der Verbindung ihres Radicals, welches wir *Formyl* nennen wollen, mit Chlor (Dumas's Chloroform) schließen wir, daß dasselbe 1 Vol. ausmacht.

Aus Dumas's Versuchen ist bekannt, daß die Flüssigkeit, welche man durch Destillation von schwachem Alkohol mit chlo-rigsaurem Kalk erhält, aus dem Radical der Ameisensäure und 3 Doppelatomen Chlor besteht, d. h. daß sie Ameisensäure ist, dessen Sauerstoff durch das Aequivalent an Chlor ersetzt worden ist. Die-

ses *Formyl-Superchlorid* hat in Gasform das spec. Gewicht 4,1163. Es besteht aus:

	1 $\frac{1}{2}$ Vol. Chlorgas	= 3,6605
und	$\frac{1}{2}$ - Formylgas	= 0,4538
		<hr/> 4,1163

folglich wiegt:

	1 Vol. Formyl	= 0,9116
das mit	1 $\frac{1}{2}$ - Sauerstoffgas	= 1,6539
gibt	1 - Ameisensäuregas	= 2,5655
wie zuvor.		

Daraus folgt, daß im Formyl verdichtet sind 1 Vol. Kohlengas und 1 Vol. Wasserstoffgas zu 1 Volum; und daß 2 Vol. Formyl sich mit 3 Vol Sauerstoff verbinden, und von 5 zu 2 Vol. Formylsäure oder Ameisensäure verdichten, die dann besteht aus  $2\text{CH} + 3\text{O}$  oder  $\text{CHO}^3$ .

Dumas und Peligot bestimmten das spec. Gewicht des *Methylfluorürs* in Gasform zu 1,186. Wahrscheinlich ist es ähnlich wie das Chlorür zusammengesetzt und enthält  $\frac{1}{2}$  Vol. von jedem seiner Bestandtheile. Zieht man nun von dem Gewicht desselben  $\frac{1}{2}$  Vol. Methyl = 0,52473 ab, so bleibt 0,66127 für  $\frac{1}{2}$  Vol. Fluor, dessen spec. Gewicht in Gasform dann 1,32254 ist, und sich auch vermuthlich niemals auf eine andere Weise bestimmen lassen wird.

Dumas und Peligot fanden das spec. Gewicht des *benzoësauren Aethyloxyds*, in Gasform, = 5,107. Besteht es aus  $\frac{1}{2}$  Vol. Aethyloxydgas und  $\frac{1}{2}$  Vol. Benzoësäuregas, so wiegt das halbe Volum dieser Säure 4,1163, Aber diese Säure besteht aus:

11 Vol. Kohlengas	= 11,7992
10 - Wasserstoffgas	= 0,6880
3 - Sauerstoffgas	= 3,3078
	<hr/> 15,7950.

Wenn nun diese 27 Vol. sich zu 2 Vol. verdichtet haben, so wiegt 1 Vol. Benzoësäure 7,8975, was nur etwas weniger als das Resultat aus der Wägung des Aethergases ist, und zu beweisen scheint, daß das spec. Gewicht des benzoësauren Aethyloxydgases eigentlich 5,28925 seyn muß; eine Abweichung, die bei einem so wenig flüchtigen Körper leicht erklärlich ist.

Mitscherlich fand das spec. Gewicht der wasserhaltigen Benzoësäure in Gasform = 4,27. Besteht sie aus

$$\begin{array}{rcl} \frac{1}{2} \text{ Vol. Benzoësäuregas} & = & 3,91875 \\ \frac{1}{2} \text{ - Wasserdampf} & = & 0,62010 \end{array}$$

so wiegt 1 - wasserhalt. Säure = 4,56885

woraus man sieht, daß die Versuche um das eigentliche richtige Verhältniß variiren, was beweist, daß das Gas der Benzoësäure, wie das der beiden vorhergehenden Gase,  $1\frac{1}{2}$  Vol. Sauerstoffgas enthält, und daraus dürfte man schließen können, daß sie 1 Vol. Radical enthält, und besteht aus  $2C^2H^2 + 3O = C^2H^2O^3$ .

In der jetzt erscheinenden deutschen Ausgabe meines Lehrbuches habe ich auf diese Weise alle in Gasform gewagten organischen Verbindungen zu bestimmen gesucht, da mir dieser zu einigen erklärenden Resultaten zu führen schien. Zur leichteren Uebersicht will ich hier alle neuen spec. Gewichte, welche aus den angeführten Berechnungen hergeleitet werden können, zusammenfassen:

			Verdichtung.
Aethyl	$2C + 5H$	2,0296	7 : 1
Methyl	$C + 3H$	1,0492	4 : 1
Acetyl	$2C + 3H$	1,6920	5 : 2
Unteracetylige Säure	$C^2H^2 + O$	2,4433	11 : 2
Acetylsäure	$C^2H^2 + 3O$	3,5459	13 : 2
Formyl	$C + H$	0,9116	2 : 1
Formylsäure	$C H + 3O$	2,5655	7 : 1


Benzoëskure

 $C^2H^5 + 3O$  7,6975 27 : 2

Fluor

1,3225

Werfen wir jetzt von dem Resultate dieser Berechnungen einen Rückblick auf die beiden abweichenden Ansichten über die Zusammensetzung der Aetherarten. Die eine dieser Ansichten betrachtet dieselben als Oxyde zusammengesetzter Radicale, und die andere als Hydrate von Kohlenwasserstoff  $C^2H^5$  und  $C^2H^6$ , welche noch eben so wenig für sich dargestellt sind als die angenommenen Radicale  $C^2H^5$  und  $CH^3$ . Auch aus dieser letzteren Ansicht kann man entsprechende Herleitungen von dem specifischen Gewichte der Verbindungen aufstellen, worin aber ein, durch keine gewöhnlichen Verwandtschaften abzuschheidendes Wasseratom beständig eingeht, nach Erforderniß bald mit der Säure, bald mit dem Kohlenwasserstoff. Man mag wählen, welche Ansicht man will, die numerischen Resultate bleiben immer dieselben; sucht man aber die einfachste, die am besten mit den Erfahrungen über die unorganische Natur übereinstimmende, so ist es gewiß die, welcher hier der Vorzug gegeben wurde. Vielleicht ist Dumas jetzt der Einzige, welcher die Ansicht, daß der Aether ein Hydrat von Kohlenwasserstoff sey, ernstlich vertheidigt; allein da er in allen seinen Arbeiten, die vom Aether handeln, versichert, daß er und sein nunmehr verstorbener Theilhaber an der älteren verdienstvollen Arbeit über die Aetherarten, Boullay, Urheber beider Ansichten seyen, und er zur Bestärkung davon, daß er und Boullay schon 1828 die Idee vom Aether als Oxyd von  $C^2H^5$  aufgestellt habe, in seinem Handbuche der angewandten Chemie, T. V p. 91, nichts anderes anzuführen weiß, als Folgendes: »Die Zusammensetzung dieser Körper muß dann seyn:



so dürfte dieß mehr zu betrachten seyn als ein Manöver, den Uebergang von der einen eignen Hypothese zu der andern vorzubereiten, denn als einen Versuch sich mit einem so offenbar fremden Federchen zu schmücken, welches unter seinem übrigen wissenschaftlichen Flitterstaat wirklich nicht bemerkt werden würde.

### VIII. Ueber die Zusammensetzung einiger organischen Säuren; von den HH. Dumas und Liebig.

(Compt. rend T. V p. 863.)

Zur Zeit, da die Elementar-Analyse unter den Händen der HH. Gay-Lussac und Thénard jenen Grad von Genauigkeit erreichte, welcher ihren Nachfolgern erlaubt hat, gewisse Anwendungen davon auf das Studium der Zusammensetzung organischer Körper zu machen, unternahmen jene berühmten Chemiker eine Analyse des citronensauren Kalks. Späterhin bestimmte Hr. Berzelius die Zusammensetzung der Citronensäure und des citronensauren Bleioxyds; die Zusammensetzung dieser Säuren schien dadurch unabänderlich festgesetzt zu seyn. Indefs fand Hr. Berzelius selbst durch spätere Untersuchungen, daß die Citronensäure, betrachtet als  $C^4H^4O^8$ , wie man es bis dahin gethan, Salze von sehr ungewöhnlichen Eigenschaften erzeugen würde. Das Natron und das Barytsalz z. B., bis  $200^\circ$  C. erhitzt, verlieren Wasser, was sie nicht enthalten. Ihre Säure scheint also zersetzt worden zu seyn. Wenn man indess diese Salze mit Wasser in Berührung bringt, findet man in ihnen wieder die gewöhnliche Citronensäure mit allen ihren

Eigenschaften. Diese scheinbare Beweglichkeit der Elemente der Citronensäure hat Aufsehen bei allen Chemikern erregt. Es sind wohl wenige, die nicht einige Versuche gemacht hätten, in der Hoffnung eine richtige Erklärung hievon aufzufinden. Wir haben geglaubt, die Untersuchung dieser großen Schwierigkeit sey eine der ersten Aufgaben, die uns bei dem unternommenen allgemeinen Studium beschäftigen müsse.

Wir glauben sie gelöst zu haben. Wirklich haben wir gefunden, daß man, bei gehöriger Vorsicht, den meisten citronensauren Salzen die nämliche Menge Wasser entziehen kann, welche das Natron- und das Barytsalz bei den Versuchen des Hrn. Berzelius verloren. Man muß also annehmen, daß dieses Wasser nicht wirklich zur Zusammensetzung der Citronensäure gehört. Allein dieses angenommen, bleibt noch die Schwierigkeit, zu erklären, wie bei Hrn. Berzelius Versuchen, gleichwie bei den unsrigen, jedes Atom Citronensäure bloß ein Drittel Atom Wasser verliere, und niemals mehr.

Diese Schwierigkeit kann bei den älteren Ansichten über die Natur der Säuren nur durch die Voraussetzung beseitigt werden, daß das Atom der *Citronensäure* zu verdreifachen sey, man also in den neutralen citronensauren Salzen wirklich drei Atome Basis habe. Man würde also die folgende Reihe haben:

Wahre Säure  $C_{12}H_{10}O_{11}$

Getrockn.  $\cdot C_{12}H_{10}O_{11} + 3H_2O$

Krystallis.  $\cdot C_{12}H_{10}O_{11} + 3H_2O + 2H_2O$

Wahre Salze  $C_{12}H_{10}O_{11} + 3BaO$ , od.  $3NaO$  od.  $3AgO$ .

Nach Aufstellung dieser Punkte haben wir uns mit lebhaftem Interesse mit einer Aufgabe gleicher Ordnung beschäftigt, die durch die neueren Untersuchungen des Hrn. Biot und des Hrn. Fremy, und durch einige noch nicht veröffentlichte Versuche des Hrn. Peligot erhoben worden ist. Die für die Weinsäure angenommene Formel paßt nämlich nicht mehr auf die Gesamttheit




der von ihnen beobachteten Resultate. Nach den Analysen des Hrn. Berzelius ist die Weinsäure  $C_4H_4O_6$ . Diese Analysen sind an sich nicht zweifelhaft; allein wir haben starke Gründe zu glauben, daß die Weinsäure, wie die Citronensäure, süßig ist, Wasser auf Kosten ihrer eigenen Bestandtheile zu verlieren.

Um diese Ansicht zu bewähren, haben wir viele Analysen mit dem Brechweinstein unternommen, und uns dadurch überzeugt, daß derselbe zwei Atome Wasser verliert, welches er nicht enthält. Jedes Atom Säure, welches in die Zusammensetzung des Brechweinsteins eingeht, verliert also ein Atom Wasser. Statt den Brechweinstein vorzustellen durch:



muß man schreiben:



Die beiden Atome Wasser entweichen bei  $220^\circ C.$ , und sind unabhängig vom Krystallwasser des Brechweinsteins.

Die *Mekonsäure* und *Cyanursäure* bieten ähnliche Erscheinungen dar.

Hier ist also eine neue Klasse von Erscheinungen, welche allgemein zu werden strebt, und aus welcher folgendes Gesetz hervorzugehen scheint: Bei der Citronen-, Wein-, Mekon- und Cyanursäure kann jedes Atom Sauerstoff der Basen, mit denen sie sich vereinigen, verdrängen, und ersetzen ein Atom Sauerstoff, welches als Wasser entweicht. Diese Säuren stellen also nicht Salze mit Ueberschuß an Base dar, sondern Salze von gleicher Ordnung mit den gewöhnlichen phosphorsauren.

Man erlaube uns hinzuzufügen, daß diese merkwürdigen Erscheinungen sich einfacher und allgemeiner auffassen lassen, wenn man die genannten Säuren als *Wasserstoffsäuren* einer neuen Art betrachtet.

Die *Weinsäure* z. B., betrachtet wie bisher, giebt die Formeln:

Wahre Säure	$C_4H_4O_4$
Wasserhaltige Säure	$C_4H_4O_4 \cdot H_2O$
Neutrales Kalisalz	$C_4H_4O_4 \cdot K_2O$
Weinstein	$C_4H_4O_4 \cdot KO + C_4H_4O_4 \cdot H_2O$
Brechweinstein	$2C_4H_4O_4 + KO + Sb_2O_3$

Diese verwickelten Formeln werden sehr einfach, wenn man sie folgendermaßen schreibt:

Wasserstoffsäure	$C_4H_4O_{4,2} \cdot H_2$
Neutrales Kalisalz	$C_4H_4O_{4,2} \left\{ \begin{matrix} K_2 \\ H_2 \end{matrix} \right\}$
Weinstein	$C_4H_4O_{4,2} \left\{ \begin{matrix} K \\ H_2 \end{matrix} \right\}$
Wasserfreier Brechweinstein	$C_4H_4O_{4,2} \left\{ \begin{matrix} K \\ Sb_2 \end{matrix} \right\}$

Hieraus sieht man, daß es wasserfreie Weinsäure nicht giebt, daß man ein Radical  $C_4H_4O_{4,2}$  annehmen muß, welches mit  $H_2$  eine *Wasserstoffsäure* neuer Art ausmacht.

Dies angenommen, werden alle Verbindungen des Weinsäure-Radicals ausgedrückt, wenn man sagt: daß in diesen Verbindungen der Wasserstoff ganz oder theilweise durch sein Aequivalent an Metall ersetzt werde, wie dies bei allen ähnlichen Ersetzungen der Fall ist.

Wir können ohne Mühe zeigen, daß sich auch die Citronensäure, Mekonsäure und Cyanursäure als Wasserstoffsäuren betrachten lassen. Man findet in unserer Abhandlung eine experimentelle Discussion dieses neuen Gesichtspunktes, welcher den Meinungen des Hrn. Du-Long in Betreff der Oxalsäure eine unerwartete Ausdehnung giebt.

IX. *Ueber die Naphthalinschwefelsäure;*  
*von J. J. Berzelius.*

(*Ann. de chim. et de phys.* T. LXV p. 290)

Die Pflanzen-Schwefelsäuren (*acides vegeto-sulfuriques*) scheinen von zweierlei Art zu seyn. In der einen spielt die organische Substanz die Rolle einer Basis, und kann durch eine stärkere Base aus ihrer Verbindung ausgetrieben werden; von der Art sind die *Weinschwefelsäure* und *Methylschwefelsäure*. Ihr Sättigungsvermögen ist auf die Hälfte zurückgeführt, weil die organische Base die andere Hälfte der Säure sättigt. Sie geben keine sauren oder basischen Salze, da ihre Salze Doppelsalze von der organischen und der unorganischen Base sind. Bei der andern Art ist die organische Substanz nicht basisch, kann nicht durch eine stärkere Base ausgetrieben werden, und ändert nicht das Sättigungsvermögen der Schwefelsäure. Diese Säuren können sowohl saure als basische Salze liefern. Ihr Prototyp ist die *Benzolschwefelsäure*.

Unter diesem Gesichtspunkt habe ich Versuche unternommen, um zu bestimmen, zu welcher Gattung diese oder jene Pflanzen-Schwefelsäure gehöre. Ich begann mit der *Isäthionsäure*, deren Verschiedenheit in der Zusammensetzung mit der isomeren Schwefelweinsäure Hr. Liebig zuerst erklärt hat. Meine Resultate stimmen mit den seinigen überein; allein ich erkläre die Zusammensetzung auf eine etwas andere Weise. Hr. Liebig hat gefunden, daß das isäthionsaure Kali, behandelt mit Kalihydrat in einer so hohen Temperatur, daß die darin enthaltene organische Substanz zerstört wird, schwelligsaures Kali, gemengt mit schwefelsaurem giebt; und daraus schließt er, daß die Säure Unterschwefelsäure enthalte, weil das weinschwefelsaure Kali, eben so behandelt, nicht dasselbe Resultat liefert. Dieser Schluss ist

vielleicht richtig, aber noch des Beweises bedürftig, denn Kali treibt das Aethyloxyd, d. h. den Aether, aus, und bildet schwefelsaures Kali. Ich erbitzte ein Gemenge von schwefelsaurem Kali mit einem verbrennlichen Kalisalz, z. B. margarinsauren Kali, und Kalihydrat. Die Pflanzensäure ward zerstört; allein bei keinem meiner Versuche fand ich schwellige Säure im Rückstand, wie sehr ich auch die Temperatur mäßigte. Es hat also große Wahrscheinlichkeit, daß die Folgerung von Hrn. Liebig richtig ist. Er betrachtet das isäthionsaure Kali als  $KS + C^2H^2O + H$ , und läßt das Atom Wasser durch eine Verwandtschaft halten, die einer Temperatur von  $350^\circ C.$  widersteht. Diese schien mir nicht recht verträglich mit dem gewöhnlichen Verhalten des Wassers. Es ist rationeller anzunehmen, Wasserstoff und Sauerstoff seyen Bestandtheile der organischen Substanz, die dann  $C^2H^2 + 2O$  seyn würde, d. h. ein Aethylhyperoxyd, und diese würde dann mit Hyposulfaten von Wasser, Baryt, Kali u. s. w. verbunden seyn. Die Hypothese läßt indess keine entscheidenden Beweise zu.

Ich wählte darauf die *Naphthalinschwefelsäure* als Gegenstand der Untersuchung. Was man Naphthalinschwefelsäure nennt, ist ein Gemenge von zwei verschiedenartigen Säuren, deren eine jedoch in Ueberschuß vorhanden ist. Das gewöhnliche naphthalinschwefelsaure Salz ist ein Gemenge von zwei schwer mit Genauigkeit trennbaren Salzen. Ich muß jedoch bemerken, daß die Säure des Salzes, welches Hr. Faraday *Glowing sulfonaphthalate of Baryte* nennt, und welches sich nur selten bildet, nicht darunter ist.

Um die beiden mit einander gemengten Salze zu trennen, dampfte ich ihre Lösung ab, bis sie anfang eine Salzhaute auf ihrer Oberfläche abzusetzen, und vermischte sie dann mit dem doppelten ihres Volums an Alkohol von 0,833.

Nach einigen Minuten begann das eine Salz sich in Gestalt eines weißen Pulvers niederzuschlagen. Nach

12 bis 16 Stunden setzte die Lösung nichts mehr ab. Die Salze sind indess noch nicht vollständig getrennt oder rein; allein es würde zu weit führen hier die Details ihrer gänzlichen Reinigung anzugeben.

Das aufgelöste Salz ist das wahre naphthalinschwefelsäure. Es krystallisirt in glänzenden Plättchen, welche, getrocknet, wie Silber aussehen, vor allem das Barytsalz, wenn man es durch Erkalten krystallisirt hat.

Es scheint, Hr. Faraday habe es rein gehabt, da er 41,70 Procent schwefelsauren Baryt daraus gewann. Offenbar kann es nicht aus Naphthalin und Schwefelsäure zusammengesetzt seyn, weil es sonst 40 Procent schwefelsauren Baryt geben müßte. Vielmehr besteht es aus 2 At. Naphthalin und 1 At. Unterschwefelsäure, verbunden mit 1 At. Baryt,  $= \text{BaS} + 2\text{C}^{10}\text{H}^8$ . Es muß also naphthalin-unterschwefelsaurer Baryt genannt werden.

Das andere Barytsalz läßt sich nicht krystallisirt erhalten; es löst sich sehr langsam und weit weniger in Wasser als das erstere. In Alkohol, selbst in sehr verdünntem, ist es wenig löslich. Es giebt 50,9 Procent schwefelsauren Baryts. Für sich in einem Glasrohr erhitzt, giebt es im Moment der Zersetzung etwas sublimirtes Naphthalin und ein saures Gas, welches nicht den Geruch der schwefligen Säure besitzt, aber im Gaumen die eigenthümliche Empfindung dieser Säure hervorbringt. Dieß Salz besteht aus 1 At. schwefelsauren Baryt, 1 At. Schwefelsäure, 11 At. Kohle und 9 At. Wasserstoff.

	Versuch.	Atome.	Rechnung
Schwefelsaurer Baryt	50,930	1	50,906
Schwefelsäure	17,507	1	17,507
Kohle	29,523	11	29,526
Wasserstoff	1,925	9	1,961

Beide Arten Säure geben keine Spur von schwefelsaurem Salz, wenn man sie heiss mit einem Ueberschuß

von concentrirter Aetzkallilauge behandelt; allein beide geben schwelligsaures Kali, wenn man sie bis zur Zerstörung der organischen Substanz mit Aetzkali erhitzt. Es ist also sehr wahrscheinlich, daß beide Unterschwefelsäure enthalten. Das Salz der letzteren würde seyn  $\equiv \text{BaS} + \text{C}^{11}\text{H}^9\text{O}$ . Unter diesem Gesichtspunkt nenne ich die neue Säure *Naphthinunterschwefelsäure* (*acide hyposulfonaphthinique*). Diese Säure bildet sich auch, wenn man Naphthalin mit gewöhnlicher concentrirter Schwefelsäure behandelt. Zugleich bilden sich andere Körper von interessanter Zusammensetzung. Die Säure des *Glowing salt* (verglühenden Salzes) von Faraday scheint isomer zu seyn mit der Naphthalinunterschwefelsäure.

Ich vermurthe, daß die beiden blauen Säuren des Indigo auch Unterschwefelsäure enthalten. Ich beschäfigte mich gegenwärtig mit ihrer Untersuchung. Ich habe Hrn. Dumas's Resultate über denselben Gegenstand gesehen; offenbar stimmt seine Analyse der *sulfindylate de potasse* sehr wohl mit dieser Idee. Vergebens habe ich gesucht schwefelsaure Salze zu erzeugen durch Behandlung von indigischwefelsauren Salzen mit anderen stärkeren Basen. Es wird nur die organische Substanz verändert, und ich habe wenigstens fünf neue Pflanzenschwefelsäuren von verschiedener Farbe dargestellt, deren Zusammensetzung ich zu untersuchen Willens bin.



X. *Ueber die Schwefelblumen;*  
*von Dr. J. Fritzsche.*

(Mitgetheilt vom Verfasser aus den Berichten der Petersburger  
 Academie.)

Bei der mikroskopischen Untersuchung der im Handel vorkommenden Schwefelblumen fand ich, daß die Annahme, die Schwefelblumen bestehen aus sehr feinen Krystallen, unrichtig sey, und daß dieselben vielmehr ein Haufwerk kleiner, mannigfach an einander gereihter Kugeln darstellen, deren Durchmesser bei den von mir untersuchten ungefähr zwischen  $\frac{1}{8}$  bis  $\frac{1}{15}$  einer Linie variierte. Sie sind bei einer 200maligen Linearvergrößerung, deren ich mich im Verlaufe dieser Untersuchungen fortwährend bediente, selbst in Flüssigkeiten liegend betrachtet, fast ganz undurchsichtig, ihre Oberfläche ist glatt; sie geben beim Zerdrücken unregelmäßige Bruchstücke, und es läßt sich also durch die Beobachtung keine krystallinische Structur an ihnen nachweisen, obgleich wir sie ihnen der Theorie nach dennoch zuschreiben müssen. Um zu erfahren, welchem Umstande sie ihre Kugelgestalt verdanken, destillirte ich Schwefel aus einer kleinen Retorte, ließ den, im Anfange der Destillation sich bildenden Strom von Schwefelblumen auf kleine Glasplatten fallen, und erhielt so, wenn ich den Strom nur sehr kurze Zeit auf eine Stelle fallen ließ, in kleineren oder größeren Abständen von einander liegende Kugeln, deren Durchmesser  $\frac{1}{100}$  bis  $\frac{1}{200}$  einer Linie ungefähr betrug. Sie sind, so frisch bereitet, durchsichtig, und befinden sich in dem bekannten zähen Zustande des Schwefels, was sich mit vieler Leichtigkeit nachweisen läßt, wenn man mit dem Finger über sie hinfahrt, wodurch sie theils zusammengeballt, theils in

lange Fäden ausgezogen werden. Lässt man solche, mit frisch gebildeten Schwefelblumen bestreute Glasplatten an der Luft liegen, ohne sie zu berühren oder überhaupt zu erschüttern, so bleiben die Kugeln mehrere Tage lang unverändert, und da in den Kammern, wo man im Großen Schwefelblumen darstellt, nicht nur diese Bedingungen vollkommen erfüllt sind, sondern auch noch ein Mangel an Licht stattfindet, so sind dies wahrscheinlich die Gründe, weshalb die Schwefelblumen bei ihrem allmählichen Erhärten ihre runde Form und glatte Oberfläche beibehalten. Dies findet nämlich nicht statt, wenn die Glasplatten, worauf die zähen Kugeln sich befinden, erschüttert und dem Lichte ausgesetzt werden; es geht dann eine fortschreitende Veränderung vor sich, und man erhält, nach kürzerer oder längerer Dauer des Liegens, verschiedene Producte. Die ersten Folgen der Erschütterung sind ein Zusammenfließen nahe liegender Kugeln ohne weitere Veränderung; selbst nach einigen Tagen sind die Kugeln noch flüssig genug, um diese Erscheinung zu zeigen, und der, durch ein starkes Ausathmen während der Beobachtung durch das Mikroskop, hervorbrachte Luftstrom reicht hin sie hervorzurufen. Die erste Veränderung ihrer Structur beginnt nun nach einer oder einigen Stunden, oder selbst in noch kürzerer Zeit, und besteht in einem Undurchsichtigwerden, welches gewöhnlich mit dem Verluste der glatten Oberfläche und der Kugelgestalt zugleich eintritt, und von dem ersten Schritte zur Annahme einer krystallinischen Structur herrührt. Die Kugeln breiten sich nämlich auf der Glasplatte aus, und es entstehen daraus mehr oder weniger regelmäßige Halbkugeln, aus deren Oberfläche Enden von Krystallen als kleine Spitzen hervortragen. Allmählig nehmen diese Spitzen sowohl an Umfang als an Länge zu, und bilden nach einigen Tagen einen durchsichtigen Ring von kleinen Krystallen um den dunkeln, durch die krystallinische Structur der Oberfläche war

morirt erscheinenden Kern, welcher noch längere Zeit in seinem zähen Zustande zu verharren scheint; nicht selten auch sind dann aus ihnen feine, prismatische, blattartige Krystalle herausgewachsen, deren Länge oft das Doppelte des Durchmessers des Schwefelkornes beträgt. Nach 5 bis 6 Tagen sind schon viele dieser Körner ganz durchsichtig geworden, und bilden dann Gruppen von Krystallen; aus anderen sind einzelne, vollkommen ausgebildete Krystalle entstanden, und da gewöhnlich auch noch ganz unveränderte zähe Kugeln vorhanden sind, so bietet eine, anfangs mit kleinen Kugeln gleichförmig besät gewesene Glasplatte nun alle Stufen der erfolgten Veränderungen dar.

Die Bildung der einzelnen Krystalle, deren Form unverkennbar das Rhombenoctaëder des Schwefels ist, kann man schon nach einigen Stunden dadurch hervorrufen, daß man mit einer Nadelspitze Striche durch die auf einer Glasplatte befindlichen frisch gebildeten Kugeln zieht; es bleibt dabei gewöhnlich eine sehr dünne Schicht Schwefel auf der Fläche des Glases kleben, und die so gebildeten Strafsen erscheinen nach kurzer Zeit mit kleinen Krystallen besät, deren Form man, trotz dem, daß der Durchmesser ihrer Hauptaxe oft nur  $\frac{1}{10}$  einer Linie beträgt, mit völliger Bestimmtheit erkennen kann. Größere einzelne Krystalle bilden sich, wie es scheint, unmittelbar durch die allmähliche Einwirkung des Lichts aus Kugeln, welche durch Zusammenhessen mehrerer kleiner gebildet worden sind: ich fand nie in allen Gröfsen bis zu  $\frac{1}{5}$  Linie Durchmesser ihrer Hauptaxe.

Weit einfacher erscheint der Verlauf der Veränderungen, und weit schneller ist er vollendet, wenn man die mit frischen Schwefelblumen bestreuten Glasplatten mit Oel benetzt. Die Kugeln behalten dann ihre Form und Durchsichtigkeit, werden aber allmählig kleiner, und es bilden sich dafür an einzelnen Stellen große Krystalle, von denen ich einen in wenigen Stunden bis zu

$\frac{1}{2}$  Linie Durchmesser der Hauptaxe angewachsen fand. Viele derselben haben eine Menge secundärer Flächen (Abstumpfung und Zuspitzung der Endecken etc.), andere sind dendritenförmig an einander gereiht, und noch andere bilden dünne Blätter oft bis über  $\frac{1}{2}$  Linie Länge. Läßt man die frischen Schwefelblumen auf Glasplatten fallen, welche vorher mit Oel bestrichen waren, so geht die Umwandlung der Kugeln in große Krystalle noch schneller und schöner vor sich, indem dann wahrscheinlich die Adhäsion des Schwefels am Glase nicht hindernd einwirken kann. Unstreitig spielt bei dieser merkwürdigen Umwandlung das Auflösungsvermögen des Oeles für den Schwefel eine wichtige Rolle; unbegreiflich bleibt es aber, warum das Oel gleichsam nur den Vermittler zur Krystallbildung spielt, und den eben aufgelösten Schwefel sogleich wieder absetzt.

Läßt man zähen Schwefel als Fäden in Oel fallen, so bleibt dieses so lange ohne Einwirkung, als jene ihren zähen Zustand behalten; sobald sie aber anfangen undurchsichtig zu werden, so bedeckt sich ihre Oberfläche gleichzeitig mit kleinen Krystallen, welche bei geringer Berührung sich ablösen und als vollkommen ausgebildete Individuen sich darstellen. Gießt man auf geschmolzenen Schwefel Oel und läßt ihn nun erkalten, so bilden sich in dem Oele ziemlich große Krystalle, die man sehr bequem mit bloßem Auge erkennen kann: sie entstehen aber nicht unmittelbar nach dem Erkalten, sondern erst nach einigen Stunden, und wahrscheinlich waren auch in diesem Falle keinesweges alle Krystalle auf einmal in dem Oele aufgelöst gewesen, sondern bildeten sich auf dieselbe Art, wie jene aus den Kugeln. Hatte das Oel, welches man zu diesem Versuche anwendete, vorher schon mit Schwefel in Berührung gestanden, so erfolgte die Bildung der Krystalle sehr viel *schneller*: es bildete sich in diesem Falle zuerst eine *Menge langer, blattartiger Krystalle* in dem Oele, wel-

che jedoch nach, einiger Zeit entweder sich in eine zusammenhängende Masse kleiner, rhombenoctaëdrischer Krystalle mit Beibehaltung ihrer Form umwandelten, oder auch ganz verschwanden, indem sich an anderen Stellen eine Menge kleiner Rhombenoctaëder bildeten. Es scheint daraus einerseits hervorzugehen, daß die blattartigen Krystalle der zweiten prismatischen Form des Schwefels angehörten, und andererseits scheinen diese Versuche zu beweisen, daß das Oel die oben beschriebene Einwirkung auf den Schwefel nur dann äußert, wenn der Schwefel krystallinische Structur anzunehmen im Begriff steht oder eben angenommen hat.

Legt man sehr feine, eben gebildete, durch Schmelzen erhaltene Schwefelkrystalle in Oel, so wird die Einwirkung desselben erst nach 10 bis 14 Tagen bemerkbar; es wandeln sich aber hierbei nur die Krystalle selbst in aneinandergereihte Krystalle der rhombenoctaëdrischen Form um, und man sieht keine Krystalle um sie herum in dem Oele entstehen. Waren die Krystalle durch Liegen an der Luft schon undurchsichtig geworden, ehe man sie in Oel legt, so bemerkt man auch nach langem Liegen keine andere Einwirkung, als daß sich die Krystalle gleichsam mit einem Netze umgeben, als ob das Oel den einen Theil des Krystalles aufgelöst und ausgefressen, den andern dagegen unangetastet gelassen habe; die Theilchen, aus welchen dieses Netz besteht, sind aber so klein, daß es unmöglich ist zu bestimmen, ob sie Krystalle sind oder nicht. An künstlichen Schwefelblumen sah ich, auch nach laugem Liegen in Oel, keine Veränderung.

Um zu untersuchen, in welcher Form der Schwefel bei seiner Auscheidung auf nassem Wege sich zeigt, wählte ich die Zersetzung des unterschwefelichtsauren Natrons durch Säure, und fand, *daß der Schwefel auch hierbei in seinem zähen Zustande ausgeschieden wird.* Er bildet, nach Verhältniß der Concentration der Lösungen, größere oder kleinere Kugeln, welche unter Wa-

ser längere Zeit ihren zähen Zustand beibehalten, an der Luft und mit Oel aber ähnliche Erscheinungen geben, wie die frischen Schwefelblumen. Den bei anderen Zersetzungen abgeschiedenen Schwefel habe ich nicht untersucht, weil sie ja fast nur bei gleichzeitigem Vorhanden-seyn von Schwefelwasserstoff erfolgen, und dann ein Wasserstoffgehalt Ursache eines weichen Aggregatzustandes seyn könnte \*).

**XI. Untersuchung eines, nach einem Anfall von Magenkrampf gelassenen Harns;  
von Leopold Gmelin in Heidelberg.**

**D**er Harn war klar, in Masse braun wie Bier, in dünnen Schichten gelb.

Mit viel Salzsäure lieferte er ein klares, braunes Gemisch, mit viel Salpetersäure ein klares rothes Gemisch, ohne daß der rothen Färbung eine grüne und violette vorangegangen wäre.

Wenig Salzsäure veranlaßte Trübung und braunen Niederschlag. Dieser löste sich in wässrigem Kali zu einer dunkelbraunen Flüssigkeit, welche mit wenig Salpetersäure einen violetten Niederschlag, mit mehr Salpetersäure eine schön rothe Lösung gab (ebenfalls ohne daß eine grüne Färbung vorausgegangen wäre). Auch liefs jener braune Niederschlag, mit Salpetersäure abgedampft, einen schönen rothen Fleck von Purpursäure.

Wenig Salpetersäure verhielt sich gegen den Harn wie wenig Salzsäure, nur war die rothe Färbung des in Kali gelösten Niederschlages durch Salpetersäure weniger lebhaft.

Der Harn, 24 Stunden sich selbst überlassen, gab ein rosenrothes Sediment, blieb aber noch braun, und gab mit wenig Salzsäure denselben Niederschlag wie oben.

\*) Vergl. *Frankenheim*, *Annal.* Bd. XXXIX S. 316.



Der Harn enthielt hienach Harnsäure, Purpursäure und verändertes Gallenbraun, welches demselben die braune Farbe ertheilte, und bei der Fällung durch wenig Säure mit der Harnsäure niederfiel. Der vortübergehende ikterische Zustand war wahrscheinlich durch einen consensuellen Krampf in den Abführungsgängen der Leber hervorgebracht worden. Die Veränderung, die das Gallenbraun auf seinem Wege durch das Blut in die Nieren (vielleicht mittelst der Respiration) erlitten hatte, war die Ursache, daß der Harn mit Salpetersäure nicht erst eine grüne und violette, sondern sogleich eine rothe Farbe annahm, wie ich dieses auch schon bisweilen bei anderen ikterischen Harnen wahrzunehmen Gelegenheit hatte, während mancher vor der rothen Fällung die grüne deutlich zeigt.

## XII. *Auflöslichkeit des Quecksilberoxyds in Wasser; von R. F. Marchand.*

Die Angabe einiger Chemiker, namentlich Donovan's, Guibourt's und Thomson's, daß das Quecksilberoxyd in Wasser etwas auflöslich sey, wird von anderen, vorzüglich von Ure, bestritten. Man kann mit Gmelin vermuthen, die erstgenannten Gelehrten haben ein Oxyd angewandt, welches nicht ganz frei von salpetersaurem Salze gewesen sey, wodurch freilich eine theilweise Auflöslichkeit des Präparates bedingt werden muß. Am leichtesten ließe sich die Frage hierüber durch Anwendung des Hydrargyrum rubrum praecipitatum per se entscheiden, unter welchem obsoleten Namen man bekanntlich das, durch Einwirkung der Wärme auf reines Quecksilber bereitete Oxyd versteht: doch wird dieses Präparat nicht mehr bereitet, und es ist sehr mühsam und langwierig, es sich selbst darzustellen.

Ich erhitze deshalb ganz reines Quecksilberoxyd, welches ich mir zu diesem Behufe dargestellt hatte, unter beständigem Umrühren so stark, daß ein großer Theil desselben in metallisches Quecksilber und Sauerstoff zersetzt wurde, so daß ich wohl annehmen konnte, alles anwesende salpetersaure Salz zersetzt zu haben.

Wurde das so behandelte Oxyd mit destillirtem Wasser gekocht, und die decantirte Flüssigkeit filtrirt, so wurde dieselbe durch Hydrothionammoniak sehr deutlich braun gefärbt. Diese Reaction verschwand nicht, nachdem dasselbe Oxyd wohl zwanzig Mal ausgekocht, und endlich noch mit kochender kaustischer Kalklauge behandelt und sorgfältig ausgewaschen worden war. Stets entstand mit Schwefelwasserstoffammoniak die braune, und durch Veilchensyrup die grüne Reaction, wovon auch die genannten englischen Chemiker sprechen. Von einer Auflösung des Quecksilbergases in Wasser, welche durch A. Wiggers kürzlich nachgewiesen ist, können diese Reactionen nicht herrühren, erstens schon, weil sie dann wohl anderer Art seyn müßten, und dann weil die Quantität des Quecksilbers viel zu gering ist, um in dem Wasser entdeckt werden zu können, wie aus Wiggers's Versuchen hervorgeht <sup>1)</sup>.

### XIII. *Ueber die Bestimmung der Güte des Mostes; von G. Osann in Würzburg.*

Die Beantwortung der Frage: wie bestimmt man die Güte des Mostes? ist für Weingegenden von großer Wichtigkeit. Sie hängt ab, theils von dem Zuckergehalt, theils von dem ätherischen Oel, welches dem Wein das Aroma giebt. Letzteres, welches sich erst bei der Gährung entwickelt, kann am Most nicht erkannt wer-

<sup>1)</sup> *Annalen* Bd. XXXI S. 440.

den. Ob Most einen Wein dieser Art gebe, läßt sich übrigens im Allgemeinen recht gut nach der Sorte der Trauben und nach der Lage beurtheilen. In letzterer Beziehung sind Bergweine durchaus den in Ebenen gewachsenen vorzuziehen. Was nun den Zuckergehalt betrifft, so genügt die Zunge nicht. Der Leute, welche im Stande sind durch den bloßen Geschmack die Güte des Mostes oder Weines zu beurtheilen, sind selbst in Weingegenden bei weitem weniger als man glauben sollte. Es ist daher wirklich ein Bedürfnis, ein Verfahren auszumitteln, um mit Genauigkeit Bestimmungen dieser Art zu machen.

Seit einigen Jahren ist in hiesiger Gegend eine Mostwaage in Gebrauch, welche, soviel ich weiß, aus dem Württembergischen herübergekommen ist. Sie ist ein Aräometer von folgender Einrichtung. Nicht von Glas, sondern von dünnem Metallblech, ist die Form desselben ungefähr die eines gewöhnlichen Aräometers. Die Null der Scale fängt da an, wo das Stängelchen an der Kugel befestigt ist, es zeigt den Stand desselben an, wenn es sich in destillirtem Wasser befindet. Am Ende des Stängelchens ist eine Spitze, auf welche kleine Gewichte von Blech, welche in der Mitte eine Oeffnung haben, gesteckt werden können. Sie sind von verschiedener Schwere, und ihr Gewicht ist auf ihnen angegeben. Durch das Aufstecken wird das Aräometer heruntergedrückt, und zwar in einem solchen Verhältniß, daß die Stände den Procenten der Dichtigkeit entsprechen. Hinsichtlich der Güte wird angenommen, daß sie in geradem Verhältniß zur Dichtigkeit stehe. Wäre der Most eine bloße Auflösung von Zucker in Wasser, so würde das Princip der Beurtheilung richtig seyn, da dieß aber nicht der Fall ist, sondern noch andere Pflanzenstoffe darin enthalten sind, so sieht man ein, daß der Stand des Instruments nicht das anzeigt, was man wissen will.

Ich habe ein anderes Verfahren in Vorschlag ge-

Masse angenommen werden muß, das hat bereits Quenstedt a. a. O. nachgewiesen, und ich stimme vollkommen darin mit ihm überein. — Nun zu den Gründen, die mich veranlassen die Umwandlung aus Chrysolith in Zweifel ziehen.

Betrachten wir zuvörderst die geognostischen Verhältnisse. — Man denke sich mitten im Gneus, mitten im Urgebirge, weit entfernt von jeder plutonischen oder gar vulkanischen Erhebung ein großes mächtiges Lager von Serpentin, vielleicht hundert Fufs hoch und wohl noch breiter. Ist es wahrscheinlich, ist es nach allen bisher über das Vorkommen des Olivin bekannten Thatsachen denkbar, daß dieses Lager aus Olivin bestehe oder bestanden habe? Ein Mineral, das uns bisher immer nur als Auswürfling von Vulkanen oder als Einschlufs nicht plutonischer Massen bekannt geworden ist, — ein Mineral, das wir bisher immer nur in der Nachbarschaft vulkanischer Gesteine gefunden haben, soll sich hier auf einmal unter ganz entgegengesetzten Verhältnissen, und in einer so ungeheuren Quantität vorfinden, wie man es bisher nie angetroffen hat? — Ist eine solche Annahme nicht mindestens höchst gewagt?

Der Serpentin macht bei weitem den größten Theil des Lagers aus, doch enthält es auch verschiedene andere Mineralien, die theils in jenem liegen, theils an den Gränzen desselben auftreten. Zu den ersteren gehören Glimmer, Titaneisen etc., — mitunter in sehr niedlichen Formen, die sich dem Ilmenit des Urals zu nähern scheinen, — Talk und ein asbestartiges Fossil. Zu den letzteren gehört ganz besonders Bitterspath, der an den Gränzen des Serpentin zuweilen in nicht geringer Menge erscheint, theils rein ausgeschieden, theils mit einzelnen Serpentinstückchen zu einer ganz porphyrtartigen Masse vermengt. — Das Vorkommen von Titaneisen, und wohl noch mehr der Wunsch dieses interessante Lager weiter sichtbar zu machen, haben den Hrn. Bergmeister Böbert

veranlaßt einen Schürf auf Eisenerz anlegen zu lassen, wodurch das Lager so aufgeschlossen worden ist, daß man es ganz übersieht.

In der Mitte des Lagers ist der Serpentin vollkommen frisch, von schöner grüner Farbe, stark durchscheinend, im Bruch splittrig; mitunter habe ich geglaubt, ihn für blättrig halten zu können. Mit einem Wort, es ist der reinste, wenn ich mich so ausdrücken darf, der edelste Serpentin, der mir vorgekommen ist, und dem nur einige Varietäten aus Nordamerika gleichkommen. Nirgends aber findet sich in diesem frischesten Zustande eine Aehnlichkeit mit Olivin und Chrysolith, die doch da am auffallendsten seyn müßte, wo die Verwitterung am wenigsten vorgeschritten ist. Das Serpentinlager reicht bis zu Tage aus, und man kann von der Mitte des Lagers aus bis zur Dammerde eine stufenweise Zunahme der Veränderung bemerken. Die grüne Farbe verändert sich, und macht einer vollkommen gelben und graulichgelben Platz; der Glanz verliert sich, das Mineral wird matt und todt, sowohl auf der Oberfläche, als auf dem frischen Bruch; die Durchscheinbarkeit hört gänzlich auf, und das Fossil wird vollkommen undurchsichtig. Alle diese Veränderungen, hervorgebracht durch die Nähe der Luft und durch das Eindringen der Feuchtigkeit, beziehen sich nicht nur auf den Serpentin, sondern auf alle heibrechenden Fossilien, besonders auf den Talk, Asbest und Bitterspath, und man kann sie, wie oben bemerkt, sichtlich von Stufe zu Stufe verfolgen.

Die bekannten Krystalle finden sich nur an der äußeren Gränze des Lagers dicht unter der Dammerde, und hier theils lose, theils in dem Serpentin selbst eingewachsen. Der Grund, warum man in der Tiefe des Lagers niemals oder doch nur in höchst seltenen Fällen Krystalle findet, scheint mir dann zu liegen, daß die Materie dort nicht Raum fand, um auszukrystallisiren. Wie nun aber die ganze Serpentinmasse in den oberen

Theilen des Lagers verwittert ist, so sind es auch ganz besonders die Krystalle, ja ich habe einige Fälle bemerkt, wo die Verwitterung so weit vorgeschritten war, daß die Krystalle bei der Berührung zerfielen. In den größeren Tiefen sieht man viele Spuren von sehr grofsen, aber höchst undeutlich ausgebildeten Krystallen, besonders da, wo sich viel Titaneisen in dem Serpentin findet. Diese undeutlichen Krystalle sind oft einen bis anderthalb Fufs lang bei verhältnismässiger Dicke. — Die schönen deutlichen Krystalle aus den obersten Schichten finden sich gegenwärtig höchst selten, wenigstens gelang es mir bei meiner letzten Anwesenheit nur äufserst wenige und unbedeutende Stücke zu finden, während ich bei einem früheren Besuch eine reiche Ausbeute davon machte.

Es bleibt mir nach allem diesem noch übrig die Gründe aufzuführen, auf die man die Meinung für eine Umwandlung aus Olivin gestützt hat, und deren Widerlegung zu versuchen.

Zuvörderst die Aehnlichkeit der Krystalle sowohl im Total-Habitus, als in den Abmessungen mit denen des Chrysoliths. Die allgemeine Aehnlichkeit ist gewifs nicht zu läugnen; allein reicht sie wohl hin zu der gewagten Annahme jener Umwandlung? Wir haben doch so manche Beispiele in der Mineralogie von dergleichen Aehnlichkeiten, wo von einer Umwandlung gar nicht die Rede seyn kann. — Dazu mufs man doch auch den Unterschied der Gröfse mit in Anschlag bringen; Chrysolith-Krystalle sind bisher immer nur von einem unbedeutenden Umfange bekannt geworden, und in diesem Serpentin finden sich einzelne, wenn auch unvollkommene Krystalle von ein bis anderthalb Fufs Länge. — Ganz dasselbe gilt von der Aehnlichkeit der Abmessungen beider Mineralien. — ich sage Aehnlichkeit, denn es wird doch Niemand im Ernst behaupten wollen, daß diese verwitterten, glanzlosen, ich möchte sagen todtten Krystalle sich mit einer Sicherheit von einem oder zwei



Graden messen lassen. Und von solchen ähnlichen Abmessungen haben wir ja vielfache Beispiele in der Mineralogie.

Einen besonderen Grund für seine Meinung findet Dr. Quenstedt in einem großen Krystall dieses Minerals, der sich in der Königlichen Sammlung in Berlin befindet, und dessen Aeußeres aus Serpentin, dessen innerer Kern aber aus noch unzersetztem Olivin bestehen soll. Ich habe dieses Stück vielfach und genau gesehen, und es bietet allerdings eine merkwürdige Erscheinung dar. Während die Masse der Rinde von dunkelgrüner Farbe ist, wird sie gegen die Mitte des Stückes mehr gelb, zeigt größeren Glanz und einen größeren Grad der Durchscheinbarkeit; — eine Erscheinung, die um so auffallender ist, da an allen übrigen Krystallen und an dem ganzen Lager offenbar umgekehrt der Serpentin um so frischer ist, je grüner sich die Farbe zeigt, während er um so mehr verwittert ist, je mehr er von gelber Farbe erscheint. Die ganz aufgelösten, leicht zerfallenden Parthien dieses Serpentinus sind von hochgelber Farbe.

Allein, daß der mittlere Kern des Berliner Krystalls Olivin sey, ist durchaus nicht bewiesen. Eine Untersuchung ist damit nicht vorgenommen worden, und die äußere Erscheinung scheint mir nicht einmal eine sehr auffallende Aehnlichkeit mit Olivin zu haben. Ich möchte viel eher glauben, daß durch irgend einen Umstand bei der Bildung dieses Krystalls eine ungewöhnlich reine Ausscheidung des Serpentinus stattgefunden hat, und daß der Kern, so wie die Rinde wirklich nichts anderes ist als Serpentin. — Ueberdies wäre es ganz unbegreiflich, warum bei diesem einen Krystall die Umwandlung nur einige Linien weit stattgefunden und den Kern unberührt gelassen haben sollte, während alle übrigen, zum Theil noch weit größeren Krystalle, ja die großen derben Massen des ganzen Lagers selbst, so vollkommen umge-

wandelt wären, daß man auch nicht eine Spur von ihrem früheren Zustande wahrnehmen kann.

Wie dem nun auch sey und zu welcher Entscheidung dieses Gegenstandes spätere Beobachtungen uns auch führen werden, so ist so viel gewiß, daß die Pseudomorphosen, diese Umwandlungen der anorganischen Substanzen eine der wichtigsten und interessantesten Erscheinungen und Thatsachen sind, die die Mineralogie aufzuweisen hat, — und es wäre in der That zu wünschen, daß einer der Meister der Wissenschaft eine Zusammenstellung von allen Beobachtungen gäbe, die bisher in dieser Beziehung gemacht sind, und von den Schlussfolgen, die man aus denselben ziehen kann.

### XV. Beschreibung des Brochantit: von Gustav Rose.

(Entnommen aus dessen „Reise nach dem Ural u. s. w.“ Bd. I S. 267.)

Auf der Kupfergrube Gumeschewskoi, 56 Werst süd-süd-westlich von Katharinenburg, findet sich der Brochantit krystallisirt und derb, doch, wie es scheint, nur sehr selten. Die Krystalle sind klein, 1 bis 2 Linien lang, und auf den derben Parthien, welche aus körnigen Zusammensetzungstücken bestehen, aufgewachsen. Die Krystalle sind 1 und 1 axig, und von der auf Taf. IV Fig. 7 abgebildeten Gestalt. Die Neigung von:

$g : g$ ist $104^{\circ} 10'$	$g : \frac{g}{2}$ ist $160^{\circ} 37'$
$\frac{g}{2} : \frac{g}{2} - 75 \quad 23$	$f : f - 151 \quad 52$
$g : b - 127 \quad 55$	$f : b - 104 \quad 4$
$\frac{g}{2} : b - 147 \quad 18$	

Die stumpfen Winkel der Prismen  $g$  und  $\frac{g}{2}$  und die Neigung von  $f$  gegen  $b$  sind daher nicht viel von einander verschieden. Die Flächen  $\frac{g}{2}$  sind immer nur klein und fehlen auch wohl ganz. Sie sind, wie auch die Flächen  $g$  und  $b$ , immer vertical gestreift,  $g$  und  $\frac{g}{2}$  meistens ziemlich stark,  $b$  nur schwach; doch kommen auch zuweilen die Flächen  $g$  und  $\frac{g}{2}$  nur so schwach gestreift vor, daß sie noch ziemlich scharfe Bilder reflectiren. Die Flächen  $f$  sind etwas gewölbt. Die gegebenen Winkel sind daher nicht für ganz genau anzusehen.

Nach den Flächen  $b$  sind die Krystalle sehr vollkommen spaltbar: die Spaltungsflächen in dieser Richtung sind vollkommen glatt und glänzend; nach den Flächen  $g$  finden sich nur Spuren von Spaltbarkeit.

Die Krystalle sind smaragdgrün, stark glänzend, von Glasglanz, nur auf den Spaltungsflächen von Perlmutterglanz. — Die Härte ist über der des Kalkspaths. Das spec. Gewicht ist, nach einer von mir angestellten Wägung, 3.9069 (Temperatur des Wassers 16°,5). In der chemischen Zusammensetzung stimmt, nach vorläufigen Versuchen der Brochantit vom Gumeschewskoi mit dem von Retzbaury überein <sup>1)</sup>.

1) Der Brochantit ist von Lévy entdeckt worden, aber seine Beschreibung (*Ann. of Philosoph.* 1824, T. VIII p. 241) weicht in manchen Stücken von der meinigen ab, wiewohl er Stücke von demselben Fundort (angeblich Katharinenburg) untersucht zu haben scheint. Nach ihm ist der Winkel  $g : g = 107^\circ$  und  $f : f = 150^\circ 30'$ , und die Spaltbarkeit nur sehr unvollkommen parallel einem horizontalen Prisma, das eine auf die stumpfen Seitenkanten aufgesetzte Zuschärfung bilden würde. Die Abweichungen in den Winkeln mögen sich dadurch erklären, daß Lévy noch unvollkommenere Krystalle als ich gemessen hat; aber auffallender ist es, wie Lévy die Spaltbarkeit nach der Fläche  $b$  übersehen konnte, die doch sehr vollkommen ist. Ich habe ge-

XVI. Ueber ein am südlichen Rande der Lüneburger Haide entdecktes, mehr als 28 Fufs mächtiges Infusorien-Lager;

von C. G. Ehrenberg.

(Aus den Berichten der K. Preuss. Academie.)

Nach zwei Schreiben des Hrn. Hofraths Hausmann in Göttingen an Hrn. E. sind im Hannöverschen Amte Ebsdorf, am Rande der Lüneburger Haide, bei Untersuchung des Untergrundes, durch Bohrversuche, von Seiten des landwirthschaftlichen Provincial-Vereins für das Fürstenthum Lüneburg, auffallend große Lager von mehlartiger Erde entdeckt worden, welche der Präsident des Vereins, Hr. Oberst v. Hammerstein, in Proben an Hrn. Hofrath Hausmann gesandt hat. Diese mehlartigen Massen liegen an sechs verschiedenen Stellen unter dem nur  $1\frac{1}{2}$  Fufs tiefen Haideboden, und scheiden sich in zwei Schichten von verschiedener Farbe. Eine obere, 10 bis 18 Fufs mächtige Schicht ist von sehr weißer Farbe, und ist, nach einer von Hrn. Dr. Wiggers im Laboratorium der Göttinger Universität vorgenommenen Prüfung, als *reine Kieselerde* erkannt. Eine andere, mehr bräunlich-graue Schicht liegt unter der weißen, und ist bis jetzt als wenigstens auch 10 Fufs mächtig erkannt, indem man sie bei 10 Fufs noch nicht durchsunkn hatte. Diese letztere Masse bestand, der chemischen Untersuchung zufolge, ebenfalls aus Kieselerde mit einem geringen Gehalte einer bituminösen Substanz, die durch Be-

doch meine Angaben auch bei den Krystallen von Retzbanya bestätigt gefunden, deren chemische Zusammensetzung Magnus (Pogg. Ann. Bd XIV S 145) untersucht hat, und von welcher Varietät sich Stücke in der königl. Mineraliensammlung von Berlin befinden.

handlung im Feuer sogleich verschwand, indem die Erde sich weiß brannte.

Die chemische Natur und der eigenthümliche Aggregatzustand dieser Erden erweckten in Hrn. Hofr. Hausmann die Vermuthung, daß sie aus Resten organischer Wesen bestehen möchten, und ihre Betrachtung unter dem Mikroskope schien diese Vermuthung zu bestätigen. Hr. E. wurde daher von ihm mit dem Auftrage erfreut, die mikroskopischen Verhältnisse beider Erden möglichst zu ermitteln, zu welchem Behufe Proben beigefügt waren.

Die Resultate der mikroskopischen Untersuchung, welche Hr. E. der Academie über jene sehr interessanten Ablagerungsverhältnisse am Rande der Lüneburger Heide mitzutheilen sich angeregt fühlt, sind folgende:

Beide Erden sind in ihrer mikroskopischen Mischung sich sehr ähnlich, und *enthalten* nicht bloß Infusorienschalen, sondern *bestehen* daraus. Es haben sich bis jetzt sechzehn verschiedene organische Körper als besondere Bestandtheile derselben unterscheiden lassen. Davon sind vierzehn Kieselpanzer von eben so viel Infusorienarten.

Die weiße, obere, bis 18 Fufs mächtige Lage besteht, ohne alle andere fremdartige Beimischung, als einzelne seltene Quarzsandkörnchen, aus sehr wohl erhaltenen reinen Infusorienschalen, etwa in der Art wie das Bergmehl von Santafiora, nur reiner. Er zählte bis jetzt zwölf verschiedene Arten. Die Hauptmasse bilden 1) *Synedra Ulna* und 2) *Gallionella aurichalcea*. Außerdem finden sich darin 3) *Gomphonema clavatum* und 4) *G. capitatum*, 5) *Cocconema cymbiforme* und 6) *C. Cistula*, 7) *Navicula inaequalis*, 8) *N. viridula*, 9) *N. striatula*, 10) *N. gibba*, 11) *Eunotia Westermanni*, 12) *E. Zebra*.

Die graue untere Masse, von mehr als 10 Fufs Mächtigkeit, besteht aus all denselben Formen, nur sind sie weniger gut erhalten, mehr zerbrochen, und es finden

sich dazwischen zwei Infusorienarten überdies, welche der oberen Lage zu fehlen scheinen, nämlich *Gallionella varians* und *Cocconeis Clypeus*. Ganz besonders merkwürdig aber ist eine Beimischung pflanzlicher Stoffe und Formen. Es finden sich nämlich in der unteren Masse (der Probe) man kann wohl sagen  $\frac{1}{6}$  des Volumens (!) an Pollen von Fichten, d. b. irgend einer Pinusart, und es ließen sich auch Kieselnadeln von Spongillen erkennen.

Beide Resultate stimmen mit den Resultaten der chemischen Analyse des Herrn Dr. Wiggers ganz wohl überein, und es wäre nur vorläufig noch zu bemerken, daß von den vierzehn Infusorienarten der beiden Erden sämtliche zwölf der oberen Schicht noch bei Berlin lebende Formen zu seyn scheinen, auch die *Gallionella varians*, welche in dieser größeren Form besonders im Polirschiefer von Jastraba und Cassel vorgekommen, lebt bei Berlin. Die *Cocconeis Clypeus* der unteren Lage findet sich auch mit *Navicula viridis* im Kieselguhr von Franzensbad.

Fichtenpollen fand Hr. E. zuerst im Bergmehl von Degerfors in Schweden, dann auch in dem Kieselguhr von Kymmene Gård in Finnland, neuerlich auch in dem von Franzensbad, überall aber in geringer Menge.

Möge diese, die Phantasie lebhaft beschäftigende Seite der Lüneburger Haide zu thätiger fernerer Untersuchung anregen.

## XVII. Beobachtungen über das Sinken der schwedischen Küste an gewissen Orten.

(Aus Berzelius's Jahresbericht, No. 18, S. 386 d. O.)

Seitdem man es glaublich gefunden, daß sich der Erdball einmal im geschmolzenem Zustande befand, und daß



das Urgebirge nur die durch Erkaltung erstarrte äußere Kruste desselben ist, mußte man folgern, daß bei dieser fortschreitenden Erkaltung der Durchmesser der Erde eine zwar geringe, aber gleichmäßig fortdauernde Verkürzung erleide, und die Kruste desselben also sich runzele, d. h. an gewissen Stellen sich hebe, an anderen sich senke. Auf diese Weise ist die Erscheinung des langsamen Hebens der schwedischen Küste<sup>1)</sup>, welches lange unbegreiflich war, eine Sache der Nothwendigkeit, und man hat angefangen, die Niveauveränderungen am Festlande und an den Inseln, welche, falls die plutonische Ansicht richtig ist, sich als ein allgemeines Phänomen erweisen muß, mehr als zuvor mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. Inzwischen ist erforderlich, daß gegen eine Stelle, die sich hebt, eine andere im Sinken begriffen gefunden werde. Wir wissen, daß die Hebung von Schweden gegen Süden abnimmt, und daß die Gegend von *Sölveborg*, an der nördlichen Gränze von Schonen, ihr Niveau unverändert beibehält. Dagegen hat man auf der anderen Seite der Ostsee, besonders an der flachen Küste von Samland, bemerkt, daß das Meer allmählig in das Land eindringt. Bisher scheinen keine Beobachtungen gezeigt zu haben, daß das Sinken schon an der skandinavischen Seite beginne; allein neuerlich hat Nilson beobachtet, daß dem wirklich so sey. Ich werde daher aus einem Schreiben dieses eifrigen Naturforschers an die Academie einen Auszug mittheilen.

„Ich glaube, sagt derselbe, unumstößliche Beweise für den geologischen Satz gefunden zu haben, daß die südlichste Spitze von Schweden *sich senkt*, während der übrige Theil des Landes *sich hebt*. Ich weiß nicht, ob Jemand diese Meinung schon ausgesprochen habe. Längs der Süd- und Südostküste von Schonen findet sich ein mehr oder weniger hoher Wall, welcher theils aus Sand, theils aus Grand und Feuersteinbrocken be-

1) *Annales*, Bd. II S. 308 und Bd. XXXVIII S. 61.

steht. Dieser Wall ist zuweilen niedrig, fast unmerklich, zuweilen aber aufgetrieben zu einer Höhe von 30, 50 und 100 Fufs und darüber, bei einer der Höhe entsprechenden Breite. Er heisst an der südlichsten Küste der *Göraback*. Man kann ihn verfolgen von *Falsterbo* neben *Ystad* bis *Cimbrishamn*. Innerhalb dieses Walls findet sich an ihm entlang eine Fortsetzung von Sümpfen und Torfmooren. Dieser Wall muss durch eine gewaltsame Bewegung des Ostseewassers gebildet und aufgeworfen seyn. Ich hielt es für interessant zu ermitteln, ob dies vor oder nach der Bevölkerung des Landes geschehen sey. Westlich von Trelleborg bedeckt der Göraback ein Torfmoor. An vielen Stellen hat man den Wall durchgraben, um zu dem Torf zu gelangen. Ich suchte von älteren und jüngeren Personen, die mit der Torfgräberei beschäftigt waren, zu erfragen, ob steinerne Aexte, Pfeile u. dergl., die man zuweilen in anderen Torfmooren angetroffen hat, auch im Moore unter dem Göraback gefunden seyen; allein alle stimmten darin überein, dass sie unter demselben nichts dergleichen wahrgenommen, wohl aber in denjenigen Theilen des Moors, welche innerhalb desselben liegen. Dagegen hat man auf dem Göraback selbst, auf dessen höchsten Stellen, anderthalb Fufs unter der Erdoberfläche, thönerne Urnen gefunden, von denen ich zwei erhielt, und welche, nach anderen ähnlichen, zusammen mit steinernen Aexten u. s. w. gefundenen zu urtheilen, mit letzteren von gleichem Alter sind. Hieraus kann man schliessen, dass die auf dem genannten Walle befindlichen Grabhügel von den ältesten Bewohnern herrühren, und dass, wie mir ganz wahrscheinlich scheint, der Göraback vor der Bevölkerung des Landes aufgeworfen worden ist.

Das Steinpflaster in dem alten Marktflecken *Trelleborg* liegt gegenwärtig so niedrig, dass es bei hohem Wasser überschwemmt wird. Delsungesachtet hat man

beim Graben an mehreren Stellen im Marktlecken drei Fuß unter der jetzigen Oberfläche ein anderes Steinpflaster angetroffen. Diefes alte Pflaster liegt gegenwärtig in oder vielleicht etwas unter dem mittleren Spiegel der Ostsee. Dasselbe ist der Fall mit dem Torfmoor unter dem Göraback, und der aus Thon bestehende Boden des Moors liegt noch zwei bis drei Ellen darunter. Allein das Moor ist offenbar in süßem Wasser gebildet, denn es enthält Stämme, Zweige, Früchte und Blätter von Eichen, Buchen, Erlen, Birken, Haselstauden und anderen in Schonen wildwachsenden Bäumen und Sträuchern. Hätte sein Niveau zur Zeit seiner Bildung so niedrig gelegen wie jetzt, so würden Tang und andere Meerespflanzen hineingespült und darin aufbewahrt worden seyn. Ueberdies finden sich auch Süßwasserschnecken in dem Torfmoor, z. B. *Lymnaea*, *Paludina*, *Cycas* u. s. w.

Vor der Küste, in der Ostsee selbst, 50 bis 100 Ellen vom Strande und 2 Fuß tief unter der Oberfläche des Wassers, findet sich ein Bett von Torf, das dem eben erwähnten gleich ist. Nach der von mir darüber angestellten Untersuchung enthält es alle zuvorgenannten Land- und Süßwasserpflanzen; es ist daher ohne alle Widerrede im süßen Wasser und über dem Spiegel des Meeres gebildet; jetzt liegt es aber darunter. Es ist 4 bis 6 Fuß tief und ruht auf blauem Thon. Diese Thatfachen scheinen mir zu beweisen, daß die Südspitze von Schonen gesunken ist.\*

Daß dies nicht plötzlich, sondern allmählig geschah, und noch geschieht, hat Nilson durch die Bemerkung wahrscheinlich zu machen gesucht, daß der Abstand des »Stafsten« vom nächsten Strande, durch Messungen i. J. 1836, um 380 Fuß kleiner gefunden wurde, als Liund ihn, 87 Jahre früher, in seiner schonischen Reise angiebt. Dies kann unmöglich von einem Versehen in der

Messung herrühren, selbst wenn man annehmen wollte, daß die frühere Messung nicht mit großer Genauigkeit ausgeführt worden sey.

XVIII. *Ueber einige innerhalb geschichtlicher Zeit stattgefundenen Niveau-Veränderungen in Dänemark; von G. Forchhammer.*

(Aus einem Briefe an Hrn. Lyell in den Verhandlungen der Geologischen Gesellschaft in London. — *Phil. Mag. Ser. III Vol. 11 p. 309.*)

Der Verfasser erwähnt zunächst der Beobachtungen von Hrn. Lyell und Hrn. Nilson über die ungleichen Hebungen von Schweden und das Sinken von Schonen. Zum Beweise, daß solche Hebungen nicht nur in einem verschiedenen Verhältnisse stattfinden, sondern auch Bewegungen in entgegengesetzter Richtung vor sich gehen, führt er ähnliche Erscheinungen an: die Inseln Saltholm und Bornholm, so wie die dänische Küste am Sund. Die Insel Saltholm, Kopenhagen gegenüber und kaum fünf Fuß über dem Niveau des Sundes erhaben, muß, da sie schon seit dem 13. Jahrhundert als eine Quelle des Einkommens für das Stift Roskilde genannt wird, langsamer gehoben worden seyn als Bornholm, welches einen Fuß in einem Jahrhundert steigt; denn wenn sie jetzt nur zwei Fuß säuke, würde ein sehr kleiner Theil der Insel übrig bleiben.

An der dänischen Küste des Sundes, sechs Meilen (*Miles*) nördlich von Kopenhagen, findet sich jedoch ein wohl charakterisirter Strand sechs Fuß über dem Meeresspiegel; daraus schließt der Verfasser, daß die Niveau-Veränderungen an der dänischen Küste in einem *anderen* Verhältnisse als an der schwedischen vor sich *gehen müssen*, und er schreibt dies den schwachen Erd-

behen zu, die in Schweden so oft, in Dänemark aber niemals verspürt worden sind.

Bezüglich auf Bornholm bemerkt der Verfasser, daß daselbst die ganze Ostküste aus granitischem Gestein besteht, welches steil aus dem Meere steigt und bis zur Höhe von 250 Fufs mit einem fetten Lehm bedeckt ist, der zahlreiche Bruchstücke von Schiefen und Kalksteinen der Uebergangsformation enthält, von denen die letzteren sichtlich auf die Insel Gothland hinweisen. Aus diesen Thatsachen, aus der Abwesenheit der in der Geschiebe-Formation von Dänemark so häufigen plutonischen Felsarten und aus der Abwesenheit dieses fetten Lehms an der Westseite des Granitrückens schließt er, daß jene Erscheinung das Resultat einer heftigen Ueberschwemmung der Ostsee aus Nordosten sey. Die Wirkungen davon sind sichtbar sowohl in der Gestalt der dänischen Küsten als auch in den Ablagerungen von Sand, welche einen großen Theil von Dänemark bedecken, welche aber von den östlicheren Betten der Geschiebe-Formation offenbar fortgeschwemmt sind.

In einer Höhe von 40 Fufs ist zu Bornholm der erste Strand zu beobachten. Ueberall, wo durch das Zurückweichen der Granitberge von der Küste kleine Buchten gebildet sind, findet man sie verstopft durch Granitgeröll des Strandes, und dadurch sind kleine Lachen gebildet und von dem Meer abgetrennt. Im Laufe der Zeit wurden dieselben durch Torf ausgefüllt. Diese Torfmoore sind geschieden von dem Meer durch einen Strand von geringer Breite und zehn Fufs Höhe, welcher sich unter einem Winkel von  $15^{\circ}$  verflacht und an eine horizontale, 160 Fufs breite Fläche gränzt, die ganz aus Gerölle besteht. Jenseits dieser ist eine zweite Ebene, 100 Fufs breit, die gegen das Meer unter einem Winkel von  $9^{\circ}$  bis  $10^{\circ}$  abfällt, und auf diese folgt der gegenwärtige Strand, mit einer Abdachung von  $12^{\circ}$  bis  $13^{\circ}$ . Die Geschiebe sind alle von ähnlicher Größe

und bestehen aus demselben Granit wie der anstehende Fels.

Hierauf erwähnt der Verfasser, daß auf dem geneigten Strand Gräber vorkommen, die nur durch einen Ring von Steinen bezeichnet sind, und daß es, nach dem Zeugnisse von Alterthumsforschern, um's Jahr 900 Sitte war, Christen am Ufer, wo Land und See sich scheiden, zu begraben; dadurch hat man einen rohen Anhalt zur Berechnung der Zeit der Bildung dieses Strandes. Die fortdauernde, obgleich sehr langsame Hebung der Insel, wie sie sich aus dem geneigten Strande ergibt, würde sonach einen Fuß in einem Jahrhundert betragen, und der Anfang der regelmäßigen Hebung der Insel würde ungefähr 1600 Jahre zurück zu versetzen seyn. Vor diesem Zeitpunkt muß eine lange und vollkommene Ruhe geherrscht haben, während welcher Zeit sich der Strand bildete. Gesetzt das Steigen der Insel und der seitliche Anwuchs des geneigten Strandes wären ganz regelmäßig geschehen, und die Seitenausdehnung des horizontalen Strandes wäre ebenfalls gleichförmig erfolgt, so würde zu dieser Bildung eine Zeit von 2500 Jahren erforderlich gewesen seyn. Dies würde die plötzliche Erhebung der Insel um 10 Fuß, welche durch den schmalen und steilen Strand angedeutet ist, und, nach der Meinung des Verfassers, durch ein großes Erdbeben veranlaßt wurde, 4000 Jahre vor der jetzigen Zeit zurückführen.

Der Verfasser berichtet auch, daß in ganz Dänemark, Schleswig und Holstein Muscheln aus der Nordsee von jetziger Zeit gefunden werden, zuweilen in bedeutender Höhe über dem Meeresspiegel. So findet sich nicht weit von Bornhöft in Holstein, in einer Höhe über 150 Fuß, ein Belt von Fossilien und Geschieben, worunter *Cardium edule*, *Littorina littorea*, *Buccinum undatum*, *Ostrea edulis*, letztere zwar etwas kleiner als die jetzt an der Küste lebende, aber übereinstimmend mit jener, welche fossil in erhobenen Betten von neueren Seemuscheln in England gefunden wird. Versinkungen müssen auch stattgehabt haben, da zwischen der Insel Römö und den Küsten von Schleswig ein untermeerischer Wald (angeblich von Tannen) neun Fuß unter der gegenwärtigen Hochwassermarken angetroffen wird.

Endlich lenkt der Verfasser noch die Aufmerksamkeit der Geologen auf eine Ueberschwemmung der In-



sehn an der Schleswig'schen Küste von ungefähr 60 Fuß über dem gegenwärtigen Stand des Hochwassers. Sie scheint, seit Menschen daselbst wohnen, eingetreten zu seyn, da Gräber, zum Theil durch die Fluth zerstört, daselbst angetroffen werden.

### XIX. Ueber den mittleren Luftdruck am Meeresspiegel.

Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit, die Nothwendigkeit der Schwere-Correction beim Vergleich von Barometerständen aus verschiedenen Breiten in Erinnerung zu bringen. Ich glaubte damals, die angeführten Gründe würden mehr als hinreichend seyn, diese Nothwendigkeit einleuchtend zu machen. Dem ist aber nicht so; noch ganz neuerlich hat man sie wieder in Zweifel gezogen<sup>1)</sup>. Sey es mir daher erlaubt, hier nochmals auf den Gegenstand zurückzukommen.

Die specielle Aufgabe, welche zu der früheren Erörterung Anlaß gab, war die, den mittleren Luftdruck am Meeresspiegel unter verschiedenen Breiten mit dem unter einer bestimmten Breite zu vergleichen; allein der Hauptpunkt, auf den es hierbei ankommt, ist von dieser Aufgabe ganz unabhängig. Es handelt sich nämlich eigentlich nur darum, die Angaben des Barometers richtig auszulegen. Wir messen die *Länge* der Quecksilbersäule, und schließen daraus auf ihren *Druck*; wir setzen dabei die Länge dieser Säule ihrem Druck *proportional*, und um dieses mit Recht thun zu können, *nur darum allein* muß außer der Capillarität, der Temperatur u. s. w., auch die Schwerkraft berichtigt werden, wenn sie an den Beobachtungsorten verschieden ist, weil nur alsdann Proportionalität zwischen der Länge und dem Druck der *Quecksilbersäule* besteht. Was für ein Druck dem Druck dieser Säule das Gleichgewicht hält, ob der Druck der Atmosphäre, die Spannkraft eines eingeschlossenen Luft- oder Dampfvolums, das Gewicht einer Wassersäule oder sonst irgend ein Druck auf die Welt, kommt hierbei gar nicht in Betracht; genug ist's zu wissen, daß wir diesen Druck unter verschiedenen Breiten unrichtig müssen, wenn

1) N. Gehler'sches Wörterbuch, Bd. VI S. 1907

wir die Länge der Barometersäule ihrem Druck proportional setzten, und doch dabei die Schwerkraft unberücksichtigt ließen. Alle Betrachtungen über den Zustand der Atmosphäre und die Einwirkung der Schwerkraft auf sie, welche man früher bei der Frage über den Luftdruck in verschiedenen Breiten angestellt hat, sind, so lange es sich bloß um die Messung dieses Druckes handelt, ganz überflüssig: gerade sie haben den an sich einfachen Gegenstand verdunkelt.

Wem diese Gründe noch nicht einleuchten sollten, dem möchten wir einen Versuch vorschlagen. Der Siedpunkt einer Flüssigkeit in einem und demselben Gefäße verändert sich nur mit dem Luftdruck, nicht mit der Schwerkraft, oder nur in dem Fall, daß sie den Luftdruck änderte. Man bestimme also in unseren Breiten den Siedpunkt des Wassers bei einem gewissen Barometerstand, z. B. dem von  $336^{\circ},0$ , und wiederhole diesen Versuch unter dem Aequator bei genau demselben Barometerstand, vertheilt sich, reducirt auf gleiche Temperatur mit dem früheren. Man wird jetzt eine niedrigere Siedhitze beobachten, genau entsprechend dem Druck, welchen die  $336^{\circ},0$  hohe Quecksilbersäule anzeigt, wenn man von ihr die Schwere-Correction abzieht. Oder umgekehrt, man beobachte an beiden Orten zu gleichen Siedpunkten die zugehörigen Barometerstände; dann wird man den unter dem Aequator höher finden, genau um so viel als die Schwere-Correction beträgt.

Der Erfolg dieses Versuches darf nicht bezweifelt werden, sobald nur das Thermometer für Veränderungen von einer Hunderttheile im Barometerstande empfindlich gemacht ist, was sich bewerkstelligen läßt. Es wird auch einleuchtend seyn, daß die doppelte Messung eines gleichen Luftdrucks durch Werkzeuge, von denen das eine von der Schwerkraft afficirt wird, das andere aber nicht, ein neues Mittel darbietet, die Variationen dieser Kraft auf statischem Wege nachzuweisen, und selbst annähernd zu messen, wenn nur das Gesetz zwischen der Temperatur und der Spannkraft des Wasserdampfs, innerhalb der hiebei in Betracht kommenden Grenzen, mit hinlänglicher Genauigkeit bekannt, oder wenigstens die *Correspondenz* der Stände des Barometers und Thermometers an einem und demselben Ort empirisch sicher festgestellt wäre.

I. *Rechtfertigung der Contact-Theorie des Galvanismus; von G. Th. Fechner.*

Die vorliegende Abhandlung war vollendet, als mir die, in der Hauptsache einen gleichen Zweck verfolgende, erst kürzlich erschienene, Schrift Pfaff's: »Revision der Lehre vom Galvano-Voltaismus,« zu Händen kam. Da ich finde, daß Pfaff's Experimente und Erörterungen sich meist auf andere Seiten des Gegenstandes beziehen, als meine eigenen, so glaube ich, daß diese Abhandlung durch jene Schrift nicht überflüssig geworden ist, und daß die eine zur Ergänzung der andern dienen kann<sup>1)</sup>).

Die hauptsächlichsten Argumente, welche mit einigem Scheine gegen die Contact-Theorie und zu Gunsten der chemischen Theorie geltend gemacht werden können, sind jüngst von dem eifrigsten Verfechter der letzteren, De la Rive, in einer besondern Schrift: »*Recherches sur la cause de l'Électr. volt.* 1836.« zusammengestellt worden. Auf diese werde ich mich haupt-

1) Beiläufig bemerke ich, daß Pfaff bei seiner Darstellung zweier elektrometrischen Versuche, nach Schweigg. Journ. Bd. LIII, die von mir später in demselben Journ. Bd. LV gegebene Berichtigung übersehen hat, was auf den betreffenden Gegenstand ein falsches Licht wirft. Die Sache verhält sich, wie sie in meinem Lehrbuche des Galvanismus und in diesen Annal. Bd. XLI S. 227 dargestellt ist. In letzterer Abhandlung bitte ich, folgende Druckfehler zu verbessern: S. 226 Z. 10 v. u. beliebig st. beliebiger — S. 227 Z. 17 v. u. den st. der — S. 229 Z. 8 v. o. Glasstücken st. Glasstellen — S. 231 Z. 5 v. o. nur st. nun — S. 231 Z. 17 v. o. nachfolgende st. noch folgende — S. 232 Z. 7 v. u. daran st. davon — S. 237 Z. 2 v. o. Metallkette st. Metallplatte — S. 237 Z. 3 v. u. Nun st. nur — S. 238 Z. 10 v. o. minder st. wieder.

sichtlich beziehen, um so mehr, da sich auch die Anhänger der chemischen Theorie hauptsächlich auf De la Rive's Versuche stützen. Faraday's neuere Versuche beweisen nicht sowohl gegen die Contact-Theorie, als (wenigstens scheinbar) gegen eine Theorie, die den Ursprung der Elektricität bloß im Contact von *Metallen* unter einander sucht, worüber ich zum Schluss noch einige Worte sagen werde. Sie sind übrigens, so wie die, aus demselben Gesichtspunkt zu betrachtenden Versuche Karsten's, ausführlich von Pfaß berücksichtigt worden; um so mehr kann ich sie hier übergehen. Ich selbst habe meine eigene Meinung darüber, die ich lieber ein andermal mit Experimenten, als hier mit Worten darlegen will. Was die folgenden Versuche anlangt, so sind sie oft genug von mir wiederholt und abgeändert worden, um darin den Ausdruck von *Thatsachen*, nicht von *Zufälligkeiten* sehen zu können, von denen ich, wie ich gestehe, De la Rive's Versuche nicht ganz frei halte.

I *Thatsachen, welche die ungeschlossene Kette betreffen.*

1) Ich habe in diesen Annalen (Bd. XLI S. 225) die Mittel angegeben, die gar nicht so unbedeutende Elektricität, welche zwei heterogene Metalle durch Contact in isolirtem Zustande erhalten, mit sicherem Erfolge nachzuweisen. Die Anhänger der chemischen Theorie pflegen entweder die Sicherheit dieser Versuche zu läugnen, was hinfort unter Anwendung der von mir angegebenen Vorrichtungen nicht mehr möglich seyn wird, oder die dabei entstandene Elektricität von Reibung, Druck oder chemischem Einflusse der Luft und ihrer Feuchtigkeit abzuleiten. Es ist zu zeigen, daß hiervon der Erfolg nicht abhängen kann. Zuvor indess kann ich nicht umhin, zu bemerken, daß es mir etwas sonderbar *scheint*, der Reibung und dem Druck, die doch nur be-

sondere Modificationen des Contacts sind, das Vermögen zuzugestehen, unabhängig von chemischer Wirkung Elektricität zu erwecken, während man es dem einfachen Contact so hartnäckig abspricht. Auch die Thermoelektricität hat man nicht einmal versucht vom Chemismus abzuleiten; die Mitwirkung des Contacts ist hier unzweifelhaft.

Dass der Erfolg bei den oben erwähnten Versuchen nicht von Reibung abhängen kann, ist schon in meiner Abhandlung in diesen Annalen, Bd. XLI S. 235, unter No. 4 nachgewiesen worden. Dass er nicht von Druck abhängt, erhellt theils daraus, dass, wosern nur überhaupt der Contact gehörig vollzogen wird, was natürlich ganz ohne Druck nicht abgehen kann, eine Verstärkung des Drucks keinen deutlichen Einfluss mehr auf Verstärkung der Ausschläge äußert; theils daraus, dass nach den, in diesem Gebiete sehr ausgedehnten, Erfahrungen Becquerel's zwar alle Körper der Elektricitäts-erregung durch Druck fähig sind, mit Ausnahme jedoch gerade des Falls, wo beide an einander gedrückte Körper gute Leiter sind, in welchem Falle sie wenigstens nicht nachweisbar ist, unstreitig aus demselben Grunde, der die Elektricität durch Reibung zweier guten Leiter an einander nachzuweisen hindert. Dass aber chemische Wirkung nicht Ursache des Erfolgs seyn kann, geht indirect schon daraus hervor, dass hierdurch die Condensation der Elektricitäten an den Berührungsoberflächen durchaus nicht erklärlich seyn würde, die sich dagegen sehr wohl im Sinne der Contact-Theorie erklärt. In der That versteht sich von selbst, dass, wenn in der Berührung beider Platten eine Kraft liegt, welche die Elektricitäten, ungeachtet ihrer Anziehung zu einander, zu trennen und auf die respectiven Platten überzuführen vermag, sie auch im Stande seyn muss, dieselben bis zu einem, ihrer (der Kraft) Intensität proportionalen, Grade getrennt zu erhalten.

Sie wird somit in *diesem* Bezuge die Firnisschicht der Condensatoren vertreten. Was aber könnte nach der Ansicht, daß die entwickelte Elektricität von chemischer Wirkung (die doch an den Berührungsfächen gerade am wenigsten stattfinden kann) abhängen, das Ueberfließen der condensirten entgegengesetzten Elektricitäten in einander verhüten und die Condensation selbst überhaupt gestatten? Eine etwa supponirte Luft- oder Oxydschicht zwischen beiden kann es jedenfalls nicht, weil sich diese eben so gut der Trennung beider Elektricitäten entgegensetzen müßte; ferner müßte eine solche dann auch als Hinderniß für die Uebertragung an das Elektrometer auftreten, wo nicht einmal die Anziehung zur entgegengesetzten Elektricität den Uebergang unterstützt. Inzwischen hat De la Rive mehrere Versuche angeführt, welche direct beweisen sollen, daß Contact ohne gleichzeitige chemische Wirkung keiner Elektricitätsentwicklung fähig sey. Wir wollen ihm jetzt bei diesen Versuchen folgen.

2) Schon vorlängst hat De la Rive Versuche mitgetheilt, die er auch jetzt wieder zu Gunsten seiner Ansicht geltend macht (*Recherch. p. 57*), zufolge deren im luftleeren Raume und in ausgetrockneter Luft die Zeichen von Elektricität, welche zwei in gewöhnlicher Luft sich berührende Platten darbieten, nicht mehr eintreten. Inzwischen geht aus der Art, wie er diese Versuche angestellt, hervor, daß der negative Erfolg derselben vielmehr daher rührte, daß er den dabei angewendeten Condensator durch ganz trocknes Holz mit dem Erdboden in Verbindung setzte, und jeder kann sich überzeugen, daß auch bei Anstellung des Versuches in gewöhnlicher Luft der Condensator unter diesen Umständen seine Dienste versagt. Bekanntlich hat Pflaff schon diese Versuche früher experimental widerlegt, und hinsichtlich *neuer* Erörterungen darüber kann ich auf seine Schrift S. 20 verweisen.



3) Schon früher anderwärts und neuerdings in *z. Recherch. p. 60* hat De la Rive folgenden Versuch geltend gemacht:

„Ein Stück Kalium oder Natrium wird mit einem seiner Enden fest in eine Platinpincette befestigt, während man es am anderen Ende mit einer hölzernen oder besser elfenbeinernen Pincette faßt. Wenn man es, nachdem man es recht blank gemacht, mit ganz reinem Steinöl umgibt und den Condensator mit dem Ende der Platinpincette berührt, so nimmt man kein Zeichen von Elektricität wahr, während, wenn das Steinöl entfernt wird, so daß nichts davon um das Metall bleibt, dieses sich rasch an der Luft oxydirt und das Elektroskop eine außerordentlich lebhafteste Elektricität anzeigt. Kaum bedarf es des Condensators, sie bemerklich zu machen. Wenn man manchmal einige Anzeichen von Elektricität wahrnimmt, während Kalium und Natrium im Steinöl sind, so rührt dies daher, daß man ein wenig Feuchtigkeit mit in das Steinöl gebracht hat, welche an der Oberfläche dieser Metalle adhärirend blieb, und auf sie eine leicht wahrzunehmende chemische Wirkung äußert. In Stickstoff und Wasserstoff haben beide Metalle auch eine Elektricitätsentwicklung hervorgebracht, wegen der chemischen Wirkung, welche diese Gasarten entweder an sich oder vermöge der Wasserdämpfe, wovon es unmöglich ist sie zu befreien, ( ) darauf äußern; und zum Beweise dieser chemischen Wirkung sieht man ihre Oberfläche den Metallglanz verlieren und glanzlos werden, ungefähr eben so wie in der atmosphärischen Luft.“

Das Ergebnis, was mich eine Wiederholung dieses Versuches hat ziehen lassen, ist dieses, daß er in der von De la Rive angewendeten Form überhaupt untauglich ist, einen Beweis für die eine oder die andere Ansicht zu geben, weil nämlich das Kalium, mittelst trocknen Holzes mit der Erde in Verbindung gesetzt, weder außer noch in dem Steinöl eine Elektricitätsentwicklung

am Condensator zu erkennen giebt, was sich nach beiden Ansichten aus der Eigenthümlichkeit des Condensators erklärt, mittelst *feuchten* Holzes aber mit ihm in Verbindung gesetzt, gleich starke Wirkung in und ausser dem Steinöl giebt, was der Anhänger der chemischen Ansicht aus der durch die Feuchtigkeit eingeleiteten chemischen Wirkung, der Anhänger der Contact-Theorie aus dem erhöhten Leitungsvermögen des Holzes erklären kann, für dessen Einfluss hierbei übrigens in dem folgenden Detail hinreichende Bewährung enthalten ist. Es lässt sich aber in der That der Versuch so abändern, dass er entscheidend wird, und in dieser Form spricht er, wie man sehen wird, *gegen* die chemische Theorie. Das Nähere der Versuche ist in Folgendem enthalten.

Eine Kaliumkugel wurde an zwei einander gegenüber befindlichen Stellen mit frischen Schnittflächen versehen; in die eine Schnittfläche ein Ende eines Platindrahts, in die andere das Ende eines lufttrocknen Holzstäbchens gesteckt, so dass sich die Kaliumkugel zwischen beiden befand, nun der (bald messingene, bald kupferne) sehr empfindliche Condensator, der mit dem von mir in diesen Annalen beschriebenen Elektroskop mit trockner Säule in Verbindung stand, mit dem Platin berührt, während das Holz mit der Hand gefasst ward. Ich konnte, bei der bekannten Manipulation mit dem Condensator, keine oder durchaus nur höchst unbedeutende Spuren Elektricität wahrnehmen. Dem Holze ward ein zugeschnittener Span aus einer Federspule substituiert und das Resultat war dasselbe. Wenn ich dagegen die Kaliumkugel unmittelbar mit der Hand fasste und den Condensator mit dem Platin berührte, so wurde ein Ausschlag des Goldblatts von bemerkenswerther Heftigkeit erhalten <sup>1)</sup> ohne Vergleich stärker, als man gewohnt ist, ihn mit Zink zu erhalten (er qualificirt sich hierdurch

1) Diefes war selbst dann der Fall, wenn die Kaliumkugel von anhängendem Steinöl nicht gereinigt wurde, und überhaupt kann

gut zu einem Collegienversuche). Dasselbe war der Fall, wenn ich das Holzstäbchen nach zuvoriger schwacher Befeuchtung desselben anfasste, und in letzterem Falle war es für die Wirkung ganz gleichgültig, ob das Kalium dabei unter Steinöl lag oder nicht. Ich musz hier nach vermuthen, dasz De la Rive, weil er außerhalb des Steinöls einen Erfolg, innerhalb des Steinöls aber keinen Erfolg erhielt, bloß innerhalb des Steinöls die leitende Verbindung mit dem Boden durch Holz oder Elfenbein herstellte, außerhalb des Steinöls aber durch einen mehr feuchten Leiter; widrigenfalls würde ein directer Widerspruch zwischen meinen und seinen Beobachtungen stattfinden. Man wird wohl glauben, da mir dieser Widerspruch nicht entgangen ist, dasz ich den Versuch oft genug wiederholte und in der Form abgeändert habe, um überzeugt zu seyn, dasz bei einer Wiederholung desselben von andern Seiten das Recht auf meiner Seite bleiben wird.

Es blieb nun zu untersuchen, ob der fehlende Ausschlag bei Anwendung lufttrockenen Holzes von mangelndem Leitungsvermögen des Holzes, oder von mangelnder chemischer Wirkung abhing. Denn allerdings ließ sich nicht läugnen, dasz, wenn die Kaliumkugel direct mit den Händen, oder mittelst des feuchten Holzstäbchen angefaßt ward, die Feuchtigkeit derselben chemisch darauf einwirken muszte, was auch, wenn der Versuch unter Steinöl angestellt ward, durch die, von der Einfügungsstelle des schwach feuchten Holzstäbchens aufsteigenden Gasbläschen erkannt werden konnte. Folgender Versuch nun, directer als alle, welche De la Rive in diesem Bezuge mittheilt, beweist ganz entschieden, dasz das schlechte Leitungsvermögen des lufttrockenen Holzes allein wenigstens *hinreicht*, den Nichter-

ich nach meinen Versuchen die Ansicht von Ohm und Pfaff nicht theilen, dasz eine isolirende Zwischenschicht von Steinöl bei De la Rive's Versuche im Spiele gewesen.

folg zu erklären. Wenn ich bloß die eine, mit dem Kalium in Verbindung stehende, Hälfte des Stübchens, und namentlich auch die Einfügungsstelle desselben in das Kalium eben so gut, als bei den vorigen Versuchen, wo ein Erfolg stattfand, befeuchtete, während der Berührung des Condensators mit dem Platin aber das Holz an der lufttrocken gebliebenen Hälfte anfaßte, wurde das frühere negative Resultat erhalten; ja dies war selbst dann der Fall, wenn ich unter Anwendung dieser Angriffsweise das Kalium während der Berührung des Condensators mit saurem Wasser befeuchtete, so daß eine explosivartige chemische Wirkung entstand <sup>1)</sup>. Hierdurch ist das, für dergleichen Versuche ganz ungenügende, Leitungsvermögen lufttrocknen Holzes zur Genüge dargethan, und Jeder kann sich ganz einfach, auch ohne Kalium, davon überzeugen, wenn er dem Kalium Zink substituirt, wo die Erscheinungen bei gleichgelgender Anordnung ganz eben so ausfallen.

Man sieht also, daß De la Rive's Versuch unter Steinöl nach der Art, wie er ihn beschreibt, nicht gelingen konnte, weder nach der chemischen, noch nach der Contact-Theorie, daß er also überhaupt nichts beweist.

Ich bin aber im Stande gewesen, diese Versuche so abzuändern, daß ein Beweis daraus gegen die chemische Theorie gezogen werden kann.

Bei der außerordentlichen Lebhaftigkeit, mit welcher der Ausschlag erfolgte, wenn das am Condensator mittelst eines Platindrathes, oder auch durch directe Berührung (denn in der That ist das Platin hierbei ganz unwesentlich) angebrachte Kalium mit dem Boden durch einen feuchten Leiter in Verbindung stand, und bei der ausnehmenden Empfindlichkeit des mir zu Gebote stehenden Elektrometers mit trockner Säule schien es mir

1) Fig 6 Taf. III versinnlicht diese kleine Vorrichtung. *K* ist die Kaliumkugel, *P* der Platindrath, *H* der Holzstab, *f* der feuchte und *t* der trockne Theil desselben.

nicht unwahrscheinlich, daß selbst ohne Condensator durch die Berührung eines negativen Metalls mit Kalium ein Ausschlag entstehen würde. Dieser Versuch ist vollständig gelungen. Wurde der Messingstift, von welchem das Goldblatt des Elektrometers herabhängt, direct oder auch unter Zwischeneinbringung eines lufttrocknen Streifchens Papier oder Leinwand, welche viel besser zu leiten schienen, als lufttrocknes Holz, mit dem Platindraht der Kaliumkugel berührt, während die Kaliumkugel unmittelbar mit der Hand, oder an einem schwach feuchten Holzstäbchen gefaßt ward, so war, wenn das Goldblatt sichere Stabilität hatte, ein allerdings schwacher, aber unverkennbarer, negativ elektrischer Ausschlag wahrzunehmen, und eben so ein positiv elektrischer, wenn ich unter Umkehrung der Combination den Platindraht mit den Fingern faßte und das Elektroskop, unter Zwischenwirkung des lufttrocknen Zwischenleiters, oder auch nur einer am Kalium gebildeten Oxydschicht, mit dem Kalium berührte. Durch die vielfaltigen Gegenversuche, indem ich das Elektroskop theils mit isolirtem, theils nicht isolirtem Platin, *ohne Mitwirkung von Kalium*, berührte, überzeugte ich mich, daß in der That kein Ausschlag des Elektrometers durch solche Berührungen hervorgerufen wurde, der Contact des Kaliums mithin wesentlich war; und solche Gegenversuche sind auch bei den nachfolgenden Versuchen nicht vernachlässigt worden.

Bei der Deutlichkeit der erhaltenen Anzeigen (die bis hieher noch keinen Einwand gegen die chemische Theorie begründen) schien es mir nicht unmöglich, auch bei gänzlicher Isolirung des Kaliums noch Anzeichen von Elektricität wahrnehmbar zu machen, und so allen Einfluß von Feuchtigkeitz zu beseitigen. Der Condensator kann unter diesen Verhältnissen aus bekannten Gründen nicht angewendet werden; andererseits stand freilich auch dem Erfolge der Anwendung einer hiervon nicht unterstützten elektrometrischen Vorrichtung die Schwier-

rigkeit entgegen, daß die Intensität der Elektricität sich auf zwei einander berührenden heterogenen Platten umgekehrt wie ihre Oberflächengrößen oder Ableitungsgrößen verhält, mithin, wenn die Oberfläche des Elektrometers beträchtlich größer als die des Kaliums, überdies jenes nicht sehr gut isolirt ist, kein Erfolg zu erwarten steht. In der That konnte ich, wenn ich das Kalium in einer trocknen Isolirpincette faßte, und mit dem Platindrachte des Kaliums mein Elektrometer berührte, die früher mit völliger Bestimmtheit wahrgenommene Zeichen von Elektricität nicht mehr erhalten. Auf folgende Weise indess ist auch dieser meine Versuch völlig gelungen. Ich ließ ein Elektrometer absichtlich mit kleinstmöglicher Oberfläche verfertigen, bestehend bloß aus einem sehr dünnen und kurzen Messingdraht, welcher, als Axe eines ihn umgebenden Gummilackeylinders, durch den durchbohrten Boden eines umgekehrten Trinkglases hindurchging, und von welchem innerhalb des Glases ein sehr schmales,  $2\frac{1}{4}$  Zoll langes Goldblatt zwischen die Polplatten der Säule des Elektrometers herabhängt, während an das außerhalb des Glases vortragende Ende des Messings die Elektricität übertragen werden konnte. In die Kaliumkugel ward ein dünner Platindrath, so kurz, als es die Bequemlichkeit der Uebertragung der Elektricität erlaubte, eingeklebt, und die Kugel selbst, zu Vergrößerung ihrer Oberfläche, zwischen zwei, mit Steinöl geölteten Kupferplatten so glatt gepreßt, als es geschehen konnte, ohne durch den Platindrath die Kaliumschicht zu durchschneiden. So mochte das ganze Elektrometer nur etwa die doppelte Oberflächengröße vom Kalium haben <sup>1)</sup>).

Nach so getroffener Vorrichtung wurden nun die vorigen Versuche erst in der Luft wiederholt, indem da-

1) Ich versuchte mehrere Kaliumkugeln durch Druck zu vereinigen, was aber wegen des anhängenden Steinöls, oder sofort an frischen Schnittflächen sich bildenden Oxyds, nicht gelang.



bei bald das Kalium, bald das Platin mit der Isolirpinzette gefasst, und das andere Metall jedesmal mit dem Elektroskop in Verbindung gesetzt ward. Ein deutlicher entgegengesetzter Ausschlag des Goldblatts konnte hier noch mit völliger Bestimmtheit beobachtet werden, so wie sich diese Vorrichtung auch, wenn die Combination von Platin und Kalium nicht isolirt war, viel empfindlicher zeigte, als die vorher angewandte, und ohne Condensator die deutlichsten (bei entgegengesetzter Anbringung die entgegengesetzten) Ausschläge gab, die leicht bis zum Anschlagen des Goldblatts an die Polplatten getrieben werden konnten, wenn diese nur eben so weit ( $7\frac{1}{2}$  Lin.) von einander entfernt wurden, als zur Stabilität des Goldblatts hinreichend war. Ich setzte jetzt die Kaliumscheibe mit dem daraus hervorragenden, aufwärts gehobenen Drahte in ein kleines Gläschen, übergoss sie etwa einen halben Zoll hoch mit Steinöl, und entlud nun, während ich das Gläschen mit der Hand faßte, den aus dem Steinöl vorragenden (das Glas nirgends berührenden) Platindraht am Elektrometer. *Der Ausschlag nach der Seite, welcher die negative Elektricität anzeigt, erfolgte hier ganz eben so constant, deutlich und bestimmt, als wenn sich das Kalium isolirt in der Luft befand.* Dafs die nöthigen Gegenversuche hierbei nicht vernachlässigt wurden, ward schon oben erwähnt.

Den Erfolg dieses Versuches im Sinne der chemischen Theorie zu deuten, scheinen sich noch folgende Wege darzubieten:

a) Es wurde mit dem Kalium etwas Feuchtigkeit in das Steinöl eingeführt, dessen chemische Wirkung den Erfolg bedingte.

b) Das Steinöl war vielleicht verfälscht, und noch einer chemischen Wirkung auf das Kalium fähig.

Was nun *a* anlangt, so hat dieser Einwand für den ersten Anblick Einiges für sich, indem man in der That,

rigkeit entgegen, daß die Intensität der Elektricität sich auf zwei einander berührenden heterogenen Platten umgekehrt wie ihre Oberflächengrößen oder Ableitungsgrößen verhält, mithin, wenn die Oberfläche des Elektrometers beträchtlich größer als die des Kaliums, überdies jenes nicht sehr gut isolirt ist, kein Erfolg zu erwarten steht. In der That konnte ich, wenn ich das Kalium in einer trocknen Isolirpincette faßte, und mit dem Platindrachte des Kaliums mein Elektrometer berührte, die früher mit völliger Bestimmtheit wahrgenommene Zeichen von Elektricität nicht mehr erhalten. Auf folgende Weise indess ist auch dieser meine Versuch völlig gelungen. Ich ließ ein Elektrometer absichtlich mit kleinstmöglicher Oberfläche verfertigen, bestehend bloß aus einem sehr dünnen und kurzen Messingdraht, welcher, als Axe eines ihn umgebenden Gummilackcylinders, durch den durchbohrten Boden eines umgekehrten Trinkglases hindurchging, und von welchem innerhalb des Glases ein sehr schmales,  $2\frac{1}{4}$  Zoll langes Goldblatt zwischen die Polplatten der Säule des Elektrometers herabhing, während an das außerhalb des Glases vorragende Ende des Messings die Elektricität übertragen werden konnte. In die Kaliumkugel ward ein dünner Platindraht, so kurz, als es die Bequemlichkeit der Uebertragung der Elektricität erlaubte, eingefügt, und die Kugel selbst, zu Vergrößerung ihrer Oberfläche, zwischen zwei, mit Steinöl geätzten Kupferplatten so glatt gepresst, als es geschehen konnte, ohne durch den Platindraht die Kaliumscheide zu durchschneiden. So mochte das ganze Elektrometer nur etwa die doppelte Oberflächengröße vom Kalium haben <sup>1)</sup>).

Nach so getroffener Vorrichtung wurden nun die vorigen Versuche erst in der Luft wiederholt, indem da-

- 1) Ich versuchte mehrere Kaliumkugeln durch Druck zu vereinigen, was aber wegen des anhängenden Steinöls, oder sofort an freischen Oberflächen sich bildenden Oxyds, nicht gelang.

bei bald das Kalium, bald das Platin mit der Isolirpinzette gefasst, und das andere Metall jedesmal mit dem Elektroskop in Verbindung gesetzt ward. Ein deutlicher entgegengesetzter Ausschlag des Goldblatts konnte hier noch mit völliger Bestimmtheit beobachtet werden, so wie sich diese Vorrichtung auch, wenn die Combination von Platin und Kalium nicht isolirt war, viel empfindlicher zeigte, als die vorher angewandte, und ohne Condensator die deutlichsten (bei entgegengesetzter Anbringung die entgegengesetzten) Ausschläge gab, die leicht bis zum Ausschlagen des Goldblatts an die Polplatten getrieben werden konnten, wenn diese nur eben so weit ( $7\frac{1}{2}$  Lin.) von einander entfernt wurden, als zur Stabilität des Goldblatts hinreichend war. Ich setzte jetzt die Kaliumschreibe mit dem daraus hervorragenden, aufwärts gebogenen Drahte in ein kleines Gläschen, übergoss sie etwa einen halben Zoll hoch mit Steinöl, und entlud nun, während ich das Gläschen mit der Hand faßte, den aus dem Steinöl vorragenden (das Glas nirgends berührenden) Platindraht am Elektrometer. *Der Ausschlag nach der Seite, welcher die negative Elektricität anzeigt, erfolgte hier ganz eben so constant, deutlich und bestimmt, als wenn sich das Kalium isolirt in der Luft befand.* Dafs die nöthigen Gegenversuche hierbei nicht vernachlässigt wurden, ward schon oben erwähnt.

Den Erfolg dieses Versuches im Sinne der chemischen Theorie zu deuten, scheinen sich noch folgende Wege darzubieten:

a) Es wurde mit dem Kalium etwas Feuchtigkeit in das Steinöl eingeführt, dessen chemische Wirkung den Erfolg bedingte.

b) Das Steinöl war vielleicht verfälscht, und noch einer chemischen Wirkung auf das Kalium fähig.

Was nun *a* anlangt, so hat dieser Einwand für den ersten Anblick Einiges für sich, indem man in der That,

wenn man das Kalium aus der Luft in Steinöl einführt, einige Zeit hindurch noch einige Gasblasen von dem Kalium aufsteigen sieht, welche unstreitig von einer chemischen Einwirkung anhängender Feuchtigkeit abhängen. Allein diese Gasentwicklung ist in Kurzem beendigt; und lange nachdem sie *gänzlich* verschwunden ist, noch 21 Stunden nachher, während welcher Zeit das Kalium stets unter dem Steinöl untergetaucht blieb (später habe ich nicht mehr beobachtet), habe ich die elektrischen Zeichen im Steinöl *noch ganz in derselben Stärke* wahrgenommen, als während der Gasentwicklung und als in der Luft selbst, so daß dieser Einwand hierdurch völlig unhaltbar wird.

Den Einwand *b* anlangend, so war das angewandte Steinöl ein solches, in welchem sich das Kalium schon viele Jahre hindurch aufbewahrt fand, ohne weiter als an seiner Oberfläche glanzlos zu seyn; während ein Sauerstoffgehalt des Oels eine allmähige Zerstörung des Kaliums hätte hervorbringen müssen; und wenn ja das Oel anfangs etwas Sauerstoff enthielt, so müßte dieser während der langen Aufbewahrung des Kaliums gewiß verzehrt worden seyn, so daß ich auch diesen zweiten Einwand für vollständig widerlegt ansehe.

4) Ein Versuch, auf den De la Rive besonders Gewicht zu legen scheint, da er sich an verschiedenen Orten darauf bezieht, ist folgender (*Recherch. p. 67*):

»Ich nahm zwei Zinkplatten, die in den Dimensionen ganz gleich waren den Messingplatten eines Condensators, löthete an jede einen Stift (*bout*) von Messing, bedeckte ihre innere Fläche mit einer dünnen Schicht Gummilackfirnis, so daß sie die Stelle von Condensatorplatten vertreten konnten, und überzog außerdem auch die äußere Fläche der einen Zinkplatte mit einer Schicht desselben Firnisses, so daß diese Scheibe *zu keinem ihrer Punkte in unmittelbarer Berührung mit der Luft war*. Es wurden nun verschiedene Versuche

angestellt, indem der Condensator bald aus den beiden Zinkplatten, bald bloß aus einer Zinkplatte mit einer Messingplatte hergestellt wurde. Wenn die Zinkplatte, deren ich mich bediente, völlig mit Firniß überzogen war, so erhielt ich stets viel milder starke Zeichen von Elektricität, als bei Anwendung von derjenigen, deren äußere Oberfläche ganz bloß und dem directen Luftzutritt ausgesetzt war. Da ich vermuthete, daß die, allerdings nur sehr schwache Elektricität, welche mit der ganz überfirnißten Zinkplatte erhalten wurde, davon abhing, daß die Firnißschicht zu dünn war, um alle chemische Wirkung der Luft und Feuchtigkeit vollständig zu hindern, so vermehrte ich successiv die Dicke dieser Schicht, und gelangte dahin, sie so dick zu machen, daß die Platte aufhörte Zeichen von Elektricität zu geben. Ein Beweis übrigens, daß die (vorher) beobachtete Elektricitätsentwicklung wirklich noch von einer chemischen Einwirkung der feuchten Luft, welche sich durch den Firniß hindurch auf das Zink äußerte, abhing, lag darin, daß man nach sehr kurzer Zeit eine anfangende Oxydation auf der Oberfläche des Zinks wahrnahm. — Man sieht also, daß, wenn eine Zinkplatte mittelst einer (hinreichend dicken) Firnißschicht vor dem Einfluß der Luft und anderer Agentien, die eine chemische Wirkung darauf äußern können, ganz geschützt ist, dieselbe in Berührung mit einem Messingstift nicht elektrisch wird. Noch mehr, dieser wirkungslose Apparat erhält sich wie eine homogene Messingplatte. So, wenn ich den an die Oberfläche des Zinks gelötheten Messingstift mit dem Kupfer eines Elektromotors berührte, dessen Zink in der Hand gehalten wurde, gelangte ich dahin, ihn mit negativer Elektricität zu laden; während nach der Contact-Theorie kein Erfolg hätte statthaben können. Ein vielleicht noch frappanteres Phänomen derselben Art konnte man erhalten, wenn man beide Zinkplatten zum Condensator vereinigte, indem man die daran gelötheten

für letzteren Fall Zink, sowohl ungefirnißt, als auch mit einer dicken Lage Firnißs überzogen (so daß auch die Verbindungsstelle des Zinks mit dem Platin auf das Genaueste verstrichen war), angewandt, und in beiden Fällen nicht merklich verschiedene Resultate (einen nämlich merklich gleich starken negativen Ausschlag) erhalten. Die Zinkplatte war groß genug, daß die Oberfläche des Elektrometers gegen sie nicht sehr in Betracht kam. Zum Gelingen dieses Versuches müssen die Polplatten so nahe gestellt seyn, als es mit der Stabilität des Goldblatts nur eben verträglich ist.

5) De la Rive macht geltend (*Recherches* p. 66), daß Becquerel mittelst empfindlicher Apparate nach dem Verfahren, welches ich in meiner Abhandlung in diesen Annal. Bd. XII S. 226, das zweite genannt habe, unter Anwendung eines vergoldeten Condensators doch nicht die schwächste Spur von Elektricitätsentwicklung zwischen Gold und Platin nachzuweisen vermochte (*Ann. de chim. et de phys.* XLII, p. 292, oder *Traité de l'Electr.* T. II p. 137), und wüßte dies der fehlenden chemischen Einwirkung der Luft auf beide Metalle bei; da in der That Versuche mit dem Multiplicator unter Anwendung einer, diese Metalle angreifenden Flüssigkeit zeigen, daß ihre Verbindung elektrischer Erregung fähig ist. Hiergegen ist zu erwiedern, daß ein nur mäßig empfindlicher Multiplicator ein ohne Vergleich empfindlicheres Instrument zur Nachweisung der schwächsten Elektricitätsspuren ist, als der empfindlichste Condensator; daher bei dem unstreitig nur sehr schwachen elektromotorischen Gegensatze des Goldes und Platins, für den ihr chemisches Verhalten selbst spricht, wohl erklärlich ist, daß das eine Instrument eine Wirkung noch anzeigt, wo das andere eine solche versagt. Die Becquerel'sche negative Erfahrung verliert vollends alles Gewicht dadurch, daß Becquerel bei derselben Versuchsreihe fand, daß Graphit und einige andere Körper, auf die



die ein chemischer Einfluss der Luft nicht nachweisbar ist, einer durch den Condensator deutlich erkennbaren Elektricitätsentwicklung mit Gold fähig sind, auch nachdem sie zuvor mit destillirtem Wasser gewaschen worden, und ich selbst habe schon früher der Elektricitätsentwicklung zwischen Silber und Gold, die in schwachem Grade selbst ohne Condensator nachweisbar ist, gedacht. Wenn freilich De la Rive auch in allen diesen Fällen eine chemische Wirkung *supponirt*, so habe ich bloß die Bemerkung zu machen, daß es auch erlaubt seyn muß, in allen Fällen eine elektrische Wirkung zu supponiren, wo sie nicht nachweisbar ist, wofern sie nur besser zur Contact-Theorie paßt.

6) Biot hat sich vorlängst überzeugt, daß Säulen, aus gleich viel Plattenpaaren, mit Flüssigkeiten von sehr verschiedener chemischer Einwirkung aufgebaut, als Wasser, Auflösung von Kochsalz, von Salmiak, von chlorsaurem Kali, von Eisenvitriol, dieselbe Intensität der Pole am Elektrometer zeigten. Wenn einige Flüssigkeiten, wie Natronlösung, Ausnahmen zeigten (die im Sinne der Contact-Theorie durch eine Veränderung der metallischen Oberflächen erklärlich werden), so sind diese wenigstens nicht von der Art, daß sie zu Gunsten der chemischen Theorie sprechen. De la Rive selbst hat ähnliche Betrachtungen gemacht (*Rech. p. 142*), indem er fand, daß Säulen aus gleich viel Paaren, mit Flußwasser, Glaubersalzlösung und sehr verdünnter Salpetersäure geschichtet, gleiche Stärke der Elektricität am isolirten Pole zeigen, wofern (wie dies auch bei Biot's Versuchen der Fall war) der andere Pol mit dem Boden in Verbindung steht; sind dagegen beide Pole isolirt, so findet ein Unterschied statt, und die verdünnte Salpetersäure giebt die schwächsten, oft ganz verschwindende elektrische Anzeichen.

Um nun die, für den ersten Anschein offenbar der chemischen Theorie widersprechende, Gleichheit der Kraft

bei Aufbau der Säule mit verschiedenen Flüssigkeiten (im Fall der Nichtisolirung) zu erklären, nimmt De la Rive an, es werde zwar durch die stärker eingreifenden Flüssigkeiten mehr Elektricität entwickelt, aber von den sich entwickelnden entgegengesetzten Elektricitäten vereinige sich immer wieder ein Antheil durch die Glieder der Säule selbst hindurch. Da nun die Flüssigkeiten von stärkerer chemischer Wirkung im Allgemeinen auch ein besseres Leitungsvermögen besitzen, so gestatten sie auch eine schnellere Wiedervereinigung, und hierdurch sey erklärlich, daß der freibleibende Antheil Elektricität doch bei ihnen nicht stärker ausfalle, als bei den schwächer wirkenden Flüssigkeiten. Abgesehen von anderen Einwürfen indeß, die sich dieser Ansicht machen lassen, so wäre es doch sonderbar, wenn diese Compensation bei den verschiedensten Flüssigkeiten gerade bis zur Gleichheit der Wirkungen gehen sollte, um so mehr, da das Leitungsvermögen der flüssigen Glieder der Säule auch mit von ihren Dimensionen abhängt, mithin die Compensation nur bei einer einzigen Dicke der flüssigen Schichten genau seyn könnte. Bei der Contact-Theorie geht die Gleichheit der Intensität nicht isolirter Säulen beim Aufbau mit verschiedenen Flüssigkeiten (in sofern sie nicht die metallischen Oberflächen ändern) begreiflich als natürliche Folgerung ohne alle Hülfs-hypothese hervor. Die verschiedene Wirkung der isolirten Säule ist noch räthselhaft, könnte aber möglicherweise darauf beruhen, daß bei schlechtleitender Flüssigkeit die Ableitungsgröße der Säule wohl größer wird, da dann wahrscheinlich die Elektricität auch zwischen Flüssigkeit und Metallfläche eindringt, was weniger der Fall seyn möchte, wenn das Leitungsvermögen der Flüssigkeit sich dem der Metalle mehr nähert; ein Gegenstand, über den übrigens specielle Versuche noch wünschenswerth wären.

II. Thatsachen, welche die geschlossene Kette betreffen.

1) Nach der Contact-Theorie scheint es, müßte Eisen, was sich gegen Kupfer in Berührung mit Wasser oder verdünnten Säuren positiv elektrisch zeigt, auch in allen anderen Flüssigkeiten positiv elektrisch dagegen seyn, es verhält sich aber in Schwefelleberlösung negativ dagegen. Diesem Beispiel lassen sich andere zur Seite setzen, wo sich ebenfalls das elektromotorische Verhältniß der Metalle nach Beschaffenheit der Zwischenflüssigkeit ändert, z. B. von Zinn und Kupfer ist es in Ammoniakflüssigkeit das entgegengesetzte von dem in reinem Wasser, und von Kupfer und Blei in concentrirter Salpetersäure das entgegengesetzte von dem in verdünnter Salpetersäure, was zugleich den Einwand beseitigt, als wenn die verschiedene elektromotorische Wirkung der verschiedenen Flüssigkeiten auf die Metalle selbst eine scheinbare Umkehrung der Polarität hervorrufen könnte, da in letzterem Beispiele die Flüssigkeit, abgesehen vom Concentrationsgrade, dieselbe bleibt. Nach der chemischen Ansicht erklären sich alle diese Fälle leicht aus dem allgemeinen Satze, daß das von der Flüssigkeit stärker angegriffene Metall stets das positivere ist. (De la Rive in *a. Recherch. p. 7.*)

Diesen Einwand glaube ich in einer ausführlichen, die Polaritätsumkehrungen der Kette betreffenden, Abhandlung, die De la Rive'n unstreitig unbekannt geblieben ist, genügend berücksichtigt zu haben <sup>1)</sup>. Ich habe gezeigt, daß, wenn das Kupfer in Schwefelleberlösung positiv gegen Eisen wird, dies auf einer (selbst dem Auge sichtbaren) Veränderung seiner Oberfläche beruht, die in concentrirter Schwefelleberlösung sofort beim Eintauchen, in verdünnter allmählig erfolgt, woher denn auch in verdünnter Lösung erst der normale Aus-

1) Schweigg. Journ. Bd. LIII S. 61. 129, oder Biot's Lehrbuch, Bd. III S. 93.

Ausschlag des Multiplicators erfolgt, der erst allmählig in den entgegengesetzten übergeht. Auch zeigt sich das in Schwefelleberlösung veränderte Kupfer dann in anderen Flüssigkeiten positiv gegen Eisen. Ich habe ferner nachgewiesen, daß auch in anderen concentrirten Flüssigkeiten und bei anderen Metallen, wo ein dem gewöhnlichen entgegengesetztes elektromotorisches Verhalten beobachtet wird, sich im Allgemeinen ein gewisser Verdünnungsgrad der Flüssigkeit finden läßt, unterhalb dessen die Metalle anfangs das normale Verhalten zeigen, was dann allmählig in das entgegengesetzte übergeht (wosern der Verdünnungsgrad nicht zu stark ist), was ebenfalls für eine, allerdings nicht allenthalben durch unmittelbare Anschauung nachweisbare, allmählig erfolgende Oberflächenänderung der Metalle spricht; denn daß die Aenderung der Flüssigkeit hierbei nicht in Betracht kommt, habe ich durch anderweite Versuche gezeigt. Wenn übrigens das positive Metall zugleich stets das stärker angegriffene ist, so entscheidet diese Coincidenz zweier Umstände begreiflich gar nichts darüber, welcher von beiden als die Ursach des anderen zu betrachten sey.

Da übrigens unter den, in meiner Abhandlung enthaltenen Fällen, die, oben speciell von De la Rive gemachten, Falle des umgekehrten Verhaltens von Zinn und Kupfer in Ammoniak, und von Blei und Kupfer in starker Salpetersäure gerade nicht enthalten waren, so habe ich mich neuerdings noch speciell überzeugt, daß in der That, wenn man Zinn und Kupfer in officineller Ammoniakflüssigkeit, Blei und Kupfer in rauchender Salpetersäure schließt, selbst wenn diese Flüssigkeiten nicht verdünnt sind, der Ausschlag anfangs das normale positive Verhalten respective des Zinns und Bleis anzeigt, was aber in Kurzem (im Maasse als die Veränderung der Metalle von Statten geht) in das entgegengesetzte übergeht. Auch noch durch andere Versuche läßt sich *die stattfindende Aenderung der Metalle in diesen Flüs-*

sigkeiten nachweisen, die ich inzwischen hier übergebe, da sie besser anderwärts im Zusammenhange vorgetragen werden.

Ueberhaupt sind die Änderungen, welche die Flüssigkeiten an den Metallen hervorzubringen vermögen, bei weitem noch nicht genug gewürdigt und studirt, und ich werde hierauf noch öfter in dieser Abhandlung und ausführlicher bei einer anderen Gelegenheit zurückkommen. Alle Versuche, die Pfaff, Karsten, Becquerel u. A. über die Elektricitäts-erregung zwischen flüssigen und festen Körpern angestellt haben, sind mindestens *compliqué* durch diese Veränderungen, und erfordern eine Revision in Bezug darauf. Es wäre sogar nicht unmöglich, daß der Erfolg dieser Versuche *bloß* von solchen Veränderungen abhinge. Fernere Versuche werden mir hoffentlich bald darüber Aufschluß geben.

2) Schönbein theilt in diesen Annalen (Bd. XXXIX S. 351) einen Versuch mit, den er für besonders schlagend zu Gunsten der chemischen Theorie hält, und der wesentlich darauf zurückkommt, daß ein Eisendraht, der durch zuvoriges Eintauchen in Salpetersäure in den sogenannten passiven Zustand versetzt worden ist, mit einem Platindraht in Kupfervitriollösung zur Kette geschlossen, indem er kein Kupfer fällt, auch keinen Strom giebt, daß aber sofort ein Strom entsteht, wenn man durch eine beliebige Ursache die Passivität des Drahts aufhoben, d. h. seine chemische Wirksamkeit wieder herstellt hat.

Ueber diesen Versuch ist Folgendes zu sagen:

Es ist durch frühere Versuche von Wetzlar und von mir selbst zur Genüge dargethan, daß die (im Sinne der chemischen Theorie eben sowohl als im Sinne der Contact-Theorie unerklärte) Veränderung, welche das Eisen in Salpetersäure und starker salpetersaurer Silberauflösung erfährt, dasselbe beträchtlich negativer macht, als vorher. Daß nun ein sehr negatives Metall weder

Kupfer fällt, noch mit Platin einen bemerklichen Strom giebt (zumal wenn man die Metalle in Form von Drähten und einen Multiplicator von wenig Empfindlichkeit anwendet), wird gewiss Niemand mit der Contact-Theorie unvereinbar finden, und eben so wenig, daß ein Strom zugleich mit der Kupferfällung wieder eintritt, wenn man durch irgend eine Ursache jene Oberflächen-änderung des Eisens beseitigt. Wo liegt der Beweis, daß die Kupferfällung nicht vielmehr Folge als Ursach der wiederhergestellten elektrischen Wirkung sey. Noch überdies wäre es möglich, daß die eigenthümliche Veränderung, welche das Eisen in Salpetersäure erfährt, auch seinen Uebergangswiderstand erhöhte. (Vergl. unten No. 3.) Ich kann daher in diesem Versuche nicht das geringste Beweisende finden.

Aus gleichem Gesichtspunkte ist der Versuch zu betrachten, den De la Rive in diesen Annalen, Bd. XI, S. 368, mittheilt. Wenn ich sage, daß Eisen auch in Kalilauge eine Veränderung der Art erleidet, daß es dadurch beträchtlich negativer wird, als vorher, so erklärt sich wohl hiermit alles dort Angeführte, wenngleich die Veränderung des Eisens selbst noch einer Erklärung bedarf, nicht minder nach der chemischen, als nach der Contact-Theorie. Einen Beweis dieser Veränderung kann man unter andern darin finden, daß Eisen, mit Kupfer in Kalilauge zur Kette geschlossen, zwar erst den normalen Ausschlag des Multiplicators, welcher Ausschlag Eisen positiv erscheinen läßt, giebt, welcher sich aber in Kurzem umkehrt. Daß übrigens Eisen mit Platin in Kalilauge keinen Strom gäbe, habe ich nicht bestätigt finden können. Er war bei Anwendung eines allerdings empfindlichen Multiplicators stark genug, um die Doppelnadel fast senkrecht auf die Windungen zu stellen.

3) Folgende Erfahrungen gehören zu denen, welche für den ersten Anblick am schlagendsten zu Gunsten der chemischen Theorie sprechen, und auf welche



die Anhänger derselben besonders Gewicht legen. Zink mit Kupfer giebt eben sowohl in destillirtem Wasser als in concentrirter Schwefelsäure geschlossen nur schwache elektrische Strömung, in verdünnter Schwefelsäure, also einer Mischung beider Flüssigkeiten, sehr starke. Da es nun nicht wahrscheinlich ist, daß das eigenthümliche Leitungsvermögen der Flüssigkeiten durch ihre Vermischung abgeändert wird, so bleibt (nach den Anhängern der chemischen Theorie) nichts übrig, als der mit Verdünnung der Schwefelsäure eintretenden verstärkten chemischen Wirkung und dadurch vermehrten Elektricitätsentwicklung den verstärkten Strom beizumessen. Aehnlich ist folgende Erfahrung: Platin mit Gold giebt sowohl in reiner Salpetersäure, als in reiner Salzsäure einen schwachen, bald verschwindenden, oder (nach De la Rive's Behauptung) selbst nicht merklichen Strom, in Königswasser einen hinreichend kräftigen. Aehnliche Beispiele werden noch viele angeführt, die alle zur selben Klasse gehören. Indefs zugegeben, daß die Vermischung der Flüssigkeiten ihr Leitungsvermögen nicht ändere, so fragt sich noch, ob der in allen diesen Fällen mit verstärkter chemischer Wirkung eintretende verstärkte Effect nicht bloß davon abhängt, daß mit zunehmender chemischer Wirkung auf die Metallplatten sich der Uebergangswiderstand vermindert. In der That habe ich in meinen galvanischen Maaßbestimmungen gezeigt, daß dieser Widerstand in stärker eingreifenden Flüssigkeiten kleiner ausfällt. Noch directer entscheidend aber in Bezug auf vorliegenden Gegenstand dürften folgende Versuche seyn:

Wenn ich irgend eine Flüssigkeit zwischen homogene Platten bringe, so kann, bei Schließung der Platten mit dem Multiplicator, nach keiner Theorie ein Strom durch selbstständige Wirkung dieses Systems entstehen; und wenn ich within eine Flüssigkeit zwischen homogenen Platten in eine wirksame Kette einschiebe, so wird

dieses Einschießel nach jeder Theorie auf keine andere Weise als durch seinen Leitungswiderstand auf die Kraft der Kette influiren können, so lange nicht ein Ladungszustand der Platten eingetreten ist. Nun zeigt sich:

a) Dafs concentrirte Schwefelsäure zwischen homogenen Zinkplatten, oder Salzsäure zwischen homogenen Platinplatten in eine wirksame Kette eingeschoben, die Kraft dieser Kette beträchtlich schwächt; ein Beweis, dafs ein starker Leitungswiderstand dadurch in die Kette kommt.

b) Dafs eben so destillirtes Wasser zwischen homogenen Zinkplatten, oder Salpetersäure zwischen homogenen Platinplatten in die Kette eingeschoben, ihre Kraft beträchtlich schwächt.

c) Dafs aber verdünnte Schwefelsäure zwischen homogenen Zinkplatten, oder eine Mischung aus Salzsäure und Salpetersäure zwischen homogenen Platinplatten in die Kette eingeschoben, ihre Kraft verhältnißmäßig wenig schwächt; ein Beweis, dafs durch die Mischung (und unstreitig das dadurch bewirkte chemische Eingreifen) der Flüssigkeiten der Leitungswiderstand wirklich abgenommen hat. Hier folgt das Detail der Versuche:

Im Troge *A*, Fig. 7 Taf. III, wurde eine Zinkkupferkette *K*, *Z* (von jeder Platte 11,2 Par. Duod. Quadr. Zoll eintauchend, bei 4 Lin. Abstand) in stark saurem Wasser mittelst des (aus dickem Kupferdraht und nicht sehr vielen Windungen bestehenden) Multipliers *M* und des eingeschobenen Zwischentrogs *B* geschlossen, der die Zinkplatten *a*, *a*, und entweder Wasser oder rauchende Schwefelsäure, oder verdünnte Schwefelsäure als Zwischenflüssigkeit enthielt. Der Abstand der Platten *a*, *a* war 14 Linien, die eintauchende Fläche 1,1 Quadr. Zoll. Das Maas der Stromkräfte wurde stets nur durch die Anfangsoscillationen der senkrecht auf die Windungen gestellten Nadel unmittelbar nach der Schließung mittelst der, anderweit hinreichend von nur erör-

terten Methode genommen, und die Kette, zu möglichster Vermeidung der Wirkungsabnahme, dann sofort wieder geöffnet; überdies vor jedem neuen Maasse nicht nur der Wirkungszustand der Zinkkupferkette durch längeres Herausziehen der Platten wieder hergestellt (vergl. über diesen Umstand meine Maassbest.üb. die galvan. Kette), sondern auch die Zinkplatten *a, a* durch Ableiten gereinigt. Wurde nun die Kraft des Stromes ohne Einschiebung des Zwischentrogs = 1000 gesetzt, so war sie, bei Einschiebung des Zwischentrogs:

wenn d. Zwischentrog mit dest. Wass. gefüllt war	0,8275
- - - - - rauchend. Schwefels.	64,663
- - - - - verdünnt. Schwefels.	651,04.

Die letzte Kraft konnte wegen übergrosser Schnelligkeit der ersten Oscillationen nicht genau gemessen werden, und liegt vielleicht selbst der Kraft ohne Zwischentrog noch näher, als angegeben.

Zur Herstellung der verdünnten Schwefelsäure wurde nach ungefährem Augenmaasse 1 Vol. rauchende Schwefelsäure und 3 Vol. destillirtes Wasser genommen.

Bei Anwendung von Platinplatten statt Zinkplatten in dem Zwischentrog wurden, je nachdem dieser mit folgenden Flüssigkeiten gefüllt war, folgende relative Stromkräfte erhalten, wobei wiederum der Werth des Stromes ohne Zwischentrog = 1000 zu Grunde liegt:

wenn d. Zwischentrog m. rect. Salpeters. gefüllt war	17,703
- - - - - Salzsäure	2,5922
- - - - - Salpetersalzs.	338,31.

Die Salpetersäure war aus ungefähr gleichen Volumtheilen der einzelnen Säuren (deren spec. Gew. ich inzwischen nicht geprüft habe) zusammengesetzt. Merkwürdig war der Umstand, daß in der Salpetersalzsäure die Wirkung nicht gleich anfangs nach der Schließung die bezeichnete, sondern beträchtlich schwächer war, aber sehr schnell bis zu der angegebenen GröÙe stieg, welches wiederholt beobachtet wurde; dagegen in dem Ver-

auch mit Zink, Schwefelsäure und Wasser gleich anfangs die bezeichnete Kraft stattfand. Die Veränderung, von welcher diese Zunahme abhing, war eine Wirkung der Schließung selbst, da sie auch dann sich zeigte, wenn die Platinplatte vor der Schließung schon einige Zeit in der Salpetersäure gestanden hatte, und sich bei neuen Schließungen nach dazwischen stattgefundener Oeffnung wiederholte. Inzwischen kann sie einer allmäligen Ladung der Platte, in sofern man darunter eine Aenderung der elektromotorischen Kraft versteht, nicht beigegeben werden, da hierdurch die Kraft der Kette nur hätte verringert werden können; wie denn auch wirklich die mit dem Kupfer metallisch communicirende Platinplatte nicht nur durch Entwicklung von Gasblasen in der Kette, sondern auch durch einen speciellen Versuch, indem sie, nach einiger Dauer der Zwischenschließung, für sich mit der anderen zur Kette geschlossen ward, sich negativ gegen diese zeigte. Mithin konnte der Grund der allmäligen zunehmenden Wirkung wirklich nur in einer, hier allmäligen eintretenden Widerstandsverminderung gesucht werden.

Der Versuch mit den Zinkplatten ist zwei Mal, der mit den Platinplatten drei Mal mit ganz analogen Ergebnissen an verschiedenen Tagen angestellt worden.

De la Rive behauptet übrigens, daß Platin mit reinem Golde in reiner Salpetersäure geschlossen gar keinen, oder vielmehr einen schnell verschwindenden Strom, den er zufälligen Unreinigkeiten beimeist, erzeuge. Ich habe diesen Umstand eben so wenig als Mariani bestätigt finden können; ungeachtet ich 24-karätiges Gold und eine Salpetersäure, die sich, gehörig verdünnt, durch salpetersaures Silber nicht trübte, anwandte. Die Metalle waren durch Abreiben mit trockenem Rostpapier mit frischen Oberflächen versehen. (Behandeln mit Säuren, um die Reinigung zu bewirken, habe ich mit Fleiß unterlassen, weil hierdurch eigenthümliche

Oberflächenänderungen zu besorgen sind.) Der anfangs ziemlich lebhafte Ausschlag verminderte sich allerdings bald beträchtlich, blieb aber doch constant zu Gunsten der Positivität des Goldes. Allerdings wurde ein sehr empfindlicher Multiplicator von mehreren tausend Windungen dabei angewandt. Mit demselben habe ich auch eine nicht unbedeutende Wirkung zwischen Gold und Platin in rectificirter Salzsäure wahrgenommen, die dagegen mit einem Multiplicator aus einer mäßigen Anzahl Windungen, aber aus viel dickerem Draht, kaum merklich war. Dafs in der That in diesem Fall, wo die Kette einen beträchtlichen Widerstand in sich schliesst, nur von einem Multiplicator mit *vielen* Windungen, wenn auch aus dünnem Draht, Wirkung zu erwarten ist, dafür dürften die Gründe aus der Ohm'schen Theorie bei uns zur Genüge bekannt seyn.

Mag es indess auch seyn, dafs De la Rive unter den Umständen seines Versuches keine Wirkung einer Gold-Platin-Kette beobachtete, so würde er doch dieselbe zuverlässig beobachtet haben, wenn er diese Säure mit einem Ueberschusse salpetersauren Silbers versetzt hätte, wo in der That, der chemischen Theorie scheinbar entgegen, eben sowohl ein beträchtlicher Ausschlag erhalten wird, als wenn man Gold mit Platin in bloßer salpetersauren Silberlösung schliesst. Inzwischen bin ich weit entfernt, diese Umstände mit gleicher Voreiligkeit gegen die chemische Theorie geltend zu machen, als man Erfahrungen scheinbar entgegengesetzter Art für dieselbe hat geltend machen wollen; denn es ist gewifs, dafs salpetersaure Silberlösung in der That einen modificirenden Einflufs auf die Oberflächen von Gold und Platin ausübt, wenn dies gleich den gewöhnlichen Annahmen der Chemie widerstreitet. Nur bleibt ganz unentschieden, ob diese verändernde Einwirkung der Flüssigkeit auf die Metalle auch *Ursache* der Strömung ist.

Dafs wirklich salpetersaure Silberauflösung *Ursache*

auf Gold und Platin wirkt, ergiebt sich aus folgendem Umstande:

Sowohl in ziemlich concentrirter (1 Theil Salz gegen 8 Th. Wasser) als einigermaßen verdünnter salpetersaurer Silberauflösung, als auch endlich in Salpetersäure, welche mit einem Ueberschuss von salpetersaurer Silberauflösung versetzt ist, verhält sich Gold *negativ* gegen Platin; bei Anwendung einer sehr starken Verdünnung der salpetersauren Silberlösung aber erfolgt eine Umkehrung aus Platin Gold in Platin Gold. Es giebt noch andere Beweise der erfolgten Aenderung des Platins zu's Positive, die ich inzwischen hier übergehe. Ueberhaupt haben mich meine Versuche gelehrt, dass selbst die edlen Metalle in Flüssigkeiten, durch die man sie gewöhnlich für unangreifbar hält, die auffallendsten elektrochemischen Veränderungen zu erfahren vermögend sind. Es würde jedoch zu weit führen, hier davon zu handeln.

Es erhellt wohl aus allem diesem, dass bei dem jetzigen Stande der Wissenschaften Erfahrungen über die schwächere oder geringere galvanische Wirksamkeit der Ketten in Flüssigkeiten von scheinbar grösserer oder geringerer chemischer Wirksamkeit überhaupt keine sicheren Schlüsse weder für noch gegen die chemische Theorie begründen können. Vor allem handelt es sich darum, dem Grunde der eigenthümlichen, nach dem gewöhnlichen chemischen Verhalten oft gar nicht zu erwartenden, Veränderungen auf die Spur zu kommen, welche die Metalle in Flüssigkeiten erfahren, bevor man ihr Verhalten in denselben zur Erörterung anderer Umstände benutzen kann.

4) Den folgenden Versuch habe ich schon vor längerer Zeit in Schweigg. Journ. Bd. I. VII S. 9. gegen die chemische Theorie angeführt; daher ich mich der *obhermaligen* Mittheilung desselben überheben würde, wenn *er bisher von irgend einem Anhänger dieser Theorie be-*



rücksichtigt worden wäre, was mich schliesen läßt, daß er wenig bekannt geworden ist. Gerade dieser, so höchst leicht zu wiederholende Versuch aber, den ich jährlich als Collegienversuch anstelle, scheint mir ein *Experimentum crucis* gegen die chemische Theorie zu seyn.

Man disponire in einem Trog- oder Becherapparate eine paare Anzahl Zink-Kupfer-Plattenpaare (ich wende deren gewöhnlich zehn an) zu einer nach dem Schema einer Säule zusammengesetzten Kette; aber so, daß die eine Hälfte der Elemente einen entgegengesetzten Strom als die andere hervorzubringen strebt. Die Leitungsfähigkeit sey Wasser. Ist alles in allen Zellen gleich, so werden beide entgegengesetzte Ströme sich in der Wirkung auf den schließenden Multiplicator compensiren und keinen Ausschlag hervorbringen. Zuweilen glückt es, das Gleichgewicht merklich genau zu treffen, und dann besteht dies Gleichgewicht selbst noch fort, wenn man zu der Flüssigkeit in der einen Hälfte der Zellen eine beliebige Menge Salzsäure fügt, auch diese Zellen viel höher mit der verdünnten Säure auffüllt, als die, den entgegengesetzten Strom hervorbringenden Zellen mit Wasser angefüllt sind<sup>1)</sup>. Allerdings entwickelt sich, unstreitig vermöge der verändernden Einwirkung der Salzsäure auf die Platten, allmählig ein Uebergewicht des einen Stroms, aber nicht die Zellen mit der Säure, in welchen eine tumultuöse Gasentwicklung vor sich geht, sondern die Zellen mit dem Wasser erlangen dieses Uebergewicht. Schließt man dagegen jede Hälfte der Zellen für sich durch den Multiplicator, so wird er durch die Zellen mit der Säure eine stürmische, durch die mit dem Wasser bloß eine schwache Wirkung erfahren. Wie nun der Erfolg dieses Versuchs nach der chemischen Theorie zu erklären ist, sehe ich durchaus nicht

1) Fig. 8 Taf III veranschaulicht diese Vorrichtung. *W* sind die mit reinem und *S* die mit gesäuertem Wasser gefüllten Zellen, *A* die Kupfer- und *Z* die Zinkplatten. *M* ist der Multiplicator.

ein. Nach der Contact-Theorie ist die Erklärung leicht. Nach dieser nämlich wirkt die Zufügung der Salzsäure verstärkend bloß durch Verminderung des in der Kette vorhandenen Leitungswiderstandes, und diese Verminderung kommt der Elektricität, welche sich durch Contact in den Zellen ohne Säure entwickelt, in ihrem Kreislaufe durch die ganze Kette eben so gut zu Statten, als der Elektricität der Plattenpaare, die sich unmittelbar in der sauren Flüssigkeit befinden. — Nicht immer glückt es, so homogene Plattenpaare zu treffen, daß, wenn man anfangs alles für die Plattenpaare der einen und andern Seite gleich gemacht hat, doch Gleichgewicht bestehe. Meist wird schon vor Zufügung von Säure in die Zellen der einen Seite eine gewisse Seite, in welcher die Plattenpaare ein etwas stärkeres elektromotorisches Verhältniß haben, ein, obschon bei übrigens gut getroffenen Vorsichten nur schwaches Uebergewicht haben. In diesem Falle kann man jedoch den Versuch eben so beweisend machen, indem man jetzt die Säure in die Reihe Zellen, welche sich als die schwächeren erweisen, zufügt. Nach der chemischen Theorie müßte sich jetzt der Ausschlag des Multiplikators schnell umkehren; statt dessen aber wächst er nach derselben Richtung, die er schon vorher hatte.

Noch will ich folgende, mit einer Messung verbundene Abänderung dieses Versuches beifügen :

Auf der einen Seite wurden fünf Plattenpaare Zink-Kupfer, auf der anderen fünf Plattenpaare Zink-Zinn in einem Becherapparate angeordnet. Die Gefäße der ersten Seite wurden nur ein Drittheil so hoch als die der zweiten, jene mit bloßem Brunnenwasser, diese mit stark salzsaurem, eine lebhafte Gasentwicklung bedingendem, Wasser angefüllt. Die ersten fünf Plattenpaare, für sich zur Kette geschlossen, gaben einen Strom, den der Multiplikator mittelst der Anfangs-Oscillogewissen,  $= 1,41$  gefunden ward (wenn die der Erde auf die Nadeln des Multiplikators

= 1 gesetzt wird), die letzten für sich geschlossen, einen Strom, dessen Kraft, eben so gemessen, durch 44,7 ausgedrückt ward. Als nun beide Ketten zu einer einzigen mit entgegengesetzter Richtung der Strömung combinirt wurden, zeigte sich, daß dennoch der Strom der Zinkkupferpaare das Uebergewicht hatte. Das Maas des aus der Differenz resultirenden Stromes war 0,45.

5) Ungeachtet die Vermehrung der chemischen Wirkung bei gewöhnlicher, durch nicht zu schlechte Leiter geschlossener, Kette einen sehr auffallenden Einfluß zur Verstärkung ihrer Kraft äußert, verliert sich doch dieser vortheilhafte Einfluß um so mehr, je größer der Widerstand des schließenden Leiters wird. So stieg z. B. die Stromkraft einer Kette bei Schließung mit verhältnißmäßig kurzem und dickem Draht durch Zufügung eines gewissen Quantum von Säure im Verhältniß von 1 : 191. (Die Platten wurden vor Zufügung der Säure neu abgefeilt und die Kraft, wie das erste Mal, nur durch die Anfangs-Oscillationen gemessen.) Als derselbe Versuch unter sonst ganz gleichen Umständen, aber bei Schließung mit einem sehr langen und dünnen Draht, der ungefähr den 7000fachen Widerstand des vorigen äußerte, wiederholt ward, stieg die Kraft durch die gleiche Verstärkung der Flüssigkeit nur im Verhältniß von 1 :  $1\frac{1}{2}$  (andere hieher gehörige Beispiele finden sich in meinen galvanischen Maasbestimmungen). In der ganzen chemischen Theorie finde ich keinen Grund, warum das *Verhältniß* des Kraftzuwachses nicht in beiden Fällen dasselbe seyn sollte. Für die Contact-Theorie, nach welcher durch Verstärkung der Flüssigkeit nicht die Menge der entwickelten Elektricität vermehrt, sondern nur ein Theil des in der Kette befindlichen Leitungswiderstandes vermindert wird, findet hier gar keine Schwierigkeit statt, da die Verminderung eines Theils des gesammten Leitungswiderstandes um so mehr an Einfluß zur Verstärkung der Kraft der Kette verlieren muß, je

weniger er im Verhältniß zum übrigen Theile des Widerstandes der Kette beträgt. Verlängert man nun den Schließungsdraht immer mehr, so kann man es zuletzt so weit bringen, daß der Widerstand der Flüssigkeit gegen den seinigen merklich verschwindet.

### III. Ueber die Elektricitätsentwicklung bei Berührung von Metallen mit Flüssigkeiten.

Es bleibt noch übrig, einige Versuche zu berücksichtigen, welche man wohl als gegen die Contact-Theorie sprechend angeführt hat, welche aber eigentlich bloß beweisen (vielleicht auch nur zu beweisen scheinen):

1) Daß es nicht bloß der Contact der Metalle, oder überhaupt fester Körper unter einander ist, welcher der Elektricitätsentwicklung fähig ist.

2) Daß die Elektricitätsentwicklung, welche die Flüssigkeiten, sey es durch ihre gegenseitige Berührung, sey es durch Berührung mit festen Körpern, bewirken, nicht schlechthin nach denselben Gesetzen erfolgt, als die durch Berührung fester Körper unter einander. Ersteres ist nur eine Verallgemeinerung der Contact-Theorie, die schon Volta gemacht hat; Letzteres ist kein Einwand gegen dieselbe, da wir nicht wissen, von welchem Einflusse der Aggregatzustand auf den überhaupt noch so dunkeln Proceß der Elektricitätsentwicklung ist. Gewiß lehren Erfahrungen unzweideutig, daß entweder die Flüssigkeiten an sich nicht unter dasselbe Gesetz der galvanischen Spannungsreihe treten als die festen Körper, oder daß, wenn es der Fall ist, secundäre Erfolge, die von der Beweglichkeit der Theilchen, Veränderungen der metallischen Oberflächen oder anderen Umständen abhängen, das Resultat modificiren. Letzteres ist meine Ansicht, die ich im Wesentlichen (obschon noch nicht mit der erforderlichen Berücksichtigung der Veränderung der Metalle) in Biot's Lehrbuch, Th. III S. 321, 372, auseinandergesetzt habe, und die ich mich

bis

bis jetzt noch nicht bewogen gefunden habe zu verlassen. Namentlich scheinen mir die meisten der, von Faraday neuerdings bekannt gemachten, Thatsachen sich dadurch weit ansprechender, als nach seiner eigenen Ansicht repräsentiren zu lassen. Wie dem aber auch sey — denn ich will jene Ansicht Niemand aufdringen — so können jedenfalls Erfahrungen, wo wir Elektrizität auch ohne Contact fester Körper, oder so, daß dieser dabei einflußlos ist, entstehen, und hierbei die Flüssigkeiten eine andere Rolle spielen sehen, als feste Körper, keine Gegenbeweise gegen die Contact-Theorie selbst abgeben. Aus diesem Gesichtspunkte wird denn auch folgender Versuch, De la Rive's zu betrachten seyn, den ich mit meinen eigenen Erfahrungen darüber anführen will. Er findet sich in Schweigg. Journal, Bd. LIX 494 (aus der *Bibl. univ.*), und mit einiger Abänderung in den *Recherches*, p. 62, angeführt.

„An jedes Ende eines Holzcylinders von 10 bis 12 Centimetern Länge und 1 oder 2 Centimetern im Durchmesser befestigte ich eine Zinkplatte, die sich nach außen in einen angelötheten Messingknopf endigte; indem ich nun den Messingknopf der einen Platte in die Hand nahm, berührte ich den (gleichfalls messingenen) Condensator mit dem Knopfe der andern. Der Contact-Theorie gemäß durfte ich kein Zeichen elektrischer Thätigkeit hierbei erhalten, indem die beiden Zink-Messing-Platten einander gegenüber lagen und durch ein isolirtes Holzstück vereinigt waren, welches die Dienste eines Leiters zwischen beiden Platten versah. Weil indessen das eine Ende des Holzcylinders etwas feuchter war, als das andere, so erhielt ich Zeichen von Elektrizität, deren Natur jederzeit im Verhältnisse stand mit der chemischen Wirkung, welche durch die Berührung des sorgfältig blank geschabten Zinks mit dem feuchten Holz erregt wurde. Diese Zeichen von Elektrizität wa-

ren negativ <sup>1)</sup>, wenn ich den Messingknopf derjenigen Zinkplatte zwischen den Fingern hielt, deren anderes Ende in dem minder feuchten Theile des Holzes befestigt war. Zum Gelingen dieses Versuches ist nöthig, daß das Holz etwas feucht sey; die Feuchtigkeit, welche es aus der Luft anzieht, ist vollkommen hinreichend; auch muß man Sorge tragen, daß das eine Ende des Holzes trockner erhalten werde, als das andere.«

Man hat den reinen Erfolg vorstehenden, gewiß interessanten, Versuches bezweifelt; er ist aber richtig, wie ich mich durch öftere sorgfältige Wiederholung desselben unter folgender leichteren Form überzeugt habe.

Auf die Zinkfläche einer zusammengelötheten Zink-Kupfer-Platte wurden drei bis vier gleich große oder etwas größere Blätter von lufttrocknem Schreibpapier gelegt, das oberste mit destillirtem Wasser befeuchtet, und auf dieses oberste eine zweite zusammengelöthete Zink-Kupfer-Platte mit der Zinkfläche aufgelegt; so daß ein System von nachstehender Folge entstand: Kupfer, Zink, trocknes Papier, feuchtes Papier, Zink, Kupfer (wie in Fig. 9 Taf. III durch die Buchstaben K, Z, f, z, Z, K angegeben ist). Zink und Kupfer waren ganz blank gefeilt, und ich hatte mich überzeugt, daß, wenn ich das angegebene System, aber mit Weglassung des feuchten Papiers, am kupfernen Condensator prüfte, keine Elektricitätsentwicklung nachweisbar war. Wenn ich nun aber obiges System mit dem eingeschobenen feuchten Papier so an dem Condensator anbrachte, daß die dem feuchten Papier anliegende Doppelplatte damit in Verbindung kam, während die andere Doppelplatte mittelst des lufttrocknen oder mit destillirtem Wasser genetzten Fingers mit dem Erdboden in Verbindung stand, so wurde, in Uebereinstimmung mit De la Rive, ein ne-

1) In Schweigg Journ. steht zwar *positiv*, dies muß indess theils nach der Angabe in den *Recherches*, theils nach meinen eigenen Versuchen ein Versehen seyn.



gativer Ausschlag erhalten, ein positiver dagegen bei Umkehrung des Systems. Dasselbe fand statt, wenn statt destillirten Wassers salpetersaures Wasser zur Befeuchtung diente.

Diese Versuche habe ich noch in folgender Weise abgeändert und vereinfacht. Zwischen zwei Zinkplatten ohne Kupfer wurden mehrere Lagen lufttrocknen Schreibpapiers gebracht, und die eine Gränzlage, an welcher die eine Zinkplatte anlag, wiederum mit destillirtem oder salpetersaurem Wasser befeuchtet. Es wurde nun bald die an trockner, bald die am feuchten Papier anliegende Zinkplatte mit einem Condensator von Zink in Verbindung gesetzt. Noch einfacher läßt sich der vorige Versuch in folgender Form anstellen: Man unwickelt ein Zinkstäbchen an einem Ende mit lufttrocknem Fließpapier, am anderen mit Fließpapier, was mit Brunnenwasser oder mit destillirtem Wasser genäßt ist. Je nachdem nun das trockne oder feuchte Papier am (messingenen) Condensator entladen wird, während man zugleich das andere Papier mit den Fingern faßt, erhält man einen negativen oder positiven Ausschlag. Die Entladung geschah in beiden Fällen von mir an einem, mit destillirtem Wasser befeuchteten Blättchen Papier, was auf die untere Condensatorplatte applicirt war, während zugleich ein anderes, die obere Condensatorplatte bedeckendes Blättchen feuchten Papiers mit den Fingern berührt ward, um in Betreff des Condensators Alles an beiden Seiten gleich zu machen. Die einfachste Form des Versuchs möchte inzwischen die seyn, daß man eine Zink-Condensatorplatte unmittelbar mit dem feuchten Finger berührt, was, wie auch schon Andere bemerkt haben, hinreicht, einen negativen Ausschlag zu bewirken. Ich sage nicht, daß dieser Versuch im Sinne der Contact-Theorie bis jetzt erklärt ist; aber eben so wenig dürfte Jemand einen Beweis für die chemische Theorie darin finden können. Uebrigens läßt sich derselbe mit

anderen, viel weiter greifenden Versuchen in Beziehung setzen, welche wenigstens eine theilweise Aufklärung desselben versprechen, wovon ich jedoch hier nicht handeln will.

## II. Interferenzphänomenen.

Vor einigen Jahren hat Hr. Necker die auffallende Erscheinung beschrieben (Ann. Bd. XXVII S. 197), daß ein Beobachter, der sich kurz vor Sonnenaufgang im Schatten eines mit Baumwerk bedeckten Hüfels befindet, nahe an der Gränze dieses Schattens, die Zweige und Blätter dieses Baumwerks nicht dunkel und opak auf den Himmel projicirt erblicke, sondern im Gegentheil silberweiß und glänzend, wie wenn die ganze Vegetation aus dem allerschönsten matten Silber gearbeitet wäre.

Bei der Seltenheit eines heiteren Sonnenaufgangs in unseren Klimaten verdient die Bemerkung wohl einige Beachtung, daß man die eben genannte Erscheinung, ihrer Wesentlichkeit nach, jederzeit im Zimmer, ganz nach Belieben, hervorrufen kann. Man beobachtet sie nämlich in jedem Barometer, das mit Mikroskopen zur Ablesung versehen ist, an dem Fädenkreuze dieser Mikroskope, sobald die Fäden desselben hinreichend dünn sind, der erleuchtete Theil der Quecksilberkuppe hinter dieselben gestellt ist, und das Auge in schiefer Richtung, entweder von oben, von unten oder von der Seite her, in das Mikroskop blickt. Man trifft dann leicht die Stellung, wo die Fäden, welche sich bei geradem Hineinsehen kohlschwarz auf die Quecksilberfläche projiciren, im strengsten Gegensatz dazu silberweiß und leuchtend erscheinen. Bei einzigem Nachdenken wird man finden, daß die Umstände hier ganz denen in der Natur analog sind, und daher auch auf sie die von Hrn. Babinet gegebene Erklärung (Ann. Bd. XXXI S. 137) ihre Anwendung findet.

(P.)

III. *Ueber das Verhalten des Chlors zu Schwefelmetallen, und über eine, der schwefelichten Säure entsprechende Chlorverbindung des Schwefels; von Heinrich Rose.*

Chlor und Schwefelzinn.

Vor längerer Zeit machte ich die Bemerkung, daß man krystallisirte Verbindungen von Zinnchlorid und von Titanchlorid mit Chlorschwefel erhalten könne, wenn man diese Substanzen vorsichtig zusammenmengt und in wohl verschlossenen Flaschen längere Zeit in der Kälte stehen läßt. Diese im Winter gebildeten Krystalle werden während des Sommers wieder flüssig <sup>1)</sup>.

Es schien mir von Wichtigkeit zu seyn, die Zusammensetzung dieser krystallisirten Verbindungen genau kennen zu lernen, um zu sehen, in welchem Verhältnisse in ihnen das Chlor mit dem Schwefel im Chlorschwefel enthalten sey. Ich hatte früher mehrere Versuche angestellt, um eine höhere Chlorstufe des Schwefels auf die Weise zu bilden, daß ich durch Chlorschwefel, welcher vermittelst Destillation vom überschüssigen Schwefel gereinigt worden, Chlorgas lange Zeit hindurch strömen ließ. Aber obgleich eine große Menge von Chlorgas absorhirt wurde, so gelang es mir nicht, eine immer gleich zusammengesetzte Verbindung darzustellen <sup>2)</sup>. Wenn daher eine höhere Chlorstufe des Schwefels existiren sollte, so ist es schwer, sie in isolirter Form zu erhalten. Es schien mir indessen wahrscheinlich, daß sie in Vereinigung mit anderen Chlorverbindungen dar-

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XVI S. 67.

2) Ebend. Bd. XXVII S. 107.

gestellt werden könne, und aus diesem Grunde untersuchte ich jene krystallisirten Verbindungen näher.

Diese Verbindungen, auf die oben erwähnte Art erhalten, können indessen unnützlich zu diesen Untersuchungen dienen, da sie schwer vom überschüssigen anhängenden Chlorschwefel zu trennen sind, und wegen ihrer äußerst leichten Zersetzbarkeit nicht beim Zutritt der atmosphärischen Luft behandelt werden können. Ich fand indessen, daß die Verbindung des Chlorschwefels mit dem Zinnchlorid sich sehr leicht auf die Weise im gut krystallisirten Zustande bildet, wenn man Chlorgas über Schwefelzinn im Max. von Schwefel ( $\text{Musivgold}$ ,  $\text{SnS}^2$ ) leitet, ohne dasselbe zu erwärmen. Das Schwefelmetall zerfließt erst zu einer braungelben Flüssigkeit, und durch mehr hinzugefügtes Chlorgas bilden sich schöne gelbe Krystalle, zu welchen die ganze Flüssigkeit erstarrt. Ich habe diese sehr leicht im reinen Zustand erhalten, geschieden von allen Unreinigkeiten, die sich im Zinnsulfid befinden konnten, auf die Weise, daß ich mich eines Apparates bediente, der aus einer gläsernen Kugel bestand, in welcher das Zinnsulfid sich befand, die an eine Röhre gelöthet war, welche einen ziemlich großen Durchmesser hatte, und an beiden Seiten zu sehr verengert wurde. Sie war dazu bestimmt, die krystallisirte Chlorverbindung aufzunehmen. Mit einer ihrer verengten Mündungen hing sie mit der, das Schwefelmetall enthaltenden Kugel zusammen, und diese wurde mit einem Apparate verbunden, aus dem Chlorgas entwickelt wurde, das durch Chlorcalcium sich trocknete, ehe es mit dem Schwefelmetall in Berührung kam. Auch die andere verengte Mündung der Glasröhre wurde mit einer kleinen, mit Chlorcalcium angefüllten Röhre in Verbindung gebracht, damit keine Spur von Feuchtigkeit aus der Luft in die Glasröhre zu der gebildeten Substanz dringen konnte. — Durch eine geringe Hitze, vermittelt einer kleinen Spirituslampe, wurde, wenn das

Zinnsulfid in die zu untersuchende Verbindung sich verwandelt hatte, diese in die Glasröhre getrieben. Nach Beendigung der Operation wurde ein Strom von trockener Luft über die erhaltene Verbindung geleitet, um das freie Chlorgas zu vertreiben, und darauf die Glasröhre an beiden Seiten bei ihren verengerten Mündungen zugeschmolzen.

Die entstandene Substanz bildet sehr deutliche Krystalle, oft von nicht unbedeutender Grösse, von gelber Farbe, deren Form aus dem Grunde nicht bestimmt werden konnte, weil man sie nur durch's Glas der Röhre betrachten und untersuchen kann, in welcher man sie aufbewahrt. Ich enthalte mich daher jeder Beschreibung der Krystallform, weil man bei Bestimmung derselben sich zu sehr täuschen kann.

An der Luft stoßen die Krystalle einen sehr starken weissen Dampf aus, stärker als Zinnchlorid allein. Sie ziehen äusserst leicht Feuchtigkeit an und zerfliessen. Bringt man sie in Wasser, so geben sie eine milchicht-trübe Auflösung durch sich ausscheidenden Schwefel. Sie rothet Lackmuspapier, riecht aber nicht unmittelbar nach ihrer Bildung nach schwefelichter Säure, wohl aber nach kurzer Zeit. Leitet man durch die Auflösung Schwefelwasserstoffgas, so erhält man einen gelben Niederschlag von Zinnsulfid; die davon getrennte Flüssigkeit giebt mit Chlorbaryum einen Niederschlag von schwefelsaurer Baryterde. Wird die Auflösung gekocht, so trübt sie sich durch sich ausscheidendes Zinnoxid, das auflöslich in Chlorwasserstoffsäure ist.

Wird die trübe Auflösung mit einer Auflösung von salpetersaurem Silberoxyd vermischt, so entsteht ein käsiger Niederschlag von Chlorsilber. Dieser ist im Anfang ganz weiss, bräunt sich aber nach kurzer Zeit von selbst, und wird endlich, besonders leicht, durch's Erhitzen schwarz, doch nicht vollkommen, weil er mit einer grossen Menge von weissem Chlorsilber gemengt

ist. Dieß Verhalten beweist offenbar, daß die Auflösung unterschweflichte Säure enthält, welche diese Zersetzung hervorbringt.

Diese Versuche zeigen, daß in der krystallisirten Verbindung das Zinn als Zinnchlorid enthalten sey, weil die Auflösung mit Schwefelwasserstoffgas gelbes Zinnsulfid bildet; sie zeigen ferner, daß der Chlorschwefel, welcher mit dem Zinnchlorid in der Substanz verbunden ist, bei seiner Auflösung in Wasser in Chlorwasserstoffsäure, in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zerfällt.

Daß in der krystallisirten Verbindung das Zinn mit dem Schwefel noch in demselben Verhältnisse enthalten ist, wie im Zinnsulfid, und daß keine Chlorverbindung des Schwefels bei der Bildung entwichen ist, zeigt folgender Versuch. Es wurde schwarzes, gepulvertes, krystallinisches Zinnsulfuret,  $\text{SnS}$ , in demselben Apparate in der Kälte einem Strom von Chlorgas ausgesetzt, wie das Zinnsulfid. Es zeigten sich im Anfange dieselben Erscheinungen, wie bei der Behandlung des Zinnsulfids mit Chlorgas. Das Schwefelmetall wurde leicht durch das Gas angegriffen, und zeitlos zu einer braungelben Flüssigkeit, aus welcher sich noch und nach die gelbe krystallisirte Verbindung absetzte. Während aber bei der Behandlung des Zinnsulfids,  $\text{SnS}^2$ , die gebildete braune Flüssigkeit durch mehr hinzugeleitetes Chlorgas vollständig in gelbe Krystalle sich verwandelt, blieb, nach langer Behandlung des Zinnsulfurets mit Chlorgas, über diesen Krystallen eine farblose Flüssigkeit schwimmen, die sich durch ferneres Durchleiten von Chlorgas nicht mehr veränderte. Es bestand diese aus reinem Zinnchlorid,  $\text{SnCl}^2$ , das sich im Wasser ganz klar auflöste, und dessen Auflösung die salpetersaure Silberoxydauflösung vollkommen weiß fällte.

Wird die krystallisirte gelbe Verbindung in etwas verdünnte Salpetersäure so gebracht, daß dieselbe nur *nach und nach* auf jene wirken kann, so löst sie sich



in der Kälte ganz vollständig, unter Entwicklung von pomeranzengelben Dämpfen von salpetricher Säure, darin auf, und es scheidet sich nicht eine Spur von Zinnoxid aus: der Schwefel wird vollständig zu Schwefelsäure oxydirt, und die Auflösung enthält, außer Chlorwasserstoffsäure, keine Spur von unterschweflichter oder schweflichter Säure, und salpetersaure Silberoxydauflösung bildet darin einen rein weissen Niederschlag. Ist die angewandte Salpetersäure zu verdünnt, so bleibt eine Spur von Schwefel unaufgelöst. — Wenn man rauchende Salpetersäure zur Oxydation der Verbindung anwendet, so bildet sich eine dicke, weisse Masse, die sich aber durch hinzugefügtes Wasser vollständig auflöst, ohne das Zinnoxid abgeschieden wird.

Dieses Verhalten der krystallisirten Substanz zur Salpetersäure giebt eine gute Methode ab, dieselbe zu analysiren. Die an beiden Seiten zugeschmolzene Glasröhre, welche die Verbindung enthielt, wurde an einer Mündung geöffnet, schnell gewogen, und mit der offenen Spitze in einem grossen zu verschleissenden Glase in verdünnte Salpetersäure gebracht. Sehr langsam stieg die Säure in die Röhre, indem sie die Substanz auflöste. Nach vollständiger Auflösung wurde die Röhre gereinigt und gewogen, wodurch das Gewicht der zur Untersuchung angewandten Verbindung sich ergab.

Durch die mit Wasser verdünnte Auflösung wurde ein Strom von Schwefelwasserstoffgas geleitet; das gefällte gelbe Zinnsulfid liess man sich vollständig setzen, und es mit der Flüssigkeit längere Zeit stehen, ehe es filtrirt wurde. Es wurde darauf in einem offenen Platintiegel beim Zutritt der Luft zuerst so lange sehr gelinde erhitzt, als sich schweflichte Säure entwickelte, und dann erst bis zum Glühen gebracht. Erhitzt man das Zinnsulfid plötzlich stark, so entweicht die Hälfte des Schwefels, und es verwandelt sich in schwarzes Zinnsulfuret, das leicht schmilzt, den Platintiegel dabei stark an-

greift und im geschmolzenen Zustande sich sehr schwer in Zinnoxid verwandelt, was aber vollständig geschieht, wenn die Röstung vorsichtig äußerst langsam, und bei einer Temperatur stattfindet, bei welcher das Zinnsulfuret nicht schmelzen kann. Man begeht übrigens keinen Fehler, wenn nicht alles Zinnsulfuret in Zinnoxid verwandelt worden ist und eine Mischung von beiden als Zinnoxid berechnet wird, da Zinnsulfuret und Zinnoxid ein fast ganz gleiches Atomengewicht besitzen. Es ist aber dann nöthig, daß alle gebildete Schwefelsäure aus dem Zinnoxide entfernt ist. — Auf das erhaltene Zinnoxid wurden zuletzt Stückchen von kohlensaurem Ammoniak gelegt, und der Tiegel nochmals zum starken Glühen gebracht, um hierdurch die letzten Spuren von Schwefelsäure vom Zinnoxid zu verjagen.

Aus der vom Zinnsulfid abfiltrirten Flüssigkeit wurden die noch darin enthaltenen Spuren von Schwefelwasserstoff mittelst einer Auflösung von schwefelsaurem Kupferoxyd entfernt, und nach Entfernung des Schwefelkupfers mittelst salpetersaurer Silberoxydauflösung Chlorsilber gefällt.

Der Schwefel wurde in der salpetersauren Auflösung einer anderen Menge der Verbindung unmittelbar als Schwefelsäure mittelst einer Auflösung von Chlorbaryum bestimmt.

In drei Versuchen erhielt ich folgende Resultate:

	Menge der angewandten Verbindung.	Menge des erhaltenen Zinnoxids.	Menge des erhaltenen Chlorsilbers.
I.	1,666 Grm.	0,407 Grm.	4,672 Grm.
II.	2,456 -	0,610 -	6,778 -
III.	1,479 -	0,390 -	4,028 -

Hieraus ergibt sich folgende procentische Zusammensetzung der Verbindung:

	I.	II.	III.
Zinn	19,21	19,52	20,73
Chlor	69,18	68,18	67,20
Schwefel als Verlust	11,61	12,30	12,07
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00.</u>

Bei einem vierten Versuche erhielt ich von 0,857 Grm. der Verbindung, welche in rauchender Salpetersäure aufgelöst wurde, 0,707 Grm. schwefelsaure Baryterde oder 11,38 Procent Schwefel.

Die Verbindung hat, als eine deutlich krystallisirte, immer eine bestimmte Zusammensetzung. Die nicht völlige Uebereinstimmung in den Resultaten der Analysen hat ihren Grund in der Analyse selbst. Bei der Oxydation der Verbindung durch Salpetersäure ist es nicht zu vermeiden, daß etwas freies Chlor als Gas entweicht. Der Chlorgehalt ist daher in allen Analysen ein wenig zu niedrig, besonders bei denen, wo eine nicht zu verdünnte Salpetersäure angewandt wurde, was bei der zweiten, und besonders bei der dritten Analyse geschah. Bei der dritten Analyse ist ferner der Zinngehalt zu hoch ausgefallen, weil beim Glühen des Zinnoxyds die Anwendung des kohlensauren Ammoniaks unterlassen wurde.

Die Resultate der Analysen indessen stimmen hinreichend mit der berechneten Zusammensetzung einer Verbindung, welche aus 1 Atom Zinn, 12 Atomen Chlor und 2 Atomen Schwefel besteht. Diese würde im Hundert enthalten:

1 At. Zinn	19,38
12 At. Chlor	70,01
2 At. Schwefel	10,61
	<u>100,00.</u>

Da i der Verbindung das Zinn als Zinnchlorid enthalten ist, weil nach der Zersetzung mit Wasser durch

Schwefelwasserstoffgas gelbes Zinnsulfid entsteht, so ist der Schwefel mit so viel Chlor verbunden, daß er eine neue, noch nicht dargestellte Chlorverbindung bildet, welche der schweflichten Säure entspricht. Die Zusammensetzung der Verbindung kann daher durch folgende Formel ausgedrückt werden:  $\text{SnCl}^2 + 2\text{SCl}^2$ . Die neue Chlorverbindung des Schwefels, welche im Hundert zusammengezetzt ist aus:

Schwefel	18,52
Chlor	81,48
	<hr/> 100,00

enthält in der Verbindung doppelt so viel Chlor als das Zinnchlorid.

Es war nicht möglich, in der Verbindung von Zinn- und Schwefelchlorid letzteres in eine noch höhere Chlorstufe auf die Weise zu verwandeln, daß ich durch gelinde Hitze sie in eine sehr geräumige, mit Chlorgas angefüllte Flasche trieb, und diese darauf luftdicht verschloß. Ich habe sie länger als zwei Jahre darin aufbewahrt, und sie von Zeit zu Zeit vorsichtig erwärmt. Die Krystalle konnten von einer Wand des Gefäßes zur anderen sublimirt werden, ohne sich im Mindesten zu verändern.

Diese höhere Chlorstufe des Schwefels scheint nicht in isolirter Form dargestellt werden zu können, sondern nur in Verbindung mit einigen Chlormetallen, vorzüglich mit Zinnchlorid. Mischt man daher Chlorschwefel,  $\text{Cl} + \text{S}$ , mit Zinnchlorid, wie ich es früher gethan habe, so entsteht die krystallurte Verbindung auf die Weise, daß ein Theil des Chlorschwefels aus einem anderen Theile desselben  $\frac{2}{3}$  von dessen Schwefel aufnimmt, so daß dieser Theil sich in Schwefelchlorid,  $\text{SCl}^2$ , verwandeln kann, das sich mit dem Zinnchlorid verbindet. Es ist bekannt, daß Chlorschwefel jede Menge von Schwefel aufzulösen vermag.

Die wichtigste Eigenschaft der neuen Chlorverbindung des Schwefels ist, daß sie nicht, wie man aus der Zusammensetzung derselben vermuthen sollte, bei der Behandlung mit Wasser in schweflichte Säure und in Chlorwasserstoffsäure zerfällt. Ich habe schon oben angeführt, daß in der Auflösung der Verbindung in Wasser Zinnchlorid enthalten ist, aber außer demselben Chlorwasserstoffsäure, Schwefelsäure und unterschweflichte Säure. Letztere Säure fängt aber sehr bald nach der Behandlung mit Wasser auf die bekannte Weise sich zu zersetzen an; die Auflösung wird trübe durch sich ausscheidenden Schwefel, und es zeigt sich sehr bald ein Geruch nach schweflichter Säure.

Diese Eigenschaft des Schwefelchlorids,  $\text{SCl}_2$ , durch Wasser in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zu zerfallen, ist ganz analog dem Verhalten der schweflichten Säure im wasserfreien schweflichtsauren Ammoniak, welche durch Wasser, wie das ihr entsprechend zusammengesetzte Schwefelchlorid, ebenfalls in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zerfällt<sup>1)</sup>.

Wird das Zinn-Schwefelchlorid mit trockenem Ammoniakgas in Berührung gebracht, so findet eine sehr starke Einwirkung statt, und es entsteht eine sehr starke Erwärmung. Man erhält eine gelbbraune Masse, nicht unähnlich dem Chlorschwefelammoniak<sup>2)</sup>. Wird diese mit Wasser behandelt, so bleibt eine flockige, weiße Masse ungelöst; die filtrirte Auflösung bläut nicht das Lackmuspapier, wenn auch das Ammoniakgas im Ueberschuß angewandt worden war, sondern fängt sogar nach einiger Zeit an dasselbe zu röthen. Sie enthält keine Spur von Zinnoxid aufgelöst, dasselbe bleibt, mit Schwefel gemengt, unauflöslich bei der Auflösung im Wasser, und ist vollständig durch's Ammoniak abgeschieden worden.

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XXXIII S. 235.

2) Ehend. Bd. XXIV S. 306.

Die wässrige Auflösung wird schon in der Kälte durch Auflösungen von Chlorbaryum und Chlorstrontium gefällt, und mit einer salpetersauren Silberoxydauflösung bringt sie, außer daß dadurch Chlorsilber gefällt wird, alle Erscheinungen wie die Auflösung eines unterschweflichtsauren Alkalis hervor. Die wässrige Auflösung enthält daher schwefelsaures, unterschweflichtsaures und Chlorwasserstoff-Ammoniak.

Dieses Verhalten der mit Ammoniak gesättigten Verbindung ist in gewisser Hinsicht bemerkenswerth. Sie enthält keine Mischung von Zinnchlorid-Ammoniak und Schwefelchlorid-Ammoniak, denn das Zinnchlorid-Ammoniak ist im Wasser auflöslich, und aus dieser Auflösung wird durch mehr Ammoniak das Zinnoxid nicht gefällt<sup>1)</sup>, das überhaupt aus seinen Auflösungen durch Ammoniak nicht vollständig abgeschieden werden kann.

Wird das Zinn-Schwefelchlorid hingegen mit wässrigem Ammoniak behandelt, so sind die Erscheinungen etwas anderes. Es wird dadurch ebenfalls eine Mischung von Schwefel und Zinnoxid ausgeschieden, aber die Auflösung enthält noch viel Zinnoxid, das nach einem Zusatze einer Säure durch Schwefelwasserstoffgas als Zinneulfid abgeschieden werden kann. Sie enthält ferner noch schwefelsaures, unterschweflichtsaures und Chlorwasserstoff-Ammoniak.

Ich habe mich auch des wässrigen Ammoniaks bedient, um das Zinn-Schwefelchlorid quantitativ zu analysiren; aber obgleich die Resultate der Analysen sich sehr den oben angeführten nähern, so konnten sie aus mehreren Ursachen nicht vollkommen genau seyn. Das durch Ammoniak abgeschiedene Zinnoxid enthielt noch eine kleine Menge Chlor; aber die größte Menge desselben in einer Auflösung zu bestimmen, welche zugleich unterschweflichtsaures Ammoniak enthält, ist mit vielen

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XVI S. 64.



Schwierigkeiten und dessen ungeachtet mit Verlust verbunden.

### Chlor und Schwefeltitan.

Durch Zusammennischen von Titanchlorid und Chlorschwefel erhielt ich früher, wie durch Zinnchlorid und Chlorschwefel, Krystalle <sup>1)</sup> von hellgelblicher Farbe, die aus einem oben angeführten Grunde nicht näher untersucht werden konnten. Ich habe indessen auch schon vor längerer Zeit bemerkt, daß, wenn man Chlorgas über Schwefeltitan leitet, man eine flüchtige, feste, gelbe Verbindung von Chlorschwefel und Titanchlorid erhält <sup>2)</sup>.

Bei der Behandlung des Schwefeltitans durch Chlorgas erhält man, wie beim Schwefelzinn, zuerst eine gelbe Flüssigkeit, welche indessen durch mehr hinzugeleitetes Chlorgas und durch's Erkalten vollständig zu einem festen hellgelben Körper erstarrt. Dieser bildet aber nicht, wie bei der entsprechenden Zinnverbindung, deutliche Krystalle, sondern nur eine pelzartige Masse, in welcher keine krystallinische Structur entdeckt werden kann. An der Luft stößt sie einen starken weißen Dampf aus, zieht sehr schnell Feuchtigkeit aus derselben an, zerfließt und zersetzt sich äußerst leicht. Mit Wasser verhält sie sich ganz ähnlich wie die Zinnverbindung. In der wässrigen Auflösung findet man nämlich Titansäure, Chlorwasserstoffsäure, Schwefelsäure und unterschweflichte Säure. Auch gegen Salpetersäure hat sie ein gleiches Verhalten. Sie löst sich in etwas verdünnter Salpetersäure, unter Entwicklung von pomeranzengelben Dämpfen, ganz vollständig auf. Die Auflösung enthält keine unterschweflichte Säure, sondern nur Schwefelsäure, Titansäure und Chlorwasserstoffsäure. Von rauchender Salpetersäure wird sie, wie das Zinn-Schwefel-

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XVI S. 67.

2) Ebd. Bd. XV S. 145.

chlorid, in eine dicke weiße Masse verwandelt, die sich aber, ohne Abscheidung von Titansäure, vollständig durch hinzugefügtes Wasser auflöst.

Die Verbindung wurde durch dieselben Handgriffe wie die Zinnverbindung im reinen Zustand erhalten, um zur quantitativen Untersuchung angewandt werden zu können. Diese war in sofern weit leichter, als die Titansäure vollkommen durch Ammoniak gefällt werden kann, was bekanntlich beim Zinnoxid nicht der Fall ist. Es konnten daher in der salpetersauren Auflösung alle drei Bestandtheile der Verbindung bestimmt werden, was bei der Auflösung des Zinn-Schwefelchlorids nicht gut möglich war, in dessen schwefelsaurer Auflösung das Zinnoxid durch Schwefelwasserstoffgas gefällt werden mußte, wodurch eine genaue Bestimmung der Schwefelsäure schwerer möglich wurde.

Zur quantitativen Analyse wurde die Verbindung auf dieselbe Weise wie das Zinn-Schwefelchlorid in verdünnter Salpetersäure aufgelöst. Aus der Auflösung wurde durch Ammoniak die Titansäure gefällt. Die davon getrennte Flüssigkeit wurde durch Salpetersäure sauer gemacht, durch salpetersaure Silberoxydauflösung Chlorsilber gefällt, die abfiltrirte Flüssigkeit mit Chlorwasserstoffsäure, zur Abscheidung des überschüssig hinzugesetzten Silberoxyds, versetzt, und sodann durch eine Auflösung von Chlorbaryum schwefelsaure Baryterde niedergeschlagen.

Auf diese Weise habe ich vier Analysen von vier Quantitäten der Titanverbindung angestellt, welche zu verschiedenen Zeiten bereitet worden waren. Die Resultate derselben gaben indessen nicht die übereinstimmenden Resultate, wie die der Analysen des Zinn-Schwefelchlorids.

1. 1,5093 Grm. der Verbindung gaben 0,390 Grm. Titansäure und 0,993 Grm. schwefelsaure Baryterde. Die Verbindung war bei diesem Versuch mit rauchender Sal-

petersäure behandelt worden; daher wurde die Bestimmung des Chlorgehalts unterlassen.

II. 1,452 Grm. gaben 0,427 Grm. Titansäure, 0,656 Grm. schwefelsaure Baryterde und 4,491 Grm. Chlorsilber.

III. 0,959 Grm. gaben 0,332 Grm. Titansäure, 0,257 Grm. schwefelsaure Baryterde und 2,938 Grm. Chlorsilber.

IV. 1,775 Grm. gaben 0,576 Grm. Titansäure, 0,525 Grm. schwefelsaure Baryterde und 5,563 Grm. Chlorsilber.

Aus diesen Versuchen ergeben sich folgende Zusammensetzungen der zu verschiedenen Zeiten bereiteten Verbindung im Hundert:

	I.	II.	III.	IV.
Titan	15,58	17,73	20,87	19,56
Schwefel	9,09	6,23	3,70	4,09
Chlor	75,34 (1)	76,31	75,58	77,31
	<hr/> 100,00	<hr/> 100,27	<hr/> 100,15	<hr/> 100,95.

Aus diesen Resultaten folgt offenbar, daß die Verbindung immer verschieden zusammengesetzt bei jeder Bereitung erhalten wird. Denn der Mangel an Uebereinstimmung kann nicht durch den Gang der Untersuchung entspringen, welcher einfach ist; auch geben die verschiedenen Analysen keinen Verlust, sondern gerade nur einen so kleinen Ueberschuß, als man, bei gehöriger Vorsicht und Genauigkeit, immer bei der Analyse ähnlicher Substanzen erhält. Die Bereitung der Verbindung, die zu den verschiedenen Analysen angewandt wurde, war fast immer die nämliche; nur die zur dritten Analyse angewandte war in sofern von den andern verschieden bereitet worden, als sie mehrmals in einem Strome von Chlorgas von Neuem sublimirt worden war, und mit dem Chlorgase lange in Berührung blieb.

1) Als Verlust bestimmt.

Die berechnete Zusammensetzung einer Verbindung, welche dem Zinn-Schwefelchlorid analog zusammengesetzt ist, und der Formel  $\text{TiCl}^2 + 2\text{SCl}^2$  entspricht, ist folgende:

Titan	9,03
Schwefel	11,97
Chlor	79,00
	<hr/>
	100,00.

Nimmt man an, daß das Titan als Chlorid in der Verbindung enthalten ist, so nehmen die verschiedenen Mengen dieses Metalles, welche in den vier oben angeführten Analysen erhalten wurden, folgende Mengen von Chlor auf:

	I.	II.	III.	IV.
Titan	15,58	17,73	20,87	19,56
Chlor	45,52	51,69	60,84	57,02.

Der Schwefel ist dann in den vier untersuchten Quantitäten mit folgenden Mengen Chlor verbunden:

	I.	II.	III.	IV.
Schwefel	9,08	6,23	3,70	4,08
Chlor	29,92	24,62	11,71	20,29.

Diese Verbindungen des Schwefels mit Chlor würden folgende Zusammensetzungen im Hundert haben:

	I.	II.	III.	IV.
Schwefel	23,28	20,19	20,07	16,71
Chlor	76,72	79,81	79,93	83,26
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	100,00	100,00	100,00	100,00.

Vergleicht man diese Zusammensetzung mit der des Schwefelchlorids  $\text{SCl}^2$ , welche im Hundert aus:

Schwefel	18,52
Chlor	81,48
	<hr/>
	100,00

besteht, so findet man, daß in den drei ersten Versuchen das Schwefelchlorid weniger Chlor, im vierten Ver-

suche hingegen mehr Chlor als dieses enthält. Es glückte mir indessen nicht, durch mehrmalige Behandlung der Verbindung mit Chlorgas ein höheres Schwefelchlorid hervorzubringen. Durch erneuertes Erhitzen der Verbindung in Chlorgas entweicht Schwefelchlorid, ob mit einer gleichen Menge von Chlor, oder mit mehr, als es schon enthielt, lasse ich unentschieden. Diefs beweist wenigstens das Resultat des dritten Versuches, bei welchem dadurch die geringste Schwefelmenge bei der Analyse gefunden wurde.

Es scheint aus diesen Versuchen hervorzugehen, daß sich das Titanchlorid wohl mit dem Schwefelchloride,  $\text{SCl}_2$  zu verbinden scheint, daß aber durch gelindes Erhitzen die Verbindung nach und nach zersetzt wird, indem das Schwefelchlorid entweicht, und eine an Titanchlorid reichere Verbindung zurückbleibt. Wie wenig Schwefelchlorid beim Titanchlorid zurückbleiben muß, um mit diesem noch eine feste Verbindung zu bilden, bleibt noch zu untersuchen. — Das Verhalten des Antimonchlorids zum Schwefelchlorid, von welchem ich weiter unten handeln werde, ist dem des Titanchlorids ähnlich.

Zinnchlorid sowohl als Titanchlorid können sich mit den niedrigeren Chlorstufen des Schwefels verbinden; denn ich habe schon oben angeführt, daß Zinnsulfid sowohl als Titansulfid, wenn sie der Einwirkung des Chlorgases ausgesetzt werden, zuerst zu einer braungelben Flüssigkeit zerfließen, welche erst durch mehr hinzugeleitetes Chlorgas feste Verbindungen bilden. In den flüssigen Verbindungen sind die Chloride mit einer niedrigen Chlorstufe des Schwefels verbunden. Etwas von dieser ist in drei der untersuchten Verbindungen des Titanchlorids enthalten gewesen.

Ich muß noch bemerken, daß das Schwefeltitan, welches ich zu den angeführten Versuchen anwandte, nicht vollkommen rein war, was übrigena keinen Ein-

Aufs auf die angeführten Versuche haben kann. Ich habe schon früher gezeigt, daß, wenn man es durch Behandlung von Schwefelkohlenstoff mit erhitzter Titansäure bereitet, es schwer ist, es ganz frei von Titansäure zu erhalten <sup>1)</sup>. Aber außer dieser Einmischung enthält das Titansulfid noch oft Titansulfuret, das schwarz ist, während jenes grün, und im Strich messinggelb und stark metallisch ist. Beide Schwefelungsstufen scheinen den beiden Schwefelungsstufen des Zinnes, dem Sulfuret und dem Sulfid zu entsprechen. Ich behandelte ein Schwefeltitan, das sichtlich von dem schwarzen Titansulfuret enthielt, mit Chlorgas, und leitete, während jenes erhitzt wurde, das flüchtige Titan-Schwefelchlorid in Wasser, durch welches das Chlorgas noch längere Zeit hindurchströmte, wodurch fast aller sich ausscheidende Schwefel oxydirt wurde. Die Titansäure wurde durch Ammoniak, und die Schwefelsäure durch eine Auflösung von Chlorbaryum gefällt. Ich erhielt 0,0065 Grm. Schwefel, der nicht oxydirt worden war, 2,147 Grm. schwefelsaurer Baryterde und 0,128 Grm. Titansäure. Diese enthalten 0,2550 Grm. Titan und 0,3027 Grm. Schwefel, oder im Hundert 46,01 Proc. Titan und 53,99 Proc. Schwefel. Das Titansulfid,  $TiS_2$ , enthält im Hundert 43,01 Proc. Titan und 56,99 Proc. Schwefel. Die geringere Menge von Schwefel rührt daher vom eingemengten schwarzen Titansulfuret her.

#### Chlor und Schwefelantimon.

Reines Schwefelantimon ( $SbS_3$ ) in ganzen Stücken sowohl, als auch selbst als feines Pulver wird in der Kälte nicht von Chlorgas angegriffen. Wird indessen das Schwefelantimon nur höchst gelinde an irgend einer Stelle erhitzt, so fängt sogleich das Chlor an auf dasselbe einzuwirken, und verwandelt es in eine braune Flüssigkeit, die durch fernere Einwirkung des Chlors zu

*1) Poggendorff's Annalen, Bd. XV S. 445.*



einer fast pulverförmigen, nicht krystallinischen, beinahe ganz weissen Masse sich umändert. Wird diese ein wenig stärker erhitzt, so schmilzt sie, und bei noch stärkerer Erhitzung zersetzt sie sich vollständig in Antimonchlorür ( $\text{SbCl}_3$ ), Chlorschwefel und Chlor, wie ich dies schon früher bei einer anderen Gelegenheit erwähnt habe <sup>1)</sup>, wo ich umständlich die Erscheinungen beschrieb, die Chlorgas auf Schwefelantimon bewirkt, wenn man dieses erhitzt und die entstandenen flüchtigen Producte abdestillirt werden.

Wegen dieses Verhaltens ist es schwer, oder unmöglich, die Verbindung von Antimon- und Schwefelchlorid rein von eingemengtem Antimonchlorür zu erhalten. Ich brachte eine bestimmte Menge von gepulverten Schwefelantimon in einen gewogenen Apparat, und nachdem lange Chlorgas über dasselbe geleitet worden war, wurde an einer Stelle das Schwefelmetall sehr gelinde erhitzt. Wurde die Einwirkung dadurch zu stark, so wurde der Apparat von aussen mit Aether oder Alkohol betröpfelt, um die Hitze zu mildern. Dies wurde mehrere Male wiederholt, und wenn die Verwandlung vollendet zu seyn schien, wurde der Apparat gewogen, worauf er von Neuem der Einwirkung des Chlorgases ausgesetzt wurde. Die Wägungen wurden so oft wiederholt, bis keine Gewichtszunahme, sondern sogar durch erneutes gelindes Erhitzen eine geringe Gewichtsabnahme sich zeigte.

0,525 Grm. Schwefelantimon auf diese Weise mehrere Tage hintereinander behandelt, nahmen, nach violenten Wägungen, so lange beständig an Gewicht zu, bis sie 1,463 Grm. wogen. Aber es konnte nicht vermieden werden, dass durch das gelinde Erhitzen eine kleine Menge von Chlorschwefeldampf sich verflüchtigte, während das schwerere flüchtige Antimonchlorür verhältnissmässig in

1) Poggendorff's Annalen, Bd III S 446

größerer Menge zurückblieb. Bei der nächsten Wägung wog das Ganze nur 1,435 Grm.

Die Masse wurde mit sehr verdünnter Salpetersäure behandelt, worin sie sich, unter Entwicklung von pomeranzengelben Dämpfen, auflöste, ohne daß sich Antimonoxyd oder Antimonsäure ausschied. Durch die mit Wasser verdünnte Auflösung wurde Schwefelwasserstoffgas geleitet, und das erhaltene Schwefelantimon durch Wasserstoffgas in metallisches Antimon verwandelt. Es wurden 0,3683 Grm. daraus erhalten. Aus der vom Schwefelantimon getrennten Flüssigkeit wurden die letzten Spuren von aufgelöstem Schwefelwasserstoff durch eine salpetersaure Kupferoxydauflösung abgesehen, und sodann durch salpetersaure Silberoxydauflösung 3,882 Grm. Chlorsilber gefällt. Nachdem das überschüssig hinzugefügte Silberoxyd durch Chlorwasserstoffsäure entfernt worden war, wurden durch Chlorbaryumauflösung 0,794 Grm. schwefelsaure Baryterde niedergeschlagen.

Die Analyse hatte aber ergeben:

0,3683	Grm. Antimon
0,1095	- Schwefel
0,9572	- Chlor
<hr/>	
1,4350.	

In 0,525 Grm. Schwefelantimon sind indessen 0,382 Grm. Antimon und 0,143 Grm. Schwefel enthalten. Während der Operation hatten sich also 0,0137 Grm. Antimon und 0,0335 Grm. Schwefel mit Chlor verbunden verflüchtigt.

Im Hundert enthält jene Verbindung:

Antimon	25,67
Schwefel	7,63
Chlor	66,70
	<hr/>
	100,00.

*Offenbar ist hierin das Antimon mit der größten*

Menge von Chlor, die es aufnehmen kann, als  $\text{SbCl}^3$ , und der Schwefel als Schwefelchlorid,  $\text{SCl}^2$ , enthalten. Aber in dieser Verbindung,  $\text{SbCl}^3 + 3\text{SCl}^2$ , ist noch Antimonchlorür gemengt enthalten, weil bei der nothwendigen Einwirkung der gelinden Hitze die Verbindung sich in Chlorgas, Antimonchlorür und Chlorschwefel verwandelt hatte, von welchen, wie schon oben angeführt worden, sich verhältnißmäßig mehr vom letzteren als vom Antimonchlorür verflüchtigt hatte.

7,63 Theile Schwefel erfordern 33,57 Th. Chlor, um Schwefelchlorid,  $\text{SCl}^2$ , zu bilden. Aber 7,63 Th. Schwefel erfordern zu jener Verbindung,  $\text{SbCl}^3 + 3\text{SCl}^2$ , statt 23,67 Th. Antimon nur 20,39 Th., welche mit 27,97 Th. Chlor die höchste Chlorstufe des Antimons,  $\text{SbCl}^5$ , bilden. Die übrig bleibenden 5,28 Th. Antimon gebrauchen 4,35 Th. Chlor, um Antimonchlorür,  $\text{SbCl}^3$ , zu bilden. Die ganze Menge des Chlors, welche erfordert wird, wäre also 65,89 Th., statt 66,70 Th., welche die Analyse ergeben hat, woraus folgt, daß das eingemengte Antimonchlorür durch die längere Einwirkung des Chlors sich zu einem kleinen Theile in die höchste Chlorstufe verwandelt hatte.

Das Antimon - Schwefelchlorid verhält sich gegen Reagentien wie die entsprechenden Verbindungen des Zinns und des Titans. Bei der Behandlung mit Wasser zerfällt es in Antimon-säure, in Chlorwasserstoffsäure, in Schwefelsäure und in unterschwellichte Säure.

Wird die Verbindung,  $\text{SbCl}^3 + 3\text{SCl}^2$ , mit trockenem Ammoniakgas behandelt, so zeigen sich ähnliche Erscheinungen, wie bei der Behandlung der analogen Zinnverbindung,  $\text{SnCl}^4 + 2\text{SCl}^2$ , mit Ammoniakgas. Die Menge des absorbirten Ammoniaks ist beträchtlich, und beträgt beinahe  $\frac{2}{3}$  von der Menge des angewandten Schwefelantimons.

## Chlor und Schwefelarsenik.

Von allen Schwefelmetallen werden die Verbindungen des Schwefels mit dem Arsenik am leichtesten durch Chlorgas angegriffen. Ganze Stücke des in der Natur vorkommenden reinsten Auripigments ( $\text{AsS}_3$ ) zerfließen nach einer kurzen Zeit zu einer braunen Flüssigkeit, ohne daß dazu eine äußere Erwärmung nothwendig ist, wohl aber entsteht eine nicht unbedeutende Erwärmung durch die Einwirkung des Chlorgases von selbst. Die braune Flüssigkeit wird, wenn sie in einer Flasche aufbewahrt wird, welche mit Chlorgas angefüllt ist, nicht weiter verändert. Das Arsenik wird auch in seiner Verbindung mit Schwefel, wie im metallischen Zustande, durch Chlorgas nur in das der arsenichten Säure entsprechende Chlorarsenik,  $\text{AsCl}_3$ , verwandelt, und kein Ueberschuß von Chlorgas bringt eine höhere Chlorstufe hervor. Wird die braune Flüssigkeit mit verdünnter Salpetersäure behandelt, so löst sie sich, unter Entwicklung von pomeranzengelben Dämpfen, vollständig darin auf; es scheidet sich zwar aus der Auflösung keine arsenichte Säure ab, aber mit salpetersaurer Silberoxydauflösung versetzt, giebt sie, nach Abscheidung des Chlorsilbers und Sättigung der Flüssigkeit mit Ammoniak, einen gelben Niederschlag von arsenichtsaurom Silberoxyd. Auch entsteht in der salpetersauren Auflösung der braunen Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoffgas sogleich ein gelber Niederschlag.

Aber eben so wenig, wie das Arsenik in der Verbindung sich nicht durch die Einwirkung des Chlorgases in die höchste Chlorstufe verwandelt, so geschieht dies beim Schwefel eben so wenig; es bleibt auch bei einem Ueberschusse von Chlorgas auf einer niedrigeren Chlorstufe.

1,762 Grm. der braunen Flüssigkeit, in Salpetersäure

aufgelöst, gaben mit salpetersaurer Silberoxydauflösung 4,507 Grm. Chlorsilber. Die davon getrennte Flüssigkeit gab, nach Abscheidung des überschüssig zugesetzten Silberoxyds vermittelst Chlorwasserstoffsäure 1,756 Grm. schwefelsaure Baryterde. Die Menge des Arsens wurde aus dem Verluste bestimmt. Die Analyse ergab im Hundert:

Chlor	63,10
Schwefel	13,98
Arsenik (als Verlust)	22,92
	<hr/> 100,00.

Bei einer zweiten Analyse wurden 3,020 Grm. der Verbindung in wässrigem Ammoniak aufgelöst. Aus der milchichten Auflösung setzte sich Schwefel ab. Nach längerer Zeit wurde derselbe abfiltrirt, und die Flüssigkeit mit salpetersaurer Silberoxydauflösung versetzt. Der Niederschlag war erst weiß, wurde aber nach einiger Zeit braun. Er wurde so lange mit Salpetersäure digerirt, bis alles Schwefelsilber daraus entfernt war. Er wog darauf 7,701 Proc., was 62,91 Proc. Chlor in der Verbindung entspricht.

13,98 Theile Schwefel würden mit 21,78 Th. Arsenik (statt mit 22,92 Th.) sich zu Schwefelarsenik,  $\text{AsS}^3$ , verbinden. 21,76 Th. Arsenik erfordern 30,76 Th. Chlor, um Chlorarsenik,  $\text{AsCl}^3$  zu bilden; 13,98 Th. Schwefel würden mit 30,76 Th. Chlor eine Verbindung bilden, welche noch ein Mal so viel Chlor als der gewöhnliche Chlorschwefel ( $\text{SCl}$ ) enthält, und deren Darstellung im isohydrten Zustande mir nicht, wohl aber Dumas <sup>1)</sup> gelungen ist.

Die Zusammensetzung der braunen Flüssigkeit, in welche Auripigment durch Chlorgas verwandelt wird, kann also durch die Formel  $\text{AsCl}^3 + 3\text{SCl}$  ausgedrückt

1) *Annales de chimie et de physique*, T. XLIX p 204.

werden. Der sehr geringe Ueberschuss von Chlor, welchen die Analyse giebt, rührt von etwas aufgelöstem Chlor her, da die braune Flüssigkeit in einer großen Flasche aufbewahrt wurde, welche mit Chlorgas angefüllt war.

Die wahrscheinliche Ursache, weshalb in dieser Verbindung der Schwefel mit dem Chlor nur die Chlorstufe  $\text{SCl}$  und nicht  $\text{SCl}^2$  bildet, wird weiter unten angegeben werden.

Uebrigens verhält sich diese Verbindung gegen Wasser in sofern analog den früher beschriebenen, als sie bei Behandlung mit demselben in arsenichte Säure, in Chlorwasserstoffsäure, in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zerfällt. Bei der ferneren Zersetzung letzterer in schweflichte Säure und in Schwefel scheidet sich letzterer, mit der Menge von Schwefel gemengt, ab, den die Verbindung mehr enthält, als die früher erwähnten.

Wird Realgar,  $\text{AsS}^3$ , mit Chlorgas behandelt, so zerfließt es schon in der Kälte eben so leicht wie Auripigment, im Anfange zu einer gelblichen Flüssigkeit, welche indessen durch Absorption von mehr Chlor braun wird.

### Chlor und Schwefelselen.

Das Schwefelselen war aus einer Auflösung der selenichten Säure vermittelt Schwefelwasserstoffgas gefällt worden. Die Fällung geschieht eben so schwer vollständig, wie die einer Auflösung von Arseniksäure vermittelt Schwefelwasserstoffgas. Nach dem Trocknen sah das Schwefelselen roth aus.

Mit Chlorgas behandelt, verhält sich das Schwefelselen wie eine Mischung von gepulvertem Selen und Schwefel. Ich erhielt eine weiße Masse von Selenchlorid ( $\text{SeCl}^2$ ), gemengt mit Chlorschwefel, der gelbbraune Stellen darin bildete. Durch sehr gelinde Hitze ließ sich letzterer ganz vollständig vom Selenchlorid abtreiben, so daß dasselbe ganz rein zurückblieb. Es löste sich vollständig in Was-



ser auf, und bei einer Analyse erhielt ich daraus fast die ganze Menge von Chlor, welche im Selenchlorid enthalten ist. 1,417 Grm. davon gaben 3,638 Grm. Chlorsilber oder 63,34 Proc. Chlor. Im reinen Selenchlorid sind 64,16 Proc. Chlor enthalten.

Wird das Selenchlorid im Wasser aufgelöst, wenn der Chlorschwefel noch nicht vollständig davon verjagt worden ist, so erhält man eine rothe Auflösung, in welcher durch die, aus der unterschweflichten Säure frei gewordene schweflichte Säure die selenichte Säure zum Theil zu Selen reducirt worden ist.

Aus den beschriebenen Versuchen ergibt sich, daß mehrere flüchtige Chlormetalle mit einem für sich nicht darstellbaren, der schweflichten Säure analog zusammengesetzten Chloride des Schwefels Doppelverbindungen bilden können, welche oft durch erneuertes Erhitzen in Chlorschwefel, Chlor und in die Chlorverbindung des Metalles zerfallen. Von allen diesen Chlorverbindungen bildet das Zinnchlorid die ausgezeichnetste Verbindung mit dem Schwefelchlorid, welche in großen, deutlichen Krystallen erhalten werden kann, und nicht zersetzbar durch erneuerte Erhitzungen wie die anderen Verbindungen ist.

Als ich diese Reihe von Untersuchungen anfang, glaubte ich, daß die beschriebenen Verbindungen wie wahre Chlorsalze (analog den Schwefel- und den Sauerstoffsalzen) betrachtet werden konnten, da es einleuchtend ist, daß das Schwefelchlorid,  $\text{SCl}_2$ , offenbar weit besser mit basischen Chlormetallen Chlorsalze würde bilden können, als die Chloride des Quecksilbers, des Goldes, des Platins und ähnlicher Metalle mit denselben, welche Verbindungen v. Bunsdorff als wahre Chlorsalze betrachtet. Ich mußte indessen diese Ansicht sogleich aufgeben, als ich fand, daß das Schwefel-

chlorid sich nur mit solchen Chlormetallen verbindet, deren entsprechend zusammengesetzte Oxyde Säuren bilden, wie die dem Zinnoxid, der Titansäure und der Antimonsäure analogen Chloride. Mit Chlormetallen, deren entsprechend zusammengesetzte Oxyde starke Basen bilden, wie die Chlorverbindungen des Bleis, des Silbers, des Kupfers, des Kobalts, des Nickels, des Mangans u. s. w., kann das Schwefelchlorid sich nicht verbinden, wenigstens kann es in Verbindung mit diesen Chlorverbindungen nicht dargestellt werden, wenn man die entsprechenden Schwefelverbindungen mit Chlorgas behandelt. Während Zinn- und Titansulfid, so wie die Schwefelverbindungen des Arsens in der Kälte schon durch Chlorgas vollständig zersetzt werden, und Schwefelantimon schon bei einer äußerst gelinden Hitze, werden Schwefelblei, Schwefelkupfer und die Schwefelverbindungen der übrigen, so eben erwähnten Metalle in der Kälte gar nicht zersetzt, und bei anhaltender Hitze äußerst langsam und unvollständig, so daß z. B. zur vollständigen Zersetzung einiger Grammen von Schwefelblei mehrere Tage erfordert werden, während welcher es beständig erhitzt werden muß. Aber auch dann bildet sich nur Chlorblei, das zurückbleibt, und gewöhnlicher Chlorschwefel, der abdestillirt, und der eine gelbe Farbe hat, wenn äußerst wenig Chlorgas, eine braune hingegen besitzt, wenn dasselbe in reichlicher Menge zuströmt. Nur die Verbindungen des Schwefels mit dem Eisen lassen sich von diesen Schwefelmetallen leichter als andere durch Chlorgas zersetzen, aber auch in diesem Falle ist äußere Erwärmung nothwendig, und es bildet sich keine Verbindung; es destillirt Chlorschwefel ab, und es sublimirt Eisenchlorid. Dahingegen wird selbst das durch die schwächsten Säuren so sehr leicht zersetzbare Schwefelmangan, wie andere basische Schwefelmetalle, fast gar nicht durch Chlorgas zerlegt; nur durch ein stärkeres Erhitzen destillirt eine höchst geringe

Menge Chlorschwefel ab. Dasselbe ist auch beim Schwefelchrom der Fall <sup>1)</sup>. Der Grund davon scheint mir darin zu liegen, daß es vielleicht weder vom Mangan, noch vom Chrom höhere Chlorverbindungen im isolirten Zustande giebt, als Manganchlorür ( $MnCl^2$ ) und Chromchlorid ( $CrCl^3$ ). Ich habe gezeigt, daß das höhere Chromchlorid ( $CrCl^3$ ) nur in Verbindung mit Chromsäure dargestellt werden kann, und habe es wahrscheinlich gemacht, daß beim Mangan etwas ähnliches stattfindet.

Die Verbindungen des Schwefelchlorids mit flüchtigen Chlormetallen können, wenn man sie oxydirten Verbindungen analog betrachten will, am süglichsten mit den Doppelsäuren verglichen werden, welche die, jenen flüchtigen Chlormetallen analogen Oxyde mit stärkeren Säuren bilden. Es ist bekannt, daß Zinnoxid, Titansäure und Antimonsäure mit stärkeren Säuren Verbindungen nach bestimmten Verhältnissen bilden, die zum Theil im Wasser unlöslich sind.

Ich muß noch einen Umstand erwähnen, der vielleicht Beachtung verdient. Während reines Schwefelantimon, selbst im gepulverten Zustande, in der Kälte nicht vom Chlorgas angegriffen wird, und die Verbindungen basischer Metalle mit Schwefel, wie Schwefelblei, Schwefelkupfer u. s. w., der Zersetzung durch Chlorgas lange widerstehen, selbst wenn sie erhitzt werden, zersetzen sich die in der Natur vorkommenden Verbindungen des Schwefelantimons mit Schwefelblei, Schwefelkupfer u. s. w., welche wie Schwefelsalze betrachtet werden müssen, ganz vollständig durch Chlorgas schon in der Kälte, oft sogar wenn sie in ganzen Stücken damit in Berührung gebracht werden. Eine spätere Er-

1) Das Schwefelmangan wurde dargestellt, indem über stark erhitztes schwefelreiches Manganoxydul Schwefelwasserstoffgas so lange geleitet wurde, als sich noch Wasser entwickelte. Das Schwefelchrom war durch Behandlung des Chromchlorids ( $CrCl^3$ ) mit Schwefelwasserstoffgas bereitet worden.

bitzung ist dann nur nothwendig, um die flüchtigen Chlorverbindungen von den nicht flüchtigen abzudestilliren.

Ich habe schon bei einer anderen Gelegenheit erwähnt, daß, um die in der Natur vorkommenden Verbindungen des Schwefelantimons und des Schwefelarseniks mit basischen Schwefelmetallen zu analysiren, keine Methode der vermittelst Chlorgas vorzuziehen ist <sup>1)</sup>. — Diese Methode paßt indessen durchaus nicht, wie sich aus dem so eben Gesagten ergibt, für die Untersuchung basischer Schwefelmetalle, und selbst auch nicht zur Analyse der Verbindungen von Antimon- oder Arsenikmetallen mit Schwefelmetallen (Nickelglanz, Glanzkobalt, Arsenikkies), weil auch diese nur mit großer Schwierigkeit und langsam vom Chlorgas zerlegt werden <sup>2)</sup>.

Ich kann dieser Abhandlung noch die Bemerkung hinzufügen, daß das Schwefelchlorid,  $\text{SCl}_2$ , nicht die höchste Chlorstufe des Schwefels sey. Es ist mir gelungen ein Schwefelchlorid darzustellen, welches der Schwefelsäure entsprechend zusammengesetzt ist,  $\text{SCl}_3$ , und das bei seiner Zersetzung durch Wasser in Schwefelsäure und in Chlorwasserstoffsäure zerfällt.

#### Bemerkungen über den Chlorschwefel ( $\text{S} + \text{Cl}$ ).

Der Chlorschwefel zeichnet sich durch den Mangel an Analogie in seinen Eigenschaften von allen anderen flüchtigen Chlorverbindungen aus. Bekanntlich werden diese durch Behandlung mit Wasser in Chlorwasserstoffsäure und in eine Sauerstoffsäure zersetzt, welche durch den mit Chlor verbundenen Körper und durch den Sauerstoff des Wassers gebildet wird. Einige wenige Chlorverbindungen setzen, weil keine ihnen entsprechende Sauerstoffsäuren existiren, einen Theil des mit Chlor verbundenen Körpers ab. Dieß ist der Fall beim Tellur-

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XV S. 456.

2) *Ebend.* Bd. XV S. 588.

chlorig und Selenchlorig, welche, bei der Behandlung mit Wasser, Tellur und Selen hinterlassen, während Chlorwasserstoffsäure, tellurichte und selenichte Säure gebildet werden.

Auch der Chlorschwefel hinterläßt bei seiner Behandlung mit Wasser Schwefel ungelöst. Aber es ist bekannt, wie schwierig und langsam sich dieser ausscheidet. Früher, als man die Zusammensetzung des Chlorschwefels als der unterschweflichten Säure analog zusammengesetzt glaubte, also der Formel  $S + Cl$  entsprechend, war man ziemlich allgemein der Meinung, 'dass dieser sich ausscheidende Schwefel von der Zersetzung der durch Behandlung mit Wasser gebildeten unterschweflichten Säure herrühre, und dass der Chlorschwefel durch Wasser in Chlorwasserstoffsäure und in unterschweflichte Säure, und diese wieder in Schwefel und in schweflichte Säure zerfalle. Aber schon vor längerer Zeit gaben Bucholz und Berthollet unter den Zersetzungsproducten des Chlorschwefels durch Wasser Schwefelsäure an. Diese Thatsache, welche ihre volle Richtigkeit hat, ist indessen in die meisten neueren Lehrbücher der Chemie nicht aufgenommen worden, und von allen, die ich in dieser Hinsicht durchgesehen habe, ist es nur vorzüglich Dumas's, *Traité de chimie* (T. I p. 225) der ihrer erwähnt. Die Schwefelsäure, welche sich bei der Zersetzung des Chlorschwefels vermittelt Wasser bildet, entsteht, wie ich mich oft überzeugt habe, nicht durch Oxydation der aufgelösten schweflichten Säure durch den Sauerstoff der atmosphärischen Luft. Man kann ihre Gegenwart entdecken, wenn man luftfreies Wasser angewandt, und mit der größten Sorgfalt allen Luftzutritt verhindert hat. Auch ein Chlorschwefel, der sehr viel überschüssigen Schwefel aufgelöst enthält, giebt unter seinen Zersetzungsproducten durch Wasser Schwefelsäure, so dass man nicht die Meinung aufstellen kann, die Schwefelsäure würde vielleicht durch überschüssiges Chlor des Chlorschwefels

bei der Zersetzung mit Wasser gebildet. Der Chlorschwefel, von welcher Zusammensetzung er auch seyn mag, zerfällt also durch Wasser in Chlorwasserstoffsäure, in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure; diese zersetzt sich dann ferner langsam in schweflichte Säure und in Schwefel, und mit letzterem scheidet sich auch noch der Schwefel ab, den der Chlorschwefel aufgelöst enthält.

Aber dieselbe Eigenschaft, in Chlorwasserstoffsäure, in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zu zerfallen, besitzt auch das Schwefelchlorid,  $\text{S}\text{Cl}^2$ , in seiner Verbindung mit Zinnchlorid, mit Titanchlorid und mit Antimonchlorid. Es scheint mir daher sehr wahrscheinlich, daß im Chlorschwefel, wie er durch Einwirkung von überschüssigem Chlor auf Schwefel entsteht, das Schwefelchlorid enthalten sey, das durch Einwirkung von Chlor auf die Schwefelverbindungen des Zinns, des Titans und des Antimons erzeugt wird. Aber nur in Verbindung mit den höchsten Chloriden dieser Metalle kann der Schwefel so viel Chlor aufnehmen, daß er das der schweflichten Säure entsprechende Chlorid  $\text{S}\text{Cl}^2$  bildet. Wahrscheinlich kann dieses Schwefelchlorid im reinen Zustande für sich nicht existiren, sondern nur entweder in Verbindung mit jenen Chloriden, oder mit Schwefel, den es in allen Verhältnissen aufzulösen vermag.

Nach dieser Ansicht ist also aller Chlorschwefel, der durch Einwirkung von Chlor auf Schwefel entsteht, Schwefelchlorid,  $\text{S}\text{Cl}^2$ , das Schwefel aufgelöst enthält. Außer Schwefel scheint das Schwefelchlorid viele andere Substanzen auflösen zu können, ohne seine charakteristische Eigenschaft, durch Wasser in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zu zerfallen, zu verlieren. In einer Abhandlung, welche ich in einem der folgenden Hefte dieser Annalen bekannt machen werde, werde ich zu zeigen suchen, daß wasserfreie Schwefelsäure in sehr



großer Menge vom Chlorschwefel aufgenommen werden kann.

Ich habe früher zu zeigen gesucht, daß die Verbindung des Chlors mit Schwefel, in welcher gleiche Atome von beiden Elementen verbunden sind,  $S + Cl$ , in sofern eine gewisse Beständigkeit besitzt, als sie ohne Zersetzung von einem Chlorschwefel, der noch mehr Schwefel enthält, abdestillirt werden kann, und daß dieses Destillat immer von gleicher Zusammensetzung ist <sup>1)</sup>. Man muß daher wohl auf die Meinung geführt werden, daß dieses Product eine bestimmte chemische Verbindung sey. Nimmt man indessen dies an, so wäre die rationelle chemische Formel für diese Verbindung nicht  $S + Cl$ , sondern nach obiger Ansicht  $SCl^2 + 3S$ .

Daß diese Verbindung bei niedrigerer Temperatur flüchtig ist, als Schwefel, und von diesem bei der Destillation nichts zurückbleibt, kann nicht auffallend seyn, da schwerer flüchtige Körper gemeinschaftlich mit leichter flüchtigen bei niedrigeren Temperaturen überdestilliren, als wenn sie allein ohne diese erhitzt werden. Daß bei dieser Verflüchtigung oft Verbindungen von bestimmter Zusammensetzung überdestillirt werden können, sehen wir bei den Verbindungen des Alkohols und des Chlorgwasserstoffs mit Wasser.

Ich habe früher bemerkt, daß es mir nicht hat gelingen wollen, eine beständige Verbindung von Chlor und Schwefel darzustellen, welche der Zusammensetzung  $S + Cl$  entspräche. Dumas indessen behauptet, sie im isolirten Zustande dargestellt zu haben. Aus oben angeführten Versuchen ergibt sich, daß sie wenigstens in Verbindung mit Arsenikchlorür,  $AsCl^3$ , existiren könne. Nimmt man an, daß auch sie eine bestimmte chemische Verbindung ist, so ist die chemische Formel für dieselbe  $SCl^2 + S$ , und für die oben erwähnte Verbindung von

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XXI S. 432.

diesem Chlorschwefel und Arsenikchlorür, welche oben mit der Formel  $\text{AsCl}^3 + 3\text{S}\text{Cl}$  bezeichnet wurde, müßte dann eigentlich die Formel  $2\text{AsCl}^3 + 3\text{S}\text{Cl}^2 + 3\text{S}$  gelten. — Offenbar giebt das Schwefelarsenik mit dem Chlor aus dem Grunde nicht analoge Verbindungen, wie Schwefelzinn und Schwefelantimon, weil das Schwefelchlorid,  $\text{S}\text{Cl}^2$ , sich nur mit den höchsten Chlorverbindungen von Metallen zu verbinden scheint. Vom Arsenik existirt indessen keine der Arseniksäure analoge Chlorverbindung,  $\text{AsCl}^3$ . Würde sie dargestellt werden können, so würde dieselbe eine ähnliche Verbindung mit dem Schwefelchlorid geben, wie das Antimonchlorid,  $\text{SbCl}^3$ .

Dafs die dem Schwefelchlorid,  $\text{S}\text{Cl}^2$ , entsprechend zusammengesetzte schweflichte Säure, wenn sie im wasserfreien Zustande mit trockenem Ammoniak verbunden wird, einen festen Körper bildet, der krystallinisch und von gelber Farbe ist, und in welchem durch Behandlung mit Wasser die schweflichte Säure in Schwefelsäure und in unterschweflichte Säure zerfällt, ist schon oben erwähnt worden. Die Zusammensetzung dieser Verbindung, welche durch die Formel  $\text{NH}^3 + 2\text{S}$  ausgedrückt werden kann, ist ganz der der Zinnverbindung,  $\text{SnCl}^2 + 2\text{S}\text{Cl}^2$ , entsprechend, indem wasserfreies Ammoniak und Zinnchlorid mit zwei Atomen, ersteres von schweflichter Säure, letzteres von dem derselben entsprechenden Schwefelchlorid, vereinigt sind.

#### IV. Ueber zwei norwegische Kobalterze von den Skutteruder Gruben; von Th. Scheerer, Hüttenmeister auf Modums Blaufarbenwerk in Norwegen.

Unter den Krystallen, welche auf den Skutteruder Gruben vorkommen, unterscheidet man durch das äussere Ansehen leicht drei Arten. Die erste Art ist der ge-

wöhnliche normale Glanzkobalt, der sich durch seine, fast stets pentagondodecaederische Krystallform und seinen röhlichen Glanz auszeichnet. Die andern beiden Arten haben diesen Stich in's Röhliche durchaus nicht, und unterscheiden sich auch durch die Krystallform sehr wesentlich. Diese Kobaltspecies, welche sowohl durch den hiesigen Inspector, Hrn. Roscher, so wie durch den Bergmeister, Hrn. Böbert, schon seit einer Reihe von Jahren beobachtet sind, habe ich zum Gegenstande einer näheren, sowohl analytischen als krystallographischen, Untersuchung gemacht, von der ich hier die Resultate mittheilen will.

*Erste abweichende Art.* Dieselbe kommt sowohl derb als krystallisirt vor, hat einen lebhaften Arsenikkiesglanz, und, dem äußeren Ansehen nach, auch ganz dieselbe Krystallform, selbst bis auf die charakteristische brachydiagonale Streifung des letzteren Minerals. Die Härte weicht ebenfalls nicht merklich von der des Arsenikkieses ab, und auch das specifische Gewicht = 6.23 ist so wenig von dem des Arsenikkieses verschieden, daß man aus allen diesen Merkmalen schließen sollte, einen normalen Arsenikkies vor sich zu haben, wenn man sich nicht leicht durch chemische Versuche überzeugen könnte, daß diese, dem Arsenikkies so ähnlichen Krystalle einen nicht unbedeutenden Kobaltgehalt besitzen. Eine Analyse erschien also hier vor der Hand als das Wichtigste, um dem Wesen des Minerals auf die Spur zu kommen. Ich nahm daher mehrere, 2 bis 3 Linien lange Krystalle, zerstieß sie gröblich, und unterwarf einen Theil der erhaltenen Stücke der Analyse. Dieselbe wurde auf die von mir früher <sup>1)</sup> beschriebene Art unternommen, jedoch so, daß der Arsenik auf die gewöhnliche Art durch Fällung mittelst Schwefelwasserstoffgas bestimmt wurde. Es ergab sich hierbei folgende Zusammensetzung:

1) Siehe S. 104 dieses Bandes.

## 548

17,57 Schwefel

47,55 Arsenik


26,54 Eisen

8,31 Kobalt

---

 99,97.

Ich versuchte nun die numerische Gestalt dieser Zusammensetzungsart durch Formeln auszudrücken, und fand, daß keine dieselbe so genau wieder gab, als:



oder mit Worten: das Mineral erschien als eine chemische Verbindung von 3 Atomen Arsenikkies mit 1 Atom (eisenfreien) Glanzkobalt. Diese Formel giebt nämlich folgendes numerische Verhältnisse:

19,76 Schwefel

46,18 Arsenik

25,00 Eisen

9,06 Kobalt

---

 100,00

welches, scheint mir, genau genug mit der Analyse übereinstimmt, indem man sich nur einen kleinen Theil Kobalt durch Eisen, und einen Theil Schwefel durch Arsenik ersetzt zu denken braucht.

Die Idee, daß das hier untersuchte Mineral weiter nichts sey, als ein kobalthaltiger Arsenikkies, d. h. ein Arsenikkies, in welchem *mehr oder weniger* von dessen Eisengehalt durch Kobalt ersetzt sey, lag zu nahe, als daß ich es bei einer Analyse hätte bewenden lassen können. Ich analysirte daher den zurückgebliebenen Theil der Krystallstücke (welche, ihrer gröblichen Form wegen, nicht mit den vorigen als von gleicher Mengung betrachtet werden konnten), und fand:

17,34 Schwefel

46,76 Arsenik

26,36 Eisen

9,01 Kobalt

---

 100,47

in nicht sehr großer Abweichung von der ersten Analyse. Auch hiermit noch nicht zufrieden, unterwarf ich einen einzelnen Krystall, welcher 1,003 Grm. wog, der analytischen Untersuchung. Es ergab sich folgende Zusammensetzung:

18,06 Schwefel

46,01 Arsenik

26,97 Eisen

8,38 Kobalt

---

99,42.

Um nun völlig sicher zu seyn, probirte ich auch eine Quantität des derb vorkommenden Minerals bloß auf seinen Kobaltgehalt, und fand:

10,8 Kobalt.

Dieser hohe Gehalt schien wieder der Selbstständigkeit meines Minerals ungünstig zu seyn; jedoch, da ein derbes Stück angewendet wurde, so war eine Einmischung von Glanzkobalt denkbar. Um endlich meinem Zweifel durch einen entschiedenen Schritt ein Ende zu machen, benutzte ich eine Mittheilung des Hrn. Inspector Roscher. Derselbe hatte nämlich durch Kobalt-Schmelzproben bemerkt, daß der Kobaltgehalt in diesem Minerale abnehme, je größer die Krystalle seyen. Ich untersuchte daher den größten Krystall, den ich mir verschaffen konnte. Hr. Bergmeister Böbert hatte die Güte, mir denselben zu überlassen. Dieser Krystall war beinahe einen Zoll lang und etwa einen halben breit. Da es nur auf den relativen Gehalt an Eisen und Kobalt ankam, bestimmte ich auch nur diesen. Das Durchschnittsresultat zweier sorgfältiger, sehr wenig von einander abweichender Proben war:

28,77 Eisen

6,50 Kobalt.

Dieses Ergebnis warf meine ganze frühere Theorie über den Haufen, und ich glaube es ist dadurch erwiesen, daß das in Rede stehende Mineral nur als ein Kobalt-

haltiger Arsenikkies zu betrachten ist. Der Kobaltgehalt in demselben kann jedoch nicht als bloß mechanisch eingemengt betrachtet werden, wie sich leicht ergibt, wenn man die bei den verschiedenen Analysen erhaltenen numerischen Werthe des Eisen- und Kobaltgehaltes zusammenlegt. Nämlich:

	1.	2.	3.	4.
Eisen	26,54	26,36	26,97	28,77
Kobalt	8,31	9,01	8,38	6,50
	34,85	35,37	35,35	35,27.

Das Kobalt ersetzt also wirklich das Eisen. Sehr merkwürdig bleibt jedoch stets der sich bei Krystallen von mittlerer Gröfse so gleich bleibende Kobaltgehalt, und das Abnehmen desselben bei der Zunahme der Krystalle. — Das bei den Analysen erhaltene Eisenoxyd und Kobaltoxyd ward stets einer weiteren Prüfung unterworfen, ohne dafs sich bemerkbare Verunreinigungen auffinden liefsen.

Ich war nun begierig zu sehen, welche Verschiedenheit in der Krystallform der Kobaltgehalt beim Arsenikkies hervorbringe. Zum Messen eigneten sich nur die kleinsten, meist unter einer Linie langen Krystalle, da die gröfseren zu viel Streifung, Krümmung und dergleichen Unebenheiten zeigten.

Die am häufigsten vorkommende Krystallform war die, wie sie Fig. 11 Taf. I zeigt, also, dem Habitus nach, ganz die rhombische des Arsenikkieses. Die Flächen  $rr'$  des horizontalen brachydiagonalen Prisma's  $m\bar{P}\infty$  sind häufig so verlängert, dafs die Krystalle dadurch ein säulenartiges Ansehen erhalten. Sie sind, auch bei den kleinsten Krystallen, so stark gestreift, dafs sie keine genaue Messung gestatten. Die Flächen  $MM'$  des verticalen Prisma's  $\infty P$  waren bei den gröfseren ziemlich bedeutend ausgehöhlt, gerade wie es oft beim Arsenikkies der Fall ist. Auch bei den kleineren Krystallen wachte diese Aushöhlung stattfinden, jedoch wies sie



sich in keinem dem Auge bemerkbaren Grade. Bei drei verschiedenen Krystallindividuen ward durch Messung vermittelt eines Apel'schen Reflexionsgoniometers gefunden:

$$1) M : M' = 111^{\circ} 40'$$

$$2) M : M' = 111 \quad 49$$

$$3) M : M' = 112 \quad 2$$

Beim Arsenikkies ist:

$$M : M' = 111^{\circ} 53'.$$

Ob nun die hier stattfindende Abweichung von jener Krümmung, oder von dem verschiedenen Kobaltgehalte herrührt, will ich nicht entscheiden.

Die Flächen  $gg'$  des horizontalen makrodiagonalen Prisma's  $P\infty$  waren bei allen Krystallen die am besten ausgebildeten. Ich erhielt bei verschiedenen Individuen folgende Resultate:

$$1) g : g' = 58^{\circ} 30'$$

$$2) g : g' = 58 \quad 32$$

$$3) g : g' = 58 \quad 29$$

$$4) g : g' = 58 \quad 28$$

$$5) g : g' = 58 \quad 30$$

während beim Arsenikkies ist:

$$g : g' = 59^{\circ} 22'.$$

Diese constante Abweichung von beinahe einem ganzen Grade ist zu bedeutend, als daß sie als unwesentlich betrachtet werden könnte. *Der Kobaltgehalt im Arsenikkies scheint also besonders auf die Verkürzung der Brachydiagonale zu wirken.*

Einer Combination, welche, meines Wissens nach, nicht beim Arsenikkies vorkommt, will ich noch hier gedenken. Dieselbe ist, wie Fig. 12 Taf. I sie zeigt. Die  $p$  Flächen sind gleich einem makrodiagonalen Flächenpaar  $= \infty P\infty$ , und  $xx'$  ist eine Pyramide  $m'Pn'$ , welche die Combinationskante von  $Mg$  parallel abstumpft. Vermittelt der Combinationsgleichung:

$$m'n'(m''n - mn'')rr'' + r'm'(r''m - rm'')nn'' \\ n'r'(n''r - nr'')mm'' = 0,$$

wo  $m$ ,  $n$ ,  $r$  die Parameter der Flächen  $g$ ,  $g'$ , und  $m''$ ,  $n''$ ,  $r''$  die der Flächen  $M$ ,  $M'$  sind, die gesuchten Parameter von  $x$ ,  $x'$  dagegen  $m'$ ,  $n'$ ,  $r'$ , findet man:

$$n' = \frac{m'}{m' - 1}, \text{ also: } m' \bar{P} \frac{m'}{m' - 1}.$$

Die Flächen  $x$ ,  $x'$  waren jedoch nicht so spiegelnd, daß  $m'$  hätte bestimmt werden können. Sehr interessant, besonders in krystallographischer Hinsicht, wäre es, zu untersuchen, ob nicht durch Zunahme des Kobaltgehaltes ein Uebergang des kobaltbaltigen Arsenikkieses in den Glanzkobalt stattfindet. Es scheint aber, daß die Lücke von einigen 30 Proc. bis zu 10 Proc. Kobaltgehalt nicht ausgefüllt sey. Dennoch werde ich aber in der Folge mein Augenmerk darauf richten, diese Uebergangsglieder zu finden.

Die Ansicht, daß das hier betrachtete Mineral ein kobalthaltiger Arsenikkies sey, gewinnt noch mehr Wahrscheinlichkeit durch folgende geognostische Thatsache: Das Kobaltlager von Skutterud, welches ziemlich genau senkrecht fällt und von Nord nach Süd streicht, endet plötzlich in einem südlichen Gebirgsabhange. Verfolgt man das Streichen des Kobaltlagers etwa eine Meile, so findet sich, jenseits eines Flusses (des Storelv), ein kobaltfreies Arsenikkieslager von ungefähr derselben Schichtenstellung. Es scheint also, daß die Entstehung des Arsenikkies- und des Kobaltlagers gleichzeitig gewesen sey, und daß letzteres das erste mit Kobalt versehen habe, so weit es selbst reichte.

In seinem Handbuche der Oryktognosie führt Steffens einen »partiell decrescirenden« Glanzkobalt auf. Die Beschreibung dieses Minerals paßt in vielen Stücken auf das hier beschriebene, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß Steffens diesen kobaltbaltigen Arsenikkies damit meint.

**XXX**

*Zweite abweichende Art.* Dieselbe ist durch ihren starken Zinn- ja fast Silberglanz ausgezeichnet, und ihr großes specifisches Gewicht = 6,78 charakterisirt sie noch mehr. Sie findet sich sowohl derb, als mit mehr oder weniger deutlichen tesseralen Spaltungsflächen und auch in einzelnen Krystallen ausgebildet.

Eine Analyse ergab folgende Zusammensetzung:

77,84 Arsenik
20,01 Kobalt
0,69 Schwefel
1,51 Eisen
Spur Kupfer
100,05

welche ziemlich scharf mit dem numerischen Verhältniß paßt, welches die Formel



gibt, nämlich:

79,26 Arsenik
20,74 Kobalt
100,00

sobald man annimmt, daß etwas Arsenik durch Schwefel, und etwas Kobalt durch Eisen ersetzt sey.

Bei der Analyse dieses Minerals will ich eines Umstandes gedenken, welcher vielleicht Manchem unbekannt seyn könnte. Wenn man nämlich die Auflösung desselben in Salpetersäure oder Königswasser mit Schwefelwasserstoffgas füllt, so erhält man zuerst einen orangenrothen Niederschlag, etwa von der Farbe des Schwefelantimons, aber nicht von der flockigen Beschaffenheit desselben. Nach Verlauf einiger Zeit hört jedoch dieser so gefärbte Niederschlag auf, und es bildet sich dann nur der bekannte des Schwefelarseniks. Unterbricht man die Operation, sobald man das Aufhören des rothen Niederschlags merkt, und filtrirt denselben, so findet man,

dafs sich die abfiltrirte Masse ganz wie Schwefelarsenik verhält. Verflüchtigt man dieselbe jedoch, so läfst sie einen höchst unbedeutenden Rückstand, welcher sich in Salzsäure mit grünlicher Farbe löst, und sich sowohl vor dem Löthrohre, als auf nassem Wege als Kupfer ausweist. Behandelt man das gepulverte Mineral zuerst mit Salzsäure, so wird fast gar nichts von demselben gelöst. Das Wenige des Gelösten giebt aber mit Schwefelwasserstoffgas einen braunschwarzen Niederschlag von Schwefelkupfer. Wird darauf das so durch Salzsäure behandelte Mineral in Salpetersäure oder Königswasser gelöst, so giebt es durch Schwefelwasserstoff nicht mehr jenen orangerothen Niederschlag. Es ist also hierdurch erwiesen, dafs eine Spur von Kupfer dem Schwefelarsenik eine röthliche Farbe mittheilt. Wahrscheinlich ist dieses Kupfer in einer Spur von mechanisch eingemengtem Kupferkies enthalten.

Das krystallisirte Mineral hat, bei den von mir beobachteten Krystallen, stets die Hauptgestalt des Octaëders mit untergeordneten Würfel-, Rhombendodecaëder- und Ikositetraëder-Flächen. Diese letztere fehlen an keinem Krystalle. Ich mafs den Neigungswinkel einer solchen Fläche zu der des Octaëders, und fand:

$$160^{\circ} 33',$$

woraus sich ergibt, dafs das Ikositetraëder ein 202 (Parameter  $= 2 : 1 : 2$ ) ist, also gerade wie es an dem gewöhnlichen Speiskobalt vorkommt.

Ein Verhältnifs, von dem ich mir anfangs ein sehr interessantes Resultat versprach, ist das Vorkommen von Krystallen dieses Minerals, welche mit Krystallen des normalen Kobaltkieses zusammengewachsen sind. Dieses Vorkommen ist nicht so selten, dafs es als eine einzelne Zufälligkeit angesehen werden könnte. So viel ist gewifs, dafs die Zusammenwachsung nicht nach den bisher bekannten Gesetzen der Zwillingsbildung stattfindet; *welche Regel aber dabei obwalte, habe ich bis jetzt noch*

nicht ausfindig machen können. Sehr wahrscheinlich sind die weissen Kobaltkrystalle später entstanden, als die röthlichen, weil man fast stets die letzten völlig ausgebildet findet, und die erstere aufsitzend. Sie können sich daher wohl auch ohne Gesetzmässigkeit an die hervorstehenden Kanten der Glanzkobaltkrystalle angesetzt haben.

Das hier in Rede stehende Mineral ist offenbar dasselbe, welches Breithaupt schon früher als „Tesseral-kies“ beschrieben hat; nur standen demselben keine Krystalle zu Gebote. Seit sich aber diese fanden, ist, glaube ich, der Name Tesseralkies nicht mehr passend, da der Würfel an den Krystallen sehr untergeordnet vorkommt, und die tesseralen Spaltungsflächen sich nur an einzelnen Stücken, und selbst da undeutlich (nur im Grossen) zeigen. Im Kleinen hat das Mineral einen muschligen Bruch, ohne bemerkbares krystallinisches Gefüge. Ich schlage daher vor, dieses Mineral, wegen seines grossen Arsenikgehaltes, *Arsenikkobaltkies* zu nennen.

Derb vorkommende Kobalterze von den drei hier gedachten Arten kann man, wenn man in Ungewissheit über ihre Art seyn sollte, sehr leicht durch das Löthrohr unterscheiden. In einer offenen Glasröhre gelind geröstet, giebt der Arsenikkobaltkies ein rosenrothes, der Glanzkobalt ein schmutzig violettes, und der kobaltbaltige Arsenikkies ein braunschwarzes Pulver. Zugleich giebt sich ersterer, sowohl im Kolben, wie in der Glasröhre, durch die Menge des sich sehr leicht sublimirenden Arseniks und der arsenichten Säure, so wie durch die nur schwache Spur von Schwefelreaction zu erkennen.

---

V. *Verhalten des Glases zum schwefelsauren Ammoniak und im Vacuum;*  
*von R. F. Marchand.*

Ein Gemenge von chlorwasserstoffsauerm und salpetersauerm Ammoniak greift Glas, namentlich bleihaltiges, sehr stark an. (Poggend. Annal. Bd. XXIV S. 192.) Ganz ähnlich verhält sich schwefelsaures Ammoniak. Da sich dieses Salz, wenn es im neutralen Zustande angewendet wird, bekanntlich durch Erhitzen in das saure Salz umändert, indem es Ammoniak entweichen läßt, so können wir sie gleich der sauren Verbindung betrachten. Wird dieses in einem Glasgefäße erhitzt, so beginnt es bei ungefähr  $140^{\circ}$  C. zu schmelzen; bis zu  $280^{\circ}$  C. erleidet es keine weitere Veränderung, bei dieser Temperatur aber entweicht Ammoniak, schwefelsaures und schweflichtsaures Ammoniak sublimiren sich, und sehr bald bemerkt man nun, daß das Glasgefäße stark angegriffen wird. Die ganze innere Oberfläche wird matt, indem sich die Schwefelsäure mit dem Kali und, vielleicht vorübergehend, das Ammoniak mit der Kieselsäure verbindet. Meist zerspringt das Gefäße, das oft bis in die Mitte des Glases zerfressen ist, und aus den Rissen quillt eine weiße, feuerbeständige, schwer schmelzbare Salzmasse, die sich vor dem Löthrohre bald als schwefelsaures Kali zu erkennen giebt.

Ich habe ferner sehr oft bemerkt, daß die (bleihaltigen) Uhrgläser, welche ich anwende, um Substanzen darauf im Vacuum über Schwefelsäure zu trocknen, nach einiger Zeit, ungefähr 2 bis 4 Wochen, stets mit unzähligen Rissen und Sprüngen bedeckt sind, und sich leicht kleine Splitterchen ablösen lassen. Eine Gewichtsabnahme habe ich dabei durchaus nicht bemerken können, weshalb die Erscheinung auch nicht auf Entweichen von eingeschlossener Luft beruhen kann, wie Bischof, der etwas Aehnliches bemerkt hat, anzunehmen geneigt ist. (Poggend. Ann. Bd. I S. 397.) Bei den Glocken der Luftpumpen und anderem Glase habe ich dergleichen niemals wahrgenommen.



## VI. Beschreibung einiger chemischen Apparate; von Leopold Gmelin in Heidelberg.

### 1) Austrocknungsapparat.

Das Trocknen erfolgt in demselben, wie in den ähnlichen von Berzelius und von Liebig (Poggend. Annal. Bd. XXVII S. 304 und 679), durch einen Strom heißer Luft. Die getroffene Abänderung bezweckt einen schnelleren Erfolg und ein bequemerer Abwägen vor und nach dem Trocknen.

Durch die in eine feine Spitze auslaufende, mit trockenem Chlorcalcium angefüllte Röhre *a* (Figur 1 Taf. IV) dringt die Luft herein. Die hufensförmige Röhre *bcd* besteht aus einem engeren und einem weiteren Stücke, in welches letztere die Röhre *a* eingeschoben ist. Die Röhre *a* (in Figur 2 Taf. IV vergrößert und für sich zu sehen) ist an beiden Enden offen, läuft jedoch am unteren in eine nach oben gebogene enge Spitze aus, so daß von der zu trocknenden Materie, die man in die Röhre schüttet, nichts herausfallen kann. In das untere Ende des weiten Theils der Röhre *bcd*, nämlich bei *c*, ist mit Kleister ein ausgehöhlter Kork geklebt, in welchen das untere Ende der Röhre *a* ganz luftdicht paßt. Hat man demnach die Röhre *a* mit ihrem gröblich gepulverten Inhalte, den man zu trocknen beabsichtigt, gewogen, so schiebt man sie in die Röhre *bcd* und drückt sie mittelst eines hölzernen Stäbchens hinreichend fest in den bei *c* angebrachten Kork, so daß nachher die Luft genöthigt ist, durch die Röhre *a* hindurchzugehen. Der Kessel *fgh* dient als Wasserbad; sein Deckel hat zur Aufnahme der Röhre *bcd* eine Spalte. Der übrige Apparat ist hinreichend bekannt. Die Austrocknung erfolgt schnell und gleich-

förmig, da die trockne Luft durch die ganze Stule des Pulvers hindurchgeht, und nicht bloß darüber hinwegstreicht. Zeigt sich in der Röhre *ik* keine Feuchtigkeit mehr, und nimmt auch die der Röhre *l* ab, so nimmt man den Apparat aus dem Wasserbade, zieht die Röhre *ik* mit ihrem Stöpsel aus *d* heraus, und zieht dann mittelst einer mit Faden umwickelten platten Drahtzange sehr behutsam die Röhre *e* aus dem Kork heraus, um sie zu wägen. Beim raschen Herausziehen könnte die krumme Spitze der Röhre *e* abbrechen; auch kann man die Röhre *e* oben auf einer Seite platt machen, damit sie um so weniger von der Zange zerdrückt werde.

## 2) Destillirapparat.

Ein Glaskolben *a*, Figur 3 Taf. IV, ist mit einem, ungefähr 3 Fuß langen Glasrohre *bcd* mittelst eines Stöpsels verbunden. Dieses ist 1½ Zoll über dem Kolben unter einem beinahe rechten Winkel gebogen, so daß der längere Schenkel gelinde abwärts geneigt ist. Es ist von *c* bis *d* mit einer einfachen Lage von feuchtem Fließpapier umwickelt, welches man mittelst des Tropfapparates *g* beständig feucht erhält, und mündet mittelst eines lose schließenden Korks in den als Vorlage dienenden Kolben *f*, den man noch mit kaltem Wasser umgeben kann.

Diese Einrichtung gewährt folgende Vortheile:

Das Einfüllen der zu destillirenden Flüssigkeit und das Ausleeren des Rückstandes ist viel bequemer, als bei Anwendung einer Retorte. Es kann nichts überspritzen, und nicht leicht etwas mechanisch mit übergerissen werden. Man bedarf einer höchst geringen Wassermenge zur Verdichtung der Dämpfe, da das Wasser dadurch abkühlt, daß es selber Dampfgestalt annimmt. Die Verdichtung der Dämpfe ist höchst vollständig, so daß sich auch im Sommer Aether und Blausäure ohne merklichen Verlust destilliren lassen. Nur hat man bei

der Destillation solcher sehr flüchtigen Stoffe das Ende der langen Röhre mittelst eines gut schließenden Stöpsels in eine tubulirte Vorlage treten zu lassen, aus welcher eine Schenkelröhre die mit Dämpfen beladene Luft in eine zum Theil mit Wasser gefüllte Flasche leitet.

Dieser Apparat dient auch zu lange dauernden Digestionen verschiedener Stoffe mit Weingeist und andern flüchtigen Flüssigkeiten. Der Destillirkolben *a* wird dann etwas schief gestellt, so daß der längere Theil der Röhre etwas in die Höhe geht, und der sich darin verdichtende Dampf in den Kolben zurückfließt, wobei man, so weit dieses nöthig erscheint, die Röhre durch feuchtes Papier kühl erhalten kann. Namentlich gelingt auf diese Weise sehr gut die Darstellung von Kleenaphtha aus verwitterter Kleeensäure und absolutem Weingeist; die man auf dem Wasserbade einige Tage auf einander wirken läßt, bevor man die Destillation vornimmt.

Auch läßt sich durch diesen Apparat aus wenigen Flüssigkeiten sogleich bei der ersten Destillation ein starker Weingeist erhalten, und so der Weingeistgehalt bequem bestimmen. Zu diesem Zwecke läßt man die lange Röhre ebenfalls gehude aufwärts steigen; sie ist am oberen Ende etwas nach abwärts gebogen, und mündet mittelst eines in eine oben weite, unten enge, ungefähr 2 F. lange abwärts gehende Röhre, welche mit feuchtem Papier umgeben ist, und die Flüssigkeit in eine Vorlage überführt. Vergleiche Figur 4 Taf. IV. Diese Einrichtung beruht auf demselben Princip, wie die von Eduard Adam erfundene, mittelst welcher der Weingeist im Großen dargestellt wird; und ich zweifle nicht, daß meine Einrichtung, mit langen kupfernen Röhren und einigen Zuthaten, wie sie die Erfahrung an die Hand giebt, im Großen ausgeführt, viel wohlfeiler kommen und denselben Nutzen gewähren würde, wie der Adam'sche Apparat.

## 3) Filtrirapparat.

Der von Haüy und Berzelius (Poggend. Ann. Bd. XVIII S. 408 und 411) vorgeschlagene Filtrirapparat ist selbst für die genauesten analytischen Arbeiten nicht genug zu empfehlen. Ich bediene mich desselben fast ausschliesslich, und zwar auf folgende Weise: An einem Stative (ab Fig. 3 Taf. IV), aus einem runden Messingstab und einem mit Blei ausgegossenen Fusse bestehend, befinden sich an Armen drei bewegliche Ringe von verschiedener Weite. Man kann sie leicht auf und nieder schieben, und sie bleiben ohne alle Schraube, die nur hindern würde, bloß vermittelt einer in der Hülse angebrachten, gegen den runden Messingstab drückenden Messingsfeder in der ihnen erteilten Lage. Man setzt auf den unteren engen Ring den Trichter mit glattem Filter, welches nicht ganz bis an den Rand des Trichters hinaufreicht; und darunter einen Cylinder oder Kolben zum Auffangen des Filtrates. Die zu filtrierende Flüssigkeit befindet sich in einem Kolben mit etwas engem Halse und glatter Mündung. Man stellt nun den oberen Ring *c* eber etwas zu niedrig als zu hoch über den im Ring *c* befindlichen Trichter, hebt den Trichter bis an den Ring *c* in die Höhe und stülpt den Kolben rasch in das Filter um, so daß seine Mündung bis in die Spitze des Filters reicht. Hierauf läßt man den Trichter in den Ring *c* herab, und schiebt den Ring *c* so weit in die Höhe, daß sich das Filter möglichst hoch mit Flüssigkeit füllt, ohne doch überzulaufen. Das Umstülpen erfordert Augenmaafs und Übung: es kann hierbei etwas herauspritzen, oder das Filter kann überlaufen, besonders wenn der Hals des Kolbens zu weit, wenn das Filter zu klein, und wenn der Kolben mit zu wenig Flüssigkeit oder mit kochender gefüllt ist. Ist der Kolben nur theilweise mit kochender Flüssigkeit gefüllt, so ist das Ueberlaufen des Filters fast unvermeidlich. In einem solchen Fall muß man den Kolben zuvor mit kal-

kaltem Wasser (oder eine andere schickliche Flüssigkeit) völlig füllen. Die Regeln sind daher: Enger Hals des Kolbens, nicht zu kleines Filter, mögliche Anfüllung des Kolbens mit einer nicht zu heißen Flüssigkeit und schnelles Umstülpen tief in's Filter hinein. Bei Beobachtung dieser Regeln kann man mit aller Sicherheit verfahren. Vor dem Umstülpen des Kolbens hat man ihn umzuschütteln, damit der Niederschlag nicht auf dem Boden sitzen bleibt. Sollte die Flüssigkeit aus irgend einem Grunde trüb durchlaufen, so wartet man ab, bis sie klar kommt, ersetzt den untergestellten Cylinder durch einen andern, und gießt den Inhalt des ersten nach und nach auf's Filter; um hiefür Platz zu gewinnen, hat man während dieser Zeit die Ringe *c* und *e* etwas zu nähern. Hätte man den Trichter, statt in den Ring *e*, unmittelbar in die Oeffnung eines Gefäßes gesetzt, so würde man, wenn das Filtrat anfänglich trüb kommt, in einige Verlegenheit gerathen. Uebrigens kann man auch bei einiger Uebung die umgestülpte Flasche wieder aus dem Filter herausnehmen. Zu diesem Zweck nähert man zuerst die beiden Ringe *c* und *e*, damit der Wasserstand im Filter möglichst niedrig werde, hebt dann den Trichter bis unter Ring *c* in die Höhe, und wendet dann den Kolben schnell um. Um das Umfallen des Stativs zu verhüten, legt man auf den nach der entgegengesetzten Richtung gedrehten Ring *d* ein Gegengewicht. Während des Filtrirens kann man den Trichter mit Glasplatten etwas zudecken. Ist der Kolben entleert, so wäscht man zuerst mit dem Spritzer die nach unten gekehrte Mündung desselben rein, dann das Innere des Kolbens. Endlich wird das Auswaschen des Filters mit der Berzelius'schen Waschflasche vorgenommen.

Da die zu dieser Waschflasche erforderliche Röhre, deren Verfertigung einen geübten Glasbläser voraussetzt, nicht überall zu erhalten seyn möchte, so empfehle ich statt derselben folgende Einrichtung, welche ich durch

meinen ehemaligen Zuhörer, Hrn. Apotheker Scheeff-fer in Dirmstein, kennen gelernt habe: Der die Waschflasche schließende Korkstöpsel erhält zwei Röhren, eine zwei Mal gebogene, sehr enge, und eine gerade, weite, sich unten zuspitzende (Fig. 6 Taf. IV). Durch die enge Röhre steigt die Luft auf, durch die weite fließt das Wasser ab. Je größer die Entfernung der Spitze der weiten Röhre von dem gebogenen Theile der engen, desto stärker fließt das Wasser ab, und durch Umstülpen über ein mit Wasser gefülltes Filter läßt sich leicht die richtige Entfernung ausmitteln, bei welcher der Ausfluß aufhört, sobald die Spitze ein Paar Linien im Wasser steht. Während des Auswaschens braucht die Spitze das Filter nicht zu berühren, sondern sie kann mitten in der Flüssigkeit des Filters stehen.

Die Vorzüge der Umstülpungsmethode beim Filtriren sind folgende: Die Filtration erfolgt so schnell als möglich, da sich das Filter immer ganz gefüllt befindet. Man erspart sich die höchst langweilige Arbeit des öfteren Aufgießens. Die Gefahr des Mißlingens ist viel geringer; denn, ist einmal das Umstülpen glücklich vollbracht, und dieses hat man bei Beobachtung der oben gegebenen Regeln in seiner Gewalt, so geht das Uebrige auf das Schönste von statten, während bei dem öfteren Aufgießen jedesmal Verlust durch Abfließen der Flüssigkeit oder Trübung durch Ueberlaufen möglich ist. Endlich trocknet der Niederschlag im Kolben nicht an, weil seine Mündung durch die Flüssigkeit des Filters gesperrt ist, und er läßt sich daher mit dem Spritzer leicht rein waschen, während das Antrocknen an dem Cylinder, aus welchen man sonst die Flüssigkeit auf das Filter zu bringen pflegt, einige Umstände veranlaßt.



VII. *Vergleichende Untersuchung über das Verhalten des Antimon- und des Arsenikwasserstoffgases, und über die neuesten Methoden das Schwefelarsenik zu reduciren;*  
*von J. Franz Simon.*

Die interessante Entdeckung Thompson's <sup>1)</sup> und, wie ich so eben ersehe, gleichzeitig Pfaff's <sup>2)</sup>, daß sich Antimon Wasserstoffgas zu einer eigenthümlichen Gasart ver- und binden, die besonders das mit dem Arsenikwasserstoffgas gemein hat, daß sie, erhitzt, sich unter Abscheidung von Antimonmetall zersetzt, und daß sie, entzündet, sich eben so verhält, wie das unter gleichen Umständen behandelte Arsenikwasserstoffgas, macht die J. Marsh'sche Methode, welche bis hieher mit Recht so viel Anerkennung gefunden hat, das Arsenik in gerichtlichen Fällen nachzuweisen, sehr unsicher.

Bei meinen unten folgenden Untersuchungen habe ich mich nicht bloß darauf beschränkt, die Angaben beider Chemiker durch eigene Versuche zu bestätigen, sondern ich bestrebt mich zu ermitteln, ob sich bei dem Studium der Eigenschaften dieser beiden Gasarten nicht ein Weg finden ließe, auf welchem, mit der nöthigen Sicherheit, die Beibehaltung besagter Methode bei chemisch-gerichtlichen Untersuchungen zu gründen wäre.

Ich bediente mich bei diesen Arbeiten eines arsenikfreien Zinks und reiner Schwefelsäure; sollte Arsenikwasserstoffgas entwickelt werden, so wurde eine Lösung von arseniger Säure, für Entwicklung des Antimonwasserstoffgases eine Lösung von Brechweinstein ange-

1) Journal für pract. Chemie, Bd. XI S. 369.

2) Poggendorff's Annal. Bd. XXXII S. 339.

wendet. Es verdient bemerkt zu werden, daß in beiden Fällen, wenn zur Mischung von Zink und Schwefelsäure die erwähnten Metalllösungen gesetzt wurden, die Entwicklung des Wasserstoffgases ungemein heftig wird, was vorzüglich beim Antimonwasserstoffgase leicht, durch das Hochtreiben der Flüssigkeit, die Versuche stören kann <sup>1)</sup>).

1) Das Antimonwasserstoffgas verhält sich, in einer Glasröhre geglüht oder beim Ausströmen entzündet, im Allgemeinen wie das Arsenikwasserstoffgas; aber der Metallspiegel vom Antimon erscheint schon bei einer bei weitem niederen Temperatur als der des Arsens: ersterer ist, selbst bei gleich dicken Lagen der Metalle, mehr silberglänzend. Ist die Quantität Metall in dem Wasserstoffgase so gering, daß der Anflug mit geringem oder ohne metallischem Glanz erscheint, so ist der des Antimons dunkelgrau, der des Arsens dunkelbraun. In der Farbe der brennenden Flamme ist nicht leicht ein Unterschied zu bemerken, eben so wenig in dem Anfluge, der sich unter den verschiedenen Bedingungen an einem darüber gehaltenen Glase oder Porzellanscherbchen ansetzt.

2) Wasser absorbiert keine der beiden Gasarten.

3) Kaustisches Kali, kaustisches Ammoniak, concentrirte Salpetersäure bleiben ohne Wirkung auf beide Gasarten.

4) Frisch bereitetes Chlorwasser zersetzt das Antimonwasserstoffgas und hält fast alles Antimon zurück. Die Flamme des durchgeleiteten Gases brennt nur in den ersten Momenten weiß, sodann nimmt sie die Farbe des

1) Bei den besten Vorsichtsmaßregeln kann man sich, besonders wenn man sich länger mit Arsenikwasserstoff zu arbeiten genöthigt sieht, nicht ganz der Einwirkung desselben entziehen. Bei mir zeigte sich dieselbe nicht in Kopfschmerzen, Schwindel, Uebelkeit, sondern in hartnäckiger Verstopfung und Unverdaulichkeit.

reinen Wasserstoffgases an. Das Chlorwasser trübt sich hierbei und setzt weisse Flocken ab, zugleich verliert es den Geruch vollkommen und reagirt stark sauer. In dem so veränderten, abfiltrirten Chlorwasser konnte kein Antimon nachgewiesen werden. Die gesammelten und gewaschenen Flocken lösten sich nicht in Salpetersäure oder Chlorwasserstoffsäure, färbten sich mit Schwefelwasserstoffwasser orange, waren also für antimonige Säure oder für Antimonsäure zu halten. Pfaff konnte bei einem ähnlichen Versuch keine Einwirkung des Chlorgases auf Antimonwasserstoffgas beobachten. — Arsenikwasserstoffgas verhält sich wie Antimonwasserstoffgas, aber es bildet keine Flocken, das Chlorwasser verliert ebenfalls den Geruch und reagirt stark auf Arsenik (arsenige Säure).

5) Eine spirituöse *Jodlösung* wirkt zersetzend auf Antimonwasserstoffgas; es wurde jedoch nicht alles Antimon absorhirt, denn die Flamme braunte noch etwas weiss, und beim Erhitzen des Glasrohrs zeigte sich gleichfalls ein Metallspiegel. Die Jodlösung entfärbt sich nach und nach; es bilden sich weisse Flocken, die durch Braun in Schwarz übergehen. Die vom Niederschlage gesonderte wasserhelle Flüssigkeit liess kein Antimon entdecken. Der gewaschene Niederschlag wird, mit Salpetersäure erhitzt, weiss, löst sich in Chlorwasserstoffsäure, bei welchen beiden Einwirkungen eine Abscheidung von Jod nicht bemerkt wird, und verhält sich, in einem Glasröhrchen erhitzt, wie Antimonmetall. — Arsenikwasserstoffgas verhält sich sehr ähnlich; es wird nicht alles Arsenik zurückgehalten, die Jodlösung entfärbt sich, und nach sehr lange fortgesetzter Einwirkung zeigt sich eine geringe Menge schwarzen Präcipitats. In der wasserhellen Flüssigkeit zeigen Reagentien einen ausserordentlich starken Gehalt an Arsenik als arsenige Säure aufgelöst.

6) *Bromlösung* halt, wenn man Antimonwasserstoff hindurchleitet, alles Antimon zurück; das entweichende

Gas setzt daher keinen Metallspiegel ab, brennt nicht mit weißer Farbe. Die Bromlösung trübt sich nach und nach, ohne sich zu entfärben; es setzen sich weiße Flocken ab. In der abfiltrirten Flüssigkeit ist kein Antimon enthalten. Die Flocken, gehörig ausgewaschen, werden von Salpetersäure nicht gelöst, lassen aber Brom bemerken; von Chlorwasserstoffsäure werden sie unter Abscheiden von Brom gelöst, und gehen mit Schwefelwasserstoff Kermes (vielleicht ein Bromantimon?) — Arsenikwasserstoff, durch eine Bromlösung geleitet, läßt alles Arsenik zurück, die Flüssigkeit entfärbt sich nicht vollkommen, trübt sich nicht. Mit Chlorwasserstoffsäure und Schwefelwasserstoff behandelt, zeigt sie Arsenik. Sie verdampft mit Ausstoßen weißer, dicker, stechend riechender Dämpfe (Bromwasserstoffsäure). Destillirt geht eine schwach nach Brom riechende Flüssigkeit über, die mit Silber einen weißen, in Ammoniak löslichen Niederschlag giebt, und kaum merklich auf Arsenik reagirt. Der Rückstand enthält sehr viel Arsenik. Es bildet sich in den Versuchen 4, 5, 6 Chlor-, Jod-, Bromwasserstoffsäure.

7) Durch frisch bereitetes Schwefelwasserstoffwasser geleitetes Antimonwasserstoff und Arsenikwasserstoff werden nicht verändert, auch dann nicht, wenn dem Wasser Kali oder Ammoniak zugesetzt wird. Auch wenn man Schwefelwasserstoffgas und Antimon- oder Arsenikwasserstoffgas über Wasser gemischt auf einander wirken läßt, zeigt sich keine Reaction.

8) *Sublimatlösung* hält, wenn man einen langsamen Strom von Antimonwasserstoffgas durchleitet, alles Antimon zurück. Die Sublimatlösung trübt sich, es setzen sich weiße Flocken ab, die durch Grau in Sammtschwarz übergehen. Ein graues Präcipitat wurde, mit Salpetersäure erhitzt, weiß; die Säure enthielt Antimon, der weiße Rückstand war Calomel. Die von dem grauen Präcipitat abfiltrirte Flüssigkeit enthielt noch Quecksilber.

Ein schwarzes Präcipitāt wurde nach dem Kochen mit Wasser grau, gab, getrocknet und in einer Röhre erhitzt, Calomel und eine gelbe nicht sublimirbare schmelzende Masse, die ich für antimonige Saure hielt. Pfaff erhielt bei der Analyse dieses Niederschlags ebenfalls Calomel und Antimonoxyd. — Arsenikwasserstoff weicht hier etwas ab. Es wird alles Arsenik zurückgehalten, wenn die Gasentwicklung nicht zu stürmisch ist. Bei der ersten Einwirkung des Gases auf die Sublimatlösung zeigt sich eine gelbe Färbung und eben solcher Niederschlag, der endlich durch Braun in Schwarz übergeht. Die vom Niederschlage abfiltrirte Flüssigkeit enthält kein Quecksilber mehr, sondern nur Arsenik als arsenige Saure aufgelöst. Der schwarze Niederschlag mit Wasser gekocht zieht sich bedeutend zusammen, und zeigt sich als Quecksilbermetall.

9) *Salpetersaures Silber* wirkt sehr zersetzend auf Antimonwasserstoffgas, wenn man dieses durch seine Auflösung leitet. Alles Antimon wird zurückgehalten: es zeigt sich bald eine schwarze Trübung und dann ein annnischwarzer Niederschlag. Die darüber stehende klare Flüssigkeit enthält kein Antimon. Der schwarze Niederschlag löst sich in Chlorwasserstoffsäure, mit Hinterlassung von Hornsilber; die Chlorwasserstoffsäure enthält Antimon (Antimonsilber). — Arsenikwasserstoffgas verhält sich ganz wie Antimonwasserstoffgas. Der hierbei sich bildende Niederschlag ist reines Silber ohne Beimengung von Arsenik (durch das Löthrohr und durch Auflösen in Salpetersäure und vorsichtiges Sättigen mit Ammoniak geprüft). Die über den schwarzen Niederschlag stehende klare Flüssigkeit enthält arsenigsaures Silber gelöst, was sich leicht durch Ammoniak fällen lässt.

10) Eine *essigsäure Bleilösung*, die Lösungen von *schwefelsaurem Zink* und *Eisenchlorür* wirken weder auf Antimon- noch auf Arsenikwasserstoffgas.

11) *Schwefelsaure Kupferlösung* wirkt nur nach lange fortgesetztem Hindurchleiten von Antimonwasserstoffgas zersetzend auf dieses; es scheiden sich schwarze Flocken ab, aber nur ein geringer Theil Antimon scheint dabei dem Gase entzogen zu werden. Die Kupfersalzlösung wird dabei nicht oder unbedeutend entfärbt. Die schwarzen Flocken bestehen aus Antimon und Kupfer. Pfaff beobachtete bei der Einwirkung des Antimonwasserstoffgases auf schwefelsaure Kupferlösung keine Zersetzung, wahrscheinlich weil er das Gas nicht hinreichend lange durchstreichen ließ. — Arsenikwasserstoffgas verhält sich ganz wie das vorhergehende; es werden auch nur eine geringe Menge Flocken gebildet.

12) *Chlorplatinlösung* wird sowohl beim Hindurchstreichen des Antimonwasserstoffgases wie auch des Arsenikwasserstoffgases schnell schwarz gefärbt, und bald eben so gefällt; dabei werden die Metalle aus ihren Gasen vollkommen absorbiert. Die Niederschläge bestehen das eine Mal aus Antimon und Platin, und das andere Mal aus Arsenik und Platin.

13) Eine *Brechweinsteinlösung* wird nicht verändert wenn Arsenikwasserstoffgas hindurch streicht, und umgekehrt eine Lösung der arsenigen Säure nicht, wenn Antimonwasserstoffgas hindurchstreicht. Eben so wenig wirken die beiden Gase auf einander, wenn sie zusammengeleitet werden.

14) Wenn man Schwefelarsenik zu einer Mischung von Schwefelsäure und Zink thut, aus der sich Wasserstoffgas entwickelt, so wird gleichfalls Arsenikwasserstoffgas gebildet. Auf gleiche Weise wird Antimonwasserstoffgas gebildet, wenn man statt des Schwefelarseniks Kermes hinzusetzt.

15) Löst man, wie Liebig zur Reduction des Schwefelarseniks vorschlug, Kermes in kaustischer Kalilauge, fügt Bleizuckerlösung hinzu, und darauf Schwefelsäure und Zink, so bildet sich auch Antimonwasserstoffgas.

Aus diesen, den Gegenstand ziemlich erschöpfenden



Versuchen geht hervor, daß es in der That kein Mittel giebt, auf eine augenfällige und sichere Weise das Antimouwasserstoffgas von dem Arsenikwasserstoffgas zu unterscheiden, wenn man nicht zur weiteren Untersuchung der Flüssigkeiten schreiten will, durch welche man das Gas geleitet hat, und wo dann die Auflösung des salpetersauren Silbers, des Quecksilberchlorids und etwa, aber weniger gut, des Broms sich am besten eignen möchten. Aber auch hier würde man wahrscheinlich mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wenn beide Gase gemengt wären. Da aber Brechweinstein leichter als irgend ein anderes Metall bei gerichtlichen-chemischen Untersuchungen in den verdächtigen Flüssigkeiten für sich oder neben Arsenik vorkommen dürfte, so möchte dieses eine hinreichende Motive seyn, die J. Marsh'sche Ermittlungsmethode ganz fallen zu lassen, überdem da es uns gar nicht an ganz zweckmäßigen, sicheren und leicht auszuführenden Methoden, Schwefelarsenik zu reduciren, fehlt.

Ich habe die in der neuesten Zeit wieder bekannt gemachten Methoden genau geprüft, und unter denselben die von Berzelius <sup>1)</sup>, wo man das Schwefelarsenik mittelst einer mit Soda getränkten und wieder geglühten Holzkohle reducirt, als sehr zweckmäßig und leicht ausführbar gefunden. Ich möchte hierbei nur bemerken, daß man den Kohlensplitter nicht gern kürzer anwendet, wie Berzelius vorschlägt, und ihn so auswählt, daß er den Raum des Röhrchens, wo er liegt, möglichst ausfüllt: man bemerkt alsdann keine Sublimation von Schwefelarsenik, und erhält von der kleinsten Menge angewendeter Schwefelverbindung einen schönen Metallspiegel. Eben dasselbe läßt sich von der Anwendung einer in Silberlösung getränkten und wieder geglühten Kohle, wie es Runge <sup>2)</sup> vorschlägt, sagen.

1) Poggendorff's Annalen, Bd. XXXXII S. 163.

2) Ebendaselbst, Bd. XXXXII S. 163.

Duflos<sup>1)</sup> hat vorgeschlagen, die auf Arsenik zu untersuchende, von organischer Beimischung freie Substanz mit dem 20fachen eines Gemisches aus gleichen Theilen Sauerkleesalz und kohlensauren Kalk zu mengen, die Mischung möglichst auszutrocknen, und  $\frac{1}{10}$ , höchstens  $\frac{1}{4}$  Gr. davon in einer Glasröhre, nachdem durch langsames Erwärmen die Luft entfernt ist, mit dem Lüthrohr zu glühen; man soll dann oberhalb des Gemisches den Arsenikspiegel erhalten. Es hat mir nicht gelingen wollen, auf diese Weise ähnliche Metallspiegel zu erhalten, wie nach den beiden vorhergehenden Angaben. Aus den obersten Schichten des Gemisches entweicht immer etwas Schwefelarsenik unzersetzt, überdem muß man nicht unterlassen das Röhrchen bei so kleinen Mengen, wie  $\frac{1}{10}$  Gr. des Gemisches, worin sich nur  $\frac{1}{100}$  Gr. Schwefelarsenik befinden, sehr fein ausziehen; aber auch dann erhielt ich keine Metallspiegel, die sich mit den obigen vergleichen ließen.

Die Methode, welche ich in diesen Annal. (Bd. XXXIX S. 157) angegeben habe, das Schwefelarsenik mittelst kautistischer Kalkerde zu reduciren, habe ich in sofern vervollkommen, als ich dem wohl ausgeglühten kautistischen Kalke etwa die Hälfte seines Volumens in einem verdeckten Tiegel geglähtes feines Kohlenpulver zumische, und mit dieser Mischung, die sich in einer wohl verschlossenen Flasche längere Zeit sehr gut aufbewahren läßt, wie früher angegeben, verfähre. Hierdurch erreiche ich den Zweck, daß alles Arsenik reducirt wird, und ich habe wirklich von der kleinsten Quantität noch einen schönen, reinen Metallspiegel erhalten. Da das Vorstossen der Reductionsmischung, welches Berzelius tadelt, nicht stattfinden kann, wenn man, wie schon früher von mir angegeben, eine kleine Quantität Soda

1) Pharm. Centralbl. 1837, S. 831.

vor dem Kalke anschmilzt, so steht diese Methode, in Bezug auf sichere und leichte Ausführbarkeit keiner andern nach.

Bei diesen vier letzten Verfahren <sup>1)</sup>, so wie bei der von Liebig und Rose, endlich auch bei der von mir angegebenen, wo man die verdächtige Schwefelverbindung in glühenden Salpeter trägt und das arseniksaure Silber nachweist, — bei allen diesen Methoden kann Schwefelantimon, unter welchen Bedingungen es sey, nie eine Täuschung verursachen, wovon ich mich für jeden einzelnen Fall speciell überzeugt habe.

Zinn, Platin, Silber, Chrom, Quecksilber, Blei und einige andere Metalle wurden als Salze mit Schwefelsäure und Zink zusammengebracht, aber keine Verbindung irgend eines derselben mit Wasserstoffgas erhalten.

---

### VIII. Ueber die chemische Zusammensetzung des Periklin; von M. C. J. Thaulow.

---

Die einzige Analyse, welche wir vom Periklin besitzen, ist die, welche von Chr. Gmelin mit dem Periklin von Zöblitz in Sachsen angestellt ist <sup>2)</sup>, einer derben Varietät, an welcher Breithaupt zuerst die Charaktere der Gattung bestimmt hat.

1) Alle übrigen Verfahrensarten habe ich in der von mir und dem Dr. Sobornheim verfassten practischen Toxikologie zusammengestellt. Simon.

2) Kastner's Archiv der Naturlehre, 1824, Heft 1.

Gmelin fand bei der Analyse:

Kieselsäure	67,910
Thonerde	18,932
Natron	9,986
Kali	2,412
Kalkerde	0,150
Eisenoxydul	0,181
Glühungsverlust	0,360
	100,261.

Die gefundene Zusammensetzung weicht hiernach nur durch den geringen Kaligehalt von der des Albits ab. Da sie aber nur bei einer derben Varietät gefunden ist, so schien es von Interesse, auch eine krystallisirte Varietät zu analysiren, um zu ersehen, ob der geringe Kaligehalt sich auch bei dieser finde. Hr. Prof. G. Rose theilte mir deshalb einen deutlich krystallisirten Periklin vom Gotthardt mit, den ich im Laboratorium des Hrn. Prof. H. Rose analysirte.

Um die Menge der Kieselsäure und der Thonerde zu bestimmen, wurde auf die gewöhnliche Weise verfahren; 2,237 Grm. vom geschlämmten Mineral wurden mit dem 3fachen Gewicht von trockenem kohlensauren Natron im Platintiegel geschmolzen, die geschmolzene Masse mit Wasser und Salzsäure behandelt, durch Uebersättigung mit Salzsäure der größte Theil der Kieselsäure ausgeschieden, und zur völligen Abscheidung der Kieselsäure alles vorsichtig in einer Porcellanschale zur Trockniss eingedampft. Die trockne Masse wurde mit Salzsäure betröpfelt, hierauf die Kieselsäure mit warmem Wasser ausgesüßt, und alsdann getrocknet, geglüht und das Gewicht derselben bestimmt, welches 1,344 Grm. betrug. Aus der Flüssigkeit wurde die Thonerde durch Ammoniak niedergeschlagen. Die ausgewaschene, getrocknete und geglühte Thonerde wog 0,146 Grm.

*Nachdem die Thonerde durch Ammoniak gefällt war,*

wurde sogleich zu der von der Thonerde abfiltrirten ammoniakalischen Flüssigkeit etwas Oxalsäure gesetzt, wodurch nach längerem Stehen etwas oxalsaurer Kalk niedergeschlagen wurde. Der ausgewaschene und getrocknete oxalsäure Kalk wurde durch schwaches Glühen in kohlelsauren Kalk verwandelt, welcher 0,008 Grm. betrug.

Zur Bestimmung der Alkalien wurden 4,53 Grm. vom fein geschlämmten Mineral in eine große Platinschale mit frisch dargestellter concentrirter Flußsäure übergossen; hierdurch wurde unter starker Wärmeentwicklung die Kieselsäure fortgeschafft, indem sich Fluorkieselgas entwickelte; nur eine unbedeutende Menge des Minerals blieb unauflöst. Nachdem alles in der Platinschale bis fast zur Trockniss abgedampft war, wurde concentrirte Schwefelsäure hinzugesetzt und von Neuem erhitzt, wodurch die letzten Spuren von Fluorkieselgas und Flußsäure ausgetrieben wurden. Durch anhaltendes Erhitzen wurde die überschüssige Schwefelsäure verjagt, dann alles mit etwas Salzsäure übergossen und in Wasser aufgelöst. Hierbei blieb etwas unauflöst, welches unauflösliches Mineral war; dieses wog 0,087 Grm.

Aus der erhaltenen Auflösung wurde die Thonerde durch Ammoniak gefällt, und die kleine Menge Kalk durch Oxalsäure.

Die zurückbehaltene Flüssigkeit, welche also noch die in dem Mineral enthaltenen Alkalien enthielt, wurde in einer großen Platinschale vorsichtig zur Trockniss abgedampft und zur Verjagung der überschüssigen Schwefelsäure stark erhitzt. Um die Schwefelsäure vollständig zu verjagen, wurden kleine Stückchen von festem kohlelsauren Ammoniak hinzugesetzt und von Neuem erhitzt. Die trockne Salzmasse wurde in einen kleinen Platiniegel gebracht, anhaltend geglüht, bis kein Gewichtsverlust mehr stattfand, und alsdann gewogen. Das Gewicht betrug 1,19 Grm.; diese schwefelsäure Verbin-

dung konnte nur schwefelsaures Kali, oder schwefelsaures Natron, oder ein Gemisch von beiden seyn. Um dies zu bestimmen, wurde das geglühte und gewogene Salz in sehr wenigem Wasser aufgelöst; hierbei blieb aber etwas ungelöst, welches Kieselsäure war. In einer ziemlich geräumigen Flasche wurde diese Auflösung mit Platinchlorid und mit Alkohol versetzt. Nach 24 Stunden hatte sich indessen kein Kalium-Platinchlorid ausgeschieden, sondern es war ein weißer Absatz gebildet, welcher ausgewaschen, geglüht und gewogen wurde; das Gewicht betrug 0.016 Grm. Vor dem Löthrohre verhielt sich dieser Absatz wie Kieselsäure. Das Mineral enthielt also hiernach kein Kali, sondern nur Natron. Um aber überzeugt zu seyn, daß das Alkali wirklich Natron sey, wurde die mit Platinchlorid und Alkohol versetzte Auflösung des schwefelsauren Salzes, nachdem die kleine Menge Kieselsäure durch Filtration getrennt war, in einer Platinschale zur Trockniß abgedampft und die trockne Masse geglüht, wodurch sich metallisches Platin bildete. Das Alkalisalz wurde hierauf durch warmes Wasser ausgezogen, und das noch in der Auflösung enthaltene nicht reducirte Platin durch Schwefelwasserstoffwasser niedergeschlagen. Die vom Schwefelplatin abfiltrirte Flüssigkeit wurde wiederum zur Trockniß abgedampft und das Gewicht des trocknen Salzes bestimmt. Die wässrige Auflösung dieses schwefelsauren Salzes, welche völlig neutral reagirte, bildete, beim ruhigen Verdampfen, verwitternde Krystalle, welche für schwefelsaures Natron erkannt wurden. Aus dem schwefelsauren Natron wurde nun die Menge des Natrons berechnet.

Durch diese Analysen wurde gefunden:

Kieselsäure	69,00
Thonerde	19,43
Natron	11,47
Kalk	0,20
	<hr/> 100,10.



Es ergibt sich hieraus, daß der krystallisierte Periklin sich in der chemischen Zusammensetzung von dem Albit gar nicht unterscheidet. Es ist daher möglich, daß der geringe Kaligehalt des derben Periklins von Zöblitz nur von etwas eingemengtem Feldspath herrührt.

### Nachtrag.

Die wichtigsten mineralogischen Unterschiede, welche nach den bisherigen Beobachtungen zwischen dem Periklin und Albit stattfinden, bestehen in den Krystallwinkeln und in dem specifischen Gewichte.

Die Unterschiede in den Winkeln ergeben sich aus folgender Zusammenstellung. Es beträgt nämlich, nach Breithaupt, beim Periklin <sup>1)</sup>, und, nach meinen Messungen, beim Albit <sup>2)</sup>:

	beim Periklin.	beim Albit.
die Neigung von <i>P</i> : <i>M</i>	93° 19'	93° 36'
- - - <i>P</i> : <i>T</i>	114 45	115 5
- - - <i>T</i> : <i>l</i>	120 37	122 15
- - - <i>M</i> : <i>T</i>	120 18	117 53
- - - <i>M</i> : <i>l</i>	119 5	119 52

Diese Unterschiede sind demnach zuweilen ziemlich bedeutend, können indessen kaum in Anschlag gebracht werden, da die Flächen des Periklins immer mehr oder weniger stark gestreift und gewölbt, und die Krystalle daher zu genauen Winkelmessungen nicht geeignet sind. Die vier letzten Winkelangaben hält Breithaupt selbst für nicht genau, doch möchte davon auch wohl die erste nicht auszuschließen seyn.

1) Vollständige Charakteristik des Mineralsystems, 3. Aufl. S. 157.

2) Gilbert's Annalen, 1823, St. 2. Die Namen der Flächen beziehen sich auf die hier befindlichen Krystallfiguren.

Es bleiben also nur die Unterschiede im specifischen Gewichte, welches nach den verschiedenen Beobachtungen beim Periklin zwischen 2,54 und 2,57, beim Albit dagegen zwischen 2,61 und 2,63 schwankt <sup>1)</sup>. Um mich selbst von dem geringeren specifischen Gewichte des Periklins zu überzeugen, wog ich vier grössere und mehrere kleinere Krystalle aus Tyrol, und fand das specifische Gewicht der ersteren = 2,437, das der letzteren etwas höher = 2,457, also immer noch niedriger, als oben angegeben ist. Da es zu vermuthen war, daß dieses geringe specifische Gewicht nur von der Porosität der Periklinkrystalle, die wahrscheinlich eine Folge ihrer häufigen Zwillingungsverwachsung ist, herrührt, so wurden die vier ersten Krystalle zu einem gröblichen Pulver zerrieben und nun wieder gewogen, wo ich allerdings ihr specifisches Gewicht viel höher, bei einem Versuche = 2,645, bei einem anderen = 2,637 fand. Das specifische Gewicht des Periklins übersteigt demnach noch etwas das specifische Gewicht des Albits, aber dieses möchte vielleicht selbst noch etwas höher ausfallen, wenn man den Albit im pulverförmigen Zustand anwendet.

Außerdem zeichnet sich der Periklin noch vom Albit durch eine eigenthümliche Zwillingungsverwachsung und durch geringere Durchsichtigkeit aus. Die Zwillingungsverwachsung, die bei dem Periklin schon länger erkannt, aber zuerst von Kays er, richtig beschrieben ist <sup>2)</sup>, geht parallel der Fläche *P*. Sie kommt bei dem Periklin vom Gotthardt und aus Tyrol sehr häufig vor, und ist beim Albit noch nicht beobachtet worden, zeigt aber keine specifische Verschiedenheit, sondern nur eine Eigenthümlichkeit gewisser Localitäten an. Dasselbe gilt auch von der geringeren Durchsichtigkeit des Periklins, die aufer-

dem

1) Volla. Charakteristik der Mineralsysteme, S. 157 und 161.

2) Poggendorff's Annalen, Bd. XXXIV S. 112.

dem auch noch bei mehreren Albiten (wie bei dem Albite von Alabaschka, bei Mursinsk im Ural, und von Arendal) vorkommt.

Da nun, nach dem vorigen Aufsatze, auch die chemische Zusammensetzung des Periklins mit der des Albites übereinstimmt, so folgt wohl daraus, daß man nach den jetzigen Erfahrungen nicht berechtigt ist, den Periklin als Species von dem Albite zu trennen.

G. Rose.

---

IX. *Ueber eine neue Verbindung der schwefelsauren Talkerde mit Wasser;*  
*von J. Fritzsche.*

(Mitgetheilt vom Verfasser aus den Berichten der Petersburger Academie.)

---

Setzt man eine concentrirte Lösung von schwefelsaurer Talkerde einer Temperatur von  $0^{\circ}$  aus, so bildet sich darin, zugleich mit blättrigen Eiskrystallen, ein emailweißes Salz, in größeren oder kleineren Krystallen, je nachdem man eine größere oder kleinere Menge der Flüssigkeit anwendet. Läßt man große Massen einer solchen Auflösung im Winter langsam gefrieren, so scheidet sich dieses Salz in oft fingerlangen Krystallen aus, und man kann es dann bei langsamem Aufbauen der Flüssigkeit von den Eiskrystallen getrennt erhalten, indem seine Krystalle bei  $0^{\circ}$  in der Flüssigkeit unverändert bleiben. Die emailweiße Farbe der im Kleinen dargestellten Krystalle beruht nur darauf, daß sie aus einem Conglomerate sehr vieler kleiner Krystalle bestehen; die einzelnen Krystalle, welche man bei der Darstellung im Großen erhält, besitzen diese Farbe nicht, sondern sind wasserhell und durchsichtig. Wird diese Verbindung einer Temperatur über  $0^{\circ}$  ausgesetzt, so be-

ginnt sie sehr bald sich zu zersetzen; Wasser wird abgeschieden, sie wird undurchsichtig und es bildet sich das gewöhnliche Bittersalz mit 7 Proportionen Wasser, von dem das ausgeschiedene Wasser so viel auflöst, als es bei der jedesmaligen Temperatur zu einer gesättigten Auflösung bedarf. Die Krystalle behalten dabei ihre äußere Form, werden aber in ihrem Inneren ganz von kleinen Bittersalzkristallen durchzogen, und stellen, nachdem sie trocken geworden sind, nur ein Haufwerk dieser Krystalle dar.

Um den Wassergehalt dieser neuen Verbindung zu bestimmen, versuchte ich zuerst einzelne kleine, durchsichtige Krystalle zwischen Fliesspapier so abzutrocknen, daß die Einwirkung der Handwärme möglichst vermieden wurde; dennoch aber wurden sie auf ihrer Oberfläche undurchsichtig. Bei der Analyse gaben sie dann folgende Resultate:

I. 0,443 Grm. gaben nach dem Glühen einen Rückstand von 0,166 Grm. trockner schwefelsaurer Talkerde, welche sich vollkommen in Wasser löste.

II. 1,016 Grm. gaben 0,374 Grm. Rückstand.

III. Gaben 0,177 Grm. von Krystallen, welche einige Tage lang bei einer niedrigen Temperatur der Luft ausgesetzt gewesen und dabei undurchsichtig geworden waren, 0,068 Grm. wasserfreies Salz.

Diese drei Versuche geben folgende procentische Zusammensetzung:

	I.	II	III.
Mg S	37,47	36,81	38,42
H	62,53	63,19	61,58
	<hr/> 100,00	<hr/> 100,00	<hr/> 100,00

nach welcher der Wassergehalt zwischen II und III Proportionen schwankt; es schien mir wahrscheinlicher, daß durch das Trocknen Wasser verloren gegangen war,

als daß die einzelnen, vorher klaren und durchsichtigen Krystalle noch Wasser eingeschlossen enthalten hätten, und ich stellte daher neue Glühungen mit ganz durchsichtigem Salze an. Ich hatte beinahe handgroße Gruppierungen größerer Krystalle bekommen, liefs diese mehrere Tage lang unzerbrochen auf Papier bei 0° an der Luft liegen, und fand dann in ihrem Inneren große, trockene, durchsichtige Blätter, welche sich beim Zerbrechen als solide Krystalle erwiesen, und beim Berühren mit der Hand sehr bald weiß auf der Oberfläche wurden; diese wandte ich nun zur Analyse an.

I. 1,263 Grm. gaben 0,455 Grm. wasserfreies Salz.

II. 1,170 Grm. gaben 0,119 Rückstand.

III. 0,884 Grm. hinterliessen 0,325 trockne schwefelsaure Talkerde.

Diese Resultate stimmen nun fast genau mit der Formel  $\text{MgS} + 12\text{H}$ , und man muß diese daher als die richtige betrachten.

	Gefunden		
	I.	II.	III.
Mg S	36,02	35,81	36,55
H	63,98	64,19	63,45
	100,00	100,00	100,00.

Berechnet.

$$\left. \begin{array}{l} 36,01 \\ 63,99 \end{array} \right\} = \text{MgS} + 12\text{H}$$

100,00

An der geglühten schwefelsauren Talkerde fand ich die Eigenthümlichkeit, daß sie beim Uebergießen mit Wasser zu einem feinen Pulver zerfiel, welches sich nicht sogleich in dem Wasser auflöste. Unter dem Mikroskope konnte ich keine krystallinische Structur an diesem Pulver erkennen, welches aus eckigen, rundli-

chen Bruchstücken von fast gleicher Größe bestand. Meine Bemühungen, dieses Pulver von der Flüssigkeit zu trennen, waren vergebens; denn sobald auf dem Filter die Flüssigkeit durchgelaufen war, hatte sich auch jenes Pulver größtentheils in Bittersalzkristalle verwandelt. Vielleicht ist dies die Verbindung des Salzes mit der einen Proportion Wasser, welches Graham das salinische nennt, und das, nach seinen Versuchen, noch bei ziemlich hoher Temperatur zurückgehalten wird.

#### X. *Bemerkungen über den schwarzen Turmalin vom Sonnenberge bei Andreasberg.*

Durch die Güte des Hrn. Hausmann jun. erhielt ich mehrere sehr vollständig ausgebildete Turmalinkristalle vom Sonnenberge bei Andreasberg, nebst deren Beschreibung, welche letztere ich nicht unterlassen kann, hier mitzutheilen, da sie nicht allein meine frühere Beschreibung dieser Krystalle <sup>1)</sup> vervollständigt, sondern auch von Interesse für die Krystallform des Turmalins im Allgemeinen ist. Ich lasse die Beschreibung des Hrn. Hausmann hier wörtlich folgen:

„Außer den Rhomboëdern  $R$ ,  $2r'$  und  $4r''$  finden sich bisweilen die Flächen von  $\frac{r'}{2}$ , aber nur am Ende  $B$ , und stets mit matter Oberfläche (s. Krystall No. 1) <sup>2)</sup>.

Ebenfalls nicht häufig, aber gewöhnlich sehr nett ausgebildet, zeigen sich die Flächen des Skalenoëders 5 (s. Krystalle No. 2,  $a$ ,  $b$ ,  $c$ ). Sie sind immer mit dem

1) Poggendorff's Annalen, Bd XXXIX S. 297.

2) Vergl. Taf. III Fig. 11.

3) Bezieht sich auf die Krystalle, die Hr. Hausmann mir mit der Beschreibung übersandt hat.



Rhomboëder  $4r$  verbunden, indem dieses die stumpfen Polkanten des Skalenoëders gleichwinklig abstumpft, und kommen nur an dem Ende  $A$  vor.

Was endlich die Prismenflächen anbetrifft, so findet sich in der Regel das dreiseitige mit dem sechsseitigen combinirt; bisweilen aber kommen die Flächen des ersten sechsseitigen Prisma's homoëdrisch vor (s. Krystall No. 3). Der Werth dieser Flächen ist aber nicht immer gleich; indem, wenn sie alle sechs ausgebildet sind, bald die gegen die  $R$  Flächen am  $A$  Ende, bald die gegen die  $R$  Flächen am  $B$  Ende gestellten, vorherrschen (s. Krystalle No. 4,  $a$  und  $b$ ).<sup>a</sup>

Außer den früher von mir beschriebenen Flächen findet sich also an diesen Krystallen noch die zweite Hälfte  $g'$  der Flächen des ersten dreiseitigen Prisma's, die Flächen des Skalenoëders 5 an dem Ende  $A$  und die Flächen des ersten stumpferen Rhomboëders  $\frac{r'}{2}$  an dem Ende  $B$ . Die Flächen des Skalenoëders kommen zuweilen noch größer vor, als in der Zeichnung angegeben ist, so daß sie die Flächen des Hauptrhomboëders  $R$  nicht bloß in einem Punkte berühren, sondern auch in einer Kante schneiden; in welchem Fall man sehr deutlich den Parallelismus der Kanten zwischen den Flächen  $R$ , 5,  $a$  und dem unteren  $R$  sieht. Hieraus, wie aus dem Parallelismus der Kanten, den zwei benachbarte Skalenoëderflächen auf den Flächen des zweiten spitzeren Rhomboëders  $4r$  bilden, ergibt sich schon ohne Messung, daß das an diesen Krystallen vorkommende Skalenoëder das Skalenoëder  $5 = (\frac{1}{3}a : \frac{1}{3}a : \frac{1}{3}a : c)$  ist.

Die Krystalle vom Sonnenberg bieten demnach das erste entschiedene Beispiel von Turmalinkrystallen dar, an denen die Flächen des ersten stumpferen Rhomboëders an dem Ende  $B$ , d. i. dem Ende, welches bei abnehmender Temperatur positiv elektrisch wird, und die Flächen eines Skalenoëders an dem Ende  $A$ , dem Ende,

welches bei abnehmender Temperatur negativ elektrisch wird, vorkommen. Besonders bemerkenswerth sind die Krystalle aber dadurch, daß die Flächen des ersten sechseitigen Prisma's nicht allein homoëdrisch vorkommen, sondern die Flächen der einen gewöhnlich schließenden Hälfte  $g'$  sogar zuweilen größer sind, als die der Hälfte  $g$ . Dies ist zwar nur sehr selten der Fall, wie überhaupt schon auch an diesen Krystallen die Flächen  $g'$  nur selten vorkommen, ist jedoch an mehreren der überschickten Krystalle ganz deutlich. Es bleibt in diesem Fall also nur der verschiedene Glanz der Flächen des Hauptrhomboëders  $R$  übrig, der das elektrisch-positive oder negative Ende verräth, indem auch hier diese Flächen an dem letzteren Ende glänzend, an dem ersteren aber matt sind.

Gustav Rose.

# XI. Mineralogische Notizen; von Hrn. J. Brooke.

(Phil. Mag. Ser. III T. XI p. 175 et 261.)

1) *Blei-Muriocarbonat*, auf einer Stufe aus Cornwall sitzend, hatte die in Taf. III Fig. 12 abgebildete Gestalt, mit folgenden Winkeln:

$$P : M = 90^\circ$$

$$P : a = 123 \quad 6'$$

$$P : b = 112 \quad 22$$

$$M : a = 126^\circ 20'$$

$$M : b = 145 \quad 47$$

$$M : d = 135$$

$$M : c = 153 \quad 26$$

[ Hiernach kommen den Flächen folgende Zeichen zu:

$$a = a : a : c$$

$$P = \infty a : \infty a : c$$

$$d = a : a : \infty c$$

$$M = a : \infty a : \infty c$$

$$c = a : \frac{1}{2} a : \infty c$$

$$d = a : \frac{1}{2} a : c ]$$

Auf derselben Stufe fand sich *Chlorblei*, in gelblich weissen, sehr dünnen, unregelmässig gekrümmten, durchscheinenden Krystallen, die indess keine Messung zuließen.

2) *Krystallform des Pyrosmalit*. Siehe Taf. III Fig. 10. Die Winkel daran betragen  $P : a = 146^{\circ} 30'$ ;  $P : b = 129^{\circ} 13'$ ;  $P : M = 90^{\circ}$ ;  $M : M' = 120^{\circ}$ .

## XII. Auffindung von Steinsalz in den preussischen Staaten.

Obgleich die Provinz Sachsen einen übergrossen Reichtum an Salzquellen besitzt, von denen einige, wie zu Halle und Stassfurt, einen beträchtlichen Gehalt zeigen, so war dennoch das Vorhandenseyn von Steinsalz bisher in denselben eben so unbekannt, wie in den übrigen Provinzen des preussischen Staates. Eine der schwächsten dieser Salzaolen ist diejenige, welche auf der Saline zu Artern, im Kreise Saengerhausen, Regierungsbezirk Merseburg, benutzt wird; sie enthält nur  $3\frac{1}{2}$  bis  $3\frac{2}{3}$  Proc. Salz. Diese Quelle ersetzt theilweise, was ihr an Gehalt abgeht, durch die grosse Masse, mit der sie auströmt; sie liefert gewöhnlich gegen 100 Kubikfuss Soole in einer Minute, bisweilen aber auch das Dreifache dieser Menge. Für diese Saline wäre eine gehaltreichere, oder gar eine gesättigte Soole, welche gegen 27 Proc. Salz enthält, von grossem Vortheil gewesen. Auf den Vorschlag des Bergrath Backs zu Dürrenberg, dem damals die Inspection der Saline Artern übertragen war, wurde am 18. October 1831 eine Bohrarbeit unweit der dortigen Quelle angefangen, welche, grosser Schwierigkeiten ungeachtet, mit Ausdauer 6 Jahre hindurch fortgesetzt wurde. Diese Ausdauer in der Verfolgung eines reiflich erwogenen Planes wurde endlich belohnt; am

25. November (1837) war kein Zweifel mehr übrig, daß das Bohrloch in einer Tiefe von 986 Fufs reines *Steinsalz* erreicht hatte, denn es wurden Stücke desselben bis an die Oberfläche herausgezogen. So war das erste Steinsalz in dem preuss. Staate gefunden. Im Dec. 1837 war der Bohrer bereits 11 Fufs 8 Zoll in das reine Steinsalz eingedrungen, so daß die Masse desselben bedeutend genug erscheint, um die Saline mit völlig gesättigter Soole zu versorgen. Die Schwierigkeiten dieser Bohrarbeit bestanden vom Anfange an in Kieselager, welche, ohne Zusammenhang, eine Ausfütterung des Bohrloches nothwendig machten, in der bröcklichen Beschaffenheit des darunter folgenden Thons und Sandsteins, worin große Weitungen entstanden und wiederholt das Einbringen starker Röhren von Eisenblech erforderten. In einer Tiefe von 584 Fufs wurde Gyps erbohrt, welcher mit wenig Unterbrechungen bis auf das Steinsalz ausgehalten hat. Die zuletzt eingesetzten Röhren reichen bis 708 Fufs Tiefe und haben ein Gewicht von 63 Centn. Die glückliche Ueberwindung dieser Schwierigkeiten ist in den letzteren Jahren dem regen Eifer und der Umsicht des Salinen-Inspectors Siemens zu verdanken.

Merkwürdig ist es wohl, daß bereits in den Jahren 1725 bis 1731 in dieser Gegend unter der Leitung des Bergraths Borlach Arbeiten zur Auffindung von reicherer Salzsoole unternommen worden sind, welche indessen nur eine 7procentige Soole in so geringer Menge lieferten, daß sie nicht benutzt werden konnte. Die chursächsische Regierung stellte diese Arbeiten ihrer Kostbarkeit wegen ein, obgleich Borlach, der bereits bis zu einer Tiefe von 584 Fufs vorgedrungen war, die feste Ueberzeugung von dem Gelingen dieser Untersuchung hegte, welche sich jetzt so glänzend bestätigt hat.

### XIII. Kalte Höhlen von Rocquesfort.

Zwei Lieues nordwestlich von Saint-Afrique, im Dep. de l'Aveyron, am Nordabbange eines grossen Kalksteinplateaus, le causse de l'Arzac genannt, welches sich 5 bis 600 Toisen über das Bett des Tarne erhebt, liegt das kleine Dorf Rocquesfort, das weit und breit wegen seiner Käse berühmt ist, und es schon zu Plinius Zeiten gewesen seyn soll. Diesen Ruhm verdankt es hauptsächlich seinen Kellern, die aus dem Felsen gehauen sind, und die Eigenschaft besitzen, das ganze Jahr hindurch eine sehr niedere Temperatur zu bewahren, wodurch der Käse in seiner Gährung verlangsamt und veredelt wird. Wegen dieser niederen Temperatur, die ihre einzige Merkwürdigkeit ausmacht, da sie sonst weder an Gestalt noch Grösse etwas Ausgezeichnetes haben, klein, niedrig und schmutzig sind, wurden sie mehrfach untersucht, unter andern von Chaptal (*Ann. de chim. T. IV p. 31*; auch Gilbert's Ann. Bd. III S. 211 und Bd. XIX S. 139), von Girou de Buzareignes (*Ann. de chim. T. XLV p. 362*), und neuerdings von Hrn. Marcel de Serres (*Ann. de chim. et de phys. T. LXIII p. 5*). Alle fanden die Thatsache der niederen Temperatur bestätigt, wie folgende Tafel zeigt:

Zeit.	Temperatur im Felsen.	Kellertempe- ratur.	Beobachter.
1835 März 22.	+ 8° R.	+5 — 6° R.	M. de Serres
1827 Aug. 19.	16	3 — 4	Laumière
Oct.	13	5 $\frac{1}{2}$	Marcorello
1787 Aug. 21.	23	3	Chaptal.

Die Keller, welche vorzugsweise kühl sind, und deshalb sehr hoch im Preise stehen (ein jetziger Besitzer kaufte die seinigen für 216000 Fr.) finden sich

in einer Straße des Dorfs, die 150 Meter unterhalb des im Ganzen von Ost nach West streichenden Randes der Hochebene liegt, und von zwei nach Norden auslaufenden Vorsprüngen des Berges eingeschlossen wird. Dieser geschützten Lage wegen werden sie nur auf kurze Zeit von der Sonne beschienen; indess verdanken sie ihre niedere Temperatur nicht diesem Umstande allein, da sie überdies im Niveau der Straße liegen, und von außen nicht besonders gegen äußere Wärme bewahrt werden. Vielmehr liegt die Ursache ihrer Kühle in kalten Luftströmen, die unausgesetzt aus Rissen und Spalten des Kalkfelsens hervordringen, und an einigen Stellen so stark, daß sie ein Licht ausblasen. Dicht vor diesen Spalten ist auch die Temperatur am niedrigsten, und man hat sie daselbst schon auf  $-2^{\circ}$  R. sinken gesehen. Es fragt sich nun, woher diese Luftströme und ihre niedere Temperatur entspringen? Hr. de Serres hat diese Frage zu beantworten gesucht, indess mehr durch Vermuthungen als durch directe Thatsachen. Seine Ansicht ist im Wesentlichen die, welche Saussure der Aeltere <sup>1)</sup> und Pictet <sup>2)</sup> von ähnlichen kalten Höhlen aufstellten, daß nämlich Luft von oben durch Spalten

1) So heißt es in der *Biblioth. univers. N. S. T. VI* p. 378. — Eigentlich dachte sich aber Saussure große geschlossene Höhlen im Innern der Berge, welche, im Sommer erwärmt, Luft ausströmen, und im Winter, bei Erkaltung, einsinken sollten (*Voyages dans les Alpes*, T. V §. 1404 bis 1415. — Siehe Nicholson in *Gilb. Ann.* Bd III S. 211.)

2) *Mémoires sur les glaciers naturels qu'on trouve dans quelques grottes du Jura et des Alpes*, in der *Biblioth. univers.* (1822), T. XX p. 200 — womit indess die Abhandlung von Dalm (Ann. de chim. et de phys. T. XXI p. 113) zu vergleichen, da darin die entgegengesetzte Meinung aufrecht gehalten wird, daß es Eishöhlen ohne Luftströme gebe, und daß darin das Eis im Winter durch kälterlich eingedrungene Kälte gebildet, und im Sommer bloß am schnellen Schmelzen gehindert werde.



in den Berg eindringe, dort große, mit Feuchtigkeit bekleidete Höhlen finde, Verdunstung daselbst erzeuge, sich dadurch erkalte, verdichte und nun unten aus den Rissen wieder ausströme. Er glaubt indess, daß diese Verdunstung allein nicht hinreiche zur Erzeugung der Kälte, und nimmt daher noch große Eismassen im Innern des Berges an, eine Annahme, die, da sie nicht durch Thatfachen unterstützt wird, eben keine Wahrscheinlichkeit hat.

XIV. *Ueber eine Verfälschung des Carmins, welche auch für Malerei beachtungswerth scheint;*  
*von C. G. Ehrenberg.*

Es findet sich jetzt im Handel eine Sorte sehr schön farbigen, sehr theuern Carmins in Form von Tuschtäfelchen, welche ihre schöne Farbe einer Verfälschung verdankt. Da mich verschiedene Untersuchungen zur Entdeckung dieser Verfälschung führte, so halte ich für gut sie sofort bekannt zu machen. Beim gewöhnlichen Malen mit dieser schönen Carminfarbe bemerkt man keinen Unterschied, allein unter dem Mikroskope besteht fast die Hälfte der Masse aus bloßem Stärkmehl (Weizenstärke), welches dem fein zertheilten Carmin einen hellen Grund und Glanz giebt, was beides seine Farbe sehr angenehm erhöht. Mischt man solchen Carmin in vieles Wasser, so vertheilt er sich darin und bleibt lange im Wasser suspendirt, und gießt man das Wasser ab, so hat man einen weißen Bodensatz wie beim Bleiweiß. Dieser Bodensatz ist Stärkmehl. Außer der völlig deutlichen Form und Größe der Amylum-Körperchen versuchte ich ihre Reaction auf Jodtinktur, wodurch sie augenblicklich indigblau gefärbt wurden. Ich habe dann in einem Uhrglase den Bodensatz mit Wasser erhaltet und

gekocht, wodurch ich Kleister erhielt. So ist denn in jenen Täfelchen die theure Carminmasse mit wohl etwa der Hälfte ihres Volums an roher Stärke versetzt, welche wahrscheinlich im breiartigen Zustande des Carmins in denselben eingeknetet wird, weil sie sonst zu Boden sinken oder unregelmäßig vertheilt seyn würde. Zusatz von Bleiweiß kann man durch das Gewicht erkennen, aber Zusatz von Stärkmehl nicht so leicht. Das Mikroskop erlaubt alle Verfälschung mit Stärkmehl sogleich mit voller Sicherheit zu erkennen, und chemische Proben unterstützen die Ueberzeugung. Vielleicht ist es auch für die Malerkunst nicht ganz uninteressant zu erfahren, daß schöne Farben dieser Art mit einem organischen Körper gemischt sind, welcher zwar ziemlich dauerhaft ist, aber in einer feuchten Atmosphäre doch für sich besonders eine Zersetzung eingeht. Rücksichtlich des Deckens verhält sich übrigens Stärkmehl anders als Bleiweiß. Es deckt weniger und nafs fast gar nicht, weil es dann durchsichtig ist, während die Deckfarben ihre Eigenschaft durch beigemischte undurchsichtige, erdige oder metallische Theilchen erlangen.

## XV. Vermischte Notizen.

1) *Umwandlung der Traubensäure in Weinsäure.* — Schmilzt man, am besten in einem Oelbade, Traubensäure vollständig, ohne sie jedoch zu zerstören, und löst darauf das Product in Wasser, so hat man eine Auflösung von Weinsäure. (Briethche Mittheilung vom Prof. Löwig.)

2) *Säure des Sauerkohls.* — Dieselbe ist Milchsäure, denn Sauerkohl mit Wasser und kohlensaurem Zinkoxyd gekocht, gab milchsaures Zinkoxyd. (Liebig, in *Annal. d. Pharm.* Bd. XXIII S. 113.)

3) *Heißhalten durch kalte Luft.* — Um Eisen während der Bearbeitung auf dem Amboss heiß zu halten, pflegen die Nagelschmiede in England einen kalten Luftstrom auf dasselbe zu leiten. Hr. R. Phillips selbst sah diese Operation mit Erfolg ausführen, und erfuhr dabei, daß es dazu nöthig sey, einerseits den Blasebalg mehr als gewöhnlich zu beschweren, und andererseits das Eisen vorher recht heiß zu machen, weil sonst die kalte Luft, statt die Hitze zu unterhalten und zu verstärken, eine Abkühlung bewirken würde. Natürlich wird die Hitze hiebei durch eine Verbrennung des Eisens unterhalten. (*Phil. Mag. Ser. III Vol. XI p. 407.*) — In derselben Zeitschrift (*Vol. XI p. 446*) bestätigt ein Hr. Addams die Richtigkeit dieser Thatsache. Eine an der Spitze weiß glühend gemachte Eisenstange sah er durch darauf geblasene Luft so heiß werden, daß sie schmolz und unter Funken sprühen verbrannte. Ein anderes Verfahren, diese Erscheinung zu zeigen, besteht nach ihm darin, daß man die an der Spitze glühend gemachte Eisenstange an einen Faden bindet und rasch in einem senkrechten Kreise herumschwenkt. Das Eisen geräth dann in Fluß, und die brennenden Funken fliegen in Tangenten des leuchtenden Kreises fort. Auch kann man das Eisen auf dem Umfang eines Rades befestigen, das man darauf rasch in Rotation versetzt. Er empfiehlt diesen Versuch für Vorlesungen.

4) *Thermo-elektrischer Funken mittelst einfacher Kette.* — Mittelst einer einfachen Kette aus Wismuth und Antimon, jedes Metall 0,5 Zoll lang, 0,12 Zoll dick und 5 Gran schwer, und mit Anwendung von Henry's Spirale aus Kupferstreifen ist es Hrn. Francis Watkins gelungen, einen wahrnehmbaren und glänzenden elektrischen Funken zu erhalten. Als Zeugen dafür nennt er die HH. De la Rive, Plateau und Netschajeff (*Phil. Mag. Ser. III Vol. XI p. 399.*) — An einer andern Stelle derselben Zeitschrift (*Vol. XI p. 301*) be-

merkt Hr. W., daß er mit einer thermo-elektrischen Kette aus 30 Paaren Wismuth-Antimon (Platten) von  $1\frac{1}{2}$  Zoll im Quadrat und  $\frac{1}{4}$  Zoll Dicke, erregt an einem Ende durch die Strahlung von glühendem Eisen und am andern Ende durch Eis, einen temporären Magnet dargestellt habe, der 98 Pfund trug.

5) *Elektrische Strömung in Eisenbahnen.* — Herr Colladon hat den Einfall gehabt zu versuchen, ob sich in einer Eisenbahn elektrische Ströme nachweisen ließen. Zu dem Ende trennte er auf der Bahn zwischen Givors und Lyon einen Theil der vier Schienen von dem Uebrigen ab und verband sie durch Drähte mit einem Galvanometer. Nach einer halben Stunde sah er an der Magnetonadel periodisch eine sehr deutliche Oscillation, die 15 bis 20 Secunden anhielt. Die Ablenkung hatte eine gleiche Richtung und gleiche Größe. Die Ankunft des Wagenzugs nöthigte den Versuch abzubrechen, dessen Wiederaufnahme er den Physikern bestens empfiehlt. (*Biblioth. univers. N. S. T. VIII p. 187*). Der Strom war wohl ein thermo-elektrischer? *P.*

6) *Licht für Taucherglocken.* — Bekanntlich erscheint das lebhafteste Licht, welches eine Volta'sche Säule zwischen Kohlenspitzen entwickelt, auch unter Wasser. Hr. Maugham, Lehrer an der Adelaide-Street Gallery in London, schlägt dies Licht zum Gebrauch in Taucherglocken vor. (*Herapath's Railway Magazine, Jun. 1837, p. 354.*)

7) *Fraunhofersche Linien.* — Im *Phil. Mag. Ser. III Vol X p. 183* macht Hr. Ritchie darauf aufmerksam, daß man die Fraunhoferschen Linien schon mit bloßem Auge sehen könne, wenn man dasselbe dicht hinter ein gutes Flintglasprisma von  $70^\circ$  bis  $80^\circ$  bringt, auf welches, im finstern Zimmer, Sonnenlicht durch eine schmale Spalte einfällt. (Dieselbe Erfahrung ist vor längerer Zeit schon von Hrn. Prof. Ettingshausen in Wien gemacht; er hatte zu Prag, auf der letzten Naturforscher-

versammlung, die Güte mir selbst die Erscheinung an einem mit Schwefelkohlenstoff gefüllten Prisma zu zeigen. P.)

8) *Algierische Bomben.* — In der Sitzung der Pariser geol. Gesellschaft vom 9. Jan. 1837 zeigte der Marquis de Roys ein Bruchstück einer zu Algier erbauten Bombe vor, aus deren Gestalt zu schliessen ist, dass sie aus einer spanischen Gießerei herstamme. Hr. Berthier, der die Masse analysirte, fand in derselben: Arsenik 27, Kohle 1,8 und Eisen 71 ohne Spur von Kieselerde, Schwefel oder Phosphor. Bisher kennt man kein Beispiel von Anwendung einer Legirung von Eisen und Arsenik in den Künsten. Wollten die Algerer bloß eine in ihrem Gebiete vorkommende Arsenikgrube benutzen, oder glaubten sie ihre Geschosse durch eine solche Beimischung mörderischer zu machen? (*Bullet. geol. T. VIII p. 85.*)

9) *Sandsteinkrystalle.* — In der Sitzung der geologischen Gesellschaft zu Paris vom 3. Apr. 1837 wurde ein Schreiben des Hrn. Puton vorgelesen, worin derselbe Nachricht giebt von sehr regelmässigen kubischen Krystallen, die zu Ruauz (in den Vogesen) im bunten Sandstein vorkommen und ebenfalls aus diesem Sandstein bestehen. Es sind offenbar Asterkrystalle, aber von welcher Abkunft? Hr. Puton hält dafür, dass sie von Steinsalz herkommen, und führt als Stütze dieser Meinung an: erstlich das öftere Vorkommen von Steinsalz in der Formation des bunten Sandsteins, und dann den Umstand, dass auf den Flächen der erwähnten Krystalle ganz dieselben treppenförmigen Vertiefungen sichtbar sind, welche man am Kochsalz kennt, besonders wenn es aus wässrigen Auflösungen angeschossen ist. (*Bullet. de la Soc. Geolog. T. VIII p. 196.*)

10) *Höhe des Aconcagua.* — Nach neueren Messungen des Hrn. Pentland hat der nördliche Gipfel dieses Vulkans ( $32^{\circ} 38'$  S. und  $1^{\circ} 41'$  O. von Valparaiso),

des höchsten unter den 23 bekannten Vulkanen Chiles, eine Höhe von 7300 Meter (22473 Par. Fufs), etwa 60 Meter mehr als Beechey und Fitz-Roy sie gefunden. Der Aconcagua ist also bedeutend höher als der *Chimborasso* (6530 Met.), kommt aber dem *Nevado de Sorata* (7696 Met.) lange nicht gleich, und noch weniger dem *Dawalagiri* (7821 Meter) (*Compt. rend. T. V p. 703*). — Beiläufig bemerkt, ist, Zeitungsnachrichten zufolge, der *Demavend* ( $35^{\circ} 50'$  N. und  $52^{\circ} 10'$  O. v. Greenwich, 40 engl. Meil. ONO. von Teheran) neuerlich von Hrn. Taylor Thomson erstiegen, und 14300 F. (engl.) hoch über dem Meere (10500 über Teheran) gefunden.

11) *Höhe der Meereswagen.* — Während der heftigsten Stürme, welche Hr. Pentland auf der Fregatte the Stag in den Gewässern des Cap Horn erlebte, sah er die Wagen sich nie mehr als 20 engl. Fufs über den mittleren Meeresspiegel erheben. Die grösste Höhe der Wagen über dem Verdeck der Fregatte betrug 18 engl. Fufs. (*Compt. rend. T. V p. 703.*)

12) *Meteorsteinfall in Brasilien.* — Am 11. Dec. 1836, um  $11\frac{1}{2}$  Uhr Abends, etwa 4 Stunden vor der Morgenzeit, da die achtononatlische Art von Orkan, welche in den Provinzen Rio-Grande du Nord und Ceara herrscht, aufhört, bei Südostwind und völlig heiterem Himmel, erschien über dem Dorfe Macao, am Eintritt des Rio-Assu ein an Glanz und Grösse sehr ungewöhnliches Meteor, welches gleich darauf mit Krachen zersprang, und auf einen Umkreis von 10 Lieues Durchmesser eine ungeheure Menge Steine herabschleuderte. Sie schlugen in viele Häuser ein, drangen mehr Fufs tief in den Sandboden, richteten aber weiter kein Unglück an, als dafs sie einige Ochsen verwundeten und tödteten. Das Gewicht der aufgefundenen Stücke ging von 1 bis 80 Pfund. Proben davon, die Hr. Berthou in Olinda an die Pariser Acad. gesandt, wird Hr. Berthier analysiren. (*Compt. rend. T. V p. 211.*)



**I. Ueber die Bildung der Versteinerungen auf  
unserm Wege; von H. R. Goeppert.**

(Erste Fortsetzung der im vorigen Jahre erschienenen Abhandlung über  
den Versteinungsprocess. (Ann. Bd. XXXVIII S. 561. Bd. XXXIX  
S. 222.) Vorgetragen in der ersten öffentlichen Sitzung der Versamm-  
lung der Naturforscher zu Prag 1837.)

Im vorigen Jahre machte ich Versuche bekannt, die zeigten, wie man Vegetabilien, welche in verschiedenen metallischen oder erdigen Lösungen gewesen waren, durch Glühen und Verbrennen des Organischen in Erden und Metallen mit Beibehaltung ihrer Structur zu verwandeln vermöchte. Später fand ich, daß der anorganische bald aus Kiesel, Kali oder Kalk, oder aus einem Gemisch von allen drei Stoffen bestehende Rückstand, welchen jede einzelne Zelle und jedes einzelne Gefäß nach dem Verbrennen liefert, nebst den in dieselben aufgenommenen anorganischen Stoffen, dies vorzugsweise vermitteln. Je mehr also von den letztern Stoffen die Pflanzen aufnahmen, um so besser wird man die Form erhalten finden. Man kann sich davon sehr leicht überzeugen, wenn man mehrere mäßig dünne Vertikalschnitte eines Holzes in concentrirte Auflösung von schwefelsaurem Eisenoxydul bringt, und sie in verschiedenen Zeiträumen, also das eine etwa 6 das andere 12 Stunden oder längere Zeit darin liegen läßt, sie später glüht und diese Producte mit dem ebenfalls durchs Glühen erhaltenen Resten eines nicht imprägnirten Stückchen Holzes von gleicher Größe vergleicht. Von letzterem, welches nur in zarten Umrissen der früheren Gestalt des Holzstückes entspricht, kann man durch erstere die stufenweise sich verbessernde Erhaltung der äußern Gestalt verfolgen, die dasjenige an

besten natürlich bewahrt haben wird, welches man am längsten in jener Auflösung liegen lässt. Auf Tafel I Fig. 13. sieht man zur Erläuterung des so eben Bemerkten einen Vertikalschnitt von *Pinus sylvestris* bei *a* Markstrahlen und *b* die porösen Zellen. Fig. 14. ein durch's Glühen erhaltenes Skelett eines Stückchens gleicher Grösse. Fig. 15. ein 72 Stunden in schwefelsaurer Eisenoxydlösung eingeweichtes und später geglühtes Holzstückchen derselben Art. Da nun alle Pflanzen, ja auch die zartesten Theile derselben, einen unverbrennlichen der früheren organischen Form mehr oder minder entsprechenden Rückstand (vielleicht deswegen nicht mit Unrecht *Skelett* genannt) zurücklassen, sind die von mir beschriebenen Versuche auch noch einer grossen Ausdehnung fähig, werden aber, da jene Rückstände immer nur eine sehr geringe Festigkeit besitzen, selten sehr haltbare Producte liefern, wenn man die Substanzen auch längere Zeit, vielleicht Jahre lang einweichte. Nur einige Pflanzen, wie Blüthen von *Erica mediterranea* und *Clavaria coralloides* Bull., welche ein Jahr lang in concentrirter Auflösung des salpetersauren Silbers sich befunden hatten, waren nach dem Glühen mit Erhaltung der Form in regulinisches biegsames Silber verwandelt, wie ich bei der letzten Versammlung der Naturforscher zu Prag der vereinigten geognostischen botanischen Sektion zu zeigen Gelegenheit hatte. Man kann sie also wohl mit den wahren Versteinerungen, d. h. den in Kalk, Eisen oder Kiesel sichtbar verwandelten Vegetabilien vergleichen, indem auch hier die Gestalt bei gänzlich veränderten Bestandtheilen unverändert blieb; doch dürfte sich die Natur, wie ich schon in der im vorigen Jahre erschienenen Abhandlung bemerkte, zur Bildung der durch ihre Festigkeit so ausgezeichneten Versteinerungen, wohl kaum eines so gewaltsamen Weges wie des Feuers bedient haben. Indem ich nun weiter mich bemühte, erhielt ich durch meinen geehrten Freund, Hrn. Ober-Forstrath

Cotta in Tharand, und später durch Hrn. Kaufmann Laspe in Gera, Stücke von einer Eiche der Jetztwelt, die von dem Letztern in einem Bache bei Gera gefunden worden war, und sich theilweise, in einem unbekannten Zeitraum, in kohlensauren Kalk verwandelt hatte, bedeutende Festigkeit zeigten und selbst Politur annahmen. Man sehe die Abbildung desselben in sechsfacher Vergrößerung Tafel I Fig. 16. Bei Fig. *a* Markstrahlen von der Seite und *b* auf dem Querschnitte hervorragend noch völlig biegsam und unversteinert. Bei *d* erkennt man die ausgefüllten Höhlungen der punktirten Gefäße, bei *e* ein dergleichen der Länge nach geöffnet, und *f* die Holzzellen. Noch merkwürdiger erscheint mir ein ebenfalls vom Hrn. Ober-Forstrath Cotta mitgetheiltes Stück Buchenholz aus einer alten, wahrscheinlich römischen, Wasserleitung im Bückeburgischen (siehe Tafel I Fig. 17) in natürlicher Größe. Die Versteinerung hat sich auf einzelne der Länge nach durch das Holz sich erstreckende cylinderförmige Stellen beschränkt (siehe Fig. 17. *aaaa*), so daß man bei oberflächlichen Untersuchungen wohl meinen könnte, es seien dort Risse oder durch Fäulniß entstandene Lücken gewesen, die von dem Kalk ausgefüllt worden wären. Von Fäulniß ist aber an dem diese Stellen umgebenden Holze keine Spur wahrzunehmen, und bei mikroskopischer Betrachtung sieht man auf den verkalkten Theilen dieselbe Structur wie auf dem benachbarten Holze (Fig. 18 *a* die unveränderten Holzzellen, *b* Gefäße und *c* Markstrahlen, *d* die verkalkten Markstrahlen, *e* Holzzellen und *f* punktirte Gefäße). Nach dem Auflösen der versteinerten Stellen in Säuren blieb noch sämtliche organische, in der Eiche noch Gerbstoff enthaltende, Substanz zurück, die aus Holz und punktirten Gefäßen bestand, keineswegs etwa verkohlt, sondern noch mit der natürlichen eigenthümlichen Farbe im Zusammenhange untereinander erschienen. Ein gleiches Verhalten beobachtete ich nun

auch bei den vorweltlichen in Kalk verwandelten Hölzern, wie z. B. in dem schwarzen Marmor ähnlichen Holze aus den Uebergangsgebirgen bei Hausdorff in der Grafschaft Glatz, also der ältesten überhaupt Versteinerungen führenden Formation, bei dem aus dem Lias bei Kloster Banz und Bamberg, so wie von Aidaniel aus der Krimm, und dem berühmten Stamm von Oxarglenk in Schottland, welches erstere mir Hr. Dubois, letztere Hr. L. C. Treviranus zur literarischen Benutzung mitgetheilt hatten. Aus einer ebenfalls im Uebergangsgebirge von Hausdorff entdeckten in Kalk verwandelten *Stigmaria ficoides*, über deren Struktur man so lange zweifelhaft war, schied ich auf diese Weise noch vollkommen erhaltene treppenförmige Gefäße <sup>1)</sup>. Bei dem aus der Grafschaft Glatz betrug die Menge der die Struktur von Coniferen zeigenden keinesweges verkohlten, sondern nur schwach gebräunten vollkommen biegsamen Fasern noch 5 — 7 Proc. Auch schied sich hier noch Oel aus von brenzlichem Creosot ähnlichen Geruche, welches also, eben so wie oben im Eichenholze der Gerbstoff, in die Versteinerung mit übergegangen war. Am vollkommensten erhält man die Fasern noch im Zusammenhange, wenn man recht zarte Splitterchen mit sehr verdünnter Salzsäure übergießt, weil bei der concentrirten nicht nur die Säure selbst, sondern auch die durch die rasche Entwicklung der Kohlensäure bewirkte Erschütterung auf den Zusammenhang derselben zerstörend einwirkte. Nachdem ich mich durch Versuche überzeugt hatte, daß mäßig concentrirte Flußsäure auf die vegetabilischen Fasern nicht zersetzend einwirke, bediente ich mich derselben um die Kiesel und Chalcodonhölzer in Beziehung auf ihren Gehalt an organischen Fasern zu untersuchen, und fand, daß auch in der festesten auf dem Stahl Funken gebenden Masse, wie z. B. in den

1) Die merkwürdige Structur dieser Pflanze werde ich bald näher beschreiben und abbilden.

Stämmen von Buchau in Schlesien, vom Kiffhäuser, von Ilmenau, mehreren Geschiebhölzern u. dgl. noch wohl erhaltene Gefäße vorhanden sind, die nach Entfernung der Kieseelerde zurückbleiben, und in den meisten noch vollkommen hinreichen, um auf die Gattung des Holzes schließen zu lassen. Es werden sich hierin allerdings wohl noch manche Verschiedenheiten hinsichtlich der Quantität der organischen Substanzen ergeben, worauf ich aber noch später zurückkomme, da ich alle versteinerten Hölzer nicht nur nach ihrer Structur, sondern auch nach dem hier angeführten chemischen Verhalten untersuche. Doch können Bestrebungen dieser Art nur langsam vorschreiten, weil außer den geringen Vorarbeiten in diesem Felde auch noch die Zubereitung der Hölzer zur Beobachtung, wie das Schleifen, welches man am besten nur selbst besorgt, viel Zeit und Mühe erfordern. In den Hölzern, welche nur sehr wenig organische Substanz enthalten, ist dieselbe offenbar erst nach der Versteinierung, theils durch Verwesung unter fortdauernder Einwirkung von Wärme und Feuchtigkeit, theils durch Feuer vernichtet worden. Jedes Gefäß und jede Zelle war aber gewissermaßen als ein Steinkern oder als ein Abguss zu betrachten, daher also auch solche Hölzer, wie z. B. sehr viele der Ungarischen Opalhölzer, die offenbar theilweise der Einwirkung des Feuers ausgesetzt gewesen sind, ihre Structur noch bewahrt<sup>1)</sup>. Um mich auf dem Wege des Experiments von der Richtigkeit dieser Annahme zu überzeugen, setzte ich in einem kleinen Schmelztiegel feingeschliffene Quer- und Längenschnitte der versteinerten Hölzer, von Buchau in Schlesien und Chemnitz, drei Viertelstunden lang der Weißgluth aus.

- 1) Ich erlaube mir hier nochmals die Bitte um Unterstützung dieser Arbeit durch Mitteilung knarter Hölzer zu wiederholen, indem ich zugleich mit Vergnügen diese Gelegenheit ergreife, den bisherigen Gönnern derselben ergebenst zu danken. Am fernsten in meine Sammlung noch an Hölzern aus dem Harz, und den nördlich von zwischen der Elbe und Holland liegenden Gegenden.

eines Sefströmschen Ofens aus. Die verschiedenartig holtzähnlich gefärbten Hölzer waren milchweiß geworden, und zeigten unter dem Mikroskop noch ganz deutlich die frühere die Coniferen charakterisirende Structur. Ein Paar Stücke, welche sich unmittelbar mit den Kohlen in Berührung befunden hatten, waren, offenbar durch die Einwirkung des in denselben enthaltenen Kali's, an ihrer Oberfläche glasartig. Da ich nun bis jetzt noch niemals fossile Hölzer mit solchem Ueberzuge erhielt, wiewohl es ihnen nicht an Gelegenheit fehlen konnte mit Kali in Berührung zu kommen, so dürfte auch dieser Versuch in geologischer Hinsicht ein nicht ganz unwichtiges Resultat liefern, und mit beweisen helfen, wie selten hierbei das Feuer thätig gewesen seyn mag. Nur unter den Opalhölzern aus Ungarn besitze ich, wie schon erwähnt, mehrere Staumstückchen, deren Aeußeres vollkommen mürbe, in die zartesten Fasern theilbar und milchweiß erscheint, während der innere Theil noch sehr viele organische durch Flusssäure trennbare Fasern enthält. Durch Glühen wird auch der innere Theil vollkommen entfärbt und mürbe, woraus wohl hervorgeht, daß dies der Einwirkung des Feuers, aber erst nach der Versteinerung, ausgesetzt gewesen seyn mag. Bei einigen, wie z. B. bei manchen Hölzern aus der alten Steinkohle (Löbejün bei Halle, Neurode in der Grafschaft Glatz, Radnitz in Böhmen), aber auch aus der Braunkohle (Bilin, vom Meißner) erhält man nach Entfernung der Kieselserde reine kohlige Masse, welche Fossilien also entweder vor der Verkohlung oder nach derselben von dem kieselhaltigen Fluidum durchdrungen wurden. Die älteren Naturforscher bezeichneten sie, im Ganzen sehr richtig, als *versteinerte Holzkohle*. Bei andern Hölzern, namentlich bei vielen Staarsteinen (*Pharonius Helmintholithus Cotta*) sieht man ganz deutlich an den destruirten Zellen, daß sie im Zustande der Faulniß von der versteinerten Flüssigkeit erfüllt wurden.



Auf gleiche Weise, wie die Kiesel- und Kalkhölzer, verhielten sich nun auch die in silberhaltiges Kupferoxyd verwandelten Hölzer von Frankenberg in Hessen, und die in Thoneisenstein veränderten durch ihre Festigkeit so ausgezeichneten Stämme aus der Braunkohlenformation, wie z. B. die von Schlackenwerth oder Ellenbogen, eigenthümlich die Schwefelkieshölzer. Entfernt man nämlich durch Glühen den Schwefel, bleibt das Eisenoxyd, und nimmt man durch Salpetersäure das Eisen hinweg, der Schwefel in der Form der Pflanzengefäße, zuweilen auch noch unveränderte organische Substanz zurück. Abgesehen davon, daß wir vermittelst dieser Methode in manchen Fällen das bisher der Untersuchung der fossilen Hölzer so störend entgegenstehende Schleifen entbehren können, ergeben sich hieraus wohl entscheidende Aufschlüsse über die Beschaffenheit und Bildung der Versteinerung überhaupt. *Es scheint nun nicht mehr unerklärlich, daß wir in den meisten Fällen bei den versteinerten Hölzern die einzelnen Theile derselben, Rinde, Holz, Splint, Mark und die einzelnen Jahresringe, nicht bloß wohl erhalten, sondern oft noch mit den natürlichen Farben oder wenigstens doch scharf durch Farben von einander getrennt erblicken. Die versteinernenden Flüssigkeiten durchdrangen zuerst die Wände der Holzzellen und Gefäße, später wurden die Höhlungen derselben selbst ausgefüllt. Je gleichförmiger und ruhiger dies geschah, um desto wohl erhaltener erscheint die Structur und der Durchmesser der Gefäße. Es geht hieraus auch hervor, wie richtig im Allgemeinen die älteren Naturforscher, von Agricola bis auf Walch, Schulze und Schröter, den Vorgang der Versteinerung nicht als einen Ersetzungs- oder Substitutions-, sondern als einen Imprägnations-Proceß ansahen. Auch vernuthete schon Schulzo (Von den versteinerten Hölzern, S. 5 — 29. Halle 1777) gegen Boudaroy (Von den versteinerten Hölzern in den mineralogischen Belust., Th. V, S. 438)*

und Tourette (Schröters litholog. Journal, Th. II S. 273), daß man bei Versuchen, wie sie Carl in seiner *Docimasia ossium fossilium* mit versteinerten Theilen von Thieren angestellt, deutliche Merkmale, sowohl einer vegetabilischen Grunderde, als anderer mit selbiger innigst verbundenen und von einem natürlichen Holz noch rückständigen Theilen beobachten konnte. Nach Wallerius (*Ej. Systema mineral. Th. II p. 398. Vienna 1778*) soll jedes wahre vegetabilische Petrefact durch Destillation oder Calcination ähnliche Bestandtheile (*Acidum et phlegma*) wie Pflanzen der Jetztwelt liefern. Auch läßt sich auf diese Weise leicht erklären wie man halbversteinerte Holzer antrifft, wie ich mehrere dergleichen aus verschiedenen Formationen, theilweise verkieselte, verkalzte und verkypste, besitze <sup>1)</sup>).

Was nun die versteinernnden Flüssigkeiten selbst betrifft, so war es offenbar die *Kohlensäure*, die die Auflösung des Eisens, des Kupfers und des Kalks, und das *bloße Wasser*, welches die der Kieselerde vermittelt, bekanntlich diese Erde, wiewohl nur in geringer Menge, auflöst. Doch dürften diese Auflösungen auch nur von geringer Concentration seyn, weil sich sonst Ueberzüge und Inkrustate bildeten, und dann das Organische völlig abgeschlossen sich wohl zu erhalten, aber nicht zu versteinern vermochte, wie die Untersuchung des Tuffes deutlich nachweist. Man sieht also auch hieraus, welcher lange Zeitraum zur Erzeugung derselben erforderlich war. Eisenstein, nämlich Eisenoxydhydrat, bildet sich durch das oben genannte Auflösungsmittel aus vermoderten Pflanzen bekanntlich noch vor unseren Augen, und vermag auch gegenwärtig noch Vegetabilien zu versteinern, wenn

1) Von diesem in Gyps verwandelten Holze, welches nebst dem in Kalk verwandelten am häufigsten vorkommt, wurde vor 2 Jahren ein 4 Centner schwerer Stamm in den Gypsgruben von Dirachel in Oberschlesien entdeckt, welchen ich dem Museum der hiesigen Universität überließ.

sich dazu günstige Gelegenheit darbietet. Ein solches merkwürdiges Beispiel fand ich im Herbst des vorigen Jahres auf der Bibliothek zu Gotha, dessen Mittheilung ich dem leider für die Wissenschaft viel zu früh verstorbenen Hrn. v. Hoff verdanke. Es ist eine *Fassdaube*, welche in den Tiefen des Schlossbrunnens nachweislich 150 Jahre gelegen hat, und nun theilweise, namentlich an den Stellen, wo die ganz oxydirten eisernen Reifen sich befanden, mit Eisenoxyd imprägnirt, und so fest geworden ist, daß sie sich an mehreren Stellen schleifen läßt <sup>1)</sup>. Daß sich Kalkversteinerungen noch zu unsern Zeiten bilden können, beweisen die oben erwähnten Beispiele von der Eiche und Buche, es fehlt also nur gegenwärtig eine *Kieselversteinerung*, um den für die gesammte Geologie gewiß nicht unrichtigen Satz, daß Versteinerungen sich noch heut, und also noch fort-dauernd, und nicht bloß zu gewissen Catastrophen bilden, unbestreitbar nachzuweisen. Die älteren Naturforscher führten mehrere Beispiele dieser Art an <sup>2)</sup>, und ich bin überzeugt, daß wenn wir aufhören werden ihre Angaben als Täuschungen und Irrthümer zu betrachten, die von ihnen gemachten Entdeckungen nicht mehr länger allein stehen werden.

Jedoch nicht bloß auf *analytische*, sondern auch auf *synthetische Weise* läßt sich die Bildung dieser *Versteinerungen auf nassem Wege* anschaulich machen. Auflösung des Eisens in kohlenstauhaltigem Wasser würde nur sehr langsam zum Ziele führen. Da ich nun durch

1) Ob das kürzlich in der Seine mit einem Schiffsanker gefundene Holz, welches Hr. Becquerel in der Sitzung der Academie (den 6. Novbr. d. J.) als versteinert bezeichnete, hieher gehört, werden wohl spätere Berichte näher entscheiden.

2) Siehe Waleh's bekanntes Werk: *Naturgeschichte der Versteinerungen*, Th. III S. 32, und Schröter's *Vollständige Einleitung in die Kenntniß der Geschichte der Steine und Versteinerungen*, Th. III S. 209. 1778, wo alle bis zur Zeit bekannten Erfahrungen dieser Art gesammelt sind.

Versuche fand, dass man auch innerhalb des Pflanzengewebes die Oxyde von metallischen Lösungen mittelst geeigneter Stoffe niederschlagen kann, so benutzte ich das Verhalten, um möglichst große Quantitäten Eisenoxyd (durch Imprägnation mit schwefelsaurem Eisenoxyd und Niederschlagung mittelst kohlensauren Natrons oder Ammoniaks) in die Pflanzen zu bringen, so dass das Holz binnen wenigen Wochen ganz das Aussehn des versteinerten oder in Eisenoxyd verwandelten Holzes erhielt; doch war es noch nicht sehr fest, weil, wie sich bei näherer Betrachtung ergab, erst die Wandungen, und noch nicht die Höhlungen der Gefäße ausgefüllt waren, wozu offenbar längere Zeit erforderlich ist. — Dasselbe kann man auch mit dem Kalk, und, wie mich eine in den letzteren Tagen gemachte Erfahrung lehrt, ohne Zweifel auch mit der Kiesel-erde erreichen. Gewöhnlich schlägt sich die Kiesel-erde aus ihren Auflösungen in Alkalien durch Säuren in Pulverform nieder. Als ich aber vor  $\frac{1}{2}$  Jahren in sehr engen Gefäßen eine sehr concentrirte durch organische Stoffe etwas braun gefärbte Lösung von Kiesel in Kali mit concentrirten mineralischen Säuren vermischte, hatte sich im Laufe der Zeit auf dem Boden eine feste Masse von muschligem Bruche von bedeutender das Glas ritzende Härte gebildet, die sich ganz wie Feuersteine verhielt <sup>1)</sup>. Da die Niederschlagung der Kiesel-erde auch innerhalb der Pflanzengefäße stattfindet, darf

1) Mit welcher der genannten Säuren dies am besten gelinge, vermag ich in diesem Augenblick selbst nicht zu bestimmen, da das Gewonnene aus Versehen aus den drei verschiedenen Flaschen zusammengeschüttet wurde. Anfangs waren die Stückchen noch sehr spröde, und so weich, daß sie beim Glühen in Pulver zerfielen, als ich sie aber in vier Wochen wieder auf diese Weise probirte, hielten sie das Feuer sehr gut aus. Es erinnert dies an die, wenn ich nicht irre, im Feinschlich gemachte Beobachtung, wo man eine noch weiche kieselige Masse entdeckte, die erst später in der Luft erhartete. Ich habe noch Versuche wiederholt, und hoffe näher zu bestätigen, was ich früher auch zufällig als absichtlich auffand.

man hoffen auch feste künstliche Kieselversteinerungen bereiten zu können.

Auf ähnliche Weise wie die vegetabilischen Versteinerungen ging nun wohl auch die Bildung der thierischen, wenigstens der Knochen vor sich. Ein Theil der Gallerte ward durch Einwirkung des Wassers entfernt, deren Stelle nun, und die dadurch entstandenen Lücken in dem phosphorsauren Kalk oder dem Gerüste der Knochen, kohlensaurer Kalk oder Eisenoxyd ausfüllten, die als specifisch schwerere und dichtere Massen den Knochen die größere Dichtigkeit und Schwere verliehen. Durch Imprägnation mit metallischen Substanzen und nachheriges Glühen werden die Knochen niemals schwerer, obschon die metallischen oder erdigen Substanzen in die feinsten Kanälchen verbreitet erschienen. *Die weichen thierischen Theile konnten aber eben so wenig wie die krautartigen saftigen Theile der Vegetabilien mit in die Metamorphosen gezogen werden, weil sie bei der geringen Concentration der versteinernenden Flüssigkeiten, und bei der leichten Zersetzbarkeit ihrer Structur, weit früher verfaulten, bevor sie sich mit einer hinreichenden Menge imprägniren oder nur verhärteten konnten.* Krautartige Pflanzen vermochten sich in der Regel wohl nur in Form von Abdrücken, oder auch in Substanz, abgeschlossen von Licht und Luft unter Zutritt von Wasser zu erhalten, wodurch sie allmählig sich in Braunkohle oder vielleicht selbst in steinkohlenähnliche Substanz verwandelten. Ob sie sich immer nur auf nassem Wege ohne Zuthun des Feuers bildeten, will ich durchaus nicht behaupten, indem ich nicht glaube, daß sich jemals irgend ein geologisches Gesetz auf alle Verhältnisse anwenden läßt, aber in sehr vielen Fällen mag es wohl so geschehen seyn. Daß sich Bitumen auf diese Weise bilden könne, habe ich oben bei Erwähnung des in Kalk verwandelten Holzes aus der Grafschaft Glatz bemerkt, und noch mehr sprechen dafür die in der älteren Koh-

lenformation zwischen dem Schieferthon gefundenen noch völlig biegsamen und nur schwach gebräunten Vegetabilien, die gewiß nicht so selten sind, als man bisher anzunehmen geneigt war. So besitze ich allein in meiner Sammlung aus der älteren Kohlenformation folgende auf die erwähnte Weise erhaltene fossile Pflanzen oder deren Theile: von Waldenburg in Schlesien mehrere zur zunächst ihrer Abstammung nach noch unbekannte Saamen, aus Krenzburg in Oberschlesien ebenfalls Saamen, das unter dem Namen *Alethopteris Ottonis* von mir beschriebene und abgebildete Farrenkraut (die fossilen Farrenkräuter Taf. XXXVII, Fig. 3 u. 4), ein *Lycopodites*, ähnlich unserm *Lycopodium undulatum* (die Blättchen lassen sich bei beiden noch in drei Schichten zerlegen, und gewähren natürlich vollkommene Einsicht ihrer Structur), aus Zwickau eine ähnlich erhaltene *Neuropteris*, und ein Farrenkraut mit *Sporangien*, an denen man noch den gegliederten Ring deutlich wahrnimmt; als das erste Beispiel dieser Art in der alten Kohlenformation (in der Lettenkohle des Keupers zu Baireuth fand ich im vorigen Jahre mehrere) besonders interessant. Kurz vor meiner Ankunft in Brezina im October d. J. fand Hr. Graf v. Sternberg in dem der Erhaltung fossiler Pflanzenreste äußerst ungünstigen Kohlensandstein von Radutz eine *Bruchmannia* mit so wohl conservirtem Saamen, daß deren Untersuchung uns doch wohl endlich Aufklärung über diese so lange räthselhaften Bürger der Vorwelt verschaffen wird.

Unstreitig ist bei der Verkohlung auf nassem Wege auch die Wirkung des Drucks in Anschlag zu bringen, wie der ganz einfache Versuch des Zusammenpressens frischer Blätter und Pflanzen lehrt, die sich sehr bald unter Einfluß von Wärme und Feuchtigkeit bräunen, was offenbar wohl nur als ein beginnender Verkohlungsprocess zu betrachten ist, während dieselben Vegetabilien sich in bloßem Wasser unter ähnlichen Verhältnissen,



mit Ausnahme von Einwirkung des Drucks, viel länger erhalten. Unverändert bleiben sie fast, wenn man sie hermetisch verschließt, namentlich vom Schimmel unberührt, der vorzugsweise wenigstens zum Unkenntlichmachen derselben beiträgt. Auf diese letztere Weise bewahre ich mehre Vegetabilien (die Blüthe einer Citrone, junge Erbsen und Linsenpflanzen, *Sedum rupestre*), seit  $1\frac{1}{2}$  Jahren in Glasröhren hermetisch verschlossen, unter Zutritt des Lichts und mit Ausschließung desselben, auf, ohne daß sie einer merklichen Veränderung, ausser einer gelblichgrünen Färbung, die aber bald in den ersten acht Tagen nach dem Einschließen eintrat, bis jetzt erlitten hätten<sup>1)</sup>. Eine Anzahl anderer Vegetabilien, Blätter von *Acrostichum aleicorne*, *Tectaria coriacea* Lk., *Adiantum aethiopicum*, *Pteris arguta*, *Asplenium Trichomanes*, *Aspidium molle*, *Juncus squarrosus*, Blätter vom *Thalietrum minus*, *Chaedrophyllum hirsutum*, *Equisetum palustre*, *Pinus sylvestris* legte ich am 12. August 1836 zwischen Thonplatten und senkte sie in einer offenen Glaskrause in das Bett des 6 Fuß mit Wasser angefüllten Grabens des hiesigen botanischen Gartens. Als ich sie am 20. August d. J., also nach  $12\frac{1}{4}$  Monaten wieder herausnahm, so fand ich sie im Ganzen hinsichtlich der Form sehr wohl erhalten, aber stark gebräunt, namentlich die *Tectaria*, *Aspidium molle*, *Juncus squarrosus*, die Kieferblätter und das *Equisetum* fast noch grün. Wenn diese Versuche auch zunächst noch kein erhebliches Resultat lieferten, so setze ich sie doch fort,

- 1) Am 1. Aug. d. J. schloß ich einen Frosch und eine Kröte, jede besonders, in ein hinreichend weites Cylinderglas so vorsichtig ein, daß sie von der zum Zuwachsen des Glases erforderlichen hohen Temperatur nicht beunruhigt wurden. Wie vorauszusehen war, traten sehr bald heftige Aspirationsbeschwerden ein, die dem Leben dieser Thiere ein Ende machten. Den Frosch bewahre ich noch auf. Seine äußere Gestalt ist jetzt, indem ich diese Abhandlung zum Druck abschicke (27. Novr.), natürlich noch eben so unverändert, wie die jener, auf ähnliche Weise eingeschlossenen, Pflanzen.

weil die von mir beobachtete Verfahrungsart, wenn ich nicht irre, vielleicht dem Vorgange in der Urzeit, in dem sich Abdrücke dieser Art bildeten, am meisten ähneln dürfte. Ich habe daher die oben genannten Pflanzen wieder in Thon gehüllt auf ähnliche Weise versenkt, um sie erst in ein Paar Jahren an das Tageslicht zu ziehen. Welche Veränderungen zusammengehäufte befruchtete Vegetabilien unter Zutritt der atmosphärischen Luft erleiden, zeigen die sehr interessanten Versuche des Hrn. A. F. Wiegmann durch die er nicht nur die Nachbildung von Torf, sondern auch der Braunkohle bewirkte (Ueber die Erfahrung, Bildung und das Wesen des Torfes, von Dr. A. F. Wiegmann, Professor in Braunschweig. 1837. S. 60 ff.). Während meiner Anwesenheit in Prag zeigte mir der Dr. jur. Hr. Ritter Kalina v. Jäthenstein, der sich viel mit Untersuchung der heidnischen Opfer- und Begräbnisplätze Böhmens beschäftigt, und auch bereits ein interessantes Werk darüber publicirte, Reste der ausgehöhlten Baumstämme, in welchen die Urbewohner dieses Landes, also wenigstens vor dem 6ten Jahrhundert, ihre Todten zu begraben pflegten. Wiewohl die Knochenreste in denselben, und alle anderen Verhältnisse keine Spur von Einwirkung des Feuers zeigten, fand ich doch dieses der Familie der Coniferen angehörende Holz in glänzende, schwärzlich braunliche Braunkohle verwandelt. Ich führe dies Beispiel nur an um die Aufmerksamkeit der Forscher auch auf ähnliche Fälle zu leiten, in denen sich oft die Einwirkung eines Momenten wird näher bestimmen lassen, das wir leider nur in geringem Verhältnisse anwenden können, ich meine den Einfluß der Zeit.

Erklärung der Kupfer.

Taf. I Fig. 13. Vertikalschnitt von *Pinus sylvestris* 50-mal vergrößert. *a* Markstrahlen, *b* Poröse Zellen.

Fig. 14. Durch Glühen erhaltenes Skelett.

**Fig. 15.** In Eisenoxydlösung eingeweichte und dann ge-  
glühte Holzschmitte dieser Art.

**Fig. 16.** Versteinertes Eichenholz aus der Jetztwelt,  
8mal vergrößert. *a* Markstrahlen von der Seite,  
*b* Markstrahlen von oben, wo bei *c* noch biegsame  
Fasern hervorragen; *d* ausgefüllte punktirte Gefäße,  
*eee* dieselben der Länge nach geöffnet; *f* Holz-  
zellen.

**Fig. 17.** Ein Querschnitt Buchenholz. *aaaa* Die ver-  
steinerten Stellen; *b* der Theil von welchem die  
Vergrößerung Fig. 18 entnommen ist.

**Fig. 18.** Vergrößerte Stelle. *a* Die unversteinerten  
Holzzellen; *b* punktirte Gefäße; *ccc* Markstrahlen;  
*ddd* die versteinerten Markstrahlen; *e* Holzzellen;  
*f* punktirte Gefäße.

(Wird vom Verfasser fortgesetzt)

## II. Versuche über das dritte Gesetz Keplers; von W. Eisenlohr.

Die unter dem Namen, drittes Gesetz Keplers, be-  
kannte Wahrheit, daß sich die Quadrate der Umlauf-  
zeiten der Planeten, wie die Kubikzahlen ihrer Entfer-  
nungen von der Sonne verhalten müssen, wenn, der Gra-  
vitationstheorie gemäß, die Anziehungskräfte sich umge-  
kehrt wie die Quadrate der Entfernung verhalten, ist  
meines Wissens bis jetzt nur auf eine sehr unvollkom-  
mene Art durch Ferguson (Astronomie nach New-  
tons Grundsätzen umgearbeitet von Kirchhof. 3. Aufl.  
Berlin 1793. S. 168 u. 169.) mittelst Versuche bestätigt  
worden. Der jetzige Zustand der Wissenschaft macht  
auch jeden empirischen Beweis überflüssig; dessen un-  
geachtet glaubte ein ausgezeichnete Astronom, in dessen

Gegenwart ich mehrer Versuche über obiges Gesetz anstellte, sie seyen der Veröffentlichung werth. Ich selbst lege darauf nur in sofern ein Gewicht, als es Manchem nicht uninteressant seyn wird, im engen Raume dasselbe Gesetz bestätigt zu sehen, welches der Umlaufszeit der Planeten in ihrer grossen Entfernung zum Grunde liegt, und bin auch der Meinung, daß bei den, zur Mode gewordenen populären Vorträgen der Astronomie, der empirische Beweis Vielen willkommener seyn wird, als der einfachste aller mathematischen Beweise.

Der Apparat, welchen ich dazu verfertigen liess, ist von der Ferguson'schen durch Nairne verbesserten Centrifugalmaschine nur wenig verschieden. Er ist in Fig. 5 Taf. III in dem 10ten Theil der natürlichen Grösse abgebildet. *AB* ist eine kreisförmige Scheibe von Ahornholz, welche deshalb so schwer und gross ist, damit sie einen gleichförmigen Gang erhalte. Ihre eiserne Achse ruht mit der Spitze in der Pfanne *D*. Ausserdem ist auf derselben Achse das am Rande ausgedrehte Rad *LL* befestigt. Ein zweites Rad *MM*, welches mittelst der Kurbel *N* gedreht werden kann, hat den doppelten Umfang des ersten, und dient dazu, um mittelst einer gespannten Leine dem Rade *LL*, und somit der Scheibe *AB* die doppelte Umdrehungsgeschwindigkeit zu ertheilen. Der verschiebbare Schlitten *PP* und die Schraube *Q* haben den Zweck, die Leine gehörig spannen zu können. In der Mitte der Scheibe *AB* ist ein messingenes Gestellchen *EC* befestigt, welches aus vier metallnen Stäbchen besteht, die oben und unten in messingene Plättchen eingelassen sind. In dem obern Plättchen befindet sich ein Einschnitt für die mit sehr geringer Reibung drehbare Rolle *K*. Gerade unter dieser bei *K* befinden sich zwei kleinere parallele Rollen. Die Träger *FF*, welche sich diametral gegenüber liegen, tragen die polirte Stahlstange *FF*, auf welcher die hölzerne durchbohrte Kugel *G* leicht verschoben werden kann. Auf beiden Seiten der Stahl-

stange

stange sind an der Kugel Häkchen befestigt, um an sie die Enden zweier Seidenfäden zu knüpfen. Diese Fäden laufen über die parallelen Rollen bei  $K'$ , vereinigen sich auf der Rolle  $K$ , und gehen durch die Mitte des Gestelles zu dem Häkchen, welches das Gewicht  $H$  trägt. Dieses Gewicht ist cylindrisch, wiegt  $\frac{7}{8}$  Kilogramm und berührt die vier Stäbchen nahezu. Es besteht aus vielen, gleich dicken und gleich schweren Metallplättchen, welche in der Mitte durchbohrt und mit einem Einschnitte versehen sind, um sie herausnehmen zu können. An dem untersten ist der Draht mit dem Häkchen befestigt, welches zum Aufknüpfen der Fäden dient. — Bei der Umdrehung der Scheibe spannt natürlich die Centrifugalkraft der Kugel  $G$  den Faden. Nimmt die Geschwindigkeit zu, so wird das Gewicht  $H$  gehoben, und läßt sie nach, so fällt es wieder herab. Mit einiger Uebung ist man im Stande, durch vorsichtiges Drehen das Gewicht  $H$  während der Umdrehung auf einer bestimmten Höhe, gewöhnlich 4 — 5 Millimeter, zu erhalten.

Mit der soeben beschriebenen Maschine beträgt die Anzahl der zur Erhaltung des Gleichgewichts in einer Minute nöthigen Umdrehungen 81, wenn die Entfernung der Kugel von der Mitte, nachdem das Gewicht um 5 Millimeter gehoben ist, noch 24 Centimeter beträgt, und  $\frac{7}{8}$  Kilogr. den Faden spannen. Bei 36 Centimetern Entfernung und  $\frac{7}{8}$  Kilogr. Gewicht, beträgt die Anzahl der nöthigen Umläufe 43 bis 44. Es verhalten sich also die Entfernungen wie 2 zu 3. Die Anziehungskräfte wie 4 zu 9, und die Umlaufzeiten wie 43 zu 81. Weil aber  $2^3 : 3^3 = 43^3 : 81^3$ , so bestätigt dieser Versuch das angegebene Gesetz; ebenso wird es durch andere Versuche bestätigt, deren Anführung hier überflüssig wäre. Man sieht überdies, daß dieser Apparat für alle Versuche über die Centrifugalkraft leicht eingerichtet werden kann.

Mannheim, den 14. Oct. 1837.

### III. Ueber eine neue Art der Ton-Erzeugung; von Hrn. August Pinnaud.

(L'Institut, No. 131 p. 366.)

Vor einiger Zeit war ich beschäftigt, vor der Glasbläserlampe ein Differentialthermometer zu verfertigen. Ich blies an dem Ende einer ungefähr drei Millimeter dicken Glasröhre eine kleine Kugel aus. Die Kugel war noch sehr heiss, als ich die Röhre bei Seite legte; sogleich vernahm ich einen zwar schwachen, aber sehr reinen Ton, welcher allmählig verhallte und mit der Wärme der Kugel ganz verschwand. Ich wiederholte den Versuch mit Röhren von verschiedener Länge und verschiedenem Durchmesser, und erhielt immer Töne, bald tiefere, bald höhere, je nach den Dimensionen des kleinen Apparates, der sie hervorbrachte.

Diese Erscheinung liess sich mit solcher Sicherheit und Leichtigkeit hervorbringen, dass es mich wunderte, wie die, welche täglich mit Glasblasen beschäftigt sind, dieselbe nicht schon wahrgenommen haben sollten. Indess wird es dadurch begreiflich, dass man beim Ausblasen einer Kugel am Ende einer Röhre gewöhnlich so lange hineinzublasen pflegt, bis die Kugel erkaltet ist, um so eine Mifsgestaltung derselben zu verhüten; während der von mir beschriebene Versuch erfordert, dass man mit dem Blasen einhalte, wenn die Kugel fast noch braunroth glüht.

Bei dem Bemühen, diese Thatsache zu erklären, bemerkte ich, dass die tönende Röhre, welche ich *Kugelhöhle* nennen will, inwendig mit Feuchtigkeit bekleidet war, entweder weil diese schon vor dem Einblasen vorhanden, oder durch dasselbe hineingekommen war. Von diesem Augenblick an vermutete ich, dass Wasserdampf



die Hauptursache der Erscheinung sey. Um mich davon zu überzeugen, nahm ich eine Röhre, trocknete die Luft in derselben aus, schmolz sie darauf an ihrem Ende und bliefs mit trockner Luft eine Kugel daran aus. Nun konnte ich keinen Ton mehr vernehmen. Darauf wiederholte ich den Versuch, nachdem ich dieselbe Röhre und Kugel inwendig befeuchtet hatte, und sogleich liefs sich der Ton wieder deutlich hören.

Die Erklärung der Erscheinung aus dieser Ursache schien mir ungemein einfach. Der durch die feuchte Luft in die Kugel gebrachte Wasserdampf dehnt sich durch die Wärme aus und verdichtet sich darauf an den Wänden der kalten Röhre. Durch diese Verdichtung entsteht ein leerer Raum, und die feuchte Luft tritt, um ihn zu füllen, schnell hinein. Der durch diese Luft hineingeführte Dampf dehnt sich sogleich aus und verdichtet sich zum Theil in der Röhre; es entsteht ein neues Vacuum, und abermals ein plötzliches Eindringen der Luft. Es ist also ein zwischen dem Wasserdampf der Kugel und der feuchten Luft der Röhre fortwährend unterbrochenes Gleichgewicht, woraus die Tonschwingungen entspringen.

Die Aehnlichkeit dieser Erscheinung mit der beim Ausströmen eines angezündeten Stroms von Wasserstoffgas aus einer Glas- oder Metallröhre ist unverkennbar. In beiden Fällen wird offenbar der Ton durch dieselbe Ursache erzeugt: nur ist in dem einen der Wasserdampf schon fertig gebildet da, in der an einem Ende verschlossenen Röhre; während in dem andern der Dampf seine constante Quelle in der Verbrennung des Wasserstoffgases hat, und die Röhre an beiden Enden offen ist.

Nachdem ich die Ursache der Erscheinung ausgemittelt, hatte ich noch das Gesetz derselben zu bestimmen. Ich hielt diese Bestimmung anfangs für schwierig, weil ich glaubte, das Phänomen erzeuge sich nur auf einige Augenblicke nach dem Ausblasen der Kugel; allein bald fand ich, dafs man die schon erkaltete Kugel nur

in die Flamme einer Weingeistlampe zu halten brauche, um sogleich den Ton hervorzurufen und sehr lange zu unterhalten. Wenn er zufällig nicht zum Vorschein kommt, so rührt dies davon her, daß die Röhre nicht feucht genug ist; und man braucht alsdann nur die Röhre oder selbst die Kugel inwendig zu befeuchten.

Für das Folgende setze ich immer voraus, daß man die Röhre durch Eintauchung in die Flamme einer Weingeistlampe zum Tönen gebracht habe. Diefs ist die einfachste und bequemste Art einen gleichmäßigen und anhaltenden Ton zu erlangen.

Die Beschaffenheit des in der Kugelhöhre erzeugten Tons hängt offenbar wesentlich von drei Elementen ab, nämlich: 1) von der Länge der Röhre, 2) vom Durchmesser der Kugel, und 3) vom Durchmesser der Röhre. Die anzustellenden Versuche bieten sich also von selbst dar: man muß folgeweise die Länge der Röhre, den Durchmesser derselben, und den Durchmesser der Kugel abändern, und untersuchen, wie dadurch der Ton verändert werde.

Auf solche Weise habe ich folgende drei allgemeine Gesetze aufgefunden:

I. *Der Ton, der in einer durch eine erhitzte Kugel verschlossenen Glasröhre erzeugt wird, ist, bei Gleichheit aller übrigen Umstände, desto tiefer, je länger die Röhre ist.*

II. *Bleiben Länge und Durchmesser der Röhre gleich, so ist der Ton desto tiefer, je größer die Kugel am Ende der Röhre ist.*

III. *Endlich ist der Ton, bei Gleichheit aller übrigen Umstände, desto höher, je größer der Durchmesser der Röhre.*

Diefs letztere Gesetz ist sehr merkwürdig, weil es von dem abweicht, was uns die Theorie über die Luftschwingungen in Röhren lehrt. Um es in dem Sinn zu bestätigen, wie es eben aufgestellt ist, hätte man zwei

Röhren von gleicher Länge, und Kugeln daran von gleichem Durchmesser haben müssen. Da es aber leichter ist, die Ungleichheit zweier Kugeln, als die vollkommene Gleichheit derselben zu beurtheilen, so blieb ich einerseits eine kleine Kugel an dem Ende einer kurzen und engen Röhre aus, und andererseits eine größere Kugel an dem Ende einer längeren und weiteren Röhre. Nach den beiden ersten Gesetzen hätte der Ton der zweiten Röhre tiefer seyn müssen, als der Ton der ersten Röhre, sowohl wegen des größeren Volums der Kugel, als wegen der größeren Länge der Röhre. Allein statt des erhielt ich mit der ersten Röhre einen höheren Ton. Aus doppeltem Grunde ist hieraus also zu schliessen, daß, bei gleicher Länge der Röhren und bei gleichem Durchmesser der Kugeln, der Ton desto höher ist, je weiter die Röhre, und desto tiefer, je enger die Röhre.

Zur Erzeugung eines Tons in der Kugelröhre ist es keineswegs nöthig, daß die Röhre überall einen gleichen Durchmesser habe. Nachdem ich eine Röhre, die mir wohl kalibriert zu seyn schien, zum Tönen gebracht, erhitze ich sie dicht an der Kugel, und zog sie daselbst aus, um sie zu verengern. Darauf schnitt ich so viel von der Röhre ab, daß sie ihre ursprüngliche Länge wieder bekam, und tauchte sie nun in die Flamme einer Weingeistlampe. Die Röhre gab nun wieder einen Ton, aber einen etwas tieferen, als zuvor; ein Resultat, das leicht vorauszusehen war, da das Ausziehen die Röhre verengert hatte. Auch diesen Versuch kann man als eine Bestätigung des dritten Gesetzes ansehen.

Nachdem ich die drei obigen Gesetze experimentell erwiesen hatte, beschloß ich die Zahl der in der Kugelröhre von der Luft ausgeführten Tonschwingungen zu bestimmen, und zwar in Function: 1) der Länge der Röhre, 2) des Durchmessers derselben, und 3) des Durchmessers der Kugel. Bezeichnet man mit  $n$  die Anzahl der Schwingungen, mit  $l$  die Länge der Röhre, mit  $r$  den

Durchmesser derselben, mit  $R$  den Durchmesser der Kugel, und mit  $C$  einen constanten Coëfficienten, so, glaube ich, muß man folgende Formel aufstellen:

$$n = C \frac{r^\alpha}{R^\beta},$$

wo  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  unbekannte, noch zu bestimmende Exponenten sind.

Ich glaubte überdies, daß es sich mit dem Ton der Kugelhöhre wie mit dem Ton einer gewöhnlichen Pfeife verhalten würde, d. h. daß bei Verkürzung der Röhre auf die Hälfte ihrer Länge der Ton auf die höhere Octave übergehen würde: allein, als ich den Versuch machte, erhielt ich zu meinem anfänglichen Erstaunen ein ganz anderes Resultat. Statt der Octave erhielt ich sehr deutlich die Quinte. Ich wiederholte den Versuch mehrmals mit Röhren von verschiedener Länge und verschiedenem Durchmesser, und verschiedenem Volum der Kugel; allein immer, wenn ich die Röhre in der Mitte, von der Kugel ab, durchschnitt, erhielt ich die höhere Quinte von dem Ton der ganzen Röhre. Jetzt schien es mir wichtig, die wirklichen Längen einer und derselben Röhre zu messen, die, bei ungeändertem Durchmesser derselben, und bei ungeänderter GröÙe der Kugel, also Töne der Skale geben könnten. Ich unternahm daher die Reihe von Versuchen, deren Resultate in folgender Tafel zusammengestellt sind.

Bei diesen Versuchen sah ich darauf, Röhren von verschiedenem Durchmesser, mit verschiedenen Kugeln daran, und von sehr verschiedener Glasdicke zu nehmen. Allein bei allen Versuchen mit einer und derselben Röhre veränderte ich nur die Länge dieser Röhre; auch gab ich der Kugel immer eine solche Glasdicke, daß sie durch die Hitze der Lampe ihre Gestalt, und folglich ihr Volumen nicht verändern konnte. Die erhaltenen Töne wurden mit den Tönen einer Geige oder Flöte verglichen.

## 1ster Versuch.

Röhrenlänge.	Töne <sup>1)</sup> .	Längenver- hältniss.	Musikalische Intervalle.
6 Zoll	<i>c</i>	1	Einklang
5 -	<i>d</i> (zweifelhaft)	$\frac{5}{6}$	Secunde
4 -	<i>e</i>	$\frac{2}{3}$	Große Terz
3 -	<i>f</i>	$\frac{1}{2}$	Quinte
2 -	<i>h</i>	$\frac{1}{2}$	Septime

## 2ter Versuch.

8 -	<i>gis</i>	1	Einklang
6 -	<i>h</i> (natürlich)	$\frac{1}{2}$	Kleine Terz
4 -	<i>dis</i>	$\frac{1}{2}$	Quinte

## 3ter Versuch.

12 -	<i>d</i>	1	Einklang
10 -	<i>e</i> (zweifelhaft)	$\frac{5}{6}$	Secunde
9 -	<i>f</i> (natürlich)	$\frac{2}{3}$	Kleine Terz

## 4ter Versuch.

10 -	<i>g</i>	1	Einklang
3 -	<i>g</i> (bis auf ein Komma)	$\frac{1}{10}$	Octave

## 5ter Versuch.

6 -	<i>h</i>	1	Einklang
5 -	<i>cis</i>	$\frac{1}{6}$	Secunde
4 -	<i>dis</i>	$\frac{2}{3}$	Große Terz
3 -	<i>fis</i>	$\frac{1}{2}$	Quinte
8 -	<i>b</i> oder <i>aïs</i>	$\frac{1}{2}$	Septime

## 6ter Versuch.

9 -	<i>f</i>	1	Einklang
8 -	<i>fis</i> (zu hoch)	$\frac{1}{4}$	Verminderte Secundo

1) Bei Uebersetzung der französischen Tonbenennungen ist hier *ut*,  
durch *c*, *ut* durch *c* u. s. w. wiedergegeben. p

Röhrenlänge.	Töne.	Längenver- hältnisse.	Musikalische Intervalle.
6 Zoll	$a$	$\frac{2}{3}$	Große Terz
$4\frac{1}{2}$ -	$\bar{c}$	$\frac{1}{2}$	Quinte
3 -	$c$	$\frac{1}{3}$	Septime

Berichtigt man die unvermeidlichen Fehler dieser Versuche, so wird die Zusammensetzung der von den Kugelhöhren gegebenen Tonleiter folgende:

Töne	$c$	$d$	$e$	$f$	$g$	$a$	$h$	$\bar{c}$
Röhrenlänge	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{3}{1}$	$\frac{2}{1}$	$\frac{1}{1}$

und die Intervalle zwischen zwei auf einander folgenden Tönen werden

von $d$ auf $c$	$\frac{2}{3}$	großer Ton
- $e$ - $d$	$\frac{1}{3}$	kleiner Ton
- $f$ - $e$	$\frac{1}{6}$	großer halber Ton
- $g$ - $f$	$\frac{1}{3}$	großer Ton
- $a$ - $g$	$\frac{1}{3}$	kleiner Ton
- $h$ - $a$	$\frac{1}{3}$	großer Ton
- $\bar{c}$ - $h$	$\frac{1}{6}$	großer halber Ton

Was die erhöhten oder erniedrigten Töne betrifft, so würde, da das Intervall einer kleinen Terz durch  $\frac{2}{3}$  ausgedrückt wird, man haben:

$$es = \frac{2}{3} \quad aes = \frac{1}{3} \quad b = \frac{2}{3} \quad \text{u. s. w.}$$

Eben so sieht man, daß das charakteristische Verhältniß von  $\bar{d}$ , der Octave von  $d$  und der Quinte von  $g$  gleich ist  $\frac{1}{2}$ , daß das Verhältniß  $\frac{1}{3}$  entsprechen würde  $a$ , der Quinte von  $\bar{d}$  und der Octave von  $a$  u. s. w.

Bisher habe ich nur die Länge der Kugelhöhre abgeändert; es bleibt nun noch der Einfluß des Durchmessers der Kugel und der der Röhre zu untersuchen, welche einander entgegengesetzt wirken. Ich habe nun untersucht, wie sich der Ton mit dem Volum der Kugel verändert, indess dabei noch nicht alle Vorsichtsmaßregeln angewandt, welche eine so delicate Untersuchung



erfordert. Dessenungeachtet will ich diesen Versuch hier anführen, weil der Weg, den ich dabei einschlug, mir geeignet scheint, ziemlich scharfe Resultate zu geben.

An dem Ende einer 4 bis 5 Zoll langen und 2 bis 3 Linien weiten Röhre blies ich eine ziemlich große Kugel aus, von solcher Düntheit im Glase, daß sie durch die Hitze der Weingeistlampe eine bedeutende Volumverringering erliden mußte. Ich merkte mir den Ton, welchen diese Kugel sogleich nach ihrem Ausblasen gab, und füllte sie darauf, nachdem sie erkaltet war, bis zu einem am Anfange der Röhre gemachten Strich, mit Quecksilber. In diesem Zustande wägte ich den Apparat; dann wägte ich ihn leer, so daß also der Gewichtsunterschied mir das Gewicht des die Kugel füllenden Quecksilbers gab. Ich tauchte nun diese Kugel in die Flamme einer Weingeistlampe, nachdem ich zuvor das Innere der Röhre sorgfältig befeuchtet hatte. Alsbald liefs sich ein Ton hören; Anfangs war er Unisono mit dem ursprünglichen Ton, allein so wie die Kugel durch anfangende Schmelzung ihr Volum verringerte, stieg er merklich. In dem Augenblick, wo der Ton die große Terz des ursprünglichen Tons erreicht hatte, hörte ich mit dem Erhitzen der Kugel auf; sie behielt nun ihr Volum bei, abgerechnet die kleine Zusammenziehung, die sie durch's Erkalten erlitt. Ich wägte nun wie zuvor die Quecksilbermenge, welche zur Füllung der Kugel bis zum Strich am Beginn der Röhre nothwendig war, und das Verhältniß der beiden Gewichte Quecksilber gab mir das Verhältniß der Volume der Kugel. Bei diesen Versuchen hatten sich die Länge und der Durchmesser der Röhre nicht verändert; die Steigerung des Tons erfolgte alleinig aus der Zusammenziehung der Kugel.

Bei einem nach dieser Methode angestellten Versuch war der erste Ton der Kugelhöhre ein *g*, und das Gewicht des die Kugel füllenden Quecksilbers betrug 20,3 Grm. Der Ton derselben Röhre bei verkleinerter K-

gel war  $h$ , und das Gewicht des füllenden Quecksilbers 10,5 Grm. Hiernach scheint es mir wahrscheinlich, daß, bei Verringerung des Volums der Kugel auf die Hälfte, der entstehende Ton die große Terz des ursprünglichen ist. Indefs, wiederhole ich, der Versuch war nicht sorgfältig genug angestellt, um diesen Resultaten volles Vertrauen schenken zu können. Bis neue Versuche sie bestätigt haben, halte ich sie nur für annähernd.

Am Schlusse dieses Aufsatzes will ich noch einer Beobachtung erwähnen, die mir die in Rede stehenden Untersuchungen scheint erleichtern zu müssen, weil sie die Tonerzeugung in der Kugelhöhle bequemer macht. Damit der Ton entstehe, muß die Kugel eine hohe Temperatur haben; allein, wenn man, ehe die Kugel die zum Tönen nothwendige Temperatur erreicht hat, oder nachdem sie bis unter dieselbe erkaltet ist, in die Röhre bläst, auf die Weise, wie man einem hohlen Schlüssel einen Ton entlockt, so kommt der Ton in unveränderter Höhe oder Tiefe wieder zum Vorschein. Nachdem die Kugel vollständig erkaltet ist, wird es unmöglich der Röhre denselben Ton zu entlocken; wenn es dann überhaupt gelingt, einen reinen und gleichmäßigen Ton zu erhalten, so ist derselbe weit höher.

---

#### IV. *Versuch zur Aufstellung einer Theorie der Dispersion des Lichts; von Hrn. Baden Powell.*

(*Phil. Transact.* 1836. pt. 1 p. 17. Auszug.)

---

Diese Abhandlung bildet eine Fortsetzung von der in diesen Annalen, Bd. XXXVII S. 352, mitgetheilten, und bezweckt einen Vergleich der von Rudberg am Kalkspath, Bergkrystall, Arragonit und Topas gemessenen

Brechungsverhältnisse (Ann. Bd. XIV S. 45 u. Bd. XVII S. 1), mit der aus Cauchy's Theorie der Dispersion abgeleiteten Formel:

$$\frac{1}{\mu} = H \left\{ \frac{\sin\left(\frac{\pi r n}{\lambda}\right)}{\left(\frac{\pi r n}{\lambda}\right)} \right\},$$

worin  $\mu$  das Brechungsverhältniß,  $\lambda$  die Wellenlänge, und  $H, r, n$  Constanten, die von der Natur des brechenden Mittels abhängen. Diese Formel ist, wie unter andern Hr. Tovey gezeigt (Ann. Bd. XXXVII S. 363), zwar nur eine annähernde; indess gewährt es doch Interesse, zu sehen, wie weit sie auch die an krystallisirten Mitteln gemachten Beobachtungen darstellt, und darum theilen wir nachstehend das Resultat der Rechnungen des Hrn. Powell mit:

Strahl.	Beobachtete Werthe von $\mu$ .	$\left(\frac{\pi r n}{\lambda}\right)$ .	Verhältniß $\left(\frac{\sin}{\sin}\right)$ .	Berechnete Werthe von $\mu$ . $= C \left(\frac{\sin}{\sin}\right)$ .
---------	--------------------------------------	--	--	--

### Kalkspath.

Kante des Prisma parallel der Rhomboëderaxe.

#### Ordentlicher Strahl.

<i>B</i>	1,6531	13° 16' 0"	1,009	1,6531
<i>C</i>	1,6515	13 55 2	1,010	1,6547
<i>D</i>	1,6585	15 29 59	1,0123	1,6584
<i>E</i>	1,6636	17 19 45	1,0156	1,6638
<i>F</i>	1,6680	18 47 30	1,0181	1,6680
<i>G</i>	1,6762	21 14 30	1,0233	1,6765
<i>H</i>	1,6833	23 1 30	1,0277	1,6834
			$C=1,6384$	

#### Außerordentlicher Strahl.

<i>B</i>	1,4839	9° 30' 0"	1,0045	1,4838
<i>C</i>	1,4845	9 57 59	1,0051	1,4847
<i>D</i>	1,4863	11 5 58	1,0063	1,4864
<i>E</i>	1,4887	12 24 38	1,0060	1,4889

Strahl.	Beobachtete Werthe von $\mu$ .	$\left(\frac{\pi n}{\lambda}\right)$ .	Verhältniß $\left(\frac{arc}{\sin}\right)$ .	Berechnete Werthe von $\mu$ $= C \left(\frac{arc}{\sin}\right)$ .
<i>F</i>	1,4907	13° 17' 20"	1,0092	1,4908
<i>G</i>	1,4945	15 12 30	1,0119	1,4948
<i>H</i>	1,4978	16 29 15	1,0140	1,4978
$C = 1,4772$				

## Bergkrystall.

Kante des Prisma parallel der Rhomboëderaxe.

Außerordentlicher Strahl.

<i>B</i>	1,5499	10° 33' 0"	1,0056	1,5497
<i>C</i>	1,5508	11 4 0	1,00635	1,5508
<i>D</i>	1,5533	12 19 30	1,008	1,5533
<i>E</i>	1,5563	13 46 50	1,0097	1,5560
<i>F</i>	1,5589	14 56 50	1,0114	1,5585
<i>G</i>	1,5636	16 53 15	1,0147	1,5636
<i>H</i>	1,5677	18 18 30	1,0173	1,5677
$C = 1,541$				

Ordentlicher Strahl.

<i>B</i>	1,5409	10° 20' 0"	1,0054	1,5409
<i>C</i>	1,5418	10 50 30	1,006	1,5418
<i>D</i>	1,5442	12 4 20	1,0075	1,5442
<i>E</i>	1,5471	13 30 0	1,0093	1,5469
<i>F</i>	1,5496	14 38 15	1,0109	1,5493
<i>G</i>	1,5542	16 32 45	1,0141	1,5541
<i>H</i>	1,5582	17 56 0	1,0166	1,5582
$C = 1,5326$				

## Arragonit.

Strahl parallel der ersten Elasticitätsaxe.

<i>B</i>	1,5275	9° 40' 0"	1,0047	1,5275
<i>C</i>	1,5282	10 6 27	1,0051	1,5282
<i>D</i>	1,5301	11 17 34	1,0065	1,5303
<i>E</i>	1,5326	12 37 40	1,0081	1,5328
<i>F</i>	1,5348	13 41 25	1,0095	1,5348
<i>G</i>	1,5388	15 28 33	1,0123	1,5390
<i>H</i>	1,5423	16 46 36	1,0144	1,5424
$C = 1,5204$				

Strahl.	Beobachtete Werthe von $\mu$ .	$\left(\frac{\alpha n}{\lambda}\right)$ .	Verhältniß $\left(\frac{\alpha n}{\mu n}\right)$ .	Berechnete Werthe von $\mu$ , $= C \left(\frac{\alpha n}{\mu n}\right)$ .
Strahl parallel der zweiten Elasticitätsaxe.				
<i>B</i>	1,6763	12° 50' 0"	1,0084	1,6763
<i>C</i>	1,6778	13 27 53	1,0092	1,6776
<i>D</i>	1,6816	14 59 35	1,0115	1,6815
<i>E</i>	1,6863	16 43 56	1,0144	1,6863
<i>F</i>	1,6903	18 10 42	1,0168	1,6903
<i>G</i>	1,6984	20 32 55	1,0217	1,6984
<i>H</i>	1,7051	22 16 27	1,0257	1,7050
			$C=1,6623$	

Strahl parallel der dritten Elasticitätsaxe.				
<i>B</i>	1,6806	13° 0' 0"	1,0086	1,6805
<i>C</i>	1,6820	13 38 20	1,0093	1,6820
<i>D</i>	1,6859	15 11 17	1,0118	1,6858
<i>E</i>	1,6908	16 59 0	1,0148	1,6908
<i>F</i>	1,6951	18 24 45	1,0175	1,6952
<i>G</i>	1,7032	20 48 52	1,0223	1,7033
<i>H</i>	1,7101	22 33 50	1,0263	1,7101
			$C=1,6662$	

## Topas.

## Erste Elasticitätsaxe.

<i>B</i>	1,6084	10° 5' 0"	1,0051	1,6085
<i>C</i>	1,6093	10 34 42	1,0056	1,6092
<i>D</i>	1,6116	11 46 48	1,0070	1,6114
<i>E</i>	1,6145	13 10 22	1,0089	1,6145
<i>F</i>	1,6170	14 16 53	1,0104	1,6172
<i>G</i>	1,6215	16 8 40	1,0133	1,6216
<i>H</i>	1,6254	17 30 2	1,0157	1,6254
			$C=1,6003$	

## Zweite Elasticitätsaxe.

<i>B</i>	1,6105	10° 7' 0"	1,0052	1,6105
<i>C</i>	1,6114	10 36 47	1,0058	1,6115
<i>D</i>	1,6137	11 49 10	1,0071	1,6136
<i>E</i>	1,6167	13 12 58	1,0090	1,6165
<i>F</i>	1,6191	14 19 45	1,0104	1,6189
<i>G</i>	1,6236	16 11 53	1,0133	1,6236
<i>H</i>	1,6274	17 33 29	1,0158	1,6275
			$C=1,6022$	

Strahl.	Beobachtete Werthe von $\mu$ .	$\left(\frac{\mu \sin}{\lambda}\right)$ .	Verhältniß $\left(\frac{\text{arc}}{\sin}\right)$ .	Berechnete Werthe von $\mu$ . $= C \left(\frac{\text{arc}}{\sin}\right)$ .
Dritte Elasticitätsaxe.				
<i>B</i>	1,6180	10° 7' 0"	1,00515	1,6180
<i>C</i>	1,6188	10 36 47	1,0058	1,6189
<i>D</i>	1,6241	11 49 III	1,0071	1,6209
<i>E</i>	1,6241	13 12 58	1,0090	1,6240
<i>F</i>	1,6265	14 19 45	1,0104	1,6264
<i>G</i>	1,6312	16 11 53	1,0133	1,6310
<i>H</i>	1,6351	17 33 29	1,0158	1,6351
		.	$C = 1,60955$ .	

V. *Bestimmung der Axen des elliptischen Rotationssphäroids, welches den vorhandenen Messungen von Meridianbögen der Erde am besten entspricht; von J. F. W. Bessel.*

(Auszug aus den astron. Nachrichten, No. 333.)

**W**albeck hat diese Aufgabe zuerst aus dem richtigen Gesichtspunkte betrachtet, indem er dasjenige Rotations-sphäroid zu bestimmen suchte, welches allen bis zu seiner Zeit bekannten Gradmessungen möglichst gut darstellt; allein er hat nur auf den nördlichsten und südlichsten Punkt jeder Gradmessung Rücksicht genommen, und die zwischen beiden liegenden, ebenfalls astronomisch bestimmten Punkte nicht in seine Rechnung gezogen. J. C. E. Schmidt <sup>1)</sup> hat die frühere Rechnung vervollständigt, indem er nicht nur allen beobachteten Polhöhen gleiches Recht eingeräumt, sondern auch Gradmessungen berücksichtigt hat, welche in der Zwischenzeit bekannt geworden waren; allein er hat mehrere Angaben angewandt.

1) *Lehrb. der math. u. phys. Geogr.* Bd. I S. W v. 200.



welche unrichtig zu seyn scheinen, und überdies sind seit seiner Rechnung noch drei Gradmessungen vollendet worden: die in Rußland vom General Tenner, welche mit der von v. Struve einen Meridianbogen von  $8^{\circ} 2' 29''$  umfaßt; die in Dänemark von Schumacher, welche sich über  $1^{\circ} 31' 53''$  erstreckt, und die in Preußen vom Major Bayer und Bessel, welche  $1^{\circ} 30' 29''$  umspannt. Diese beiden Umstände haben dem berühmten Königsberger Astronomen Veranlassung gegeben, auch sich die Bestimmung des wahrscheinlichsten Erdsphäroids zur Aufgabe zu stellen, und dabei, aufser den drei genannten Messungen, noch folgende zu benutzen: die peruanische, die beiden ostindischen, die letzte französische, die englische, die hannöversche und die schwedische, also in Summa zehn.

Die Hauptresultate dieser Untersuchung sind folgende:

$$\text{Große Axe } a = 3271953^{\text{Toi}}, 854.$$

$$\text{Kleine Axe } b = 3261072 \quad , 900.$$

$$\frac{a}{b} = \frac{300,7047}{299,7047} : \frac{a-b}{a+b} = 0,0016655304.$$

Länge  $m$  eines Meridiangrades, dessen mittlere Polhöhe  $= \varphi$ .

$$m = 57011^{\text{T}}, 453 - 284^{\text{T}}, 851 \cos 2\varphi + 0^{\text{T}}, 593 \cos 4\varphi - 0^{\text{T}}, 001 \cos 6\varphi.$$

Länge  $p$  eines Grades des Parallels,

$$p = 57153^{\text{T}}, 885 \cos \varphi - 47^{\text{T}}, 576 \cos 3\varphi + 0^{\text{T}}, 059 \cos 5\varphi.$$

Die Länge eines Erdquadranten, welche nach der anfänglichen Absicht 10000000 Meter seyn sollte, ist dieser Bestimmung zufolge

$$10000565^{\text{M}}, 278$$

ihre mittlere Unsicherheit ist  $= 508^{\text{M}}, 7$ , also fast so groß wie ihre Abweichung von der runden Zahl. Man sieht hieraus, wie unsicher das Meter selbst jetzt, wo die Zahl der Gradmessungen sich beträchtlich vermehrt hat, noch seyn würde, wenn es seine ursprüngliche Erklärung

dafs es der 10000000te Theil des Erdquadranten seyn sollte, behalten hätte. Noch immer würde seine Unsicherheit wenigstens  $0^{\circ},0225$  betragen, eine Gröfse, welche nur bei sehr rohen Messungen unbedeutend erscheinen könnte <sup>1)</sup>.

# VI. Ueber Thermo-Elektricität überhaupt, über den thermo-elektrischen Funken und einen Thermo-Elektromagnet insbesondere; von H. Alexander.

Prof. der Physik an der polytechnischen Schule zu München.

Oersted's wichtiger Entdeckung, wodurch er der Vater des Elektromagnetismus wurde, steht Seebeck's Entdeckung würdig zur Seite, wonach durch krystallinische Metalle, wie Antimon und Wismuth, die zusammen-  
gelöthet, im magnet. Meridian aufgestellt, und dann an ihren Endpunkten ungleich erwärmt werden — ein elektrischer Strom entsteht, der durch das Ablenken einer darüber oder darunter gestellten Magnetenadel erwiesen und zugleich gemessen wird, und den Namen eines thermo-elektrischen führt.

Die Versuche, welche Seebeck und v. Yelin gleichzeitig machten, sind seit 1821 und 22 bekannt. Seit dieser Zeit fand dieses Kapitel der Elektricitätslehre sorgsame

1) Obigen Resultaten zufolge ist also

$$\text{die Abplattung} = \frac{a-b}{a} = \frac{1}{300,7047},$$

die Länge eines Meridiangrades dessen mittlere Polhöhe

$$0^{\circ} = 56^{\circ}27'194$$

$$45 = 57^{\circ}01'153$$

$$90 = 57^{\circ}29'698$$

$$\text{Länge eines Aequatorgrades} = 57^{\circ}106'368.$$

P.

same Pflege in Italien, und Nobili's schon früher ausgesprochene Meinung, daß alle elektrischen Ströme durch Temperatur-Differenz entstehen, gewinnt mit jedem Tage an Begründung. (? P.)

Die Thermo-Elektricität bringt Erscheinungen hervor, die wir auch an der Reibungs- und Berührungselektricität beobachten. Nobili beobachtete Muskelzuckungen; Botto in Turin zersetzte Wasser. — Zu den wichtigsten Entdeckungen, die im Felde der Thermo-Elektricität in der neuesten Zeit gemacht worden sind, gehört unstreitig die des thermo-elektrischen Funkens und des Magnetismus durch thermo-elektrische Ströme, als ebenso viele Beweise für die Ansicht, daß die Elektricität, ihrer Erzeugungsquelle nach, zwar verschieden, ihrer Natur und Wirkung nach aber ähnlich sey.

Es sollen hier nun einige der genannten Erscheinungen der Thermo-Elektricität besprochen werden, so wie ich sie durch Versuche bestätigt fand.

#### 1. Die Erzeugung des thermo-elektrischen Funkens.

Antinori in Florenz hatte bereits eine Reihe von Versuchen angestellt über die Wirkungen des thermo-elektrischen Stromes, namentlich über den Funken und die chemischen Wirkungen desselben. — Prof. Linari an der Universität zu Siena wiederholte Antinori's Versuche und veröffentlichte die Resultate derselben in dem *«L'Indicatore Sanese, No. 50. Decbr. 1836.»*

Die wesentlichsten Resultate seiner Versuche sind: die Entwicklung des thermo-elektrischen Funkens, die Wasserzersetzung und die Verwandlung einer unmagnetischen Nadel in einen Magnet durch den Strom. Die Erzeugung des Funkens wollte anfangs schwer gelingen, und wurde deswegen mehrfach bezweifelt, bis man die Kupferband-Spirale als Multiplikator anwendete, wovon weiter unten. Wheatstone, Professor am King's-College in London, wiederholte diese Versuche mit glänzendem Erfolge. — Vergl. *The London and Edinburgh*

*Philosophical Magazine*, Mai-Heft 1837<sup>1)</sup>. — Francis Watkins theilt das Resultat seiner Versuche über oben genannte Erscheinungen im September-Hefte des letztgenannten Journals mit.

Ich will nun den Versuch zugleich mit den gebrauchten Apparaten beschreiben.

Die thermo-elektrischen Säulen, deren ich mich bei meinen Versuchen bediente, waren die von Nobili und Melloni, wie sie in Dove's Repertorium der Physik, Bd. I S. 355 u. 56, Berlin 1837, beschrieben und Tafel II Fig. 2 u. 6 abgebildet sind.

Den wesentlichsten Dienst leistete mir dabei ein Multiplicator in Bandform, dessen bereits oben erwähnt worden. Einige nennen ihn Spiral-Conductor. Der Erfahrung zufolge leistet nämlich ein Kupferband weit mehr als ein Draht von einer weit größeren Anzahl von Windungen, worauf, meines Wissens, zuerst ein Mitglied der American Philosophical Society im Jahre 1835 aufmerksam machte. Der Kupferstreifen, dessen ich mich bediente, ist 80' lang, 1 $\frac{1}{4}$ " breit, mit Papier überzogen und wiegt 9 $\frac{1}{2}$  Pfund. Das Band ist in einer flachen Spirale aufgewunden, wie man eine Aderlassbinde aufzuwickeln pflegt. Die obengenannte thermo-elektrische Säule ward an einem Ende durch eine Weingeistflamme erwärmt, am andern durch Verdunstung von Schwefeläther abgekühlt<sup>2)</sup>. Von den Polen der Säule wurde nun der so entstandene Strom in ein hölzernes Gefäß geleitet, welches mit Quecksilber gefüllt war. In der Mitte dieses Gefäßes befindet sich eine Scheidewand, wodurch das Quecksilber in zwei von einander getrennte Hälften getheilt wird. Das Gefäß ist für den Versuch außerst bequem, und dasselbe, wie das bei Ritchie's elektromagnetischem Rotations-Apparate. In jede der Quecksilber-Hälften führt ein Platindraht, mit welchem ein Pol der Säule gut metallisch verbunden wurde.

1) *Annal.* Bd. XXXXI S. 160.

P.

2) Die Ablenkung der Galvanometer-Nadel betrug im Max. 90°.

Die beiden spitzigen Enden der Kupferspirale wurden in das Quecksilber getaucht; so oft ich eins dieser beiden Enden aus dem Quecksilber zog, erhielt ich einen Funken. Der Funke war lebhaft und mit einem knisternden Laute verbunden. Benetzte ich zuvor die Spitzen der Spirale mit salpetersaurem Quecksilber, so war der Funke lebhafter und versagte nie.

2. Erzeugung von Magnetismus in weichem Eisen durch thermo-elektrische Ströme.

Fr. Watkins machte hierüber Versuche; ich wiederholte sie unter mannigfaltigen Abänderungen und fand die gewünschten Resultate. Das Eisen, dessen ich mich bei meinen Versuchen bediente, war so weich, daß ich es leicht mit dem Messer schneiden konnte. Es ist in Hufeisenform gebogen, mit einer Siegelacklösung überzogen, wiegt 2 Pfund; seine Polweite beträgt 2"; der Durchmesser eines Schenkels 1". — Die Zahl der Windungen des 1" dicken Kupferdrahtes um das Eisen ist 45. — Die hierzu benutzte Batterie ist von den früher angegebenen verschieden und von folgender Beschaffenheit: Sie besteht aus einer horizontalliegenden vierseitigen Säule von 23 Elementen aus Wismuth und Antimon, jede Platte zu  $1\frac{1}{4}$ " Fläche und 1" Dicke. Die Elemente sind mit Zinn gelöthet. Von den Polen dieser Säule gingen 1" starke Kupferdrähte in Quecksilbernäpfen, in welche die Drähte des Elektromagneten tauchten, die zuvor etwas angefeilt, und dann mit salpetersaurem Quecksilber benetzt wurden. Von oben wurde die Säule durch eine Lage Eis abgekühlt, von unten durch eine Weingeistflamme erwärmt. Sogleich trug das Eisen seinen Anker, und behielt ihn noch einige Zeit fest, nachdem die Flamme entfernt war. — Ich nahm nun zur Erzeugung einer größeren Temperatur-Differenz ein Gemenge von  $-10^{\circ}$  R. Das Eisen trug sein halbes Gewicht. Darauf mengte ich 3 Theile salzsauren Kalks und 2 Theile gestossenen Eises, wodurch die Tragkraft

des weichen Eisens bedeutend vermehrt wurde; indessen verdient die strahlende Wärme eines rothglühenden Eisens vor einer Weingeistflamme den Vorzug der gleichmässigeren Erwärmung der ganzen Säule, was bei der gleichmässigen Abkühlung nach der ganzen Länge der Säule von oben wichtig ist. — Diefs rechtfertigt den ohnehin leicht zu machenden Schluß, daß eine grössere Temperatur-Differenz auch stärkere magnetische Wirkung erzeugen werde.

Hr. Watkins macht im September-Heft des oben genannten Magazine's eine Mittheilung, wornach er durch einen thermo-elektrischen Strom einen Thermo-Elektromagnet von 98 Pfund Tragkraft erzeugte. Indessen gibt er weder Gewicht noch Dimensionen seines Hufeisens an, wovon doch offenbar die relative Tragkraft des fraglichen Elektromagneten abhängt.

Die Grösse des Eisens und die Dicke des umwundenen Drahtes wird wegen der zunehmenden Oberfläche, über welche sich der Strom verbreitet, die Tragkraft vermehren, nach Barlow's Versuchen zu schliessen, nach welchen die Verbreitung der magnetischen Thätigkeit in weichem Eisen nicht von dessen Masse, sondern von der Grösse seiner Oberfläche abhängt.

Merkwürdig und in ihren Resultaten wichtig sind in dieser Beziehung auch W. Sturgeon's Versuche, die er im October-Hefte der *Annals of Electricity etc.* bekannt macht.

Dieser Experimentator untersuchte nämlich das Verhältniß der elektrischen Ströme in weichem Eisen zur Metalldicke in Beziehung auf Verbreitung magnetischer Action. Er machte seine Versuche mit einem 12' langen und 9" inneren Durchmesser fassenden Flintenlauf, und einem massiven Cylinder von weichem Eisen, der genau in jene Röhre geschoben werden konnte. Der Lauf mit, oder ohne den Cylinder konnte in eine Spirale von überspannenem Kupferdraht geschoben werden,



durch den ein elektrischer Strom um das weiche Eisen geleitet wurde. Seine Batterie war ein einfaches galvanisches Element von Kupfer und Zink; die Erregungsflüssigkeit verdünnte Salpetersäure. Er leitete den Strom zuerst durch die Kupferspirale allein. Die Nadel seines empfindlichen Galvanometers zeigte  $3^\circ$  Ablenkung. Nun schob er den Flintenlauf in die Spirale. Die Ablenkung betrug nun  $30^\circ$ . Hierauf schob er nach und nach den massiven Cylinder von weichem Eisen in den Lauf. Die Ablenkung nahm zu bis zur Hälfte des eingeschobenen Cylinders, von da aus aber ab. War der ganze massive Cylinder in den Lauf geschoben, so betrug die Ablenkung wieder etwa  $30^\circ$  <sup>1)</sup>. — Sturgeon's Versuchen zufolge entwickelte eine eiserne Röhre von etwa  $\frac{1}{10}$ " Wanddicke bei einem einfachen Strome aus einem einzigen galvanischen Elemente gerade so viel magnetische Kraft, als solide Cylinder von denselben Dimensionen. — Hier erinnert man sich des analogen Verhältnisses der Oberflächen der Conductoren bei der Reibungs-Elektricität zu der Menge der auf ihnen angehäuften freien Elektricität.

Von grosser Wichtigkeit wird diese Beobachtung vorzüglich für die Praxis werden, da, wo Elektromagnetismus als bewegende Kraft für Maschinen angewendet werden soll, indem dann mit weichem Eisen von sehr grosser Oberfläche, aber verhältnissmässig sehr geringer Masse, grosse magnetische Kraft zu erlangen seyn wird.

3. Die Wasserzersetzung mittelst thermo-elektrischer Ströme.

Der Apparat, dessen ich mich bediente, war der gewöhnliche, den man zur Zersetzung des Wassers durch die galvanische Säule gebraucht; die thermo-elektrische Batterie war die zuletzt beschriebene. In das Wasser, etwa  $\frac{1}{2}$  Maass, hatte ich einige wenige Tropfen Schwefelsäure gebracht. Ich verband die Platindrähte des Was-

1) Vergl. Dove in dessen *Repert.* I. 276.

serzersetzungs-Apparats mit den Polen der thermo-elektrischen Säule durch Quecksilbernäpfe, und die Gasentwicklung ging ungefähr so vor sich, wie man sie mit Clarke's magneto-elektrischen Rotations-Apparat erzeugen kann.

## VII. *Resultate stündlicher Thermometerbeobachtungen zu Padua, Leith, Salz-Ufen und Plymouth.*

Die Aufgabe, aus täglich in geringer Anzahl angestellten Thermometerbeobachtungen die Mitteltemperatur von Tagen, Monaten, Jahreszeiten oder ganzen Jahren herzuleiten, ist unstreitig eine der hauptsächlichsten in der Meteorologie, da, ohne die Lösung derselben, ein einzelner Beobachter in unseren Breiten nicht zur genauen Kenntniß des so wichtigen Elements der mittleren Lufttemperatur seines Orts gelangen kann, es sey denn, er wäre mit einer Thermometeruhr, wie die Jürgensensche (Ann. Bd. XXXIX S. 524), versehen, oder wollte sich bloß auf die mittlere Jahrestemperatur beschränken, und wendete zu dem Ende das in diesen Annal. Bd. IV S. 417 vorgeschlagene Mittel an. Daher haben denn auch die Meteorologen diese Aufgabe vielfach zum Gegenstand ihres Nachdenkens gemacht, und gesucht, sie entweder auf theoretischem oder empirischem Wege zu lösen.

Zu den theoretischen Lösungen lassen sich rechnen:

I. Tralles Formel:

$$t = x + \frac{1}{2}L(M - x),$$

worin  $t$  die Mitteltemperatur des ganzen Tags,  $M$  das beobachtete Maximum,  $x$  eine in der Nacht oder am Morgen beobachtete Temperatur, und  $L$  die Dauer des Standes der Sonne über dem Horizont, in Theilen der ganzen Tagesdauer von 24 Stunden (Abhandl. der Berl. Akad. f. 1818 u. 19. S. 413). Die Zeit der Beobachtung

von  $x$  ist nach der Jahreszeit verschieden, und scheint es auch nach der Polhöhe des Beobachtungsorts zu seyn (Kämtz Lehrb. der Meteorolog. Bd. I S. 100); Tralles nimmt dafür approximativ 1 Uhr in der Nacht.

II. Kämtz's Formel:

$$t = x - \frac{2}{3}L(x - m),$$

worin  $m$  das beobachtete Minimum, aus Tralles's Formel abgeleitet (Lehrb. Bd I S. 101).

III. Hällström's Formel:

$$t = \frac{1}{3}A + \frac{2}{3}B(M - m) + m,$$

worin  $t$ ,  $M$  und  $m$  dieselbe Bedeutung haben,  $A$  und  $B$  aber Coëfficienten sind, von denen der erstere nach dem Beobachtungsort und dem Monat verschieden,  $B$  dagegen constant ist, und, wenn die Tageslänge von 24 Stunden zur Einheit genommen wird,  $\frac{1}{17}$  beträgt (Ann. Bd. IV S. 386). Nach Kämtz (Lehrb. Bd. I S. 93) ist jedoch  $B$  nicht constant, sondern ebenfalls nach Ort und Zeit verschieden.

IV. Hällström's zweite Formel, aus ersterer abgeleitet:

$$t = \frac{1}{3}(M + m) - p(M - m),$$

worin  $p$  ein nach dem Ort, und vermuthlich auch nach der Jahreszeit veränderlicher Coëfficient (Ann. Bd. IV S. 391).

V. Gauss's Formel zur approximativen Integration:

$$AR + A_1R_1 + A_2R_2 + \dots A_nR_n,$$

über welche, so wie über Newton's und Cotes's Interpolationsformel, in diesen Ann. Bd. IV S. 410, oder Kämtz's Lehrb. Bd. I. S. 106 das Nähere. Am letzteren Orte wird auch noch einer zu gleichem Zweck von Kramp aufgestellten Formel erwähnt.

Zu den empirischen Methoden gehören alle die, welche das arithmetische Mittel von beobachteten Temperaturen, entweder direct oder nach Multiplication mit constanten Coëfficienten, als Mitteltemperatur betrachten. Sie zerfallen in zwei Klassen:

A) Anwendbar zur Bestimmung der Mitteltemperatur des Tages, und demnächst der Monate, Jahreszeiten und ganzen Jahre.

1) Das Mittel aus den am Thermometrographen abgelesenen Extremen des Tages.

2) Das Mittel der Ablesungen bei Sonnenaufgang und um 2 Uhr Nachmittags, auch wohl mit Hinzuziehung der Beobachtung zur Zeit des Sonnenuntergangs.

3) Bloß die Ablesung zur Zeit des Sonnenuntergangs.

4) Das Viertel der GröÙe  $= XIX + II + 2 \cdot IX$ , wo XIX, II und IX die Ablesungen respective um 7 Uhr Morgens, 2 und 9 Uhr Abends bezeichnen.

5) Das Vierundzwanzigstel der GröÙe  $= 7 \cdot XX + 7 \cdot III + 10 \cdot X$ , wo XX, III und X respective die Beobachtung um 8 Uhr Morgens, 3 und 10 Uhr Abends bedeuten.

6) Ueberhaupt:  $t = ar + a'r' + a''r'' + \dots$ , wo  $\tau, \tau', \tau'' \dots$  die zu gewissen (nicht nothwendig aequidistanten) Zeitpunkten beobachteten Temperaturen, und  $a, a', a'' \dots$  empirisch bestimmte Coëfficienten sind.

7) Die GröÙe:  $t = b\tau + b'\tau' + b''\tau'' + \dots$ , wo  $b$  die Zeit zwischen den Ablesungen  $\tau$  und  $\tau'$  bezeichnet,  $b'$  die zwischen  $\tau'$  und  $\tau''$  u. s. w., dabei die Zeit von 24 Stunden als Einheit genommen.

8) Das Mittel aus den Ablesungen zu irgend drei aequidistanten Zeitpunkten, besonders 8 Uhr Vormittags, 4 und 12 Uhr Nachmittags.

9) Das Mittel aus den Ablesungen zu vier aequidistanten Zeitpunkten, besonders 4 und 10 Uhr Vormittags, und 4 und 10 Uhr Nachmittags.

B) Anwendbar bloß für die Mitteltemperatur des ganzen Jahres.

10) Die nach einer der vorstehenden Methoden bestimmte Mitteltemperatur des Octobermonates (oder

einer entsprechenden Periode des Frühjahres, nicht aber des Aprils, der ein zu geringes Resultat liefert).

11) Das Mittel der täglich um 9 Uhr Morgens oder 8 Uhr Abends (oder anderen nahe dabei liegenden, nach der Breite des Orts etwas verschiedenen Zeiten) gemachten Ablesungen.

12) Das Mittel der täglich zu irgend zwei gleichnamigen (homonymen) Stunden, besonders 10 Uhr Morgens und 10 Uhr Abends (besser 10½ Uhr Morgens und 10½ Uhr Abends), oder 4 Uhr Morgens und 4 Uhr Abends beobachteten Temperaturen.

Die theoretischen Methoden sind bisher wenig angewandt worden, und zwar aus leicht ersichtlichem Grunde. No. I, II, III, IV erfordern nicht nur eine umständliche Rechnung, sondern verfehlen auch dadurch ihren Zweck, daß sich die darin enthaltenen unbekannten Größen  $x$ ,  $A$ ,  $B$ ,  $p$  strenge genommen nicht anders bestimmen lassen, als wenn die Mitteltemperatur  $t$  schon bekannt ist. Tralles und Hällström haben sie auf eine Weise bestimmt, die nicht frei von Willkühr ist <sup>1)</sup>, und wenn man einen solchen Weg nicht einschlagen will, bleibt nur übrig,  $t$  für einige Tage durch stündliche Beobachtungen zu ermitteln, um die dadurch mittelst der Formeln gefundenen Werthe jener Größen auf die übrigen Tage des Monats anzuwenden, wobei indess der Zweifel entstehen kann, ob sie einer solchen Anwendung fähig seyen. No. V ist in der Anwendung nicht verschieden von No. 6, nur daß die Beobachtungszeiten (die sich nach der Anzahl der täglich gemachten Beobachtungen richten) so gewählt werden, daß die Coëfficienten theoretisch bestimmbar sind.

Unter den empirischen Methoden ist die besonders

- 1) Mit Verlegung der nächtlichen Beobachtung auf 1 Uhr scheint auch, daß Schonwies die Tralles'sche Methode an den Chimsnetten<sup>2)</sup> sehen Beobachtungen geprüft habe (Pflanzengeographie S. 59).

von Hrn. v. Humboldt empfohlene No. 1 die bequemste, und daher jetzt die gebräuchlichste: auch hat sie sich bewährt, so weit sie geprüft ist. — No. 2 und 3 sind wegen der Veränderlichkeit der Beobachtungszeit schwierig auszuführen, und darum jetzt meistens verlassen. — No. 4, 5, 6 gestatten eine leichtere Ausführung und geben, wie Kämtz gezeigt hat (Lehrbuch, Bd. I S. 103), sehr brauchbare Resultate, wenigstens für unsere Breiten. — No. 7 ist von Kupffer an einem System von 8 täglichen Beobachtungen (8<sup>h</sup>, 10<sup>h</sup>, Mittag, 2<sup>h</sup>, 4<sup>h</sup>, 6<sup>h</sup>, 8<sup>h</sup>, 10<sup>h</sup>) geprüft; ein Jahr lang mit No. 4 verglichen, gab sie nur 0°,19 weniger als diese (*Observations meteorologiques et magnetiques faites dans l'Empire de Russie etc. par Mr. Kupffer, T. I. St. Petersbourg 1837*). — Ueber No. 8 sehe man Taf. X S. 646. — No. 9, von Kämtz vorgeschlagen, gibt sehr genaue Resultate (Lehrbuch, Bd. I S. 105), möchte aber für die meisten Beobachter etwas unbequem seyn.

Von den empirischen Methoden der zweiten Art geben No. 10 und 11 sehr brauchbare Approximationen, No. 12 aber, wie Brewster gezeigt hat, einen hohen Grad von Genauigkeit. Siehe Taf. IX S. 645.

Sämmtliche Methoden der beiden ersten Klassen sind trügerisch, obgleich in verschiedenem Grade, wenn man sie in unseren Klimaten, besonders zur Winterzeit, wo der Gang der Temperatur zuweilen ganz anomal ist, zur Bestimmung der Mitteltemperatur eines einzelnen Tages anwenden will. Diese Aufgabe kann mit voller Zuverlässigkeit (mit einer Sicherheit bis auf ein Zehntel-Centigrad) nicht anders als mit Hülfe einer Thermometeruhr, oder durch stündliche Beobachtungen gelöst werden. Glücklicherweise handelt es sich aber vor jetzt noch nicht, oder wenig, in der Meteorologie um diese Aufgabe, sondern ausschließlich oder hauptsächlich um die Mitteltemperatur eines grösseren Zeitabschnitts, z. B. eines Monats oder des Tags im monatlichen Durchschnitt.



Und zur Lösung dieser Aufgabe sind alle genannten Methoden, freilich eine mehr wie die andere, brauchbar.

Der wahre Prüfstein aller dieser Methoden sind stündliche Beobachtungen, die wenigstens ein Jahr lang fortgesetzt wurden. Solcher Beobachtungen besitzen wir bis jetzt vier Reihen.

1) Die von Chiminello in Padua ( $45^{\circ}24'$  N. B. und  $11^{\circ}52'$  O. L. Grw.) angestellte. Sie umfaßt das Jahr 1778 ganz, das Jahr 1779 vom 7. Mai bis 22. Aug., und die fünf Wochen vom 3. Dec. 1779 bis 6. Jan. 1780, immer von 4 Uhr Morgens bis 11 Uhr Abends gehend, und noch eine Nachtbeobachtung zu veränderlicher Stunde einschließend. Sie ist die größte, welche ein Einzelner zu Stande brachte (*Ephemerid. soc. meteorol. Palat. T. IV* p. 354).

2) Die, auf Brewster's Veranlassung, von den Officieren der Besatzung des Forts Leith ( $55^{\circ}56'$  N. B. und  $3^{\circ}13'$  W. L. Grw.) angestellte. Sie umfaßt die beiden Jahre 1824 und 1825 vollständig und ohne Unterbrechung stündlich (*Transact. of the Royal Society of Edinburgh* 1826).

3) Die von R. u. W. Brandes zu Salz-Ufen ( $52^{\circ}3'$  N. B. und  $8^{\circ}40'$  O. L. Grw.) ununterbrochen das ganze Jahr 1828 hindurch stündlich angestellte (Archiv der Pharmacie, Reihe II Bd. XI St. 1).

4) Die von der Britischen Naturforscher-Versammlung angeregte, von Hrn. Snow Harris geleitete und von Beamten der Hafenwache in Plymouth ( $50^{\circ}21'$  N. B. und  $4^{\circ}6'$  W. L. Grw.) ausgeführte Reihe. Sie ist die ausgedehnteste von allen, umfaßt volle fünf Jahre, 1833 bis 1837, ohne Unterbrechung stündlich; von ihren Resultaten sind indess bis jetzt nur die aus den beiden ersten Jahren bekannt gemacht (*Report of the fifth meeting of the British Association for the advancement of Science; held at Dublin in 1835*) ').

1) Außerdem sollen noch neuerdings dergleichen Beobachtungen von

Die Leither Beobachtungen sind dem physikalischen Publikum in Deutschland nur theilweise, und die Plymouther noch gar nicht mitgetheilt, auch müchten die von Salz-Üßen demselben nur wenig bekannt geworden seyn. Ich benutze daher eine Aufforderung des Hrn. Hofr. Brandes, die letzteren in die Annalen einzurücken, um zugleich auch die übrigen Beobachtungsreihen mitzutheilen, und so den Freunden der Meteorologie alle bisher bekannten Data zur Prüfung des von ihnen befolgten Beobachtungssystems in die Hand zu geben. Die Chiminello'schen Beobachtungen gebe ich so, wie sie in Kämtz Meteorologie enthalten sind. Von den übrigen Reihen theile ich nur die monatlichen und jährlichen Mittel aus den einzelnen Tagesstunden mit, jedoch von jedem Jahre für sich, damit man sehe, wie ein Jahr in dieser Hinsicht von dem andern abweicht. Die englischen Beobachter haben überdiß die Mitteltemperaturen der einzelnen Tage mitgetheilt, welche indess für die Meteorologie von geringerem Interesse sind. Die vollständige Sammlung aller einzelnen Beobachtungen hat, außer Chiminello, nur Hr. Hofr. Brandes veröffentlicht, daher man auch nur an diesen die vorhin aufgezählten Methoden für einzelne Tage prüfen kann \*). Der Raum gebot indess mich dieser ausführlichen Publication hier zu enthalten.

P.

Montreal, in Canada und zu Toulon angestellt seyn, und in Irland angestellt werden. Die Resultate der letzteren sind indess noch nicht bekannt gemacht.

- 1) Mit Ausnahme der Methoden, welche die täglichen Extreme be-  
nutzen, also No 1 und No. 1 — IV, da in beiden Beobachtungsreihen die Extreme nicht aufgetragen worden sind. Schon w (Pflanzengeogr. S. 59) hat zwar No 1 mit den Chiminello'schen Beobachtungen verglichen, allein dabei, wie es scheint, die zufällig zu den Beobachtungsgstunden eingetretenen höchsten und niedrigsten Temperaturen als wahre Extreme genommen. Kämtz (Lehrb. Bd 1 S. 98) hat dieselbe Methode nur an den Extremen der monatlichen Mittel der Stunden, bei den Leither Beobachtungen, geprüft. Ganz genaue Prüfung dieser Methode an wirklich beobachteten täglichen Extremen wäre immer noch nicht überflüssig, und könnte durch den Vergleich mit einer der Methoden No. 4 — 9 jetzt ohne Anstellung neuer Beobachtungen vollzogen werden.

Tafel I. Padua 1776 und 79. — Centesimalgrade.

Standt	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	Novbr.	Dechr.	Jahr
Maurin	+3.25	+4.45	+6.33	+11.97	+17.13	+19.31	+23.02	+20.00	+16.08	+13.91	+6.56	+2.97	+12.19
1	2.98	4.18	6.62	11.49	16.93	19.17	22.19	19.93	16.39	13.83	6.43	2.80	11.94
2	2.96	3.88	6.20	11.17	16.60	18.93	22.06	19.42	16.07	13.63	6.28	2.61	11.66
3	2.76	3.68	5.96	10.95	16.22	18.58	21.63	18.98	15.76	13.42	6.15	2.61	11.39
4	2.72	3.65	5.63	10.57	16.05	18.51	21.34	18.49	15.46	13.18	6.01	2.53	11.17
5	2.36	3.25	5.37	10.20	16.26	18.94	21.89	18.49	15.05	12.91	5.85	2.41	11.10
6	2.30	3.06	5.16	10.25	17.52	20.40	23.47	19.13	15.20	13.00	5.87	2.39	11.48
7	2.15	2.91	5.10	10.76	19.11	21.83	25.36	20.52	16.15	13.21	5.75	2.30	12.12
8	2.37	3.12	6.91	11.74	20.26	22.74	26.37	22.06	17.39	13.91	6.52	2.39	12.99
9	2.84	3.86	6.97	12.80	21.31	23.48	28.10	24.85	19.14	14.69	7.70	3.43	14.09
10	3.58	4.99	8.17	13.56	22.09	24.00	28.92	25.17	19.67	15.56	8.71	4.16	14.93
Mittag	4.43	5.67	8.82	14.09	22.85	24.72	29.52	25.76	20.33	16.16	9.62	5.13	15.59
1	4.94	6.44	9.88	14.62	23.39	25.06	30.01	26.50	21.06	16.68	10.25	5.71	16.17
2	5.44	6.70	9.66	15.13	23.57	25.19	30.47	26.97	21.56	17.10	10.75	6.21	16.56
3	5.60	6.91	9.91	15.43	23.63	25.21	30.73	27.45	21.93	17.43	10.92	6.41	16.79
4	5.52	6.95	10.10	15.70	23.63	25.17	30.48	27.53	21.97	17.47	10.50	5.91	16.75
5	5.19	6.56	9.87	15.65	23.31	24.68	29.39	26.83	21.35	17.31	9.64	5.27	16.27
6	4.90	6.11	9.47	15.50	22.57	23.93	29.11	25.90	20.58	16.23	8.61	4.70	15.61
7	4.45	5.85	9.01	14.92	21.47	23.18	27.82	24.46	19.42	15.60	7.92	4.25	14.86
8	4.11	5.67	8.63	14.43	20.29	22.08	26.64	23.19	18.60	15.00	7.58	4.03	14.19
9	3.60	5.42	8.27	13.62	20.11	21.45	24.90	22.17	18.50	14.98	7.32	3.79	13.08
10	3.65	5.07	7.86	13.17	18.58	20.21	24.14	21.53	18.09	14.58	7.12	3.52	13.12
11	3.49	4.78	7.43	12.69	18.17	19.78	23.97	21.09	17.65	14.27	6.83	3.26	12.78
12	3.45	4.50	7.13	12.28	17.78	19.61	23.39	20.57	17.33	14.05	6.66	3.10	12.48
Mittag	+3.71	+4.89	+7.71	+13.04	+19.37	+21.93	+20.06	+22.79	+18.39	+14.92	+7.73	+3.84	+13.75



Tafel III. Leith 1823. — Fahrenheit's Grade.

Stunde.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septbr.	October.	Novbr.	Decebr.	Jahr.
1 Vormitt.	39,073	39,457	39,601	43,350	47,018	52,575	56,935	57,335	55,358	49,981	39,125	39,194	46,646
2 -	39,968	39,500	39,162	42,742	46,750	52,200	56,798	56,936	55,058	49,782	38,800	39,311	46,166
3 -	39,823	39,598	39,516	42,050	46,460	52,133	56,087	56,661	54,792	49,685	38,975	39,103	46,198
4 -	39,535	39,309	39,355	41,500	46,161	51,975	55,403	56,629	54,333	49,478	38,818	39,032	45,969
5 -	39,814	39,089	39,275	41,317	46,210	52,067	56,121	56,565	53,992	49,516	39,050	39,016	45,908
6 -	39,774	39,018	39,101	41,512	46,941	52,958	57,637	56,758	54,117	49,481	39,183	39,231	46,307
7 -	39,831	39,321	39,718	43,030	47,476	54,150	58,855	57,542	55,192	49,797	39,117	39,194	46,927
8 -	39,927	39,518	39,524	41,725	48,597	55,250	60,032	58,887	56,112	50,151	39,383	39,168	47,738
9 -	40,121	39,589	40,661	46,842	49,653	56,883	61,298	59,960	58,050	51,137	39,825	39,718	48,760
10 -	40,508	40,473	41,605	48,892	50,702	58,117	62,693	61,170	59,342	52,481	40,825	40,089	49,784
11 -	41,161	41,670	42,701	49,993	51,363	59,617	63,500	61,895	60,667	53,258	41,833	40,615	50,691
12 -	41,748	42,241	44,101	51,142	51,863	59,508	64,484	63,008	61,500	53,766	42,258	41,016	51,461
1 Nachmitt.	42,000	42,848	44,661	51,617	52,186	60,050	64,670	63,629	62,100	54,008	42,667	41,169	51,848
2 -	42,032	42,821	45,226	51,817	52,540	60,500	65,468	63,826	62,575	51,137	42,708	41,532	52,150
3 -	42,009	42,928	45,259	52,275	52,686	60,533	65,198	63,830	62,258	53,855	42,808	41,250	52,174
4 -	41,371	42,482	45,481	51,858	53,315	60,517	65,807	64,210	62,075	53,193	42,561	41,105	52,049
5 -	41,153	41,562	45,210	51,175	53,645	60,450	66,250	64,387	62,042	52,557	41,517	40,652	51,774
6 -	40,920	41,089	44,630	50,767	53,493	60,591	66,742	64,387	60,333	51,613	41,192	40,555	51,208
7 -	40,475	40,705	43,556	49,255	52,484	59,867	65,975	61,927	58,875	51,065	40,667	39,794	50,449
8 -	40,404	40,250	42,711	47,300	51,137	57,608	62,807	60,589	58,008	50,177	40,442	39,758	49,348
9 -	40,258	39,625	41,718	46,117	49,637	56,242	60,742	59,476	57,283	50,262	40,350	39,532	48,198
10 -	40,395	39,286	41,083	45,425	49,097	55,167	59,192	58,109	56,575	50,129	39,867	39,111	47,913
11 -	40,293	39,170	40,523	44,733	48,508	54,225	58,581	57,779	56,042	49,742	39,492	39,153	47,407
12 -	40,339	39,143	40,212	44,133	47,927	53,675	57,605	57,231	55,517	49,670	39,117	38,855	47,007
Mittel	40,552	40,494	41,676	46,816	49,837	56,511	61,242	60,127	58,022	51,228	40,450	39,901	48,944

Tafel IV. Leith 1824 und 25. — Fahrenheit's Grade.

Stunde	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr	October	Novbr	Deabr.	Jahr.
1 Vormit.	40,131	39,065	38,952	42,990	46,788	52,557	56,197	55,327	54,829	48,077	39,962	38,942	16,134
2 -	40,381	39,731	38,731	42,171	46,390	52,250	55,999	55,099	53,579	47,976	39,600	39,020	15,933
3 -	40,311	39,774	38,493	41,525	45,880	52,116	55,593	54,780	53,096	47,877	39,737	39,062	45,489
4 -	40,067	39,594	38,127	40,794	45,430	51,987	55,152	54,364	52,716	47,839	39,664	38,906	45,419
5 -	39,942	39,354	37,962	40,558	45,550	51,933	55,650	54,632	52,596	47,558	39,750	38,905	45,394
6 -	39,932	39,229	37,927	40,721	46,322	52,829	56,718	55,020	52,878	47,142	39,941	39,062	45,653
7 -	40,030	39,295	38,214	42,625	47,188	53,625	57,877	56,021	53,646	47,548	40,059	38,997	46,283
8 -	40,113	39,299	38,912	43,912	48,119	54,775	59,116	57,193	54,921	48,175	40,092	39,131	47,029
9 -	40,381	39,759	39,895	46,371	49,726	56,011	60,499	58,380	56,525	48,868	40,562	39,359	18,035
10 -	40,829	40,606	40,537	48,096	50,901	57,158	61,626	59,535	57,470	49,992	41,462	39,694	42,012
11 -	41,350	41,510	42,915	49,096	51,830	58,158	62,300	60,297	58,583	50,879	42,466	40,522	49,950
12 -	42,024	42,230	43,317	50,021	52,584	58,654	63,842	61,254	59,300	51,533	43,079	41,008	50,777
1 Nachmitt.	42,415	42,774	43,680	50,158	53,193	59,025	63,935	61,714	60,300	51,954	43,433	41,181	51,149
2 -	42,591	42,781	44,013	50,808	53,620	59,700	64,913	61,913	60,637	52,018	43,704	41,216	51,470
3 -	42,594	42,799	44,079	51,187	53,693	60,216	64,649	61,915	60,539	51,727	43,751	40,790	51,532
4 -	42,185	42,256	44,042	50,579	54,067	59,808	64,703	62,155	59,937	51,132	42,825	40,502	51,239
5 -	41,686	41,481	43,555	50,337	53,872	59,573	64,825	62,013	59,921	50,478	42,158	40,186	50,872
6 -	41,450	40,994	42,850	49,913	53,346	59,115	64,671	61,743	58,686	49,756	41,786	39,937	50,294
7 -	41,082	40,617	41,578	48,537	52,112	58,383	63,837	59,963	57,337	49,132	41,593	39,491	49,541
8 -	40,877	40,225	41,155	46,900	51,019	56,654	61,553	58,694	56,539	48,603	41,071	39,379	48,624
9 -	40,722	39,913	40,439	45,708	49,518	55,371	59,821	57,685	55,791	48,451	40,825	39,311	17,829
10 -	40,827	39,638	39,941	45,012	48,998	54,493	58,546	56,704	55,137	48,064	40,333	39,250	17,270
11 -	40,702	39,835	39,111	43,916	48,154	53,712	57,710	56,039	54,721	47,771	39,941	39,126	46,803
12 -	40,619	39,521	39,271	43,116	47,513	53,147	56,917	55,517	54,109	47,635	39,708	39,072	16,808
Mittel	40,972	40,465	40,714	46,290	49,951	55,887	60,259	58,657	56,374	49,231	41,152	39,672	19,206



Tafel V. Salz-Uflen 1828. — Reaumur's Grade.

Strinde	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	Novbr.	Dechr.	Jahr.
1	+0° 02'	+0° 16'	+2° 16'	+4° 09'	+8° 01'	+10° 58'	+12° 57'	+10° 35'	+8° 96'	+6° 38'	+3° 50'	+1° 76'	+6° 03'
2	-0° 02'	+0° 07'	+2° 65'	+4° 49'	+7° 66'	+10° 20'	+12° 71'	+10° 76'	+8° 71'	+6° 11'	+3° 17'	+3° 53'	+5° 84'
3	-0° 14'	+0° 07'	+2° 54'	+4° 24'	+7° 03'	+9° 89'	+12° 47'	+10° 55'	+8° 39'	+5° 76'	+2° 88'	+3° 31'	+5° 61'
4	-0° 22'	+0° 12'	+2° 52'	+4° 25'	+7° 09'	+9° 10'	+12° 33'	+10° 35'	+8° 06'	+5° 42'	+2° 56'	+3° 19'	+5° 48'
5	-0° 05'	+0° 20'	+2° 58'	+4° 64'	+7° 53'	+10° 60'	+12° 86'	+10° 75'	+8° 31'	+5° 53'	+2° 72'	+3° 09'	+5° 73'
6	-0° 03'	+0° 22'	+2° 75'	+4° 19'	+7° 21'	+10° 36'	+12° 49'	+11° 27'	+8° 75'	+5° 80'	+2° 21'	+3° 20'	+5° 11'
7	-0° 07'	+0° 41'	+3° 13'	+5° 81'	+9° 21'	+12° 04'	+14° 29'	+11° 85'	+9° 74'	+6° 26'	+3° 47'	+3° 32'	+6° 68'
8	+0° 04'	+0° 86'	+3° 59'	+6° 80'	+10° 15'	+12° 73'	+14° 85'	+12° 58'	+10° 85'	+6° 71'	+2° 83'	+3° 69'	+7° 22'
9	+0° 40'	+1° 49'	+4° 12'	+7° 51'	+11° 13'	+13° 72'	+15° 51'	+13° 13'	+11° 71'	+7° 46'	+4° 31'	+3° 91'	+7° 67'
10	+0° 82'	+1° 89'	+4° 58'	+8° 14'	+11° 93'	+14° 40'	+16° 07'	+13° 58'	+12° 55'	+8° 21'	+4° 82'	+3° 21'	+8° 43'
11	+1° 19'	+2° 35'	+4° 91'	+8° 90'	+12° 54'	+14° 96'	+16° 55'	+14° 11'	+13° 11'	+9° 76'	+5° 30'	+4° 43'	+8° 93'
12	+1° 35'	+2° 63'	+5° 23'	+9° 32'	+12° 96'	+15° 36'	+16° 79'	+11° 56'	+13° 60'	+9° 31'	+5° 79'	+4° 56'	+9° 29'
1	+1° 40'	+2° 87'	+5° 39'	+9° 58'	+13° 22'	+15° 85'	+17° 01'	+14° 84'	+13° 84'	+9° 55'	+6° 05'	+4° 58'	+9° 51'
2	+1° 38'	+3° 00'	+5° 19'	+9° 41'	+13° 14'	+16° 00'	+17° 08'	+15° 00'	+14° 02'	+9° 67'	+5° 92'	+4° 51'	+9° 54'
3	+1° 26'	+3° 08'	+5° 16'	+9° 37'	+13° 21'	+15° 92'	+17° 22'	+11° 00'	+14° 02'	+9° 67'	+5° 06'	+4° 64'	+9° 57'
4	+0° 54'	+2° 63'	+5° 23'	+9° 06'	+13° 15'	+15° 64'	+16° 08'	+14° 89'	+13° 99'	+9° 41'	+5° 60'	+4° 41'	+9° 33'
5	+0° 54'	+2° 19'	+4° 85'	+8° 76'	+13° 06'	+15° 23'	+16° 87'	+14° 85'	+13° 30'	+9° 86'	+5° 35'	+4° 28'	+9° 00'
6	+0° 61'	+1° 73'	+4° 35'	+8° 19'	+12° 56'	+14° 64'	+16° 12'	+13° 93'	+12° 71'	+9° 29'	+5° 07'	+4° 22'	+8° 53'
7	+0° 51'	+1° 58'	+3° 94'	+7° 60'	+12° 01'	+14° 64'	+15° 54'	+13° 21'	+11° 61'	+7° 91'	+4° 83'	+4° 29'	+8° 07'
8	+0° 41'	+1° 24'	+3° 69'	+6° 96'	+11° 19'	+13° 15'	+14° 63'	+12° 55'	+10° 95'	+7° 66'	+4° 75'	+4° 33'	+7° 62'
9	+0° 33'	+1° 06'	+3° 19'	+6° 34'	+10° 44'	+12° 35'	+14° 16'	+12° 03'	+10° 43'	+7° 55'	+4° 60'	+4° 22'	+7° 24'
10	+0° 30'	+1° 06'	+3° 24'	+6° 34'	+10° 44'	+12° 35'	+14° 16'	+12° 03'	+10° 43'	+7° 55'	+4° 60'	+4° 22'	+7° 24'
11	+0° 21'	+0° 33'	+2° 01'	+5° 62'	+9° 38'	+11° 24'	+13° 32'	+11° 35'	+9° 32'	+6° 78'	+4° 00'	+3° 90'	+6° 36'
12	+0° 19'	+0° 30'	+2° 00'	+5° 40'	+9° 80'	+11° 55'	+12° 80'	+11° 17'	+8° 99'	+6° 40'	+3° 75'	+3° 78'	+6° 31'
13	+0° 15'	+1° 40'	+3° 86'	+6° 92'	+10° 57'	+13° 02'	+14° 85'	+12° 09'	+11° 07'	+7° 52'	+4° 12'	+3° 08'	+7° 55'

Tafel VI. Plymouth 1833 — Fahrenheit's Grade.

Grade	Janur	Febr	Marz	April	Mai	Juni	Juli	August	Septbr	Octobr	Novbr	Decbr	Jahr
1	10 10	10 10	18 30	41 70	52 00	53 86	56 20	54 00	52 80	51 20	49 30	48 10	48 90
2	40 80	45 70	128 30	44 30	51 00	53 46	55 80	53 23	52 30	51 00	49 70	48 70	48 52
3	10 20	45 00	128 10	44 30	51 30	53 30	55 40	53 10	52 10	50 80	49 10	48 70	48 44
4	10 20	43 20	127 50	43 80	51 30	53 10	55 00	52 70	52 16	50 26	48 06	48 00	48 14
5	10 00	43 00	127 30	43 30	51 30	54 00	55 30	52 70	52 00	50 00	48 06	48 00	48 14
6	10 00	43 10	127 00	43 30	51 30	53 86	57 10	54 00	53 26	50 10	48 70	48 70	48 85
7	10 00	43 20	126 50	43 26	51 30	57 30	57 30	56 70	54 20	51 10	49 70	49 10	49 18
8	40 50	45 80	126 40	43 10	51 30	59 26	62 20	60 20	57 06	52 86	48 60	49 50	52 14
9	41 20	46 10	126 30	42 50	51 30	60 00	63 70	61 20	58 50	55 56	49 50	49 50	53 67
10	42 20	47 00	126 20	42 50	51 80	60 70	63 80	61 20	58 50	55 56	49 50	50 70	53 14
11	43 20	48 00	126 10	42 50	52 30	61 06	67 20	66 70	61 90	58 80	52 30	51 20	56 15
12	44 30	49 00	126 00	42 50	53 20	61 10	67 60	66 60	63 06	60 56	53 60	51 70	56 98
1	44 40	49 50	125 50	42 50	54 10	61 70	67 60	67 10	63 30	60 90	53 60	51 80	57 15
2	45 00	49 50	125 40	42 50	55 20	61 70	67 00	67 10	63 30	60 10	53 70	51 30	56 86
3	45 30	49 50	125 30	42 50	56 00	60 90	67 20	66 10	62 16	58 20	52 36	50 70	56 22
4	45 30	49 50	125 20	42 50	56 18	60 76	66 30	65 50	61 00	58 00	51 10	50 26	55 47
5	45 30	49 50	125 10	42 50	56 10	59 70	65 30	64 10	59 16	56 16	50 20	49 26	51 32
6	45 30	49 50	125 00	42 50	56 06	58 80	63 60	62 70	57 40	54 90	49 80	49 10	53 20
7	45 30	49 50	124 50	42 50	56 17	57 70	61 90	60 70	56 20	53 00	49 70	49 06	52 16
8	45 30	49 50	124 40	42 50	56 57	56 90	60 30	59 30	55 46	53 50	49 30	49 06	51 38
9	45 30	49 50	124 30	42 50	56 00	55 96	58 90	57 90	54 60	52 90	48 60	49 00	50 70
10	45 30	49 50	124 20	42 50	55 40	55 10	57 90	56 60	53 66	52 10	48 20	48 86	50 00
11	45 30	49 50	124 10	42 50	55 49	55 10	57 30	55 70	53 16	51 56	47 80	48 86	49 65
12	45 30	49 50	124 00	42 50	55 46	54 16	56 80	54 80	52 00	51 76	47 60	48 86	49 17
Monat	41 60	46 58	118 00	42 31	55 31	57 20	61 31	59 61	56 85	54 30	49 10	49 50	54 13

Tafel VII. Plymouth 1834. — Fahrenheit's Grade.

Stunde.	Januar.	Febr.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septbr.	October.	Novbr.	Decbr.	Jahr.
1 Vormitt.	45,60	43,60	46,00	44,70	51,90	54,30	58,90	58,60	57,90	61,86	44,86	44,30	50,64
2 -	48,36	44,90	45,56	44,30	51,20	54,10	58,46	58,10	57,50	51,36	41,80	44,30	50,26
3 -	48,20	44,10	45,40	44,90	50,80	53,66	58,26	57,70	57,20	51,30	41,90	44,20	49,98
4 -	48,16	44,10	45,00	44,70	50,60	53,70	58,30	57,40	57,00	51,60	44,90	44,10	49,93
5 -	47,90	44,10	44,90	44,50	50,60	53,90	58,86	57,20	57,20	51,30	44,80	44,10	49,89
6 -	47,50	43,90	44,96	44,40	51,70	55,80	59,90	58,50	57,40	52,90	44,76	44,10	50,45
7 -	47,70	43,90	45,60	46,50	55,10	58,30	62,86	60,40	58,60	53,00	45,00	44,30	51,73
8 -	47,90	44,30	47,30	49,20	57,50	60,30	64,60	63,10	60,20	54,40	45,30	44,60	53,29
9 -	48,76	45,80	49,10	52,30	59,70	61,76	65,96	65,10	62,70	56,50	46,40	45,20	54,99
10 -	48,50	47,90	50,70	54,40	61,10	62,10	66,30	66,70	61,70	58,50	48,40	46,40	56,79
11 -	50,46	49,70	52,00	57,70	62,60	63,10	67,10	66,80	66,00	59,76	49,00	47,60	57,53
12 -	50,80	50,50	52,90	56,90	63,70	63,10	67,90	57,50	67,10	60,10	50,60	49,30	58,39
1 Nachmitt.	50,90	51,20	53,40	57,70	64,10	63,90	68,46	67,90	67,50	60,10	51,30	49,60	58,85
2 -	50,16	50,90	52,66	57,40	64,10	63,86	68,10	67,90	66,90	59,90	50,70	49,80	58,11
3 -	50,00	50,30	52,10	56,60	63,30	63,10	68,00	67,70	66,00	59,70	50,00	48,30	57,86
4 -	49,86	50,30	51,20	54,70	62,10	62,46	67,36	66,70	64,40	57,30	48,60	47,20	56,79
5 -	49,10	47,50	49,10	53,40	61,90	62,10	66,16	65,60	62,90	56,00	47,40	46,20	55,72
6 -	49,20	46,80	47,76	49,10	57,70	59,90	65,26	64,40	61,50	51,96	46,80	45,70	54,69
7 -	48,60	46,40	47,30	48,70	56,50	57,70	63,86	62,80	60,40	53,90	46,80	45,40	53,61
8 -	48,50	46,10	46,76	48,00	55,30	57,70	62,10	61,10	59,10	53,56	46,40	45,20	52,72
9 -	48,70	45,90	46,50	46,40	54,00	56,10	60,70	60,20	59,00	53,20	46,20	45,10	52,21
10 -	48,76	46,10	46,50	45,70	53,00	56,10	60,10	59,60	58,50	52,80	45,90	45,20	51,61
11 -	48,70	46,10	46,20	45,70	53,20	55,30	59,16	59,10	58,30	52,30	45,46	44,90	51,27
12 -	48,70	46,00	46,00	45,20	52,60	54,90	58,90	58,80	58,20	52,20	45,40	44,70	50,95
Mittel	48,99	46,30	48,26	49,70	57,10	58,80	63,15	62,50	61,06	54,97	46,98	45,80	53,67

Tafel VIII. Plymouth 1833 und 34. — Fahrenheit's Grade.

Stunde.	Januar.	Febr.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	October.	Novbr.	Decbr.	Jahr.
1 Vormitt.	44,84	45,85	42,25	41,10	51,90	54,03	57,50	58,50	55,50	51,53	48,18	46,58	49,72
2	44,15	45,30	41,88	41,10	51,40	53,78	57,13	55,66	55,00	51,28	45,95	46,50	48,39
3	44,20	41,75	41,75	41,05	51,15	53,58	56,83	55,10	54,85	51,05	46,00	46,15	49,16
4	44,18	41,80	41,15	43,55	51,05	53,55	56,65	55,05	54,58	50,93	45,93	46,50	49,03
5	43,95	41,50	41,20	43,70	51,15	53,98	57,05	54,95	54,60	50,65	45,88	46,50	49,00
6	43,60	41,50	41,28	44,25	52,55	55,85	58,65	56,25	55,13	51,30	45,73	46,58	49,65
7	43,75	44,55	42,05	46,48	55,70	58,00	61,38	58,55	56,55	52,05	46,20	46,70	50,98
8	44,20	41,90	43,75	49,40	58,15	59,78	63,10	61,80	58,63	54,68	46,90	47,05	52,63
9	44,98	46,20	45,90	51,60	60,35	61,03	64,83	61,40	60,80	56,23	48,53	47,15	54,33
10	45,85	47,70	47,85	53,10	61,75	61,10	66,05	65,95	62,85	58,45	49,70	48,55	55,76
11	46,83	49,15	48,75	54,33	63,00	62,08	67,15	66,75	63,95	59,78	50,95	49,40	56,84
12	47,55	50,15	49,80	55,30	64,05	62,10	67,75	67,05	65,08	60,33	52,10	50,50	57,67
1 Nachmitt.	47,65	50,15	50,30	55,60	64,55	62,75	68,03	67,30	65,10	60,50	52,15	50,70	58,00
2	47,18	49,90	49,68	55,55	64,25	62,63	67,90	67,50	65,05	60,00	52,20	50,05	57,68
3	46,95	49,50	49,65	54,80	63,75	62,15	67,60	67,05	64,08	58,95	51,18	49,50	57,04
4	46,55	48,55	48,30	53,45	62,94	61,61	66,93	66,10	62,70	57,65	50,00	48,78	56,12
5	45,98	47,40	47,11	52,13	61,85	60,90	65,73	65,00	61,13	56,23	48,80	47,73	55,02
6	45,55	47,05	46,20	50,50	59,95	59,85	64,41	63,50	59,65	54,93	48,51	47,40	53,94
7	45,45	46,65	44,98	48,65	58,08	58,65	62,88	61,75	58,25	53,95	48,20	47,23	52,90
8	44,90	46,45	44,40	47,75	56,65	57,30	61,20	60,20	57,28	53,53	47,85	47,13	52,05
9	44,90	46,35	43,85	47,10	55,15	56,38	59,80	59,05	56,80	53,05	47,40	47,05	51,45
10	44,85	46,20	43,45	46,00	54,10	55,75	59,00	58,10	56,06	52,60	47,05	47,05	50,85
11	44,78	46,15	42,95	45,55	53,54	55,30	58,38	57,55	55,73	52,08	46,63	46,88	50,54
12	44,60	46,15	42,55	45,00	52,95	54,73	57,70	56,80	55,55	51,98	46,50	46,75	50,11
Mittel	45,30	46,12	45,04	45,96	57,53	56,16	62,50	61,16	58,97	54,69	48,12	47,72	52,90

Tafel IX. Mittlere Temperatur des Jahres, abgeleitet

aus:	sämmtlichen Beobachtungen	Leith.			Salz - Uffen.	Plymouth.		
		1824	1825	21 u 23		1833	1834	33 u 34.
October Mittel		47,59	48,94	48,27	7,55	52,12	53,66	52,90
Mittel vom Maximum und vom Minimum im ganzen Jahre		47,24	51,23	49,23	7,52	51,50	54,70	54,60
Mittel von 10 Sommermitteltagen (15 - 25 Juni) und von 10 Wintermitteltagen (15 - 25 December)		46,84	49,68	48,36		54,00	56,00	55,00
Mittel gleichzeitiger Stunden:						53,80	50,92	52,36
1 Uhr Vormitt. und 1 Uhr Nachmitt.		48,04	49,24	48,64	7,78	52,97	54,74	53,96
2 -		48,10	49,31	48,70	7,70	52,69	54,55	53,53
3 -		48,04	49,19	48,61	7,57	52,28	53,92	53,10
4 -		47,68	49,01	48,34	7,40	51,80	53,35	52,57
5 -		47,10	48,87	48,13	7,37	51,23	52,80	52,01
6 -		47,19	48,76	47,97	7,32	51,03	52,57	51,79
7 -		47,14	48,69	47,91	7,35	51,17	52,71	51,94
8 -		47,11	48,51	47,82	7,32	51,76	53,00	52,34
9 -		47,29	48,59	47,94	7,55	52,18	53,60	52,89
10 -		47,14	48,55	48,11	7,68	52,57	54,02	53,80
11 -		47,70	49,05	48,36	7,75	52,90	54,40	53,69
12 -		47,94	49,23	48,58	7,80	53,06	54,67	53,69

Tageszeit der mittleren Jahrestemperatur.

Leith	55° 56' N. B.	3° 13' L. Gr.	W. 25 Fufs Meereshöhe.	9 h 13' Vormitt.	8 h 27' Nachmitt.
Salz - Uffen	52 3 -	8 40 -	O.		
Plymouth	50 21 -	4 6 -	W. 60	7 0 -	
Padua	45 24 -	11 52 -	O.	8 41 -	7 52 -

Tafel X. Vergleich von  $M_3$  (Mittel von 8<sup>h</sup> Vormitt., 4 u. 12<sup>h</sup> Nachmitt.) mit  $M_{3,4}$  (Mittel aus allen 21 Stunden).

	Jänner	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	Dezember	Jahr
Padua 1776 — Centigrade													
$M_3$	+ 3,60	+ 4,63	+ 7,57	+ 13,12	+ 20,34	+ 22,34	+ 26,43	+ 22,96	+ 18,47	+ 13,06	+ 7,37	+ 3,61	+ 12,82
$M_{3,4}$	+ 3,71	+ 4,59	+ 7,73	+ 13,04	+ 19,97	+ 21,93	+ 26,06	+ 22,79	+ 18,48	+ 11,92	+ 7,73	+ 3,81	+ 13,75
Differenz	- 0,11	- 0,24	+ 0,14	+ 0,09	+ 0,37	+ 0,31	+ 0,27	+ 0,17	+ 0,09	+ 0,14	- 0,16	- 0,23	+ 0,97
Leith 1824 — Centigrade													
$M_3$	+ 5,23	+ 4,62	+ 4,19	+ 7,36	+ 10,92	+ 12,94	+ 15,15	+ 13,59	+ 12,57	+ 8,27	+ 5,28	+ 4,97	+ 8,62
$M_{3,4}$	+ 5,22	+ 4,76	+ 4,40	+ 7,61	+ 9,93	+ 12,92	+ 15,15	+ 13,55	+ 12,62	+ 8,46	+ 5,15	+ 4,13	+ 8,68
Differenz	+ 0,01	- 0,08	- 0,11	- 0,25	+ 0,99	+ 0,06	0,00	+ 0,04	- 0,05	- 0,19	- 0,17	- 0,06	- 0,04
Leith 1825 — Centigrade													
$M_3$	+ 4,75	+ 4,65	+ 5,41	+ 8,28	+ 9,97	+ 13,69	+ 16,19	+ 15,62	+ 14,45	+ 10,61	+ 4,58	+ 4,31	+ 9,40
$M_{3,4}$	+ 4,75	+ 4,72	+ 5,38	+ 8,23	+ 9,91	+ 13,62	+ 16,25	+ 15,63	+ 14,46	+ 10,68	+ 4,69	+ 4,39	+ 9,41
Differenz	0,00	- 0,06	+ 0,03	+ 0,05	+ 0,06	- 0,02	- 0,06	- 0,01	- 0,01	- 0,07	- 0,11	- 0,08	- 0,01
Salz. Ufen 1829 — Centigrade													
$M_3$	+ 0,19	+ 1,58	+ 4,93	+ 5,86	+ 13,40	+ 16,38	+ 18,61	+ 16,10	+ 11,05	+ 9,39	+ 5,51	+ 1,91	+ 9,83
$M_{3,4}$	+ 0,69	+ 1,63	+ 4,83	+ 8,65	+ 13,21	+ 16,27	+ 18,56	+ 15,86	+ 13,81	+ 9,40	+ 5,53	+ 1,98	+ 9,14
Differenz	- 0,41	- 0,05	+ 0,10	- 0,21	+ 0,19	+ 0,11	+ 0,08	+ 0,24	+ 0,21	- 0,01	+ 0,01	- 0,07	+ 0,69
Plymouth 1833 — Centigrade													
$M_3$	+ 5,24	+ 8,07	+ 5,32	+ 9,28	+ 11,79	+ 14,57	+ 16,32	+ 15,65	+ 13,88	+ 12,26	+ 9,56	+ 9,76	+ 11,25
$M_{3,4}$	+ 5,34	+ 8,21	+ 5,44	+ 9,08	+ 11,41	+ 14,06	+ 16,28	+ 15,45	+ 13,80	+ 12,50	+ 9,67	+ 9,72	+ 11,18
Differenz	- 0,09	- 0,14	- 0,12	+ 0,20	+ 0,38	+ 0,57	+ 0,24	+ 0,20	+ 0,08	- 0,14	- 0,11	+ 0,04	+ 0,07
Plymouth 1834 — Centigrade													
$M_3$	+ 9,33	+ 8,07	+ 8,98	+ 9,93	+ 14,22	+ 15,10	+ 17,87	+ 17,15	+ 16,07	+ 12,57	+ 8,02	+ 7,56	+ 12,04
$M_{3,4}$	+ 9,44	+ 8,22	+ 9,01	+ 9,81	+ 13,91	+ 14,89	+ 17,30	+ 16,94	+ 16,15	+ 12,70	+ 8,32	+ 7,67	+ 12,04
Differenz	- 0,11	- 0,15	- 0,06	+ 0,10	+ 0,28	+ 0,21	+ 0,27	+ 0,21	- 0,08	- 0,13	- 0,30	- 0,17	0,00



VIII. *Ueber den Gang der Temperatur zu Kasan während des Jahres 1833, nebst einem Zusatz, enthaltend: den mittleren Stand des Barometers und Thermometers in den Jahren 1834 und 35, und den des Psychrometers i. J. 1835; von Ernst Kuorr.*

Prof. ordin. der Physik bei der Universität Kasan.

(Nach dem Russischen, aus den: Gelehrten Schriften d. Univers. Kasan.)

Seit dem Jahre 1828 sind von Seiten der Universität Kasan verschiedene Zöglinge derselben beauftragt gewesen meteorologische Beobachtungen anzustellen, welches auch anfänglich unter der Aufsicht des Hrn. Akademikers Kupffer, früheren Prof. der Physik und Chemie bei der hiesigen Universität, später unter der Leitung des Hrn. Prof. Lobatschewsky, jetzigen Rectors der Universität, und endlich, nach meinem Austritt, in der letzten Hälfte des Jahres 1833, unter meiner Aufsicht regelmäßig geschah. Diese Beobachtungen, welche noch fortgesetzt werden, sind früher in dem von der Universität unter dem Titel: *Казанскія Бѣимунъ* herausgegebenem Journale monatlich zur öffentlichen Kenntniß gebracht worden; man hat jedoch auf die Correctheit des Abdrucks nicht immer die wünschenswerthe Sorgfalt verwendet, wie sich aus der Vergleichung desselben mit einigen handschriftlichen Tabellen ergibt, deren Besitz ich der Güte des Hrn. Lobatschewsky verdanke. Für das Jahr 1833 unterblieb die monatliche Bekanntmachung der Beobachtungen ganz, indem für dieses Jahr das genannte Journal nicht erschienen ist.

Kasan, welches nach den Beobachtungen des Hrn. Prof. Simonoff (*С. Симонъ Симонъ, д. т. Гибекъ*)

Schriften der Universität Kasan. Kasan 1834. 1. Heft S. 50) unter  $55^{\circ} 57' 16''$  2. nördl. Breite und  $46^{\circ} 46' 55''$  3. östl. Länge von Paris liegt, ist bis jetzt der östlichste Ort Europa's, wo mit guten Instrumenten während 6 auf einander folgender Jahre ununterbrochen meteorologische Beobachtungen angestellt worden sind. Kasan ist demnach bis jetzt die erste meteorologische Station westlich vom Ural, und die Resultate der hier angestellten Beobachtungen dürften deshalb schon besondere Beachtung verdienen, wenn sie auch nicht an Interesse gewonnen durch das hier herrschende excessive Klima, welches keinem andern Orte des westlichen Europa's in dem Maasse zukommt, und welches nach Alex. v. Humboldt's Worten (Fragmente einer Geologie und Klimatologie Asiens. Berlin 1832. S. 158) die Bewohner zwingt

*«A sofferir tormenti caldi e geli.»*

Schwerlich dürfte auch wohl Jemand, der aus einem etwas milderen Himmelsstriche hierher versetzt wird, nicht gezwungen werden, dem Klima einigen Tribut zu zahlen. Die älteren Bewohner Kasans hingegen scheinen eben nicht viel von den Qualen der Hitze und Kälte zu leiden, obgleich die Sommerhitze zuweilen bis auf  $34^{\circ}$  Centigrade steigt, und während eines strengen Winters das Quecksilber zum Frieren kommt, was hier keineswegs zu den Seltenheiten gehört, obgleich es nicht während eines jeden Winters statt findet. Es ist jedoch nicht allein dieser bedeutende Abstand der höchsten Sommerwärme von der größten Kälte des Winters, welcher das Klima von Kasan, so wie jedes excessive Klima überhaupt, charakterisirt, sondern auch der schnelle Uebergang von der Kälte zur Wärme, welcher sich zwischen den Monaten März und April zeigt, so wie die bedeutende Differenz zwischen dem Maximo und Minimo der Temperatur eines und desselben Tages, die zuweilen, wenn auch selten, noch über  $20^{\circ}$  Centigr. beträgt, obgleich, wie es mir scheint, die Veränderungen der Temperatur und

der Witterung überhaupt, in Kasan nicht so schnell erfolgen als in Rußlands nördlicher Hauptstadt. Die Schwankungen der Temperatur innerhalb eines Monats steigen in Kasan bis auf 36 Centigr., und 20 Centigr. ist die geringste monatliche Schwankung der Temperatur, welche während der Jahre 1832 und 1833 beobachtet worden ist. Nach einem flüchtigen Ueberblick der vor 1833 angestellten Beobachtungen scheint es mir, daß auch zwischen den mittleren Temperaturen der einzelnen Monate für verschiedene Jahre sich Differenzen zeigen, die relativ genommen nicht so unbedeutend sind, daß eine einjährige Reihe von Temperatur-Beobachtungen so geeignet erscheinen könnte, das Klima von Kasan kennen zu lehren, als dies für einen anderen Ort der Fall seyn würde, der sich eines constanteren und weniger excessiven Klima's erfreute. Bei dem regen Interesse, welches sich jetzt allgemein für die Klimatologie und gesammte Meteorologie überhaupt zeigt, glaube ich jedoch, daß es vielleicht nicht ganz unwillkommen seyn dürfte, vorläufig die Resultate bekannt gemacht zu haben, welche bis jetzt aus den, während des Jahres 1833 zu Kasan angestellten Temperatur-Beobachtungen gezogen wurden, so wie selbige aus den Original-Raporten folgen, welche Hrn. Lobatschewsky und mir täglich zugekommen sind; indem ich mir vorbehalte, auch die Beobachtungen früherer Jahre nach den oben erwähnten handschriftlichen Tabellen auf eine ähnliche Weise zu benutzen.

Außer dem täglichen Maximo und Minimo sind während des Jahres 1833 auf dem meteorologischen Observatorio zu Kasan auch noch die Temperaturen von 9<sup>h</sup> Morgens, 12<sup>h</sup> Mittags, 3<sup>h</sup> Nachmittags und 9<sup>h</sup> Abends beobachtet worden; werden nun die Monate durchgängig nach dem Gregorian'schen, und nicht nach dem Julian'schen Kalender gerechnet, und die hunderttheilige Thermometerscala zu Grunde gelegt, so ergeben sich für die einzelnen Monate des Jahres, und jede der

oben angegebenen Tagesstunden folgende mittlere Thermometerstände in Centigraden:

Monat.	9 <sup>h</sup> Morgens	12 <sup>h</sup> Mittags	3 <sup>h</sup> Nachmitt.	9 <sup>h</sup> Abends
Januar	— 17°,5	— 16°,0	— 15°,9	— 17°,7
Februar	— 12°,0	— 8°,5	— 8°,7	— 11°,2
März	— 8°,4	— 5°,2	— 4°,2	— 8°,2
April	+ 4°,2	+ 7°,7	+ 7°,9	+ 3°,1
Mai	+ 7°,0	+ 10°,4	+ 11°,4	+ 6°,4
Juni	+ 17°,5	+ 21°,9	+ 22°,2	+ 16°,7
Juli	+ 21°,1	+ 25°,5	+ 52°,9	+ 19°,7
August	+ 15°,9	+ 18°,6	+ 18°,6	+ 15°,1
September	+ 10°,0	+ 15°,4	+ 16°,4	+ 9°,5
October	+ 1°,5	+ 4°,6	+ 4°,7	+ 1°,2
November	— 0°,1	+ 1°,1	+ 1°,1	+ 0°,6
December	— 12°,7	— 11°,9	— 11°,5	— 12°,4
Mittel	+ 2°,2	+ 5°,3	+ 5°,7	+ 1°,9

Die vorstehende Tabelle zeigt, daß für die Monate April, Mai, Juni, Juli, August, September und October, welche für Kasan als die Frühlings-, Sommer- und Herbst-Monate anzusehen sind, die mittlere Temperatur von 9<sup>h</sup> Abends durchgängig etwas geringer, als die von 9 Morgens war; die größten Differenzen zwischen diesen beiden Temperaturen zeigen die Monate April und Juli, wo dieselben respective 1°,1 und 1°,4 betragen. — Ebenso wie die Temperaturen von 9<sup>h</sup> Morgens und 9<sup>h</sup> Abends, sind auch die von 12<sup>h</sup> Mittags und 3<sup>h</sup> Nachmittags nur wenig von einander verschieden, und die letztere ist meistens etwas größer als die erstere; die Differenz zwischen den beiden letzten Temperaturen ist für die Monate März, Mai und September am größten, in dem sie für jeden dieser drei Monate 1° beträgt. Nach dem allgemeinen Mittel zeigt sich die Temperatur von 9<sup>h</sup> Abends kleiner als die von 9<sup>h</sup> Morgens und die von 3<sup>h</sup> Nachmittags, fast um eben so viel größer als die von 12<sup>h</sup> Mittags. Der Monat Mai des Jahres 1833 war un-

gewöhnlich kühlt, wogegen sich der Monat November ungewöhnlich warm zeigte.

Nimmt man aus den beobachteten täglichen Maximis und Minimis die Mittel für jeden einzelnen Monat, so erhält man nachstehendes Tableau.

Centigrade.

Monat.	Mittleres Maximum.	Mittleres Minimum.	Differenz.
Januar	— 14°,0	— 20°,9	6°,9
Februar	— 6°,5	— 15°,7	9°,2
März	— 3°,0	— 13°,9	10°,9
April	+ 9°,1	+ 0°,2	8°,9
Mai	+ 13°,2	+ 1°,6	11°,6
Juni	+ 24°,4	+ 12°,4	12°,0
Juli	+ 27°,6	+ 14°,5	13°,1
August	+ 20°,9	+ 8°,1	12°,8
September	+ 17°,5	+ 2°,4	15°,1
October	+ 5°,7	— 1°,6	7°,3
November	+ 2°,7	— 1°,5	4°,2
December	— 9°,1	— 16°,4	7°,3

Das mittlere Maximum des Jahres ist + 7°,5

das mittlere Minimum des Jahres — 2°,6

die Differenz zwischen beiden + 10°,1

Aus den beiden mitgetheilten Tabellen zeigt sich, daß der Monat März des Jahres 1833 bedeutend kälter als der Monat November war, was jedoch nicht lediglich der ungewöhnlich hohen Temperatur des letzteren Monats in diesem Jahre zugeschrieben werden kann, denn auch die Beobachtungen sämtlicher früheren Jahre, von 1828 bis 1832 eingeschlossen, geben für den Monat März eine geringere mittlere Temperatur als für den Monat November, jedoch sind die Unterschiede minder bedeutend als für das Jahr 1833. Ueberhaupt ist der Monat März für Kasan noch als ein wahrer Wintermonat zu betrachten, ebenso wie im Allgemeinen der Monat November; der Winter dauert daher in Kasan fünf Monate, vom November bis zum April, das Frühjahr zwei Mo-

nate, vom April bis zum Juni; der Sommer drei Monate, vom Juni bis zum September, und der Herbst zwei Monate, vom September bis zum November, wobei die Monate nach neuem Styl zu zählen sind.

Aus der zuletzt mitgetheilten Tabelle folgt, daß vom Monat Mai bis zum Monat October die mittleren täglichen Schwankungen der Temperatur durchgängig größer waren, als für die kälteren Monate des Jahres; für den Monat September hat diese Schwankung ihren größten Werth, indem selbige für diesen Monat  $15^{\circ},1$  beträgt. Ueberhaupt zeichnete sich dieser Monat durch öfter wiederkehrende bedeutende tägliche Temperaturwechsel vor allen übrigen Monaten des Jahres aus, und nur ein einziges Mal im Monat Mai zeigte sich eine tägliche Schwankung der Temperatur, welche etwas größer war, als die Schwankungen im Monat September. Um den Gang der Temperatur, rücksichtlich der statt findenden täglichen Veränderungen, noch etwas näher zu bezeichnen, als dies schon durch die zweite Tabelle geschieht, fügen wir hier noch eine Uebersicht der in den einzelnen Monaten des Jahres 1833 beobachteten größten täglichen Schwankungen, nebst der Angabe des Tages ihres Eintritts hinzu.

	Größte tägliche Schwankung.	Tag des Eintritts.
Januar	$12^{\circ},9\text{C.}$	12
Februar	20 ,4	19
März	19 ,2	22
April	15 ,1	24
Mai	21 ,5	2
Juni	17 ,9	26
Juli	18 ,2	25
August	18 ,4	25
September	21 ,1	2. 4. 6. 10.
October	14 ,5	20
November	12 ,0	29
December	19 ,4	24



Für den 10. September, an welchem der Unterschied zwischen dem Maximum und Minimum der Temperatur  $21^{\circ},1$  betrug, ist die Eintrittszeit des Minimums der Temperatur beiläufig auf 5<sup>h</sup> Morgens, die des Maximums dagegen auf 1<sup>h</sup> 30' Nachmittags festzusetzen; für diesen Tag betrug demnach die mittlere stündliche Veränderung der Temperatur für die Zeit

zwischen dem Minimo und Maximo	+ 2 <sup>o</sup> ,18
- dem Minimo und 9 <sup>h</sup> Morgens	+ 2 ,62
- 9 <sup>h</sup> Morgens und 12 <sup>h</sup> Nachmittags	+ 1 ,80
- 12 <sup>h</sup> Mittags und dem Maximo	+ 3 ,50
- dem Maximo und 3 <sup>h</sup> Nachmittags	— 3 ,50
- 3 <sup>h</sup> Nachmittags und 9 <sup>h</sup> Abends	— 0 ,63
- 9 <sup>h</sup> Abends und dem nächsten Minimo	— 1 ,42

Im Mittel dürften für den Monat September 5<sup>h</sup> Morgens und 2<sup>h</sup> Nachmittags, als die Stunden des Eintritts für das tägliche Maximum und Minimum der Temperatur anzunehmen seyn; demnach würde die mittlere stündliche Veränderung der Temperatur betragen:

zwischen dem Minimo und 9 <sup>h</sup> Morgens	+ 1 <sup>o</sup> ,9
- 9 <sup>h</sup> Morgens und 12 <sup>h</sup> Mittags	+ 1 ,8
- 12 <sup>h</sup> Mittags und dem Maximo	+ 1 ,05
- dem Maximo und 3 <sup>h</sup> Nachmittags	— 1 ,1
- 3 <sup>h</sup> Nachmittags und 9 <sup>h</sup> Abends	— 1 ,15
und endlich	
- 9 <sup>h</sup> Abends und dem Minimo	— 0 ,9

Im Monat Mai, August und September zeigte sich die größte tägliche Schwankung an einem Tage, wo zugleich die höchste Temperatur beobachtet wurde, welche im Laufe des Monats eintrat. In den Monaten März und Juni zeigte sich die größte tägliche Schwankung an dem Tage, wo die niedrigste Temperatur beobachtet wurde; für alle übrigen Monate sind die Tage des Eintritts der größten täglichen Schwankung von denen des Eintritts der größten und kleinsten im Laufe des Monats beob-

achteten Temperatur verschieden, wie sich zeigt, wenn man die folgende Tabelle mit der vorhergehenden vergleicht.

Monat	Höchste beobachtete Temperatur.		Niedrigste beobachtete Temperatur		Monat Schwankung.
		Tag des Eintritts		Tag des Eintritts	
Januar	— 1°,0	8	— 30°,0	2	29°,0
Februar	+ 2°,3	13	— 29°,9	1	32°,2
März	+ 4°,1	26	— 24°,0	22	28°,4
April	+ 22°,0	27	— 12°,0	1	34°,0
Mai	+ 22°,7	2	— 1°,5	9	24°,2
Juni	+ 31°,1	20	+ 3°,1	11	27°,7
Juli	+ 31°,4	13	+ 8°,7	31	23°,7
August	+ 26°,2	1 12 25	+ 5°,7	28	20°,5
September	+ 30°,0	8	— 6°,2	27	36°,2
October	+ 12°,0	3	— 9°,5	9	21°,5
November	+ 8°,0	5	— 16°,5	30	24°,5
December	+ 1°,4	22 23	— 30°,1	31	31°,8

Am 2., 12. und 21. März war das Minimum zwischen 20 und 21°.

Der Monat September ist, der vorstehenden Tabelle zufolge, derjenige Monat, in welchem die größte monatliche Schwankung der Temperatur statt fand, und die Monate April und Februar kommen hierin dem Monat September am nächsten. Die höchste während des ganzen Jahres beobachtete Temperatur war + 31°,4, die niedrigste — 30°,4, die jährliche Schwankung der Temperatur betrug demnach 64°,8 C. Die strengste Kälte fand am 2. und 3. Januar statt; an diesen beiden Tagen erhob sich das Maximum der Temperatur nicht bis über — 21°,7, der Unterschied zwischen dem Maximo und Minimo betrug an diesen Tagen 8°,3. Anhaltender, jedoch minder intensiv, war die Kälte in der letzten Hälfte des Monats Januar, indem vom 18. bis zum 31. Januar das Maximum zwischen — 7°,5 und — 20°,2, und das Minimum zwischen — 18°,1 und — 28°,1 schwankte.

Im Monat Februar erhob sich das Maximum nur zwei Mal, am 2. und 13. bis über den Gefrierpunkt, und mit Ausnahme dieser Tage und des 1. Februars, an welchem das Minimum der Temperatur  $-20^{\circ},3$  betrug, wick die höchste Temperatur des Tages nie über  $6^{\circ}$  von dem mittleren Maximo des Monats ab. Vom 1. bis zum 15. März erhob sich das Maximum nur ein Mal, am 5. März, über den Gefrierpunkt; an den übrigen Tagen war die höchste Temperatur stets unter dem mittleren Maximo des Monats; ebenso blieb während der ersten Hälfte dieses Monats, mit Ausnahme des 1., 4. und 5., das Minimum fortwährend unter dem mittleren Minimo des Monats. Nur am 25., 26. und 27. März thaute der Schnee an seiner Oberfläche während der mittleren Stunden des Tages.

Vom 3. April an sank das tägliche Maximum nicht wieder unter den Nullpunkt der hunderttheiligen Scala hinab; anhaltendes Thauwetter ohne Nachtfrost trat aber erst am 19. April ein und wahrte bis zum 4. Mai, worauf sich wieder Nachfröste zu zeigen begannen. Der letzte gelinde Nachtfrost war in der Nacht vom 23. zum 24. Mai.

Die Temperatur der Erde, in der Tiefe von 1 Meter unter der Oberfläche, war am 1. Januar 1833  $+0^{\circ},6\text{C.}$ , am 28. Januar  $0^{\circ},0$ ; am 25. März erreichte dieselbe ihr Minimum  $-0^{\circ},6$ , und stieg erst am 20. Mai wieder bis auf  $0^{\circ},0$ . Am 29. Mai stieg dieselbe auf  $+0^{\circ},3$ , worauf sie rasch zunahm. Am 26. Juli erreichte diese Temperatur bei  $+13^{\circ},9$  ihr Maximum; auf dieser Höhe erhielt sie sich bis zum 29. desselben Monats, von welchem Tage an sie langsam wieder abnahm, so daß selbige am 31. December 1833 bis auf  $+1^{\circ},4$  hinabgesunken war.

Der Sommer des Jahres 1833 war anhaltend heiss und trocken, im Monat Juli stieg das Maximum öfter bis auf  $30^{\circ}\text{C.}$ , jedoch sank während der Nächte die Temperatur noch öfter unter  $10^{\circ}$  hinab.

Die im Monat Juli beobachtete höchste Temperatur

34°,4 ist die höchste, welche seit 1828 in Kasan statt fand. Auch der Monat August war noch sehr anhaltend und /gleichmäßig warm, die täglichen Maxima und Minima entfernten sich nur wenig von dem mittlern Maximo und Minimo des Monats. Der Monat September zeichnete sich, wie schon oben erwähnt wurde, durch bedeutende tägliche Temperaturwechsel aus; der erste Nachtfrost trat in der Nacht vom 16. zum 17. September ein, und von dieser Zeit bis gegen Ende des Monats fror es fast in jeder Nacht, zuweilen sogar schon ziemlich stark. Vom 30. September bis 6. October war die Witterung heiter und warm, vom 6. October bis zu Ende des Monats zeigten sich aber fortwährend Nachtfroste, und Regen und Schneegestöber wechselten mit einander ab.

Die Witterung des Monats November war für Kasan ungewöhnlich gelinde und angenehm, vom 1. bis 28. November sank das tägliche Minimum der Temperatur nur ein Mal bis unter  $-2^{\circ}$  hinab, öfter blieb es sogar noch einige Grade über Null. Auch der Monat December war keineswegs kalt zu nennen; desto strenger wurde dagegen der Winter im darauf folgenden Monat Januar 1834, wo das Quecksilber während der Nacht einige Male fror.

Was die mittlere Temperatur der einzelnen Monate betrifft, so scheinen für Kasan die Mittel aus den Beobachtungen von 9<sup>h</sup> Morgens und 9<sup>h</sup> Abends dem wahren Mittel näher zu kommen, als die Mittel aus den Maximis und Minimis. Nimmt man daher erstere als näherungsweise Bestimmungen, so erhält man für die mittleren Temperaturen der Monate während des Jahres 1833 folgende Werthe:

Januar	— 17°,60	Juli	+ 20°,40
Februar	— 11 ,60	August	+ 15 ,50
März	— 8 ,30	September	+ 9 ,75
April	+ 3 ,65	October	+ 1 ,35
Mai	+ 6 ,70	November	+ 0 ,25
Juni	+ 17 ,10	December	— 12 ,55

Die mittlere Temperatur des Jahres ergibt sich aus den Beobachtungen von 9<sup>h</sup> Morgens und 9<sup>h</sup> Abends zu 2°,05, aus den Maximis und Minimis zu 2°,45. Nach einer schärferen Berechnungsweise finde ich, mit Zuziehung aller während des Jahres 1833 angestellten Beobachtungen, 2°,06 für die mittlere Temperatur des Jahres. Dieses Resultat ist jedoch wegen des ungewöhnlich warmen Sommers des Jahres 1833 im Allgemeinen etwas zu groß, und es dürfte nach allen, von 1828 bis 1833 eingeschlossen, zu Kasan angestellten Beobachtungen die mittlere Temperatur des Jahres für diesen Ort zu 1°,89 anzunehmen seyn <sup>1)</sup>.

Die Zunahme der Temperatur, welche zwei auf einander folgende Monate zeigten, war für die Monate März und April am bedeutendsten, wo selbige, nach der zuletzt mitgetheilten Uebersicht der mittleren Temperaturen der einzelnen Monate, 11°,95 betrug. Nach den sechsjährigen Beobachtungen, von 1828 bis 1833 eingeschlossen, ist die mittlere Temperatur des Monats April, im Mittel 10°,8, größer als die des Monats März, und um 8°,2 kleiner als die mittlere Temperatur des darauf folgenden Monats Mai, es ist daher als ungewöhnlich zu betrachten, daß sich im Jahre 1833 zwischen der mittleren Temperatur der Monate April und Mai nur eine Differenz von 3°,0 zeigte, so wie, daß zwischen Mai und Juni eine Zunahme von 10°,4 in der mittleren Temperatur statt fand, da letztere im Mittel 5°,5 nicht übersteigt. Die Abnahme der Temperatur war am bedeutendsten zwischen den Monaten September und October, mit 8°,4, und zwischen November und December, wo selbige 12°,5 betrug. Solche Unterschiede zwischen den mittleren Temperaturen der letztgenannten vier Monate sind für Kasan keineswegs ungewöhnlich zu nennen, obgleich selbige nach den sechsjährigen Mitteln respective nur 7°,5 und 9°,5 betragen.

1) Von hier ab ist der Aufsatz noch nicht im Russischen erschienen. Poggendorff's Annal. Bd. XXXXII.

Da das excessive Klima von Kasan bedingt wird durch die Lage dieses Orts im Innern einer von Süden nach Norden weit ausgedehnten continentalen Landmasse, so ist es nicht unwichtig den Gang der Temperatur zu Kasan mit dem zu vergleichen, welcher an anderen westlicher gelegenen Orten zu gleicher Zeit statt fand, und es dürfte daher willkommen seyn, wenn wir hier eine solche Vergleichung, so weit es uns für jetzt möglich ist, wenigstens für einen westlicher gelegenen Ort versuchen, und hierzu die Beobachtungen benutzen, welche zu Moskau während des Jahres 1833 angestellt wurden, da diese letztere Stadt noch außerdem mit Kasan fast unter demselben Parallelkreis liegt. Wir müssen jedoch bedauern, daß diese Vergleichung nicht so vollständig geschehen kann, als wir es wünschen, indem das uns zu Gebote stehende Exemplar der Moskauer Zeitung, in welcher jene Beobachtungen publicirt wurden, nicht ganz vollständig ist, und es uns nicht möglich war die vorhandenen Lücken zu ergänzen: Es bleibt uns daher nichts anderes übrig, als daß wir bei dieser Vergleichung alle diejenigen zu Kasan gemachten Beobachtungen nicht berücksichtigen, die an Tagen angestellt wurden, für welche uns die Moskauer Beobachtungen fehlen. Es finden sich aber in dem uns zu Gebote stehenden Jahrgange der Moskauer Zeitung folgende zu berücksichtigende Lücken.

im Monat Mai die Beobachtungen von 7 Tagen, vom 12. bis mit 18.;

im Monat Juli die Beobachtungen von 10 Tagen, vom 1. bis 6. und vom 28. bis 31.;

im Monat August 3 Tage, vom 1. bis 3.;

im Monat September 4 Tage, vom 11. bis 14. und

im Monat October 10 Tage, vom 2. bis 8. und 13. bis 15.

Zu Moskau wurde nur um 12<sup>h</sup> Mittags gleichzeitig mit Kasan beobachtet, außerdem zeichnete man die Temperatur um 8<sup>h</sup> Morgens und 8<sup>h</sup> Abends auf. Nimmt man nun für Moskau die Mittel aus letzteren Temperaturen



als näherungsweise Bestimmungen der mittleren Temperatur, für Kasan aber die Mittel aus den Temperaturen von 9<sup>h</sup> Morgens und 9<sup>h</sup> Abends, so ergeben sich für die einzelnen Monate des Jahres 1833 folgende Resultate:

Monat.	Moskau	Kasan.	Unterschied
Januar	— 13°,7	— 17°,6	+ 3°,9
Februar	— 6°,8	— 17°,6	+ 4°,8
März	— 7°,5	— 8°,3	+ 0°,8
April	+ 3°,1	+ 3°,6	— 0°,5
Mai *	+ 9°,3	+ 6°,4	+ 2°,9
Juni	+ 17°,4	+ 17°,1	+ 0°,3
Juli *	+ 19°,6	+ 21°,7	— 2°,1
August *	+ 13°,7	+ 15°,2	— 1°,5
Septembr. *	+ 10°,6	+ 10°,7	— 0°,1
October *	+ 1°,6	+ 1°,1	+ 0°,5
November	+ 0°,2	+ 0°,2	0°,0
December	— 7°,8	— 12°,5	+ 4°,7

Vergleicht man die für Kasan angegebenen Temperaturen der mit \* bezeichneten Monate mit den weiter oben angegebenen, so zeigt sich, daß die Nichtberücksichtigung der an den früher angegebenen Tagen gemachten Beobachtungen keine bedeutenden Differenzen in den mittleren Temperaturen bewirkt haben, es ist daher wahrscheinlich, daß für Moskau dasselbe statt finden werde, und daß man demnach die aus der vorstehenden Tabelle zu ziehenden Resultate auf die mittleren Temperaturen der Monate überhaupt ausdehnen kann.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, wie schon hinreichend bekannt ist, daß das Klima von Moskau weniger excessiv als das von Kasan ist, indem die Wintermonate für Moskau eine höhere Temperatur haben als für Kasan, die Sommermonate aber für Moskau kühler sind, jedoch ist auch für diesen Ort der Monat März noch ein Wintermonat, und war sogar noch etwas kälter als der Monat Februar. Der Herbst war an beiden

Orten fast gleich warm. Die Differenz zwischen den mittleren Temperaturen der Monate März und April ist für Moskau eben nicht bedeutend geringer als für Kasan, indem selbige noch  $10^{\circ},6$  beträgt, jedoch zeigte sich die Wärmezunahme zwischen den Monaten April, Mai und Juni zu Moskau gleichmäßiger als an letzterem Orte; zwischen den mittleren Temperaturen der Monate November und December war jedoch der Abstand für Moskau weit weniger bedeutend als für Kasan, und wird von der Abnahme der Wärme vom September zum October übertroffen. Etwas verschieden gestalten sich die Resultate, wenn man die Mittel aus denen um 12<sup>h</sup> Mittags zu Moskau und Kasan gemachten Beobachtungen einander gegenüberstellt; man erhält alsdann folgendes Tableau:

Monat.	Temperatur um 12 <sup>h</sup> Mittags.		
	Moskau.	Kasan.	Unterschied.
Januar	— $10^{\circ},6$	— $16^{\circ},0$	+ $5^{\circ},4$
Februar	— $2^{\circ},4$	— $8^{\circ},5$	+ $6^{\circ},1$
März	— $0^{\circ},2$	— $5^{\circ},2$	+ $5^{\circ},0$
April	+ $10^{\circ},4$	+ $7^{\circ},7$	+ $2^{\circ},7$
Mai *	+ $13^{\circ},0$	+ $9^{\circ},7$	+ $3^{\circ},3$
Juni	+ $24^{\circ},4$	+ $21^{\circ},9$	+ $2^{\circ},5$
Juli *	+ $25^{\circ},9$	+ $27^{\circ},0$	— $1^{\circ},1$
August *	+ $19^{\circ},9$	+ $18^{\circ},5$	+ $1^{\circ},4$
Septembr. *	+ $17^{\circ},7$	+ $14^{\circ},1$	+ $3^{\circ},6$
October *	+ $7^{\circ},2$	+ $4^{\circ},2$	+ $3^{\circ},0$
November	+ $1^{\circ},0$	+ $1^{\circ},1$	— $0^{\circ},1$
December	— $6^{\circ},1$	— $11^{\circ},9$	+ $5^{\circ},8$

Hieraus geht hervor, daß, mit Ausnahme des Monats Juli und November, die Temperatur um Mittag zu Moskau im Mittel durchgängig höher als in Kasan war; auch zeigt sich die zunehmende Intensität der Sonnenwärme im Monat März zu Moskau weit wirksamer als zu Kasan, indem der Unterschied zwischen der mittleren Tem-

peratur des Monats und dem Mittel aus den Beobachtungen von 12<sup>h</sup> Mittags, in Bezug auf den Monat März, für Moskau 7°,3 beträgt, während selbiges für Kasan nur 3°,1 ist. Was die Temperatur während des Monats Juli betrifft, so war dieselbe zu Kasan weit gleichmäßiger als zu Moskau, und es ist diesem Umstande zuzuschreiben, daß die mittlere Mittagswärme dieses Monats für Kasan größer als für Moskau erscheint, obgleich an letzterem Orte die Temperatur an einigen Tagen bis zu einer Höhe stieg, welche sie zu Kasan seit 1828 nicht erreicht hat, und die auch in den Jahren 1814, 1815, 1816 und 1817, von welchen Jahren die Resultate der zu Kasan angestellten Beobachtungen in Erdmann's Beiträgen zur Kenntniß des Innern von Rußland, Bd. I S. 177 folg. mitgetheilt sind, nicht beobachtet wurde. Am 7. Juli 1833 war die Mittagshitze zu Moskau 35°,9 C., am 9. Juli aber 36°,2 C., welche Temperaturen noch nicht als Maxima angesehen werden können. Diese heißesten Tage gingen dem heißesten Tage zu Kasan voraus; wie schon oben bemerkt wurde, war dieß der 13. Juli, an welchem Tage das Maximum der Temperatur 34°,4 C. betrug.

Die geringste Mittagswärme, welche zwischen dem 7. und 27. Juli zu Moskau beobachtet wurde, war 15°,0, und fand am 20. Juli statt; zu Kasan zeigte sich innerhalb derselben Zeit die geringste Mittagswärme am 21. Juli, wo selbige 18°,7 betrug. Um endlich noch den Gang der Temperatur zu Moskau und Kasan für andere Tagesstunden als 12<sup>h</sup> Mittags mit einander zu vergleichen, bleibt kein anderes Mittel übrig, als sich der Interpolation zu bedienen, da zu keiner anderen Stunde an beiden Orten gleichzeitig beobachtet wurde. Bekanntlich kann man hierzu mehrere verschiedene Methoden anwenden; in dem gegenwärtigen Falle scheint es uns am sichersten, anzunehmen, daß innerhalb zweier Beobachtungszeiten, welche nicht die Eintrittszeit des Maximums oder Minimums der Temperatur einschließen, die Ver-

Änderung der letzteren der Zeit proportional sei; diese Voraussetzung ist die einfachste, welche man machen kann, und dürfte sich wohl nicht sehr von der Wahrheit entfernen. Soll diese Annahme im vorliegenden Fall in Anwendung gebracht werden, so müssen die Morgenbeobachtungen von Moskau auf 9<sup>h</sup> Morgens, die Abendbeobachtungen von Kasan aber auf 8<sup>h</sup> Abends reducirt werden, indem nur für letzteren Ort noch eine Zwischenbeobachtung zwischen dem Maximo und der Abendbeobachtung vorhanden ist. Auf diese Weise ergibt sich folgendes Tableau:

Monat.	Temperatur um 9 <sup>h</sup> Morgens.			Temperatur um 8 <sup>h</sup> Abends.		
	Moskau.	Kasan.	Unterschied.	Moskau.	Kasan.	Unterschied.
Januar	-13°.0	-17°.5	+4°.5	-13°.7	-17°.4	+3°.7
Februar	-6°.0	-12°.0	+6°.0	-6°.4	-10°.8	+4°.4
März	-5°.1	-8°.1	+3°.0	-7°.9	-7°.5	-0°.4
April	+5°.3	+4°.2	+1°.1	+2°.7	+3°.9	-1°.2
Mai *	+11°.3	+6°.2	+5°.0	+8°.4	+7°.2	+1°.2
Juni	+20°.0	+17°.5	+2°.5	+16°.4	+17°.6	-1°.2
Juli *	+22°.2	+21°.1	+0°.8	+18°.2	+21°.9	-3°.7
August *	+16°.2	+15°.1	+1°.1	+12°.4	+15°.5	-3°.1
Septbr. *	+13°.2	+9°.1	+3°.8	+9°.5	+9°.9	-0°.4
October *	+3°.1	+1°.0	+2°.1	+1°.6	+1°.7	-0°.1
November	+0°.5	-0°.1	+0°.6	-0°.1	+0°.7	-0°.8
December	-7°.5	-12°.7	+5°.2	-7°.6	-12°.2	+4°.6

Es folgt aus der vorstehenden Zusammenstellung, daß zu Moskau die Temperatur im Mittel durchgängig höher als zu Kasan war, während am Abend dies nur für die Monate Januar, Februar, Mai und December statt fand; dieser Umstand, daß die Morgen zu Moskau im Mittel durchgängig wärmer, die Abende aber in der wärmern Jahreszeit kühler, in der kältern wärmer als zu Kasan sind, verleiht dem Klima jener Stadt eine größere Annehmlichkeit, obgleich es immer noch als excessiv zu betrachten ist.

Eine flüchtige Vergleichung des vorletzten und letzten Tableaus reicht schon hin um zu erkennen, daß die mittlere Zunahme der Temperatur von 9<sup>h</sup> Morgens bis 12<sup>h</sup> Mittags, und die mittlere Abnahme derselben von 12<sup>h</sup> Mittags bis 8<sup>h</sup> Abends zu Moskau und Kasan sehr verschieden sind, und da diese Zu- und Abnahmen ein Klima wesentlich von einem anderen unterscheiden können, so wollen wir hier beide für die in Rede stehenden Orte einander gegenüberstellen.

Monat.	Zunahme der Temperatur von 9 <sup>h</sup> — 12 <sup>h</sup> .		Zunahme der Temperatur von 12 <sup>h</sup> — 8 <sup>h</sup> .	
	Moskau.	Kasan.	Moskau.	Kasan.
Januar	2°,4	1°,5	3°,1	1°,1
Februar	3°,6	3°,5	1°,0	2°,3
März	5°,2	3°,2	7°,7	2°,3
April	5°,1	3°,3	7°,7	3°,8
Mai *	3°,5	3°,2	6°,6	2°,5
Juni *	4°,1	4°,1	8°,0	4°,3
Juli *	3°,7	5°,6	7°,7	5°,1
August *	3°,7	3°,4	7°,5	3°,0
Septembr.*	4°,5	4°,7	8°,2	4°,2
October *	1°,1	3°,2	5°,6	3°,5
November	0°,5	1°,2	1°,1	0°,4
December	1°,4	0°,8	1°,5	0°,3

Die beiden ersten Spalten der vorstehenden Tabelle zeigen eben keine besonders bemerkenswerthen Verhältnisse, desto mehr Beachtung verdienen die Resultate der beiden letzten Spalten, indem aus ihnen die an sich sehr merkwürdige Folge hervorgeht, »daß zu Moskau die Abkühlung während der Nachmittagsstunden im Mittel durchgängig bedeutend größer war als zu Kasan.«

Wir wagen nicht hier eine Erklärung dieses eigenthümlichen Phänomens zu versuchen, da wir bis jetzt nur leere Vermuthungen über die Ursache desselben zu geben im Stande waren.

Am 9. Juli, dem heißesten Tage zu Moskau, betrug

dasselbst die Abkühlung der Atmosphäre von 12<sup>h</sup> Mittags bis 8<sup>h</sup> Abends 14°,4 C.; während sie an demselben Tage zu Kasan zwischen dem Maximo und 9<sup>h</sup> Abends nur 9°,2 war. Am 13. Juli, dem heißesten Tage zu Kasan, betrug hier der Unterschied zwischen dem Maximum und Minimum 13°,2, und die Abkühlung zwischen dem Minimum und 9<sup>h</sup> Abends war an demselben Tage nur 4°,9. Die mittlere Temperatur des Jahres 1833 ergibt sich für Moskau, aus den an den gleichnamigen Stunden des Morgens und Abends angestellten Beobachtungen, zu 3°,3 C., welches Resultat nur um 0°,01 größer ist als diejenige mittlere Temperatur, welche aus den fünfjährigen Beobachtungen von Engel und Stritter, während der Jahre 1783, 85, 89, 91 und 92 angestellt, gefolgert worden ist, jedoch ist dasselbe um 1°,7 kleiner als die von Hrn. Perevoschtschikow aus fünfjährigen Beobachtungen für Moskau gefundene mittlere Jahrestemperatur. Mit Hingewlassung derjenigen Tage für welche um die Moskauer Beobachtungen fehlen, ergibt sich die mittlere Temperatur von Kasan, aus den um 9<sup>h</sup> Morgens und 9<sup>h</sup> Abends angestellten Beobachtungen, näherungsweise zu 2°,17 C., welches Resultat nur um 0°,09 größer ist, als die für Kasan mit möglichster Schärfe bestimmte mittlere Temperatur des Jahres 1833. Es läßt sich daher wohl annehmen, daß auch das oben für Moskau gefundene Resultat sich nur sehr wenig von der wahren mittleren Temperatur des Jahres 1833 für diesen Ort entferne.

---



## A n h a n g.

Mittlere Barometerhöhen und mittlere Temperaturen zu  
Kasan für jeden Monat des Jahres 1834 u. 1835 neuen  
Styls; mitgetheilt von E. Knorr.

Monat.	1834.		1835.	
	Barometerhöhe bei 0°,0.	Temperatur.	Barometerhöhe bei 0°,0.	Temperatur.
	Millim.	Centigr.	Millim.	Centigr.
Januar	757,57	— 20,28	753,76	— 13,34
Februar	755,52	— 19,62	757,90	— 10,23
März	754,41	— 2,72	756,63	— 3,50
April	758,86	+ 0,35	754,79	+ 3,77
Mai	753,24	+ 11,03	753,10	+ 9,55
Juni	750,92	+ 16,88	753,40	+ 15,55
Juli	750,86	+ 16,29	749,36	+ 17,35
August	757,64	+ 17,97	749,47	+ 14,07
September	749,92	+ 9,62	758,68	+ 8,75
October	755,24	+ 4,98	762,25	+ 4,07
November	750,19	— 1,46	754,02	— 8,57
December	754,93	— 9,72	752,52	— 19,35
Mittel	754,11	+ 1,94	754,68	+ 1,51

Sämmtliche Barometerhöhen bedürfen keiner weiteren  
Correction.

Mittlere Feuchtigkeith der Luft zu Aasen für jeden Monat des Jahres 1835 nachem Styl.

Monat	9 <sup>h</sup> Morgens.			12 <sup>h</sup> Mittags.			3 <sup>h</sup> Nachmittags.			9 <sup>h</sup> Abends.			Feuchtigkeit
	Temperatur. Cenigr.	Thaupunkt. Cenigr.	Sättigung	Temperatur. Cenigr.	Thaupunkt. Cenigr.	Sättigung	Temperatur. Cenigr.	Thaupunkt. Cenigr.	Sättigung	Temperatur. Cenigr.	Thaupunkt. Cenigr.	Sättigung	
Januar	-13,64	...	1	-12,05	-13,00	0,93	-10,25	-13,10	0,92	-13,04	...	1	0,92
Februar	-10,97	-11,62	0,95	-9,05	-10,50	0,90	-8,06	-9,56	0,89	-9,50	-10,37	0,92	0,95
März	-3,80	-5,56	0,88	-1,77	-5,25	0,78	-0,61	-6,00	0,68	-3,20	-5,44	0,78	0,78
April	+3,05	-1,37	0,73	+5,17	+0,25	0,70	+6,31	-0,56	0,62	+4,19	+0,81	0,59	0,59
Mai	+9,71	+1,11	0,58	+12,39	0,0	0,41	+13,59	+0,56	0,43	+9,40	+1,63	0,55	0,55
Juni	+16,50	+7,00	0,55	+18,89	+5,16	0,42	+19,39	+4,87	0,40	+14,60	+5,41	0,63	0,63
Juli	+18,20	+10,77	0,63	+20,81	+10,23	0,52	+21,16	+8,41	0,45	+16,50	+9,12	0,76	0,76
August	+14,54	+9,09	0,70	+16,61	+8,77	0,61	+17,01	+8,66	0,59	+13,61	+9,22	0,70	0,70
September	+8,77	+4,96	0,78	+12,74	+4,91	0,60	+14,02	+4,31	0,53	+8,74	+3,37	0,74	0,74
October	+3,74	+0,37	0,79	+7,10	+1,31	0,68	+8,11	+0,75	0,61	+4,41	0,0	0,92	0,92
November	+8,59	-9,62	0,92	-7,05	-8,87	0,88	-7,07	-9,06	0,96	-8,56	-9,62	1	1
December	-19,06	...	1	-18,14	...	1	-18,72	...	1	-19,65	...	1	1

Die Beobachtungen zur Bestimmung der Feuchtigkeit der Luft wurden mit einem Psychrometer von Greiner, in Berlin, angestellt, und nach der von Hrn. Prof. August gegebenen Formel und Tafel berechnet. (Siehe dessen: Fortschritte der Hygrometrie in der neuesten Zeit, Berlin 1830). Im Monat Januar, besonders um 9<sup>h</sup> Morgens und Abends, zeigte das mit einer dünnen Eistrinde umgebene Thermometer des Psychrometers häufig eine höhere Temperatur als das trockne Thermometer; die psychrometrische Differenz war also negativ, sie stieg jedoch nur ein einziges Mal bis auf  $-0^{\circ},5\text{R.}$ , eine Differenz von  $-0^{\circ},4\text{R.}$  war aber nicht selten. Noch häufiger zeigten sich negative psychrometrische Differenzen im Monat December, wo sie sogar zu allen Tagesstunden vorherrschend waren: in den Frühjahrs- und Herbst-Monaten zeigten sich selbige nur ausnahmsweise während der Morgen- und Abenddämmerung, und stiegen selten über  $-0^{\circ},2\text{R.}$  Während der Wintertage, wo eine negative psychrometrische Differenz beobachtet wurde, war die Luft meistens sehr still und der Himmel heiter, jedoch zeigte sich stets ein sehr schwacher Schneefall, welcher auf den Marktplätzen, wo oft eine ziemliche Anzahl Menschen und Pferde beisammen ist, am stärksten war, indem die aufsteigenden Dünste sofort niedergeschlagen wurden. Das Klima von Kasan scheint sich sehr zu psychrometrischen Untersuchungen zu eignen, und es ist daher mein Wunsch mich nach Beendigung des noch im Bau begriffenen neuen physikalischen Kabinetts und meteorologischen Observatoriums, und nachdem ich mich im Besitz mehrerer nöthiger Hülfsmittel sehen werde, wozu die nöthigen Summen zum Theil schon Allerhöchst bewilligt sind, angelegentlicher mit diesen Untersuchungen zu beschäftigen, wobei ich aus einem eigenen, leider aber durch Versuche bis jetzt noch nicht geprüften, Instrumente einigen Vortheil zu ziehen hoffe. Obgleich dasselbe nur eine Modification eines längst bekannten hy-

parats ist, so wäre es doch leicht möglich, daß es meinen Erwartungen nicht entspräche, und ich wage deshalb noch nicht mit einer nähern Angabe desselben hervortreten. Bei der großen Entfernung Kasans von den heutigen Mittelpunkten des wissenschaftlichen Strebens, und der hieraus für mich folgenden Isolirung, entgeht mir wohl manches Neue, ich würde daher jedem Physiker, welcher sich besonders für die Meteorologie interessirt, höchst dankbar seyn, wenn derselbe, vorzüglich durch briefliche Mittheilungen, mich gütigst belehren wollte, worauf ich bei jenen Untersuchungen, und bei den hier anzustellenden meteorologischen Beobachtungen überhaupt, meine Aufmerksamkeit vorzüglich richten möchte.

Kasan, im Mai 1837.

*IX. Beobachtung eines ausgezeichnet hohen Barometerstandes zu Braunsberg in Ost-Preussen; von L. Feldt.*

Vom 1. bis 12. Febr. 1837 wurde hier in Braunsberg ein ausgezeichnet hoher Barometerstand beobachtet. Die von mir in dem eben genannten Zeitraume, in einer Höhe von 11,7 Toisen über dem Niveau der Ostsee angestellten Beobachtungen sind folgende:

Febr. 1837.	Lufttemperatur.	Barometerhöhe auf 0° R. reducirt.	Witterung.
1. 12 <sup>h</sup> Mittags	17°, 2 F.	342", 16	SO. windig, heiter
2. 12 -	22 , 3	343 , 05	SO. - Schneetreiben
3. 12 -	21 , 8	344 , 05	SO. - weißer Regen Himmel
4. 12 -	8 , 0	345 , 60	SO. heiter, sehr scharfe Luft

Febr. 1837.	Lufttemperatur	Barometertische auf 0° R. reducirt.	Witterung
5. 12 <sup>h</sup> Mittags	18°,5 F.	345",51	SSO. heiter, bedeckt
1 Nachm.	19°,6	345",56	SSO. - -
2 -	19°,0	345",59	SSO. - -
3 -	18°,8	345",64	S. schwach bedeckt
5 -	18°,2	345",88	S. - gleiche Decke
6 -	18°,2	345",93	S. - -
10 -	18°,9	346",04	still, gleiche Decke
11 -	19°,0	346",11	still, - -
12 Mittern.	18°,5	346",11	still, - -
6. 6 <sup>h</sup> 45' Mrg.	18°,5	346",26	still, - -
8 -	19°,0	346",44	S. schwach, gleiche Decke, neblicht am Horizont
9 -	19°,8	346",42	S. schwach, gleiche Decke, neblicht
10 -	20°,6	346",46	S. - bedeckt
11 -	21°,9	346",47	S. - -
12 Mittags	23°,1	346",45	S. - -
1 Nachm.	24°,0	346",45	S. - -
2 -	24°,5	346",35	S. - -
3 -	23°,8	346",27	S. - -
5 -	23°,0	346",22	S. - Abendroth
7 -	23°,5	346",19	S. windig, gebrochener Himmel
7 <sup>h</sup> 20' -	23°,0	346",12	S. - es wird heiter
11 -	14°,0	346",13	still, heiter
7. 0 <sup>h</sup> 25' Mrg	12°,9	346",17	still, -
7 -	10°,1	345",37	S. windig, heiter
9 -	13°,9	345",30	S. - -
10 -	17°,0	345",28	S. schwach, heiter
12 Mittags	22°,9	344",95	SSW. windig, heiter
11 Nachm.	16°,9	344",42	still, heiter
8. 12 Mittags	29°,0	343",43	S. nachlassend, heiter
9. 12 -	29°,0	342",84	S. schwach
10. 12 -	30°,0	342",04	S. - bedeckt, es groupelt
11. 12 -	31°,2	340",18	SSO. schwach, heiter
12. 12 -	31°,0	335",97	SSO. windig, -

Nach den vorstehenden Beobachtungen erreichte also das Barometer den 6. Febr. um 11<sup>h</sup> Vormittags die Höhe von 346<sup>''</sup>,47, oder sein Stand betrug 9<sup>''</sup>,65 über der Mittelhöhe. Der Wind wehete bei diesem hohen Stande von der Südseite des Horizonts, der Himmel war bedeckt, und das Thermometer der freien Lufttemperatur zeigte 21°,9F. — Der eben angegebene Barometerstand kommt dem 19. Febr. 1832 hier wahrgenommenen Stande nahe, ist aber über 2 Par Lin. niedriger als der von mir am 6. Decbr. 1829 hier beobachtete hohe Barometerstand. — Vergl. diese Ann. Bd. XXX S. 312 u. 316 <sup>1)</sup>).

X. *Ausgezeichnet tiefer Barometerstand, beobachtet während eines Orkans auf St. Thomas, 100 Fufs über der See, vom Kanzelei-Rath Hoshiger <sup>2)</sup>.*

(Ohne Angabe der Temperatur)

1837	Mid Zeit.	Barometer Par Maas	
Aug. 1.	18 <sup>h</sup> 0'	28 <sup>''</sup> 1 <sup>''</sup>	
- 2.	2 10	27 11	scharfer Wind, Regen, einzelne Windstöße, NW.

1) In Berlin war der Barometerstand bei 0° R..

	9 <sup>h</sup> Morgens.	12 <sup>h</sup> Mittags	3 <sup>h</sup> Nachm.
5. Febr.	344 <sup>''</sup> ,68	344 <sup>''</sup> ,76	343 <sup>''</sup> ,74
6. "	345 <sup>''</sup> ,12	345 <sup>''</sup> ,20	345 <sup>''</sup> ,01
7. "	344 <sup>''</sup> ,16	344 <sup>''</sup> ,08	343 <sup>''</sup> ,85

Der mittlere Stand = 336<sup>''</sup>,21, der Ueberschuß zu 6 Mittags also 8<sup>''</sup>,99. P

2) Mitgetheilt durch Hrn. v. Humboldt von Hrn. Prof. Schulmann, eher in Altona. — Diese Erniedrigung des Barometerstandes ist um so merkwürdiger, als oft bei ungeheuren Orkanen sie weit geringer ist. Hr. v. Humboldt giebt in seinem Reisewerke (8vo) 1 11



1837	Mitt. Zeit.	Barometer Par. Maass.	
Aug. 2.	3 <sup>h</sup> 20'	27" 10"	heftige Windstöße mit Re- gen, N.
	3 45	27 10	N.
	4 45	27 8	der Sturm nimmt zu, N.
	5 0	27 7½	der Sturm nimmt zu, NO.
	5 45	27 6	Orkan, NO.
	6 30	27 4	Orkan, NW.
	6 35	27 1½	Orkan, NW.
	6 45	27 0	Orkan immer zunehmend. So gut er sich taxiren liess, aus NW. Bei jedem heftigen Stoss des Orkans sank das Barome- ter 2", kam aber gleich nach- her auf seine Höhe vor dem Stoss zurück
	7 0	27 0	
	7 10	26 10	
	7 22	26 6½	
	7 30	26 5	
	7 35	26 4½	Todtenstille
	7 52	26 4	die drückende Stille bleibt bei
	8 10	26 4	der Orkan fängt plötzlich aus Süd wieder an
	8 20	26 4	Orkan
	8 23	26 8	Orkan, SSO.
	8 33	26 9	ebenso, SO. }
	8 38	26 10	ebenso }
	8 45	26 11	Ork. stärker }
	8 50	27 0	ebenso }
	9 0	27 2	der Orkan dauert unvermin- dert fort
	9 10	27 4	

S. 274, von halber zu halber Stunde, die Barometerveränderungen während des Orkans aus Norden, der am 27 u. 28. Aug. 1794 in der Havana wüthete und sehr heftig ist. Das Barometer fiel von 30,04 auf 29,50 Zoll engl., nicht mehr. Aber Ferrer sah in der Havana bei Sturm aus SSW. das Barom. von 763,51 Millim. auf 744,72 (289,13 par. Lin.) fallen — In nördlichen Klimaten ist der richtige Barometerstand am Meere wohl der, welchen Prof. Argelander am 3. Febr. 1825 in Åbo beobachtete. Er betrug 314,10 par. Lin. bei 0° R. (Ann. Bd. V S. 129) P.

1837.	Min. Zeit.	Barometer. Par. Mass.	
Aug. 2.	9 <sup>h</sup> 25'	27 <sup>''</sup> 5 <sup>m</sup>	} der Orkan dauert unverändert fort.
	9 35	27 6	
	9 50	27 7	
	10 10	27 8	} sehr geringe Abnahme des Orkans
	10 35	27 9	
	11 10	27 9 $\frac{1}{2}$	} der Orkan nimmt etwas ab merkliche Abnahme
	11 30	27 9 $\frac{1}{2}$	
	14 45	27 11	} schwere Regenschauer, Donner und Blitz, Sturm, SO., der Himmel schwarz
	20 0	28 0 $\frac{1}{2}$	
	21 0	28 0 $\frac{1}{2}$	

schwere Brandung im Hafen, Wind, SW.

schwacher Ostwind, Sonnenschein, warme Luft, Thermometer  $+22\frac{1}{4}^{\circ}$  R.

**XI. Beschreibung des Kosmoglobus, eines mathematisch-geographisch-astronomischen Instruments, erfunden von Dr. Gauthier in Cöln.**

Eine Weltmaschine zu construiren, welche, vollkommener als die bisherigen, als Nachbildung des Universums betrachtet werden könnte, welche Erd- und Himmelskugel, Planetarium, Luvarium und Tellurium zu einem Ganzen verbände, war seit vielen Jahren mein eifrigstes Streben. Sie sollte dem Lehrer der populären Astronomie und mathematischen Geographie vollkommen zureichen, alle Erscheinungen mit Leichtigkeit, Sicherheit und möglichster Anschaulichkeit zu erläutern; dann aber auch dem Gebildeten ein zureichendes Hülfsmittel seyn, sich mittelst desselben und der dazu gehörigen Gebrauchsanweisung

sung vollständig über alle wesentlichen Phänomene, welche das Weltganze betreffen, zu orientiren.

Ich erfind eine solche Maschine, und legte ihr den Namen

»Kosmoglobus«

bei. Persönlich übergab ich sie zunächst dem Königlich Preussischen Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. Sie wurde einer Prüfungs-Commission vorgelegt, welche ihre Neuheit und Zweckmäßigkeit anerkannte. In Folge des gefällten günstigen Urtheils, ward mir ein Privilegium auf zehn Jahre verliehen, und später erhielt ich solche auch für den größten Theil der übrigen europäischen Staaten.

Das Instrument ist von mir in einer eignen Schrift \*) genau beschrieben, und zugleich mit einer Anleitung zu seinem Gebrauch versehen worden. Da diese Schrift jedoch nur einem jeden aus der Fabrik gelieferten Apparat beigelegt, also nicht in den Buchhandel gebracht wird, so glaube ich, daß eine kurze Beschreibung und Abbildung des Kosmogloben in diesen Annalen sachgemäß erscheinen dürfte.

Die Bestandtheile und die Construction des Kosmoglobus lassen es zu, daß man daraus zwei Instrumente zusammensetzen kann, die ich mit No. I und II bezeichnet habe. Die Zusammensetzung des Kosmoglobus No. I erfolgt in der Abbildung (Taf. V). Die dem Ganzen zu Grunde liegende Idee ist: »eine Verbindung von Erd- und Himmelskugel und des Planetariums mit dem gestirnten Himmel auf eine einfache und leichte Weise zu bewirken, und durch die gegenseitigen Beziehungen dieser

- 1) Beschreibung des Kosmoglobus, eines mathematisch-geographisch-astronomischen Instruments, welches die Erd- und Himmelskugel, wie das Planetarium, Tellurium und Lunarium so in sich vereinigt, daß dadurch alle Erscheinungen des Weltganzen deutlich eingesehen werden können, erfunden und mit einer vollständigen Gebrauchs-Anweisung versehen von Dr. Garthe etc. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1833.

Sphären eine Anschaulichkeit in die Erscheinungen des Weltganzen zu bringen, wie sie durch die bisher bekannten Hilfsmittel nicht erreicht werden konnte.»

Eine 10 Zoll im Durchmesser haltende Glaskugel (a) Fig. 1 Taf. V von 1 bis 2 par. Linien Dicke, die aus zwei bei *cb* auf einander passenden Halbkugeln besteht, macht einen wesentlichen Theil des Apparats aus. Beide Halbkugeln werden durch zwei eingelassene metallene Klammern so an einander befestigt, daß eine horizontale Verschiebung derselben nicht möglich ist. Die untere Halbkugel kann bei *d* mittelst einer Pressschraube an das Fußgestell befestigt und bei Lösung derselben horizontal gedreht werden. Die obere Halbkugel auf die untere schließend gesetzt, bildet mit dieser eine vollkommene Kugel. In ein bei *e* in die obere Glaskugel eingelassenes, metallenes Muttergewinde wird die Vorrichtung *f* eingeschraubt. Ein bei *g* und *h* auf- und niederlegbarer, starker, metallener, auf bekannte Weise eingetheilter Meridian *giklmh* umfaßt bei *h* und *l* in einer halb cylinderförmigen Höhlung den untern Theil der Vorrichtung *f*, und es wird derselbe alsdann durch eine andere halb-cylinderförmige, in einem Charnier bei *k* bewegliche Klappe und eine bei *l* sich befindende Schraube (oder Federhaken) nicht allein in verticaler Stellung erhalten, sondern es bewirkt dieser Meridian auch das Aufeinanderhaften der beiden Halbkugeln. Unten ist der Meridian an dem hohlen Cylinder *n* durch die Schrauben *h* und *g* befestigt, kann aber um die vertikale Axe *kd* gedreht werden. Die ganze Kugel kann mittelst der Pressschraube *o* jede geeignete Lage gegen den Horizont erhalten.

Die Glaskugel enthält an ihrer äußern Fläche die bekannten Kreise: den Aequator und die Ekliptik mit ihren Eintheilungen und Bezeichnungen, die beiden Coluren, die Wendekreise und Polarkreise. Im Pol der Ekliptik ist ein Loch eingebohrt, und in dem Abstände

des Nordpols von demselben ein eingetheilter Kreis angebracht, welcher die Grösse des Platonischen Weltjahres umfaßt. — An der innern Fläche der Glaskugel sind die Fixsterne in ihren für das Jahr 1827 berechneten Orten angebracht. Die Sterne sind alle von verschiedener Grösse, aus farbigem Papier mit Stahlstempeln ausgeschlagen und gehörig befestigt. Die erster Grösse sind karmoisinroth, die zweiter Grösse hellblau, dritter Grösse gelb, vierter Grösse grün, fünfter Grösse dunkelroth, sechster Grösse schwarz. Die zu einem Sternbilde gehörigen Fixsterne sind mit schwarz punktirten Linien vereinigt, so daß durch den eingeschlossenen Raum, so gut es thunlich war, die Fläche des Sternbilds bezeichnet worden, dessen Namen in diesem Raume befindlich ist. Die Milchstrasse ist durch zarte, weisse, an einander gereihete Pünktchen in Lage und Gestalt angedeutet. Die nähere Nachweisung der Namen und Bezeichnung der Sterne wird durch Abbildungen der Sternbilder auf Tafeln nachgewiesen, die in alphabetischer Ordnung der Schrift beigegeben wurden.

In das Innere der Glaskugel wird eine vierzöllige Erdkugel  $p$  mit ihrer Axe  $ed$  bei  $d$  in eine Oeffnung gesteckt, so daß dieselbe dadurch eine senkrechte Stellung erhält. Die Erde umschliesst ein in jede Lage einstellbarer, metallener Horizont  $qr$  mit allen darauf gehörigen Eintheilungen. Die Ebene desselben geht durch den Mittelpunkt der Erde, und reicht nahe bis zum Himmelsgewölbe, so daß auch dieses, wie in der Wirklichkeit, stets in einen halben sichtbaren und einen halben unsichtbaren Theil dadurch geschieden wird. An dem metallenen Ringe  $stu$ , welcher den Horizont trägt, sind zugleich bei  $t$  und  $u$  Stifte befestigt, welche einen Beobachter und seinen Antipoden repräsentiren. Setzt man in  $t$  und  $u$  Stifte, welche nahe an's Himmelsgewölbe reichen, so sind dadurch Zenith und Nadir bestimmt. Vermittelst  $v$  kann von Aussen die Erde um ihre Axe be-

weg werden. Sie nimmt alsdann den an ihr befestigten Horizont, als sei er an die Füße des Beobachters in  $t$  geheftet, mit sich, und giebt für jeden Theil der Umdrehung der Zeit nach die gesetzmässige, d. h. die dem Ort  $t$  auf der Erde entsprechende Stellung gegen das feststehende Himmelsgewölbe, und es erfolgen alle Erscheinungen für den Ort  $t$  hier im Kleinen, wie in der Wirklichkeit im Großen. Um die Zeit gehörig zu fixiren, ist bei  $f$  eine horizontal bewegliche, nach Zeit eingetheilte Scheibe vorhanden, die in ihrer Mitte durchbohrt ist. Durch diese Oeffnung geht der Stift  $oc$ , der bei  $t$  mit der Erdaxe in Verbindung tritt, und der einen Zeiger trägt, welcher sich also zugleich mit der Erde umdreht. Auf dem Fusse des Instruments ist ein astronomischer Kalender oder die Nachweisung enthalten, wo man den Ort abliest, welchen die Sonne an jedem Tage des Jahres haben muß. Befestigt man jetzt die Sonne (ein kleines metallenes Scheibchen mit einem Fadenkreuz) mittelst etwas Wachs an ihrem Ort in der Ekliptik, stellt den Meridian über sie und den Beobachter unter den Meridian, so hat dieser die Sonne gerade in seinem Süden, es ist für ihn Mittag; darum darf man nur die Scheibe, welche die Zeit enthält, unter dem Zeiger so lange umdrehen, bis die Mittagsstunde dem Stande des Zeigers entspricht, und hiermit ist der Himmel gesetzmässig nach der Zeit eingestellt.

Bei  $\omega$  ist ein verschiebbares Rohr (Dioptr) angebracht, wodurch man die Eintheilungen des Meridians auf den Himmel und die Erde übertragen kann. Unterhalb desselben ist ein um dies Dioptr beweglicher, in 90 Grad eingetheilter Höhenkreis angebracht, der durch die horizontalen Drehungen des Meridians, und die verticalen des Dioptrs in jedes Zenith gebracht werden kann, so daß von hieraus Messungen ausgeführt werden können. Derselbe Höhenkreis kann auch zu den Messungen vom Pol der Ekliptik aus, demnach als Breitenkreis benutzt werden.



Der bis hierhin beschriebene Apparat ist in der Schrift mit No. I bezeichnet. Will man den Apparat No. II zusammensetzen, so wird der Meridian niedergelegt, der Theil *ve* wird herausgezogen, die Platte mit der Zeiteintheilung abgenommen, und die Vorrichtung *f* losgeschraubt. Hierauf wird die obere Glaskugel zur Seite gesetzt, die Erde mit dem Horizont herausgenommen, indem an ihre Stelle in das Innere das Planetensystem tritt, so dafs, wenn es aufgestellt ist, die Ebene der Erdbahn genau in die Ebene der an der Glaskugel angegebenen Ekliptik fällt. Die Sonne steht in der Mitte der Sphäre, und alle Planetenbahnen sind in den geneigten Bahnen genau angegeben und durch Drahtringe versinnlicht. Jeder Ring hat eine eigene Farbe und trägt einen Planeten. Vom Pol der Ekliptik aus können alle um die Sonne bewegt werden. Alles, was zur Erörterung von Begriffen gehört, ist bei der Anordnung gewahrt worden, und die Verbindung mit dem Fixsternhimmel gewährt einen ungemein deutlichen Ueberblick. Die Erde mit der eigenen Stellung ihrer Axe in den verschiedenen Punkten ihrer Bahn, mit ihrem Begleiter, dem Monde, ist vorzüglich beachtet worden, so dafs die wesentlichen Erscheinungen durch diesen Apparat mit Sicherheit versinnlicht werden können.

Endlich gehört zum Apparat No. II eine Verbindung von metallenen Ringen, welche (Fig. II) abgebildet sind. Wird durch das Loch bei *k* ein Stift gesteckt, so umschließen diese Ringe genau die äufsere, obere Glashalbkugel, und bei gehöriger Drehung um *k* kann der Ring *defgh* in eine solche Lage gebracht werden, dafs er den Aequator der Himmelskugel genau deckt. In diesem Falle weist der Zeiger *ib* bei *b* auf das Jahr 1827. Er giebt also an, welche Lage der Aequator im Jahre 1827 unter den Fixsternen hatte; und welcher Stern am Himmel Polarstern war, kann man am höchsten Punkt des Ringes bei *a* erfahren, woselbst eine kleine, die Erde

repräsentirende Kugel *i* angebracht ist, und die, auf den Ring eingesteckt, bei der Drehung desselben mit herumgeführt wird. Werden nun diese verbundenen Ringe von der Linken zur Rechten um *k* gedreht, so durchschneidet der hierdurch veränderte Aequator *defgh* die Ekliptik in immer andern Punkten, welche in Beziehung der vorigen zurückweichen; die kleine Erde bei *m* ist aus ihrer Stellung gerückt, und ihre Axe ist auf andere Punkte des Himmels gerichtet; der Aequator geht durch andere Sternbilder als vorher, und der Zeiger bei *b* weist die Jahrtausende, in welchen eine solche Veränderung statt hat. Mit dieser höchst einfachen Vorrichtung kann man also mit großer Anschaulichkeit erörtern:

1. Die Bewegung der Weltpole in Kreisen um die Pole der Ekliptik.
2. Das Platonische Weltjahr.
3. Die veränderliche Lage des Aequators gegen die Ekliptik.
4. Die veränderliche Lage der Aequinoctialpunkte.
5. Die Veränderlichkeit der Länge der Gestirne.
6. Die Veränderlichkeit der geraden Aufsteigung der Gestirne.
7. Die Veränderlichkeit der Abweichung der Gestirne.
8. Die Unveränderlichkeit der Breite der Gestirne aus dieser Ursache.
9. Welche Sterne vor Jahrtausenden Polarsterne waren, und demnächst es werden können.
10. Das östliche Vorrücken der Sterne und Sternbilder, in Bezug auf die Aequinoctialpunkte u. s. w.
11. Endlich läßt sich damit die Lage einer jeden Planetenbahn im Fixsternhimmel festlegen.

Das hier beschriebene Instrument unter dem Namen Kosmoglobus ist mit einem andern, von dem ehemaligen hannoverschen Major W. Müller, in England und Deutschland bekannt gemachten Instrument „Kosmosphäre“ ganz identisch, und, damit die Geschichte der Wissenschaft

entscheiden könne, wer der Erfinder jener Maschine sey, und ob sich jener königl. hannöversche Major eines Plagiats schuldig gemacht, theile ich das Folgende hierher gehörige mit.

Um auch von England ein Patent für die von mir gemachte Erfindung des Kosmogloben zu erwirken, schloß ich mit dem Major Müller einen Vertrag, vermöge dessen er gehalten war, in England, Schottland und Irland auf diese meine Erfindung ein Patent zu nehmen, so wie die ihm zugleich mit dem Instrumente übergebene Beschreibung und Gebrauchsanweisung ins Englische zu übersetzen. Alle Kosten, so wie der allenfalls entstehende Schaden, sollten von ihm allein getragen, ein hervorgehender Gewinn aber zu gleichen Theilen unter uns getheilt werden. Auf englischem Boden angelangt, findet es der Herr Major bequemer, das Ganze für seine Erfindung auszugeben, und sucht dies dadurch zu beschönigen, daß er manches an dem Instrumente verbessert habe. Genug, er läßt das englische Patent auf seinen Namen ausstellen, und alle englischen Blätter verbreiten sich lobend über den glücklichen Gedanken, den Herr Müller gehabt habe. Hiermit nicht zufrieden, kehrt er nach Deutschland zurück, schreibt an Hrn. v. Cotta in München, mit welchem ich, wie er wußte, wegen der merkantilschen Verbreitung meines Instruments in Verbindung stand, und macht demselben den Vorschlag, sich Patente auf diese seine Erfindung geben zu lassen, unter der Versicherung, es werde dann Niemand mein, sondern nur sein Instrument kaufen. Ich schweige über den sittlichen Werth solcher Handlungen, und bemerke nur, daß dies zu einer Zeit geschah, wo eben Hr. v. Cotta mit der öffentlichen Bekanntmachung meiner Erfindung, und mit dem Abdruck des dem Instrumente zugehörigen Manuscripts beginnen wollte. Von diesem Moment an unterläßt Hr. v. Cotta, das Geschäft ins Leben zu rufen, und legt mir mancherlei Verbindlichkeiten auf, zu

deren Erfüllung mich mein Contract nicht verpflichtete. Da auch von diesem der Verbreitung meiner Erfindung in Deutschland entgegen tretenden Hinderniß die Schuld in dem Verfahren des Major Müller lag, auch viele andere Umstände mich dringend nöthigten, meine Rechte zu sichern, so liefs ich im Jahre 1830 eine Druckschrift verbreiten, unter dem Titel:

»Oeffentliche Rüge

nebst dringender Bitte an alle geehrten Leser dieses Blatts, Unternehmungen nicht zu unterstützen, deren Unwürdigkeit in Folgendem dargethan werden soll.«

(Gerichtet gegen den Major Dr. W. Müller in Hannover). In derselben suchte ich den historischen Gang der ganzen Sache bis auf die Zeit, wo der Major Müller dem Erfolge meiner Bemühungen so beispieillos entgegenwirkte, zusammenzustellen. Ich hatte darin nur Thatsachen angegeben, deren Bekanntmachung dem Hrn. Major in seiner Stellung nichts weniger als erwünscht seyn konnte, die ihn vielmehr auf der verwundbarsten Stelle angriff. Nach dem Erscheinen dieser Schrift erhielt ich von Hrn. Müller einen Drobbrief, worin er sagte, daß er mich und meine Familie, wegen Irthümer gegen ihn gemacht haben sollender Aeusserungen, ins grösste Verderben bringen, und dazu die geeigneten Maafsregeln ergreifen würde, wenn ich nicht den Inhalt jener Rüge sofort öffentlich, als unwahr, zurücknähme. Ich sandte diesen Brief in gerichtlich beglaubigter Abschrift Sr. königl. Hoheit dem Herzog von Cambridge, und Hr. Müller wurde darauf von seinem Dienste suspendirt, aber zugleich veranlaßt, mich gerichtlich zu belangen. Da bei diesem langen, merkwürdigen Procefs Alles auf ein Gutachten von Sachverständigen ankam, so vereinigte sich mein Gegner mit mir dahin, dieses von der philosophischen Facultät der Universität Leipzig zu erbitten, und dasselbe dem Ausspruche des Gerichts zum Grunde zu legen. Es wurden daher nicht allein beide Instrumente, sondern auch die

nöthigen Acten, an die gedachte Facultät gesandt. Das darauf von ihr abgefasste Urtheil, welches sich auf alle Einzelheiten mit umfassender Gründlichkeit verbreitet und 79 Folio-Seiten enthält, theile ich jetzt in einem Auszuge mit, weil dadurch die Gerechtigkeit meiner Sache auf eine überzeugende Weise beurkundet wird.

Das kurfürstlich hessische Ober-Gericht zu Rinteln hatte von den Sachverständigen vornehmlich über folgende Punkte ein Gutachten verlangt:

- „Ob und in welchen wesentlichen Merkmalen das Instrument des Dr. Garthe von ähnlichen, frühern, gleichartigen Erfindungen, welche von Seiten des Anklägers angegeben worden, verschieden, oder mit diesen Erfindungen congruent?
- „Ob und in welchen wesentlichen Merkmalen das Instrument des Major Müller von dem des Dr. Garthe verschieden oder damit congruent?
- „Ob eine hierdurch ausgemittelte wesentliche Verschiedenheit der beiden Instrumente durch Veränderung der Bestandtheile des Instruments des angeschuldigten Dr. Garthe, oder aber durch Zusätze zu demselben entstanden sey?“

Der Schluß des Gutachtens beantwortet diese Fragen in folgenden Worten:

- „Nach diesem allen glauben wir zu dem Schlusse berechtigt zu seyn, daß der Garthesche Kosmoglobus, wenn er gleich von frühern Erfindungen Manches als Aehnliches darbietet, dennoch als ein Ganzes in der zweckmäßigen und saubern Ausführung, in der Leichtigkeit, mit welcher alle Veränderungen ausgeführt werden können, und die Auflösung jedes Problems bequem gezeigt werden kann, als eigenthümlich genug anerkannt werden muß, um dem Dr. Garthe den Ruhm, sich wesentliche Verdienste um das Instrument erworben, und durch eignes Nachdenken mehr als seine Vorgänger

geleistet zu haben, zu sichern. Dieses Urtheil hat ohne allen Zweifel auch diejenigen Regierungen, welche ihm Patente ertheilt haben, und die in dieser Hinsicht zu Rathe gezogenen Gelehrten geleitet.

„Wir sprechen es ferner als unsre bestimmte Ueberzeugung aus, dafs man:

- 1) was das ganze Instrument betrifft, nicht anders entscheiden kann, als dafs beide Instrumente in Hinsicht des Zwecks und der Anwendung nur in *unwesentlichen* Punkten verschieden sind, und dafs diese Verschiedenheiten nicht einmal mit Sicherheit als Verbesserung können angesehen werden, ja, einige diesen Namen gar nicht verdienen; dafs man
- 2) einräumen kann, dafs die Befestigung des Meridians mit Hülfe zweier Pressschrauben nach Müller's Angaben auf einem soliden Fusse (nicht aber die Aufhängung) eine, wenn auch für seltene Fälle passende Verbesserung ist.

„Wir können aber durchaus nicht glauben, dafs eine Regierung, die Hrn. Dr. Garthe ein Patent ertheilt hat, sich sollte bewegen finden, ihm darum den ungestörten Genufs seines Patents zu entreifsen, weil ein so geringer *Nebentheil*, bei sonst vollkommener Uebereinstimmung aller Hauptsachen, in dem Müllerschen Instrumente einen kleinen Vorzug besitzt.

- 3) Die von Glimmer verfertigten Blättchen, die den Horizont, die Ebene der Erdbahn vorstellten, halten wir für keine Verbesserungen. Uebrigens sind die Patentgesetze uns nicht genau genug bekannt; jedoch halten wir uns überzeugt, dafs ein Künstler, der den Meridian oder Horizont am Kosmoglobus von Silber machen wollte, darum das Garthesche Patent nicht ungültig machen würde, sondern seinen Kosmogloben mit silbernem Horizont nicht verkaufen dürfte; aber mit den Glimmer-Horizonten, die keinen wissenschaft-



lich andern Zweck haben, scheint es nicht viel anders. Und selbst die kleine Verbesserung, wenn der Horizont auf beiden Seiten Eintheilungen hat, scheint nicht das Patent für das ganze Instrument aufzuheben, da hierzu doch sehr wesentliche Verbesserungen nöthig seyn müssen.

- 4) Das Zenithalrohr, den Loxodromographen, wollen wir gern als Hrn. Müller's Erfindung, und wie er selbst sie nennt, als *„useful additions“* anerkennen. Wer sie gebrauchen will, mag sie nach den Abmessungen des Gartheschen Kosmogloben sich machen lassen, und wir würden kein Bedenken tragen, Hrn. Major Müller das Recht zuzugestehn, daß er sich auf diese kleinen Zugaben zu dem Gartheschen Instrumente ein Patent, um sie an dem Gartheschen Kosmoglobus anzubringen, kann ertheilen lassen; doch würde die Regierung, welche ein Patent darauf zu ertheilen geneigt wäre, ganz gewiß sie in einer vollkommeneren Form verlangen, als sie uns jetzt vorliegen.
- 5) Die Nonien und Mikroskope, von denen Hr. Major Müller in der Beschreibung spricht, halten wir für eine ganz nutzlose Zugabe, mehr bestimmt, um reichen Nichtkennern ein elegant aussehendes, theures Instrument in die Hände oder in die Prachtzimmer ihrer Bibliothek zu geben, als bestimmt zum Nutzen. Angaben, bei denen der Nonius nützlich würde, wird schwerlich Jemand am Kosmoglobus ablesen, und dazu ist er auch gar nicht bestimmt.

„Urkundlich ist dieses Gutachten mit Unserm der Facultät Insiegel bedruckt worden.

(L. S.) Dechant, Senior und übrige Professores der philosophischen Facultät i. d. Universität Leipzig.

Dr. Christian Daniel Beck,

ordentl. Professor der alten Literatur, königl. sächsisch. wirkl. Hofrath, Comthur des königl. sächs. Verdienst Ordens, & Z.

Dechant der philosophischen Facultät,

Ausgefertigt den 25. Aug. 1831.

Durch die Verbindung mit dem Geh.-Rath v. Cotta zu München und später mit dessen Erben, ist es möglich geworden eine Fabrik zu gründen, wo diese Instrumente mit Genauigkeit ausgeführt und zu dem enorm billigen Preise von Acht Friedrichsd'or und 2 Rthlr. für Einballage, einschliesslich der dazu gehörigen Beschreibung und Gebrauchs-Anweisung, verabreicht werden können. Die ganz vorzüglich gut gearbeiteten Glaskugeln von hinreichender Glasdicke werden von den Hrn Gebr. Schrader zu Gernheim bei Preuss. Minden geliefert, und ich sage diesen Herren für ihre Bereitwilligkeit, mit welcher sie Schwierigkeit mancher Art besiegt, und meinen Wünschen entsprochen haben, hier öffentlich den grössten Dank.

*XII. Beobachtung eines ungewöhnlichen Hagel-  
falls; vom Apotheker Müller, zu Medebach,  
im Regierungsbezirk Arensberg.*

*(Briefliche Mittheilung.)*

Am 11. August 1837, Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr, bemerkte man nach einem vorübergehenden starken Nord-West-Winde ein sehr starkes Gewitter, welches sich über einigen Dörfern des hier nahegelegenen Fürstenthums Waldeck entlud, wobei sich zugleich bei einem merkwürdigen Krachen in der Luft ein solcher Hagelschlag einstellte, der seines Gleichen sucht. Es war das Werk einer halben Stunde, in welcher auf einer Länge von drei Stunden und einer halben Stunde Breite durch Sturm und Hagel, dessen kleinste Stücke 12 Loth und die grössten 22 Unzen wogen, alles Getraide vernichtet, Bäume entwurzelt und selbst sehr vieles Vieh getödtet wurde. Der Hagel war so hart, daß er fast jedem Drucke

widerstand. Es herrschten zwei auffallende Formen dabei vor: die eine in größerer Menge vorhandene Form war die einer zusammengeballten Faust, deren Enden, bei Eröffnung der Masse, noch einen runden Zapfen zur Unterlage hatten. Die zweite war eine spiralförmig gewundene Form, welche indess nicht ganz platt, sondern in die convexe überging. Noch jetzt gräbt man solche Hagelstücke in einer Tiefe von 2 Fuß unter der Erde aus, die nicht viel von dem eigenthümlichen ursprünglichen Ansehn verloren haben. Ganz eigenthümlich verhält sich noch das Viehfutter, welches einen entschiedenen sehr starken Schwefelgeruch besitzt und vom Vieh gar nicht genossen wird, so wie auch die Kartoffeln, welche von einer solchen Härte sind, daß sie auch bei noch so lange fortgesetztem Kochen nicht weich werden.

Medebach, d. 30. Octbr. 1837.

---

XIII. *Bericht über die Erderschütterung vom 14. März 1837; von Hrn. Werdmüller von Elgg, zu Pitten, bei Wienerisch-Neustadt.*

---

Am 14. Mai 1837 Nachmittags saß ich im Laboratorium der Pittner Papierfabrik vor meinem Pulte, den Stuhl nach rückwärts geneigt und an einen Tisch gelehnt, als ich eine heftige, mich erst rückwärts neigende, dann wieder in die alte Stellung bringende Bewegung wahrnahm, welche ich gleich vielen andern einem Schwindelanfall, oder dem Spiele meiner gerade mit einem ähnlichen Gegenstande beschäftigten Phantasie — ich hatte eben die interessante Beschreibung des Moorbruchs in der Grafschaft Antrim in Irland, in dem letzten Hefte von Pogendorff's Annalen Jahrgang 1836 gelesen — zugeschrieben hätte, wenn ich nicht in demselben Augenblick durch ein Krachen der hölzernen Gestelle, das heftige

Klirren der an einander schlagenden Standgläser, der Reibschalen und Mörser, und das stellenweise herabrieseln des Mauerauwurfs zum Umschauen veranlaßt worden wäre, wo mir dann mehrere noch stark schwankende Gläser in die Augen fielen, die mich zur Ueberzeugung brachten, daß wirklich eine Erderschütterung statt gefunden habe, und somit, um den Folgen einer etwaigen Wiederholung zu entgehn, zu schleunigster Entweichung ins Freie bewogen.

Eine solche Fortsetzung des Erdbebens erfolgte nun leider nicht; um so häufiger liefen die Berichte von allen Seiten ein, welche ich nun, nebst eignen Beobachtungen, auszugsweise hier anführen werde.

Der Erdstoß schien mir eine Schwankung zu seyn, während andere Personen übereinstimmend ihn einer wellenförmigen Erhebung und nachherigen Senkung des Erdbodens verglichen, welche von WSW. nach ONO. gieng. Andere Personen wollen ein Schütteln, Zittern bemerkt haben, welches das Product aus einem einfachen Stöße in das Außerordentliche und Ueberraschende desselben gewesen zu seyn scheint. Schaden wurde hier durchaus nicht angerichtet, und es ist mir hier kein einziges Gebäude bekannt, welches etwa Risse bekommen hätte, obgleich die Erschütterung so heftig war, daß Gemälde hin und her schaukelten, und eine Wiege in starke Schwingungen gerieth. Auch im Freien fühlten Viele den Stoß.

Hefiger war das Erdbeben, vermuthlich wegen geologischer Verhältnisse, in Murzzuschlag, Reichenau, Schottwien und dem Bergschloß Wartenstein zu fühlen. An diesen Orten wurde derselbe einer großen Zahl von Rauchfängen verderblich; Spiegel fielen von den Wänden; an manchen Orten fiel sämmtliche Stuckaturarbeit herab, und wenig Häuser blieben von Rissen, worunter sehr bedenkliche, verschont. In Murzzuschlag brach in Folge eines solchen von Holzwerk begleiteten Rauchsaugeneinsturzes Feuer aus, wodurch ein Haus eingeäschert

wurde. Von der außer Schottwien, gegen den Semmering zu, rechter Hand, befindlichen Steinriese stürzten mächtige Felsblöcke von vielen Centnern herunter, und manche kolossale, seit Jahrhunderten auf dem Gipfel eines Felsens der Wuth des Sturms trotzende, Tanne und Fichte mußte der Erschütterung weichen, und ihren erhabenen Standpunkt verlassen. Doch wurde, so weit meine Nachrichten reichen, auch hier Niemand beschädigt.

Uebrigens hörten mehrere, und zwar die glaubwürdigsten Personen, während des Stosses ein dumpfes unterirdisches, donnerähnliches Getöse, welches mir, wegen der Nähe geräuschvoller Maschinen, entging. C. v. Littrow will diese Erscheinung aus dem Krachen des Dachgebälkes erklären; allein, obgleich er Gründe für diese Erklärung aufstellt, so wird sie dadurch widerlegt, daß viele Personen auch im Freien, und zwar von allen Gebäuden entfernt, dieses Getöse hörten.

Die Dauer des Stosses oder der Schwankung möchte ich wohl 1 höchstens 2 Sekunden setzen. Sie fand um 4<sup>h</sup> 45' mittlere Pitterzeit statt (um 4<sup>h</sup> 33.8' Berlin. Zeit), wobei ich jedoch für einen Fehler von 2 bis 3 Minuten nicht garantiren möchte, weil ich nicht gleich nach der Uhr sah, und folglich die seit dem Stofs verstrichene Zeit schätzen mußte; und dann, weil ich wegen ungünstiger Witterung die Correction der Uhr erst einige Tage darnach bestimmen konnte.

Die Windfahne des benachbarten 440 W. Fuß über dem Thale erhabenen Schloßsberges zeigte SSO.-Wind; die hochgehenden Wolken indess kamen von SW. Der Himmel war theilweise umwölkt, und überzog sich späterhin ganz. Das Wetter war mild und ruhig. Der Barometerstand nicht auffallend, 738 Millim. und im Sinken begriffen. Thermometer  $+ 11\frac{1}{4}^{\circ}\text{C}$ .

Beigehend noch eine interessante Handschrift. Das Individuum, welches die Beiträge der kleinern Hadersammler in Empfang nimmt, und ihnen Scheine ausstellt,

auf welche hin sie die Bezahlung erhalten, war eben mit der Anfertigung eines solchen beschäftigt, als plötzlich seine sonst nicht an kalligraphische Zierlichkeit gewöhnte Hand das so eben gemachte Kreuzerzeichen mit ganz ungewöhnlichen Ornamenten zu des Schreibers nicht geringem Schrecken und Verwunderung zu verzieren begann. Diese Züge sind daher ein sichtbares und somit gewissermaassen interessantes Andenken an dieses zwar unschädliche aber doch ziemlich starke Erdbeben.

Anszüge aus der Wiener Zeitung.

Vom 15. März 1837. Am 14. d. M. um 4<sup>h</sup> 45' (4<sup>h</sup> 33,1' Berl. Zeit) fanden 2 Erdstöße, jeder von 4 Schwingungen statt. Dauer 2 — 3". Richtung von NO. nach SW. C. v. Littrow.

Vom 18. März. Die Brünner Zeitung sagt: Am 14. d. M. um 4<sup>h</sup> 43' mittlere Brünner Zeit (4<sup>h</sup> 30,2' Berl. Z.) fand ein doppelter Erdstoss statt. Richtung von SO. — Barometer 28" 5,5" Wiener Maafs. — Thermometer + 9°,5 R. — Wind SO. — Heiterer Himmel. — Dauer der Stöße 3". — Auf dem Felsstocke des Petersberges sollen die Erschütterungen am stärksten empfunden worden seyn. Auch hier giebt die Mehrzahl der Beobachter die Erschütterung als vertikal aufsteigend an, die Minderzahl als schwingend. Von Schaden ist hier nicht die Rede.

Vom 20. März. Der Grätzer Zeitung zufolge wurde am 14. d. M. um 4<sup>h</sup> 29' (?) (4<sup>h</sup> 20,9' B. Z.) hier eine ziemlich starke, 6" dauernde, von NO. kommende Erschütterung beobachtet, welche nicht den mindesten Schaden anrichtete. Baromet. unverrückt 27" 7" Par. M. — Therm. + 9° R. — Himmel leicht bewölkt.

Vom 21. März. Die Linzer Zeitung berichtet aus Linz: Am 14. d. M. um 4<sup>h</sup> 28' (?) (4<sup>h</sup> 24,5 B. Z.) erfolgte bei + 10° R. ein 6" dauernder, nach NO. gehender, so starker Erdstoss, daß sogar Meubeln von der

Stelle



Stelle gerückt worden und eine Stockuhr stehen blieb. Das Barometer zeigte nichts Ungewöhnliches.

Aus Kremsmünster. Um 4<sup>h</sup> 25' (4<sup>h</sup> 22' B. Z.) wurde hier eine leichte, nahe von Süd nach Nord gehende Erdschütterung verspürt, welche etwa 3 bis 4 Sec. dauerte. Weder Barometer noch Thermometer boten außergewöhnliche Erscheinungen dar, und die Uhren der Sternwarte wurden nicht merklich gestört.

Vom 22. März. Nach einer genaueren Beobachtung war die Zeit des Erdbebens 4<sup>h</sup> 43' (4<sup>h</sup> 31',1 B. Z.). Einige Secunden später folgte eine zweite Erschütterung. — Dauer: 2' bis 3". — Richtung von NO. nach SW. — Weder Witterung noch Barometer, noch Thermometer zeigten etwas Außergewöhnliches. Von den beiden, vor und nach dem Erdbeben mit dem Himmel verglichenen Uhren varirte die eine um 1", die andere um 3", was bei ihrer Vortrefflichkeit sehr beträchtlich ist. — In einigen seltenen Fällen wurde das Stehenbleiben von Stockuhren beobachtet; Meubeln schwankten u. s. f. — Die Erschütterung wurde an verschiedenen Orten sehr ungleich verspürt. — Da und dort sollen in Folge des Erdstoßes sehr auffällige Häuser eingestürzt seyn, oder beträchtlichen Schaden erlitten haben. Dieses Erdbeben ist seit jenem von 1808 das stärkste. C. v. Littrow.

Vom 23. März. Die Prefsburger Zeitung berichtet: Am 14. d. M. wurde Prefsburg von einem zweimaligen Erdbeben heimgesucht. — Das erste um 4<sup>h</sup> 53' (4<sup>h</sup> 38',2 B. Z.) war eine ziemlich starke wellenförmige Bewegung, und mochte 3 bis 4 Sec. gedauert haben. — Das zweite 4<sup>h</sup> 58' (4<sup>h</sup> 43',2 B. Z.) war bedeutend stärker, da sich Kästen und Tische bewegten, Thüren klapperten, ja selbst in einigen Häusern die Thüren von Hängkästen aufsprangen u. s. f. Einige wollen unterirdisches Rollen gehört haben. Diese Erschütterung dauerte 8 bis 9 Sec. (?) und wurde nicht überall gleich stark verspürt. Der Stoß schien von NNW. zu kommen.

Am 15. beobachtete man hier von 7<sup>h</sup> 30' bis 9<sup>h</sup> ein starkes Nordlicht.

*Vom 28. März.* Die Prager Zeitung enthält von Seite der Königl. Sternwarte folgende Mittheilung: Am 14. d. M. zwischen 4 und 5 Uhr wurden hier Erdstöße verspürt. Nach der besonderen Beobachtung einer Person waren es fünf von Osten kommende Stöße, welche etwa 20' dauerten und auf 4<sup>h</sup> 42,5 Wiener Z. (4<sup>h</sup> 30,3 B. Z.) fielen. Auf der Sternwarte verspürte man gar keine Erschütterung, und die Uhren zeigten keine Unregelmäßigkeit im Gange.

In Altbunzlau wurde das Erdbeben ebenfalls im Decanalgebäude verspürt, wo die Hauglocken läuteten.

Im Stift Hohenfurth wurde die Erderschütterung ebenfalls, und zwar von Norden kommend, sehr heftig verspürt.

Nirgends wurde am Barometerstande, am Thermometerstande, oder an den Witterungsaspecten etwas auffallendes wahrgenommen.

*Vom 29. März.* Die Grätzer Zeitung vom 25. d. M. erwähnt noch mehrerer Oerter, in welchen das Erdbeben vom 14. verspürt wurde, und schließt: In Mürtzuschlag war die Erschütterung am heftigsten, so dals in diesem Orte viele Häuser durch Risse in den Mauern mehr oder minder beschädigt worden. Bilder stürzten von den Wänden herab, Gläser und Geschirre zerbrachen, Glocken zehlugen an, Mühlen wurden in ihrem Laufe gehemmt, Uhren blieben stehen, und viele Gemächer wurden unbewohnbar. Nachts um 11 Uhr fühlte man hier, und zwar hier allein, abermals eine kleine Erschütterung.

Es scheint, dals in dieser Gegend der Centralpunkt der Erschütterung gewesen sey, welche sich zwar auch weiter nordöstlich verbreitet hat, jedoch südöstlich von Grätz nicht mehr wirksam gewesen zu seyn scheint, da von den südlicheren Gegenden keine Anzeigen eingingen.

# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. -- Januar 1837.

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph			Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.		9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1	40.12	40.30	40.11	—	2.6	—	—	4.2	—	NW.	N.	NW.	bd.	bd.	bd.
2	35.91	35.10	34.61	—	1.5	—	—	1.8	—	W.	W.	NW.	bd.	bd.	bd.
3	34.76	34.15	34.10	—	0.2	—	—	0.8	—	NW.	NW.	NW.	v.	bd.	bd.
4	37.52	36.26	36.91	—	0.9	—	—	2.4	—	NW.	NW.	NW.	ht. ht.	ht. ht.	ht. ht.
5	39.37	36.81	36.33	—	1.2	—	—	1.3	—	WSW.	WSW.	WSW.	bd.	bd.	bd.
6	35.73	35.16	34.28	—	3.7	—	—	0.2	—	SW.	SW.	SW.	bd.	v.	bd.
7	31.64	31.61	31.85	—	1.1	—	—	2.8	—	SW.	SW.	SW.	bd. r.	bd.	ht.
8	35.67	36.84	37.34	—	2.3	—	—	1.7	—	NW.	NW.	NW.	v.	bd.	bd.
9	39.44	39.11	38.18	—	1.3	—	—	2.0	—	W.	W.	W.	bd.	bd.	bd.
10	34.92	34.19	32.99	—	3.3	—	—	2.2	—	SW.	W.	SW.	bd.	bd.	bd.
11	33.24	33.36	34.40	—	0.9	—	—	0.6	—	NW.	NW.	NW.	ht. ht.	bd. Sn.	ht.
12	37.11	37.42	37.63	—	2.8	—	—	2.8	—	W.	W.	W.	ht. ht.	ht. ht.	ht. ht.
13	33.41	31.58	30.45	—	0.5	—	—	2.7	—	SSW.	S.	SSW.	Sn.	bd.	bd.
14	29.43	28.90	29.36	—	2.6	—	—	2.3	—	SW.	SW.	SW.	v.	ht.	bd.
15	36.35	37.32	37.57	—	2.4	—	—	2.4	—	NO.	NO.	NO.	bd.	bd.	bd.
16	39.68	39.59	39.33	—	0.5	—	—	2.0	—	NW.	W.	W.	bd.	bd.	ht.
17	36.15	36.19	36.19	—	1.8	—	—	0.3	—	W.	W.	W.	bd. t.	bd. t.	bd. t.
18	37.85	37.55	37.41	—	0.6	—	—	1.6	—	W.	W.	W.	bd. t.	bd. t.	bd. t.
19	37.04	36.71	36.27	—	0.7	—	—	1.0	—	W.	W.	W.	bd. t.	bd. t.	bd. t.
20	34.72	34.48	34.19	—	0.7	—	—	0.4	—	O.	O.	O.	bd.	bd.	bd.

# (Januar 1837.)

Tag	Barometer bei 0° R.			Thermograph		Thermometer R.			W i n d.			W e t t e r.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21.	35.39	35.49	35.43	0.0	1.4	0.7	0.7	0.8	SSO.	SW.	SW.	bd.	v.	ht.
22.	35.41	35.36	34.58	- 0.6	2.0	0.2	1.6	1.8	SSV.	SW.	SW.	r.	bd.	bd.
23.	32.69	32.62	32.96	+ 0.6	5.1	2.7	2.7	5.0	SSV.	SW.	SW.	bd. r.	bd. n.	bd.
24.	32.81	32.87	32.95	- 3.4	5.5	4.9	5.2	5.3	SSV.	SW.	SW.	bd.	bd. r.	ht.
25.	33.93	34.17	34.10	+ 4.4	3.5	4.4	3.0	2.4	W.	NW.	N.	bd.	bd.	bd.
26.	34.72	34.85	34.80	+ 1.8	3.0	2.4	2.5	2.2	N.	N.	N.	bd.	bd.	bd.
27.	35.12	35.20	35.28	+ 0.2	1.9	1.5	1.4	0.5	NO.	NO.	NO.	bd.	bd.	ht.
28.	37.67	37.99	38.55	- 3.6	3.0	3.6	3.6	3.5	O.	O.	O.	bd. Sn.	bd.	bd.
29.	38.86	38.83	38.80	- 7.1	4.8	6.5	5.4	5.3	O.	O.	O.	bd.	bd.	bd.
30.	39.19	39.31	39.30	- 5.2	0.0	2.9	1.7	0.6	SO.	SO.	SO.	bd.	bd.	bd.
31.	39.77	39.57	39.56	- 3.8	0.5	1.4	1.2	0.7	SO.	SO.	SO.	v.	ht. ht.	ht. ht.
	36.528	36.383	36.132	- 1.63	1.44	0.22	1.03	1.11	Mittel vom 1. bis 10.					
	35.629	35.512	35.313	- 1.56	0.48	0.55	0.01	0.11	-	-	-	-	-	20.
	35.960	36.060	36.000	- 0.91	1.27	0.22	0.47	0.72	-	-	-	-	-	31.
	36.031	35.967	35.869	- 1.35	1.07	0.17	0.50	0.57	-	-	-	-	-	31.

Erläuterungen ht. ht. = ganz heiter; ht. = heiter; w. = wolkig; s. = vermehrt; bd. = bedeckt; t. = trübe; n. = neblig  
N. = Nebel, r. = regnet, R. = Regen, So = Schone; Rf. = Reif; St. = Sturm; st. = stürmisch; G. = Gewitter, G.w. = Gewitterwolken, H. = Hagel. — Höhe des Barometers über dem Stralsenpaster = 16.5 Par. Foss. — Angabe seines Standes, der Ueberschuß über 300 Par. Lin.

# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — Februar 1837.

Tag	Barometer bei 0° R			Thermograph.		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1.	39.80	39.86	39.59	—	2.6	—	4.0	—	SO.	SO.	SO.	bd.	bd.	bd.
2	40.61	40.81	40.75	—	2.2	—	3.9	—	SO.	SO.	SO.	bd.	bd.	bd.
3	42.38	41.90	41.82	—	1.5	—	3.0	—	N.	N.	NO.	bd.	bd.	bd.
4	44.19	44.21	43.94	—	2.6	—	3.3	—	NO.	NO.	NO.	bd.	bd.	ht.
5	44.68	44.76	44.42	—	4.1	—	7.6	—	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.
6	43.12	43.20	43.80	—	3.5	—	8.4	—	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.
7.	44.16	44.08	43.56	—	8.2	—	7.7	—	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.
8	42.75	42.61	42.39	—	0.7	—	5.7	—	S.	S.	SW.	ht.	ht.	ht.
9	42.17	42.08	41.67	—	1.4	—	5.4	—	S.	S.	S.	ht.	ht.	ht.
10.	41.17	40.80	40.23	—	4.0	—	0.0	—	S.	S.	S.	ht.	ht.	ht.
11	37.56	37.10	31.65	—	4.8	—	1.0	—	S.	S.	S.	v.	ht.	ht.
12	32.74	33.01	33.33	—	5.5	—	0.5	—	SW.	SW.	SW.	bd.	ht.	bd.
13	32.57	31.82	31.11	—	4.9	—	0.2	—	SO.	SO.	SO.	ht.	v.	bd.
14	31.73	31.72	36.61	—	6.2	—	3.2	—	SO.	SO.	SO.	v.	bd.	bd.
15	35.18	36.20	39.00	—	3.8	—	1.4	—	O.	NO.	NO.	bd.	bd.	bd.
16	40.43	40.47	43.90	—	4.8	—	1.3	—	SW.	SW.	SW.	ht.	ht.	ht.
17	40.63	39.39	34.41	—	7.8	—	3.4	—	SW.	SW.	SW.	ht.	v.	bd.
18	40.86	40.69	40.03	—	3.6	—	1.4	—	SW.	S.	S.	ht.	bd.	bd.
19	35.41	35.20	35.13	—	6.0	—	1.3	—	SW.	SW.	SW.	ht.	ht.	bd.
20	28.64	28.33	29.18	—	8.3	—	6.1	—	SW.	SW.	W.	bd.	bd.	bd.

# (Februar 1837.)

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21.	35,42	34,94	34,04	1,1	6,0	+	2,3	+	SW.	SW.	SSW.	ht.	ht.	ht.
22.	32,53	32,93	33,06	1,4	4,4	+	2,7	+	W.	W.	W.	ht.	ht.	ht.
23.	34,44	34,29	33,53	0,8	5,2	+	2,8	+	WSW.	WSW.	W.	ht.	ht.	bd.
24.	27,11	26,42	25,47	1,0	4,9	+	2,2	+	SW.	SW.	SW.	v.	bd.	bd.
25.	30,24	30,47	30,58	0,3	0,8	+	0,3	+	NW.	W.	W.	bd.	Sn	bd.
26.	34,17	34,72	34,94	0,0	1,4	+	0,5	+	WNW.	W.	W.	bd.	bd.	bd.
27.	35,85	36,05	35,96	1,2	1,1	-	0,4	-	W.	W.	W.	bd.	bd.	bd.
28.	37,64	36,05	36,22	2,1	0,8	-	1,4	-	SW.	SW.	SW.	v.	ht.	ht.
	42,731	42,641	42,317	5,59	1,26	-	4,90	-	Mittel vom 1. bis 10.					
	35,545	35,103	35,308	0,33	5,57	+	1,74	+	-	-	-	-	11.	30.
	33,425	33,495	33,225	0,16	3,07	+	1,12	+	-	-	-	-	21.	28.
	37,508	37,440	37,218	1,80	2,42	-	0,81	-	-	-	-	-	1.	28.



# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — März 1837.

Tag	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer R.			Wind.			Witter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1	38,47	38,31	38,14	—	0,1	—	0,4	—	NO.	NO.	NO.	bd	Sn.	Sn.
2	37,65	37,60	37,48	—	2,3	—	0,9	—	W.	NO.	NO.	Sn.	Sn.	bd.
3	37,99	37,48	36,35	—	1,8	—	1,1	—	N.	N.	N.	v.	bd.	bd.
4	32,07	32,35	33,18	—	2,3	—	0,4	—	N.	N.	N.	bd.	bd.	bd.
5	34,61	34,58	34,19	—	6,2	—	4,2	—	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.
6	32,71	33,87	34,55	—	5,3	—	4,6	—	N.	N.	N.	ht.	bd.	ht.
7	35,82	35,98	35,87	—	5,0	—	2,4	—	W.	W.	W.	v.	bd.	bd.
8	37,94	37,74	37,65	—	6,3	—	2,3	—	SW.	SW.	W.	bd.	bd.	bd.
9	35,08	35,10	35,14	—	0,6	—	2,3	—	NW.	NW.	W.	bd.	bd.	bd.
10	34,43	33,39	34,19	—	2,0	—	3,8	—	W.	W.	SW.	bd.	ht.	bd.
11	31,91	31,93	31,84	—	8,0	—	3,3	—	SW.	SW.	SW.	ht.	ht.	ht.
12	32,26	32,27	32,23	—	8,7	—	2,8	—	SSO.	SSO.	SSO.	ht.	ht.	v.
13	33,31	33,82	33,90	—	8,9	—	3,5	—	NO.	NO.	NO.	ht.	ht.	v.
14	38,52	39,24	39,48	—	3,9	—	1,8	—	NO.	NO.	NO.	bd.	bd.	bd.
15	40,23	39,91	39,28	—	1,4	—	1,8	—	O.	NO.	ONO.	bd.	ht.	ht.
16	37,04	36,75	36,61	—	8,8	—	3,7	—	SO.	SO.	S.	ht.	v.	bd.
17	37,47	37,77	37,65	—	5,0	—	2,2	—	W.	NW.	NW.	bd.	bd.	ht.
18	39,13	39,10	38,64	—	4,6	—	1,0	—	N.	N.	N.	ht.	ht.	ht.
19	35,95	34,78	33,34	—	3,5	—	0,2	—	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	bd.
20	30,70	30,43	29,13	—	1,0	—	2,8	—	NW.	NW.	NW.	v.	Sn.	bd.

(März 1837.)

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer R.			VV ind.			VV e t e r.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min	Max	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21	33.41	33.30	32.69	- 4.5	- 0.1	- 3.8	- 1.6	- 0.9	N.	N.	NO.	bd.	ht.	bd.
22	32.93	33.16	33.19	- 3.5	+ 0.5	- 1.6	- 0.0	- 0.4	NO.	NO.	NO.	bd.	bd.	v.
23	33.76	33.60	33.42	- 6.3	- 1.2	- 3.8	- 2.2	- 1.8	NW.	NW.	VV.	ht.	bd.	ht.
24	33.18	33.01	32.80	- 6.8	0.0	- 4.0	- 1.3	- 0.5	W.	W.	SW.	ht.	v.	ht.
25	33.47	33.29	33.22	- 5.0	+ 2.6	- 2.0	+ 0.6	+ 2.2	SW.	SW.	SW.	ht.	ht.	ht.
26	33.98	34.00	33.77	- 0.8	+ 3.6	+ 0.3	+ 2.0	+ 2.9	SW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
27	33.81	33.79	34.05	- 0.1	+ 3.6	+ 2.4	+ 3.4	+ 2.1	VNW.	W.	W.	bd.	bd.	Sn.
28	37.47	37.13	36.62	- 2.7	+ 2.5	- 1.3	+ 1.8	+ 2.2	SW.	VV.	VV.	ht.	ht.	bd.
29	35.64	35.58	35.00	+ 0.2	+ 6.5	+ 2.6	+ 4.8	+ 6.0	SW.	SW.	SW.	v.	ht.	ht.
30	32.72	33.13	33.28	+ 1.6	+ 4.5	+ 3.9	+ 3.7	+ 4.5	SW.	VV.	VV.	bd.	bd.	ht.
31.	34.94	35.17	35.25	- 1.2	+ 2.3	+ 0.3	+ 1.2	+ 1.1	N.	N.	N.	ht.	ht.	ht.
Mittel vom 1. bis 10.														
11 - 20														
21 - 31.														
1. - 31.														
35.677	35.610	35.674	- 2.65	+ 1.82	- 1.05	+ 0.69	+ 1.19							
35.652	35.600	35.310	+ 0.28	+ 5.58	+ 1.71	+ 4.02	+ 4.97							
34.119	34.105	33.935	- 2.65	+ 2.23	- 0.61	+ 1.13	+ 1.61							
35.1161	35.083	34.910	- 1.71	+ 3.18	- 0.01	+ 1.92	+ 2.56							

# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — April 1837.

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.			Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.		9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1.	36,15	35,99	35,44	— 2,8	— 4,3	+	— 0,1	1,7	3,9	NW.	NW.	NW.	v.	v.	v.
2.	34,04	33,97	33,82	— 0,5	4,6	+	— 1,9	2,8	4,1	W.	W.	W.	bd.	bd.	bd.
3.	35,80	35,62	34,82	— 0,8	4,4	+	— 1,0	2,8	3,9	NNO.	SW.	W.	bd.	v.	bd.
4.	31,64	31,63	31,51	— 1,4	8,1	+	— 5,2	6,7	7,7	SW.	NW.	NW.	v.	bd.	bd.
5.	33,40	33,34	33,28	— 0,8	4,9	+	— 2,3	4,7	4,7	NW.	NW.	NW.	v.	bd.	v.
6.	32,54	32,70	32,66	— 0,0	2,2	+	— 0,7	2,0	1,8	NO.	NO.	NO.	bd. Sn.	bd.	bd.
7.	31,97	31,55	31,61	— 0,3	0,3	+	— 0,3	0,1	0,2	NO.	NO.	NO.	bd. r.	bd.	bd. Sn.
8.	34,39	34,79	34,91	— 0,5	0,2	+	— 0,5	0,0	0,4	NO.	NO.	NO.	bd.	bd.	bd.
9.	34,13	34,12	34,13	— 2,2	2,3	+	— 0,3	1,2	1,8	NO.	NO.	NO.	bd.	bd.	bd.
10.	36,18	36,15	35,91	— 4,8	2,8	+	— 1,8	1,4	1,8	SSO.	SSO.	O.	bd.	v.	bd.
11.	34,83	34,65	34,31	— 0,8	4,0	+	— 1,7	3,4	3,2	NO.	NO.	NW.	bd.	v.	bd.
12.	34,21	34,38	34,70	— 0,2	3,3	+	— 1,3	2,2	2,8	NO.	NO.	O.	bd.	bd.	bd.
13.	33,07	32,73	33,70	— 0,5	1,9	+	— 0,3	1,5	1,8	NW.	NW.	W.	bd. Sn.	bd.	bd. Sn.
14.	34,68	34,60	34,71	— 0,5	5,1	+	— 1,8	4,7	4,5	NW.	NW.	W.	bd.	bd.	bd.
15.	34,52	34,36	33,96	— 1,4	6,3	+	— 2,3	4,5	5,9	NW.	NW.	W.	bd.	bd.	bd.
16.	30,51	29,83	30,25	— 2,0	13,8	+	— 6,7	11,3	13,3	O.	SO.	SO.	bd.	bd.	bd.
17.	29,39	30,27	32,05	— 7,7	13,2	+	— 10,0	12,3	13,0	SO.	SO.	SW.	bd.	v.	bd.
18.	31,09	30,91	33,21	— 2,7	6,5	+	— 3,8	5,6	6,3	NW.	NW.	NW.	bd. r.	bd.	bd.
19.	33,72	33,19	32,99	— 4,0	7,3	+	— 5,7	6,2	6,7	N.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
20.	33,61	33,95	33,95	— 4,6	6,8	+	— 5,2	5,7	6,7	NW.	W.	W.	bd.	bd. r.	bd.

(April 1837.)

Tag	Barometer bei 0° R.			Thermograph		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21	33,52	35,60	35,60	4,7	9,7	6,3	+ 8,5	+ 9,4	NW.	NW.	S.	ht.	ht.	ht.
22	33,62	35,40	34,99	3,7	13,8	0,2	+ 11,3	+ 13,3	SO.	SO.	SSO.	ht.	ht.	ht.
23	34,78	34,62	34,14	4,5	15,4	10,7	+ 13,6	+ 14,9	SO.	SO.	SSO.	ht.	ht.	ht.
24	34,39	34,15	33,99	5,9	13,4	10,6	+ 12,2	+ 12,5	O.	O.	SO.	v. r.	v. r.	v.
25	35,24	35,21	35,17	6,1	15,3	10,2	+ 14,0	+ 15,2	O.	O.	O.	ht.	ht.	ht.
26	36,60	36,43	36,21	5,2	15,1	11,2	+ 13,5	+ 14,8	N.	SW.	VV.	ht.	ht.	ht.
27	35,00	35,11	34,55	7,6	15,0	11,3	+ 14,6	+ 14,7	S.	S.	S.	v.	v.	bd.
28	34,67	34,31	33,51	6,6	12,4	8,3	+ 10,8	+ 12,3	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	v.
29	33,47	33,34	32,51	7,6	13,4	6,7	+ 11,9	+ 12,5	O.	SO.	SO.	bd.	bd.	v.
30	31,94	32,17	32,06	8,2	12,5	10,2	+ 12,7	+ 13,0	S.	SW.	SW.	bd.	bd.	bd.
Mittel vom 1. bis 10. 11. 20. 21. 30.														
	34,024	33,986	33,809	0,97	3,41	0,51	+ 2,34	+ 2,93						
	33,123	33,103	33,212	2,18	6,82	3,87	+ 5,71	+ 6,12						
	31,723	31,631	31,334	6,01	13,70	9,67	+ 12,33	+ 13,32						
	33,957	33,908	33,704	2,11	7,96	4,76	+ 6,80	+ 7,56						

# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — Mai 1837.

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 I.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	8 U.	12 U.	3 U.
1	34.89	35.16	35.02	+ 8.1	+ 14.9	+ 10.3	+ 12.7	+ 14.6	W.	W.	W.	v.	bt.	v.
2	35.51	35.19	35.12	+ 7.7	+ 14.6	+ 11.7	+ 13.0	+ 14.5	W.	W.	W.	bt.	bw.	ht.
3	35.30	34.86	34.31	+ 7.4	+ 13.2	+ 9.8	+ 11.7	+ 12.3	NNW.	N.	N.	bt.	ht.	ht.
4	31.96	31.60	32.11	+ 6.5	+ 11.2	+ 8.3	+ 10.9	+ 9.1	O.	O.	O.	bd. r.	bd. r.	bd. r.
5	33.40	33.54	33.62	+ 8.4	+ 9.9	+ 5.7	+ 7.8	+ 9.3	NNW.	NNW.	W.	bd.	bd.	ht.
6	34.08	34.45	34.46	+ 4.7	+ 9.9	+ 6.6	+ 7.7	+ 9.5	NW.	NW.	NW.	v.	v.	v.
7	35.37	35.39	35.27	+ 3.6	+ 7.9	+ 4.8	+ 6.3	+ 7.6	NW.	NW.	W.	bd.	bd.	bd.
8	35.38	35.23	34.77	+ 3.6	+ 10.5	+ 5.0	+ 7.3	+ 2.6	W.	W.	W.	bw.	v.	bd.
9	32.21	32.04	31.36	+ 5.4	+ 12.9	+ 9.3	+ 11.5	+ 11.9	SW.	SW.	SW.	v.	v.	bd.
10	30.40	30.18	30.92	+ 7.0	+ 6.6	+ 5.7	+ 5.7	+ 6.5	NNW.	NNW.	NNW.	bd.	bd.	R.
11	33.85	34.26	34.58	+ 1.5	+ 6.1	+ 3.5	+ 3.8	+ 6.1	NNW.	NNW.	NNW.	bd. R.	bd. r.	bd.
12	35.64	35.97	36.29	+ 3.8	+ 7.9	+ 5.2	+ 6.4	+ 7.6	NNW.	NNW.	NNW.	bd.	bd.	bd.
13	36.09	36.23	35.83	+ 4.9	+ 13.5	+ 9.2	+ 10.3	+ 12.7	NNW.	NNW.	NNW.	v.	bt.	bt.
14	35.04	34.63	34.48	+ 5.5	+ 14.3	+ 10.2	+ 13.3	+ 14.3	S.	O.	NNW.	bt.	bw.	bw.
15	35.22	35.19	35.37	+ 5.8	+ 11.5	+ 9.9	+ 13.3	+ 13.8	O.	O.	O.	bd.	bd.	bd.
16	35.76	35.69	35.17	+ 5.3	+ 14.6	+ 10.5	+ 13.8	+ 14.0	NO.	ONO.	N.	ht. ht.	ht.	ht.
17	35.09	34.84	34.31	+ 5.2	+ 12.5	+ 9.3	+ 11.3	+ 11.6	NNW.	NNW.	NNW.	ht. ht.	ht.	bd.
18	33.35	33.43	34.11	+ 6.0	+ 10.0	+ 6.3	+ 9.3	+ 8.7	N.	N.	N.	bd R.	v.	bd.
19	35.64	35.16	35.23	+ 4.2	+ 12.1	+ 9.1	+ 11.7	+ 11.6	NNW.	N.	NNW.	ht.	v.	v.
20	35.00	34.61	34.19	+ 2.3	+ 12.3	+ 7.3	+ 10.5	+ 11.3	N.	N.	N.	ht. ht.	ht.	v.

(Mai 1837.)

Tag	Barometer bei 0° R			Thermograph		Thermometer R.			W i n d.			W e t t e r.		
	9 U	12 U	3 U	Min	Max	9 U	12 U	3 U	9 U	12 U	3 U	9 U	12 U	3 U
21	32,55	32,19	31,49	+ 4,8	+ 11,0	+ 8,6	+ 9,3	+ 10,5	SO.	SO.	SV.	bd.	bd.	bd.
22	31,11	31,15	31,25	+ 5,2	+ 9,7	+ 9,8	+ 10,8	+ 8,0	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
23	33,91	33,64	33,62	+ 5,5	+ 12,7	+ 8,8	+ 10,3	+ 11,7	W.	W.	NW.	bd.	bd.	bd.
24	35,43	35,10	35,11	+ 5,5	+ 11,6	+ 10,3	+ 13,2	+ 14,2	SW.	NW.	NW.	ht.	ht.	bd.
25	34,43	34,19	33,93	+ 7,2	+ 12,1	+ 10,7	+ 11,3	+ 11,6	N.	N.	NO.	bd.	bd.	bd.
26	35,46	36,15	36,31	+ 7,3	+ 11,5	+ 8,3	+ 11,5	+ 14,4	SW.	W.	SW.	bd.	ht.	ht.
27	38,03	38,06	37,88	+ 7,5	+ 17,6	+ 14,5	+ 16,3	+ 17,2	SO.	S.	SO.	ht.	ht.	ht.
28	38,31	38,01	37,72	+ 9,3	+ 19,4	+ 15,6	+ 18,7	+ 19,2	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.
29	37,50	37,45	37,18	+ 10,3	+ 18,8	+ 15,8	+ 17,3	+ 19,5	O.	ONO.	NO.	ht.	ht.	ht.
30	36,76	36,37	35,75	+ 7,4	+ 18,3	+ 13,8	+ 15,9	+ 18,2	O.	NNO.	NNO.	ht.	ht.	ht.
31	36,51	36,48	35,88	+ 8,8	+ 14,0	+ 11,5	+ 12,8	+ 13,6	WNW	N	NW.	ht.	ht.	ht.
Mittel vom 1. bis 10.														
Mittel vom 11. - 20.														
Mittel vom 21. - 31.														

Erkältungen ht ht = ganz heiter; ht = heiter; w = wolkig; v. = vermischt; bd = bedeckt; t = trübe; n = neblig  
 N = Nebel, r = regnet, R = Regen; Sn = Schnee; Rf = Reif; St = Sturm; n = närmlich; G = Gewitter, Gw. = Gewitterwolken, H = Hagel. — Höhe des Barometers über dem Stralensplaner = 16,5  
 Par Fuß — Angabe eines Staates der Uebereinstimmung über 300 Par Lin.



# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — Juni 1837.

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer R.			Wind.				Wetter.			
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	3 U.
1.	33,88	33,93	33,11	7,2	+12,4	+9,3	+8,7	+12,2	SW.	NW.	NW.	bd. r.	bd. R.	v.	bd. R.	v.
2	31,47	31,94	32,17	8,3	+9,6	+6,0	+6,7	+9,2	W.	NW.	NW.	bd. R.	bd. R.	bd.	bd.	bd.
3	33,86	33,78	33,61	4,7	+10,2	+6,3	+8,2	+9,2	W.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.	bd.	bd.
4	31,42	35,09	35,40	6,1	+10,4	+8,7	+9,7	+8,3	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.	bd.	bd.
5	37,34	37,56	37,72	4,6	+11,9	+6,6	+10,2	+10,3	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.	bd.	bd.
6	36,90	36,42	35,88	4,7	+14,0	+10,2	+13,0	+13,4	NW.	NW.	NW.	v.	v.	v.	v.	v.
7	36,11	36,26	36,33	5,3	+9,8	+8,2	+9,7	+9,6	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.	bd.	bd.
8	37,55	37,12	37,12	3,5	+13,3	+9,5	+12,2	+12,2	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.	ht.	ht.
9	36,90	36,79	36,74	5,7	+15,9	+11,5	+11,3	+15,8	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.	ht.	ht.
10	35,69	35,05	34,64	7,1	+16,7	+14,2	+16,0	+14,3	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.	ht.	ht.
11	35,29	35,20	35,15	10,6	+18,7	+14,7	+17,8	+18,7	W.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.	ht.	ht.
12	35,90	35,77	36,57	10,0	+17,2	+15,3	+15,1	+16,8	W.	W.	W.	G. hw.	ht.	ht.	ht.	ht.
13	36,03	35,78	35,58	10,0	+17,2	+13,7	+16,5	+15,5	NW.	W.	W.	bd.	bd.	bd.	bd.	bd.
14	35,00	34,69	34,40	12,0	+21,3	+17,2	+19,9	+20,2	S.	S.	SSW.	ht.	ht.	ht.	ht.	ht.
15	35,37	35,63	35,67	13,3	+17,7	+13,8	+16,7	+17,3	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.	bd.	bd.
16	35,90	35,69	35,49	9,6	+18,4	+12,7	+14,8	+15,8	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.	ht.	ht.
17	36,12	35,84	35,43	7,9	+17,8	+14,3	+16,8	+17,7	SW.	SW.	SW.	ht.	ht.	ht.	ht.	ht.
18	35,16	35,16	34,93	11,4	+19,3	+14,7	+16,9	+18,4	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.	ht.	ht.
19	33,69	33,90	34,01	10,7	+14,8	+12,2	+14,5	+14,7	NW.	NW.	NW.	w.	w.	w.	w.	w.
20	37,17	37,30	37,13	10,3	+19,3	+13,2	+16,0	+18,7	N.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.	ht.	ht.

(Juni 1837.)

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.			Thermometer R.			W i n d.			W e t t e r.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Mitt.	Maz.		9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21.	37,57	37,58	37,34	+11,7	+20,5		+17,2	+19,1	+20,3	ONO.	O.	O.	ht. ht.	ht. ht.	ht. ht.
22.	38,10	38,40	38,26	+12,7	+22,7		+19,3	+21,5	+21,7	NO.	NO.	N.	ht. ht.	ht. ht.	ht. ht.
23.	39,16	38,95	38,71	+11,7	+21,5		+17,7	+20,1	+20,7	NO.	NO.	NO.	ht. ht.	ht. ht.	ht.
24.	38,40	37,96	37,14	+11,8	+21,5		+17,3	+20,4	+21,4	NO.	NO.	NO.	ht. ht.	ht. ht.	ht.
25.	36,32	35,89	35,53	+12,4	+23,9		+18,7	+21,9	+22,3	NO.	N.	N.	ht.	ht.	w.
26.	36,05	36,18	36,12	+12,3	+20,2		+18,3	+19,2	+19,1	VNW.	NNW.	NNW.	ht. ht.	ht.	w.
27.	38,15	38,16	38,02	+10,3	+18,3		+14,2	+16,9	+16,1	NW.	N.	N.	l. ht.	l. ht.	ht.
28.	38,16	37,92	37,48	+11,4	+19,7		+16,3	+19,1	+19,7	SO.	SO.	SO.	ht. ht.	ht. ht.	ht.
29.	37,35	37,19	36,97	+12,4	+21,5		+16,8	+19,3	+20,3	NO.	N.	N.	ht.	ht.	ht.
30.	35,80	35,82	35,82	+13,2	+20,9		+19,2	+20,2	+19,2	VSW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.
Mittel vom 1. bis 30.															
	35,412	35,424	35,312	+5,45	+12,42		+9,06	+10,87	+11,45						
	35,583	35,196	35,436	+10,58	+17,97		+14,18	+16,49	+17,38						
	37,345	37,405	37,169	+11,90	+21,07		+17,50	+19,67	+20,18						
	36,180	36,108	35,972	+9,34	+17,13		+13,59	+15,68	+16,34						

# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — Juli 1837.

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1	38,23	38,34	38,31	7,5	+20,6	+12,3	+15,6	+15,5	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.
2	38,97	37,59	37,03	7,6	+16,0	+13,6	+15,8	+15,3	NW.	NW.	NW.	ht.	v.	l. b.
3	36,77	36,10	36,32	7,6	+14,3	+10,0	+11,5	+12,7	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
4	36,37	36,01	35,70	5,9	+11,0	+10,5	+10,4	+10,0	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd. r.
5	36,62	36,71	36,60	5,2	+16,8	+11,7	+13,5	+13,2	NW.	NW.	NW.	w.	bd.	bd.
6	37,03	37,26	36,86	7,0	+17,4	+13,7	+15,8	+17,0	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.
7	37,06	37,00	36,90	9,2	+15,0	+10,5	+14,4	+14,7	NW.	NW.	NW.	bd.	ht.	v.
8	35,70	35,63	35,36	8,3	+13,1	+10,9	+11,2	+12,6	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
9	35,78	36,21	36,37	7,7	+15,0	+11,1	+14,3	+14,8	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	v.
10	36,76	36,43	35,67	7,8	+16,5	+14,1	+16,3	+17,7	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	v.
11	34,99	34,53	34,61	+12,3	+19,3	+16,3	+19,2	+19,0	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.
12	35,45	35,28	34,96	+16,2	+19,3	+13,6	+16,2	+18,0	O.	O.	O.	w.	ht.	ht.
13	34,19	34,26	34,02	+9,5	+19,2	+13,8	+16,6	+18,2	O.	O.	O.	ht.	ht.	ht.
14	34,83	34,95	35,09	+9,1	+18,0	+14,7	+17,2	+17,6	O.	O.	O.	ht.	ht.	v.
15	36,25	36,21	36,03	+11,6	+19,8	+18,9	+19,1	+19,7	O.	O.	O.	ht.	ht.	v.
16	35,33	34,78	34,36	+12,5	+21,1	+16,7	+20,2	+19,9	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	v.
17	34,56	34,81	34,84	+10,5	+16,0	+12,2	+15,0	+15,7	NW.	NW.	NW.	bd. r.	bd.	bd. r.
18	34,32	34,34	34,34	+11,0	+13,9	+11,3	+11,7	+12,3	NW.	NW.	NW.	bd. r.	bd.	bd.
19	35,24	34,26	34,50	+11,1	+17,5	+13,3	+15,7	+16,9	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	ht.
20	34,08	33,65	33,64	+12,3	+18,6	+15,3	+16,9	+14,3	O.	O.	O.	v.	bd. G. R.	bd. G. R.

(Juni 1837.)

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer H.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21.	37,57	37,58	37,34	+11,7	+20,5	+17,2	+19,1	+20,3	ONO.	O.	O.	ht. ht.	ht. ht.	ht. ht.
22.	38,40	38,40	38,26	+12,7	+22,7	+19,3	+21,5	+21,7	NO.	NO.	N.	ht. ht.	ht. ht.	ht. ht.
23.	38,16	38,95	38,71	+11,7	+21,5	+17,7	+20,1	+20,7	NO.	NO.	NO.	ht. ht.	ht. ht.	ht.
24.	38,40	37,96	37,44	+11,8	+21,5	+17,3	+20,4	+21,4	NO.	NO.	NO.	ht. ht.	ht. ht.	ht.
25.	36,32	35,89	35,53	+12,4	+23,9	+18,7	+21,9	+22,3	NO.	N.	N.	ht.	ht.	w.
26.	36,05	36,18	36,12	+12,3	+20,2	+18,3	+19,2	+19,1	VNW.	NNW.	NNW.	ht. ht.	ht.	w.
27.	38,15	38,16	38,02	+10,3	+18,3	+14,2	+16,9	+18,1	NW.	N.	N.	l. bz.	l. bz.	bd.
28.	38,16	37,92	37,48	+11,4	+19,7	+16,3	+18,1	+18,7	SO.	SO.	SO.	ht. ht.	ht. ht.	ht.
29.	37,35	37,19	36,97	+12,4	+21,5	+16,8	+19,3	+20,3	NO.	N.	N.	ht.	ht.	ht.
30.	35,89	35,83	35,82	+13,2	+20,9	+19,2	+20,2	+19,2	WSW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.
	35,12	35,124	35,312	+5,45	+12,42	+9,08	+10,87	+11,45	Mittel vom 1. bis 10.					
	35,583	35,196	35,136	+10,58	+17,97	+14,18	+16,49	+17,39	-	-	-	-	-	-
	37,345	37,105	37,169	+11,99	+21,07	+17,50	+19,67	+20,14	-	-	-	-	-	-
	36,180	36,108	35,972	+9,34	+17,16	+13,59	+15,68	+16,34	-	-	-	-	-	-

# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — Juli 1837.

Tag	Barometer bei 0° R.				Thermograph.			Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.		Min.	Mitt.		9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1.	38,23	38,34	38,34	+	7,5	+20,6		+12,3	+15,6	+15,5	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.
2.	38,97	37,59	37,03	+	7,5	+16,0		+13,6	+15,8	+15,3	NW.	NW.	NW.	ht. ht.	v.	l. b.
3.	36,77	36,49	36,32	+	7,6	+14,3		+10,0	+11,5	+12,7	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
4.	36,37	36,01	35,70	+	5,9	+11,0		+10,5	+10,4	+10,0	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd. r.
5.	36,62	36,71	36,60	+	5,2	+16,8		+11,7	+13,5	+15,2	NW.	NW.	NW.	w.	ht.	ht.
6.	37,03	37,26	36,86	+	7,0	+17,4		+13,7	+15,8	+17,0	NW.	NW.	NW.	ht. ht.	ht.	v.
7.	37,06	37,00	36,90	+	9,2	+15,0		+10,5	+14,1	+16,7	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
8.	35,76	35,63	35,36	+	8,3	+13,1		+10,9	+11,2	+12,6	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	v.
9.	35,78	36,21	36,37	+	7,7	+15,0		+11,1	+13,3	+14,8	NW.	NW.	N.	bd.	bd.	v.
10.	36,26	36,43	35,87	+	7,8	+18,5		+14,1	+16,3	+17,7	NW.	NW.	NW.	ht. ht.	ht.	v.
11.	34,99	34,56	34,61	+	12,2	+19,3		+16,3	+19,2	+19,0	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.
12.	35,45	35,28	34,96	+	10,2	+19,3		+13,8	+16,2	+18,0	O.	O.	O.	w.	ht.	ht.
13.	34,49	34,26	34,02	+	9,5	+19,2		+13,8	+16,6	+18,2	O.	O.	O.	ht.	ht.	v.
14.	34,63	34,95	35,09	+	9,1	+18,0		+14,7	+17,2	+17,6	O.	O.	O.	ht.	ht.	w.
15.	36,25	36,21	36,03	+	11,6	+19,5		+16,9	+19,1	+19,7	O.	O.	O.	ht.	ht.	v.
16.	35,33	34,78	34,36	+	12,5	+21,1		+16,7	+20,2	+19,9	SSO.	SSO.	SSO.	ht.	ht.	bd. r.
17.	34,96	34,81	34,64	+	10,5	+16,0		+12,2	+15,0	+15,7	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
18.	34,32	34,34	34,34	+	11,0	+17,9		+11,3	+11,7	+12,3	NW.	NW.	NW.	bd. r.	bd.	ht.
19.	33,24	34,26	34,80	+	11,1	+17,5		+13,3	+15,7	+16,9	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd. G. R.
20.	34,06	33,65	33,64	+	12,3	+18,6		+15,3	+16,9	+14,3	O.	O.	O.	v.	v.	

(Juli 1837.)

Tag.	Barometer bei 0°R.			Thermograph.		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21	33.72	34.03	34.14	+11.6	+17.9	+15.7	+16.9	+17.3	ONO.	O.	O.	ht.	bd.	ht.
22	35.46	35.37	35.30	+10.7	+19.7	+16.3	+18.7	+19.3	O.	O.	O.	v.	w.	bd.
23	36.06	35.85	35.54	+11.4	+20.0	+16.8	+19.7	+20.0	SO.	SW.	SW.	v.	w.	bd.
24	34.44	34.15	33.87	+12.4	+18.2	+15.8	+16.7	+17.2	SW.	W.	W.	v.	v.	w.
25	35.43	35.49	35.57	+10.6	+11.8	+12.2	+14.2	+14.3	NW.	NW.	WNW.	v.	v.	bd.
26	37.34	37.50	37.61	+7.6	+15.8	+13.1	+14.8	+15.4	NW.	NW.	NW.	ht.	v.	bd.
27	38.54	38.29	37.93	+6.9	+17.4	+14.4	+16.6	+17.3	SW.	O.	SO.	ht.	ht.	ht.
28	36.23	35.32	34.90	+11.2	+21.3	+17.0	+20.1	+20.7	SO.	SO.	S.	ht. ht.	ht. ht.	ht. ht.
29	33.95	33.59	33.07	+13.6	+22.5	+17.8	+20.5	+22.0	SW.	S.	SW.	ht. ht.	ht.	ht.
30	32.77	33.32	33.47	+14.8	+18.9	+17.0	+16.6	+16.8	SW.	SW.	SW.	v.	bd.	bd.
31	34.32	34.37	34.25	+11.7	+17.6	+14.8	+15.2	+17.3	W.	NW.	NW.	v.	hw.	ht.
	36.929	36.770	36.535	+7.37	+15.77	+11.84	+13.88	+14.53	Mittel vom 1. bis 10.					
	34.994	34.712	34.649	+11.00	+18.27	+11.43	+16.78	+17.16	-	-	-	-	-	-
	35.296	35.235	35.050	+11.32	+18.55	+15.54	+17.36	+17.98	-	-	-	-	-	-
	35.722	35.558	35.400	+9.94	+17.57	+13.99	+16.52	+16.60	-	-	-	-	-	-



# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — August 1837.

Tag	Barometer bei 0° R.			Thermograph			Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Mitt.		9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1	35.43	35.55	35.41	+11.4	+18.5		+14.6	+16.0	+17.5	NW.	W.	NW.	bd.	ht.	ht.
2	34.86	34.96	35.03	+10.7	+18.9		+16.1	+17.6	+18.3	SW.	S.	S.	v.	ht.	ht.
3	36.19	35.86	35.61	+12.0	+24.2		+15.2	+22.2	+23.7	SSW.	SW.	SSO.	ht.	ht.	ht.
4	36.16	36.28	35.97	+15.2	+21.6		+19.7	+22.8	+24.0	SO.	SO.	S.	ht.	ht.	ht.
5	37.32	37.39	37.59	+13.6	+19.0		+16.8	+18.3	+18.3	N.	N.	NO.	v.	ht.	ht.
6	37.70	37.50	37.31	+12.3	+19.8		+16.3	+18.4	+18.8	NO.	NO.	NO.	v.	bd.	bd.
7	39.48	39.19	39.62	+10.9	+16.9		+14.3	+16.6	+16.2	N.	N.	N.	v.	bd.	bd.
8	40.34	39.90	39.68	+8.3	+18.3		+13.3	+16.5	+16.0	NO.	NNO.	NO.	lw.	ht.	ht.
9	39.23	38.82	38.13	+10.3	+21.9		+15.5	+19.5	+21.7	NO.	O.	O.	v.	ht.	ht.
10	37.76	37.52	37.12	+12.9	+24.4		+18.7	+22.6	+24.3	SO.	O.	S.	ht.	ht.	ht.
11	36.77	36.52	36.24	+14.3	+25.0		+19.7	+23.1	+24.9	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.
12	35.53	35.39	35.12	+15.7	+26.2		+21.2	+24.7	+24.2	SO.	S.	SO.	ht.	ht.	ht.
13	37.19	37.60	37.56	+14.5	+22.7		+18.2	+20.4	+21.4	WNW.	N.	W.	ht.	ht.	ht.
14	38.66	38.61	38.47	+13.6	+21.9		+17.8	+20.6	+21.2	NO	N.	NW.	ht.	ht.	ht.
15	39.41	39.15	38.82	+11.4	+19.5		+16.1	+18.0	+19.3	ONO.	NO.	N.	ht.	ht.	ht.
16	39.12	38.94	38.67	+10.4	+20.4		+16.2	+19.0	+20.3	O.	ONO.	O.	ht.	ht.	ht.
17	38.65	38.56	38.19	+12.9	+22.6		+17.7	+20.7	+21.8	OSO.	OSO.	SO.	ht.	ht.	ht.
18	38.69	38.59	38.19	+13.5	+22.3		+18.7	+21.7	+21.5	O.	O.	O.	ht.	ht.	ht.
19	37.79	37.41	36.99	+14.2	+23.5		+18.7	+21.7	+23.0	SO.	WSW.	O.	ht.	ht.	ht.
20	36.79	36.61	36.37	+14.4	+25.0		+19.0	+22.2	+23.8	SO.	S.	S.	ht.	ht.	ht.

(August 1837.)

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph		Thermometer R.			Wind.			Weather.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21.	37.45	37.48	37.60	+14.4	+21.3	+18.0	+20.2	+20.5	VV.	VV.	NW.	bw.	ht.	v.
22.	36.92	36.66	36.49	+14.7	+16.8	+15.8	+15.3	+16.7	VV.	VV.	VNW.	bd.	bd.	ht.
23.	35.59	35.22	34.87	+12.2	+18.2	+14.4	+16.8	+16.3	VV.	VV.	VV.	ht.	ht.	v.
24.	35.34	35.32	35.34	+8.7	+14.3	+11.0	+12.6	+12.4	NW.	NW.	NW.	bd.	w.	v.
25.	36.11	36.13	36.20	+7.0	+13.2	+10.8	+11.5	+11.7	VV.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
26.	37.35	36.81	35.98	+6.7	+16.3	+11.7	+13.7	+16.2	VV.	SO.	SW.	bd.	ht.	ht.
27.	33.49	33.67	33.70	+10.0	+13.8	+11.3	+12.5	+13.3	VV.	WSW.	VV.	bd.	bd.	bd.
28.	36.08	36.20	35.99	+6.5	+12.6	+9.5	+11.7	+12.1	VV.	NW.	VV.	v.	bd.	v.
29.	31.30	31.28	32.52	+5.6	+14.4	+11.3	+13.7	+11.1	SO.	SO.	SSO.	bd.	bd.	v.
30.	30.40	30.35	29.95	+8.3	+18.3	+13.0	+16.8	+17.8	SW.	VV.	SW.	bd.	ht.	v.
31.	32.69	32.88	32.68	+8.9	+16.6	+12.4	+14.9	+15.2	WSW.	WSW.	SW.	ht.	ht.	ht.
Mittel vom 1 bis 10.														
	37.477	37.317	37.152	+11.76	+20.65	+16.45	+19.09	+19.98	-	-	-	-	-	-
	37.890	37.511	37.142	+13.49	+22.91	+19.73	+21.09	+22.17	-	-	-	-	-	-
	35.046	34.908	34.665	+9.36	+15.98	+12.65	+14.52	+14.85	-	-	-	-	-	-
	36.751	36.600	36.386	+11.471	+19.72	+16.031	+18.11	+18.86	-	-	-	-	-	-

# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — September 1837.

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1	30,75	29,98	29,98	+ 9,4	+16,7	+13,8	+15,9	+13,5	SSW.	SW.	SSW.	hl.	ht.	bd. r.
2	31,02	31,31	31,73	+ 8,0	+13,2	+10,5	+12,3	+13,1	W.	W.	W.	bd.	bd.	ht.
3	31,06	32,79	33,28	+ 7,7	+15,5	+16,9	+13,1	+11,0	WSW.	WSW.	WSW.	v.	ht.	ht.
4	35,20	35,09	33,60	+ 7,0	+15,1	+11,0	+13,9	+11,9	SSW.	SSW.	ONO	ht.	ht.	ht.
5	33,68	33,84	33,99	+ 9,0	+12,7	+11,5	+12,3	+10,1	NNO.	N.	NNO.	bd.	bd. r.	bd. R.
6	35,34	35,23	35,24	+ 5,4	+13,1	+ 9,0	+11,8	+12,0	NW.	WSW.	N.	ht.	ht.	v.
7	36,59	36,57	36,17	+ 4,6	+13,7	+ 9,5	+12,2	+13,0	SW.	SW.	SW.	ht.	ht.	ht.
8	36,71	36,73	36,63	+ 6,0	+17,5	+12,5	+15,1	+16,1	S.	SW.	S.	ht.	ht.	ht.
9	37,36	37,05	36,59	+ 7,5	+18,5	+13,9	+16,5	+16,9	SW.	WSW.	W.	ht.	ht.	ht.
10	34,73	34,99	35,41	+ 8,6	+18,6	+13,4	+17,1	+16,8	S.	SSO.	OSO	ht.	ht.	v.
11	37,55	37,20	36,65	+ 9,5	+18,2	+14,0	+15,9	+16,9	SSO.	SSO.	OSO.	ht.	ht.	ht.
12	35,04	34,42	34,08	+ 9,3	+19,7	+13,9	+18,2	+18,3	SSO.	SSO.	SSO.	ht.	ht.	ht.
13	32,20	31,53	30,72	+10,4	+20,8	+15,0	+19,4	+19,3	WSW.	W.	W.	bd.	bd.	bd.
14	29,21	29,56	29,61	+11,6	+13,9	+13,5	+12,9	+12,5	W.	W.	W.	bd.	bd.	v.
15	32,22	32,86	33,29	+ 8,3	+13,0	+ 9,7	+11,6	+12,7	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	ht.
16	36,15	36,91	37,19	+ 8,8	+13,7	+ 9,4	+12,3	+13,0	SSO.	SSO.	SSO.	bd.	bd.	bd.
17	37,65	37,28	36,94	+ 8,0	+12,7	+ 9,8	+10,6	+11,3	W.	W.	W.	bd.	bd.	bd.
18	36,45	36,52	36,30	+ 9,8	+13,7	+12,1	+13,3	+13,0	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	v.
19	34,86	35,93	36,53	+ 9,5	+12,2	+11,5	+11,6	+11,5	N.	N.	N.	bd.	bd.	v.
20	38,15	38,04	37,84	+ 7,6	+13,6	+10,5	+13,2	+13,3				bd.	v.	

# (September 1837.)

Tag	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer R.			W i n d.			W e t t e r.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21	38,69	38,75	38,41	+	+15,4	+10,6	+13,6	+14,0	O.	O.	ONO.	ht. ht.	ht. ht.	ht.
22	39,40	39,14	39,13	+	+12,0	+9,7	+10,5	+11,2	NO.	NO.	NO.	ht.	v.	ht.
23	39,54	39,26	38,99	+	+11,3	+9,4	+10,0	+9,0	NO.	NO.	NO.	ht.	v.	bd. r.
24	39,98	39,96	39,60	+	+11,5	+7,2	+10,3	+10,8	O.	ONO.	O	ht. ht.	ht.	ht.
25	39,40	39,20	38,74	+	+11,7	+7,4	+10,5	+11,5	O.	NO.	ONO	v.	ht.	ht.
26	38,44	38,27	37,83	+	+11,2	+8,5	+10,8	+10,7	NO.	ONO	NO.	ht.	v.	v.
27.	36,78	36,87	36,44	+	+9,4	+8,6	+8,2	+8,4	NW.	NW.	NW.	bd. r.	bd. r.	bd. r.
28	37,34	37,33	37,15	+	+11,5	+6,8	+10,8	+10,9	NW.	NW.	NW.	bd. n.	v.	v.
29	38,05	38,10	37,93	+	+11,2	+7,7	+11,7	+11,5	NW.	NW.	NW.	ht. ht.	v.	v.
30.	37,78	37,60	37,37	+	+12,7	+9,8	+12,0	+11,3	NW.	NW.	NW.	bd.	v.	v.
Mittel vom 1. bis 10.														
31,242	34,378	34,292	34,292	7,32	+15,16	+11,50	+11,01	+14,07						
31,978	35,024	34,915	34,915	8,99	+15,11	+11,91	+13,99	+14,18						
38,541	38,150	38,159	38,159	5,02	+11,79	+8,57	+10,84	+10,93						
35,920	35,961	35,789	35,789	7,11	+14,13	+10,67	+12,93	+13,06						

Erläuterungen. ht. ht = ganz heiter; ht. ht. = heiter; w. x. = wolkig; v. = vermisch; bd = bedeckt; t. = trübe; n. = neblig  
 N. = Nebel; r = regnet; R = Regen; Su = Schnee; Rf = Reif; st = Sturm; st = stormisch; G = Gewitter; Gw. = Gewitterwolken; ff = Hagel — Höhe des Barometers über dem Salspflaster = 16,5  
 Par. Fufa. — Angabe seines Standes, der Ueberschufs über 300 Par. Lin.

# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. --- October 1837.

Tag	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Nm.	Mm.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1.	38,09	38,33	38,24	7,6	+12,4	+	9,4	+11,7	O.	ONO.	OSO	bd.	v	v.
2.	39,36	39,30	39,07	5,0	+12,2	+	7,7	+11,4	S.	SSO	SO.	ht.	v.	bd.
3.	38,45	38,82	38,86	6,6	+12,5	+	10,0	+11,1	SO	WSW.	W.	bd.	bd.	bd. r.
4.	38,96	38,73	38,18	8,4	+15,2	+	10,4	+14,3	SSW.	SW.	SW.	ht. ht.	ht.	ht.
5.	37,54	37,55	38,06	7,6	+12,1	+	10,0	+12,5	WSW.	NW.	NW.	bd. r.	bd. R.	v.
6.	38,61	38,48	37,96	7,2	+12,5	+	9,3	+12,3	W.	W.	W.	bd.	bd.	v.
7.	36,35	36,30	37,46	7,6	+11,7	+	9,9	+11,7	WSW.	NW.	NW.	bd. r.	bd. R.	ht.
8.	38,02	38,03	37,80	4,4	+10,2	+	7,0	+10,1	WSW.	WSW.	WSW.	bd.	bd.	bd. r.
9.	37,03	36,76	36,70	6,4	+10,7	+	8,0	+10,2	WSW.	SO.	SO.	v.	bd.	v.
10.	40,03	40,38	40,72	3,1	+10,5	+	5,4	+10,3	SO.	O.	O.	ht. ht.	ht.	ht. ht.
11.	42,62	42,73	42,35	2,6	+12,6	+	7,3	+11,7	O.	SO.	SW.	ht. ht.	ht.	v.
12.	41,28	41,12	40,62	3,6	+10,6	+	6,2	+10,5	SW.	SW.	SW.	bd.	v.	ht.
13.	41,19	41,09	40,91	4,2	+9,5	+	6,8	+9,0	NW.	N.	NW.	ht. ht.	ht.	ht.
14.	41,32	41,46	41,46	3,1	+10,6	+	7,3	+10,1	NW.	NW.	NW.	bd.	ht. ht.	ht. ht.
15.	40,39	39,86	39,44	3,9	+9,3	+	7,7	+9,1	W.	W.	W.	bd.	r	bd.
16.	39,56	39,42	38,99	6,1	+10,2	+	8,0	+9,5	W.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
17.	37,03	36,72	36,13	6,5	+11,3	+	8,3	+10,5	W.	W.	W.	bd.	bd.	bd.
18.	36,34	36,35	36,19	7,8	+8,0	+	8,2	+7,8	W.	W.	W.	bd.	bd.	bd.
19.	37,31	37,40	36,36	7,8	+9,8	+	8,0	+9,5	NW.	NW.	NW.	ht.	ht.	v.
20.	40,13	39,50	38,96	4,5	+10,1	+	8,0	+9,5	NW.	NW.	SW.	ht.	v.	bd. r.

(October 1837.)

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.			Thermometer R.			W i n d.			W e t t e r.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.		9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21.	41,12	41,65	41,73	4,7	9,0		6,7	8,7	8,5	NV.	NV.	NW.	ht.	ht.	ht. ht.
22.	40,46	39,95	39,38	4,2	9,8		7,2	9,1	8,4	NV.	VV.	VV.	ht.	w.	bd.
23.	37,42	36,80	36,19	6,2	10,6		8,3	10,0	10,1	SVV.	SVV.	SVV.	bd.	bd.	bd.
24.	32,91	32,70	32,45	4,7	10,0		7,4	9,3	9,8	SVV.	SVV.	SVV.	bd.	bd.	bd.
25.	31,11	31,18	31,65	6,9	9,0		9,2	8,0	8,1	SVV.	VV.	VV.	bd.	bd.	bd. v.
26.	36,43	36,77	36,75	2,8	7,8		3,6	6,5	7,7	VV.	SVV.	VVSVV.	ht.	ht.	ht. ht.
27.	35,60	34,87	34,13	0,9	7,9		1,9	7,2	7,7	SVV.	SVV.	SVV.	ht.	ht.	ht. ht.
28.	31,52	31,90	31,63	4,3	9,6		5,3	7,7	6,6	SVV.	SVV.	SVV.	ht.	ht.	ht.
29.	31,95	31,68	31,60	3,4	10,9		5,7	9,5	9,7	SSO.	S.	S.	bd.	ht.	ht.
30.	33,42	33,52	33,01	6,1	9,5		6,7	9,4	8,7	SVV.	SVV.	SVV.	bd.	w.	v.
31.	30,72	30,74	30,50	5,7	9,9		8,2	9,7	9,2	SVV.	SVV.	SVV.	bd.	ht.	ht.
38,394	38,308	38,303	38,303	6,39	12,03		8,71	10,64	11,56	Miscel. vom 1. bis 10.					
39,720	39,617	39,521	4,91	10,21		7,58	9,04	9,75		- 11. - 20.					
35,091	34,986	34,729	4,51	9,47		6,49	8,03	8,60		- 21. - 31.					
37,561	37,549	37,364	5,23	10,54		7,56	9,42	9,92		- 1. - 31.					



# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — November 1837.

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1.	32,29	31,95	30,95	2,6	7,4	3,9	6,8	7,0	SW.	SW.	S.	ht. ht.	ht.	v.
2.	27,37	27,53	26,17	4,8	9,6	5,8	9,0	7,3	SW.	W.	SW.	bd. R.	ht.	bd.
3.	29,14	28,49	30,47	4,7	8,3	7,5	8,0	7,0	SW.	SW.	SW.	bd. st.	bd. st.	bd. st.
4.	33,00	33,55	33,95	2,2	6,4	3,0	5,7	5,8	SW.	SW.	SW.	ht. ht.	ht.	ht.
5.	36,65	36,92	36,90	1,5	6,0	2,8	5,3	5,6	SW.	SW.	SW.	ht.	v.	ht.
6.	37,21	38,10	36,76	2,3	5,9	2,8	5,7	5,0	NW.	O.	NO.	ht. ht.	ht. ht.	ht. ht.
7.	41,86	41,72	41,15	0,9	6,5	0,3	4,4	5,0	N.	N.	NO.	ht. ht.	ht. ht.	ht. ht.
8.	40,64	39,81	39,75	2,6	3,7	2,8	4,0	4,0	O.	O.	O.	bd.	bd.	bd.
9.	38,75	38,52	38,31	2,2	3,9	2,7	3,4	3,9	NW.	NW.	O.	bd.	bd.	bd.
10.	36,71	36,47	36,02	3,1	4,6	3,7	4,3	4,3	SW.	SW.	SW.	bd.	bd.	bd.
11.	31,72	31,55	31,29	2,9	8,0	5,8	7,8	4,9	NW.	W.	NW.	v.	v.	R.
12.	30,56	30,53	30,53	4,2	5,5	4,3	4,0	4,8	NW.	NW.	W.	bd.	bd.	bd.
13.	31,77	32,23	32,46	2,8	5,4	3,8	5,0	4,7	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
14.	31,37	32,20	32,01	1,4	2,9	1,7	2,4	2,1	NW.	NW.	N.	bd.	bd.	v.
15.	33,23	33,70	34,12	0,5	1,6	0,3	1,7	1,4	NO.	NO.	NO.	v.	v.	bd.
16.	35,78	35,79	35,15	0,3	2,6	0,7	2,3	2,4	NO.	NO.	ONO.	bd.	bd.	bd.
17.	34,77	34,93	35,13	0,7	3,3	1,2	2,5	2,8	O.	O.	O.	bd. r.	bd. r.	bd. r.
18.	37,01	36,95	37,06	2,0	3,2	2,1	3,0	2,5	ONO.	W.	W.	bd. r.	bd. r.	bd. r.
19.	37,29	37,19	37,12	1,0	3,2	1,7	2,4	3,2	SW.	SW.	SW.	bd.	bd.	bd.
20.	34,65	34,36	34,36	2,0	6,0	4,2	6,5	6,8	WSW.	WSW.	WSW.	bd. r.	bd. r.	bd. r.

(November 1837.)

Tag	Barometer bei 0° R			Thermograph.			Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min	Mitt	Max	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21.	32,78	32,87	33,33	+	2,5	+	4,7	+	4,5	WSW.	W.	SW.	bd. r.	bd. r.	bd.
22.	36,14	37,21	37,76	+	1,0	+	2,7	+	2,5	W.	NW.	WSW.	bd. r.	bd. r.	ht
23.	37,57	37,63	37,58	+	2,3	+	6,0	+	7,2	SW.	SW.	WSW.	bd. r.	bd.	bd. r.
24.	36,74	37,04	37,07	+	3,7	+	5,4	+	7,1	SW.	SW.	SW.	bd.	bd.	bd.
25.	37,44	37,33	37,88	+	3,8	+	4,7	+	5,5	SO.	S.	SO.	bd.	v.	ht.
26.	37,21	36,77	36,18	+	3,0	+	3,0	+	3,9	NW.	W.	SW.	bd. r.	bd.	bd.
27.	29,84	29,46	29,62	+	2,5	+	4,8	+	4,3	SW.	SW.	SW.	bd.	bd.	bd.
28.	28,42	27,58	28,74	+	1,2	+	1,2	+	3,7	S.	S.	S.	ht	r.	bd.
29.	27,15	28,08	28,96	+	0,2	+	0,7	+	1,3	SW.	NW.	NW.	n.	bd.	bd.
30.	34,01	33,74	35,31	+	0,9	+	1,6	+	2,6	W.	NW.	NW.	bd.	Sn.	bd.
Mittel vom 1. bis 10.															
	35,262	35,305	35,178	+	2,51	+	3,53	+	5,49						
	33,815	33,913	33,955	+	1,78	+	2,58	+	3,16						
	33,730	33,773	34,045	+	2,11	+	3,53	+	4,26						
	34,269	34,341	34,492	+	2,13	+	3,21	+	4,49						

# Meteorologische Beobachtungen, angestellt in Berlin. — December 1837.

Tag	Barometer bei 0° R.			Thermograph.			Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Mm	Mz		9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
1.	36,13	35,07	35,79	+ 0,5	+ 3,3		+	0,7	2,9	S	SSW.	SW.	ht. ht.	ht. ht.	bd.
2.	36,00	39,47	38,89	+ 1,5	+ 4,0		+	3,3	3,7	SW.	W.	W.	bd. r.	bd.	bd.
3.	42,62	42,56	42,56	+ 2,7	+ 3,6		+	2,7	3,3	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
4.	42,38	42,07	41,86	+ 1,5	+ 3,3		+	2,2	3,3	NW.	N.	N.	bd. r.	bd. r.	bd. r.
5.	41,74	41,53	41,31	+ 1,4	+ 1,8		+	1,4	1,6	O.	O.	O.	bd. r.	bd.	bd.
6.	40,61	40,10	39,29	+ 0,5	+ 1,3		+	0,8	1,2	O.	O.	O.	bd.	bd.	bd.
7.	39,64	38,26	37,86	+ 0,9	+ 1,9		+	1,2	1,7	SO.	SO.	SO.	bd.	bd.	bd.
8.	35,90	35,19	34,91	+ 1,3	+ 3,8		+	1,8	2,6	SO.	SO.	SO.	bd.	v.	v.
9.	33,94	33,80	33,65	+ 1,0	+ 3,3		+	2,0	2,3	W.	SW.	N.	bd.	bd.	v.
10.	36,15	36,62	37,21	+ 0,5	+ 1,2		+	0,7	1,1	NW.	WNW.	NW.	ht.	bd.	bd.
11.	38,54	38,39	38,10	+ 1,0	+ 0,4		+	0,5	0,2	O.	O.	O.	bd.	v.	v.
12.	36,05	34,96	34,05	+ 1,7	+ 0,7		+	1,7	1,0	SW.	SW.	SW.	bd.	bd.	bd.
13.	31,78	32,68	34,06	+ 1,5	+ 0,0		+	1,0	0,7	W.	N.	NNO	bd.	bd. Sn.	bd.
14.	40,07	40,52	40,67	+ 3,7	+ 0,3		+	3,7	0,8	NO	NW.	NW.	ht. ht.	ht.	ht.
15.	41,14	41,11	41,10	+ 3,9	+ 1,1		+	3,8	1,4	SW.	SW.	SW.	ht. ht.	ht.	ht.
16.	37,80	38,10	38,10	+ 4,4	+ 0,7		+	3,7	1,4	SSW.	SSW.	SSW.	ht. ht.	ht.	ht.
17.	37,59	37,19	37,02	+ 4,2	+ 1,4		+	2,8	0,7	SW.	SW.	SW.	ht.	ht.	bd.
18.	34,68	33,69	33,12	+ 0,3	+ 2,5		+	0,1	2,3	S.	SSO	SW.	bd. R.	ht.	ht.
19.	31,14	32,25	33,34	+ 2,4	+ 5,9		+	5,2	4,9	SW.	W.	W.	bd. r.	bd.	bd.
20.	32,15	32,15	31,96	+ 3,4	+ 4,5		+	4,2	3,9	W.	W.	W.	bd. r.	bd. r.	bd.

(December 1837.)

Tag.	Barometer bei 0° R.			Thermograph.		Thermometer R.			Wind.			Wetter.		
	9 U.	12 U.	3 U.	Min.	Max.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.	9 U.	12 U.	3 U.
21.	33.19	34.87	37.30	- 1.2	- 0.6	- 1.2	- 0.4	- 1.0	NO.	NO.	NO.	v.	bd.	bd.
22.	40.93	40.72	40.26	- 6.4	- 3.3	- 5.3	- 4.2	- 4.4	S.	S.	S.	bd.	v.	bd.
23.	37.60	38.94	36.15	- 5.4	- 3.7	- 4.4	- 3.7	- 3.9	SO.	SO.	SO.	bd.	bd Sn.	Sn.
24.	34.97	35.18	35.60	- 3.8	- 2.2	- 2.1	- 2.2	- 1.9	NW.	NW.	NW.	bd. n.	bd.	bd r.
25.	33.53	32.87	32.40	- 1.4	- 6.9	- 3.2	- 6.2	- 6.4	SW.	W.	W.	bd. r.	bd. r.	bd. r.
26.	35.36	36.06	36.71	- 2.3	- 2.9	- 2.3	- 2.6	- 2.7	NW.	NW.	NW.	bd.	bd.	bd.
27.	38.27	38.40	38.56	- 0.4	- 1.0	- 0.3	- 0.7	- 0.6	S.	S.	SO.	ht.	ht.	ht.
28.	39.17	39.16	39.39	- 1.0	- 0.1	- 1.0	- 0.3	- 0.0	SO.	SO.	O.	ht.	ht.	ht.
29.	40.23	40.27	40.18	- 5.1	- 2.6	- 5.1	- 3.0	- 3.2	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.
30.	40.74	40.47	40.36	- 6.0	- 2.8	- 5.5	- 3.0	- 2.8	SO.	SO.	SO.	ht.	ht.	ht.
31.	40.30	40.32	40.28	- 3.4	- 1.2	- 2.7	- 1.7	- 1.6	S.	SO.	SO.	v.	ht.	ht.
Mittel vom 1 bis 10. - 11. - 20. - 21. - 31.														
	38.741	38.597	38.434	+ 1.11	+ 2.75	+ 1.68	+ 2.26	+ 2.36						
	36.245	36.084	36.154	+ 1.49	+ 1.11	+ 0.59	+ 0.59	+ 0.53						
	37.663	37.751	37.926	- 2.56	- 0.10	- 1.56	- 0.42	- 0.48						
	37.553	37.456	37.516	- 1.03	+ 1.20	- 0.20	+ 0.57	+ 0.76						

## Berichtigungen:

1. Zu Cauchy's Notizen; aus einem Briefe des Herrn Dr.  
E. Plutzar.

Triest, den 5ten Januar 1837.

— Als fleißigem Leser Ihrer mit Recht so weit verbreiteten, vor-  
trefflichen Annalen für Physik und Chemie sind mir einige wahrschein-  
liche Druckfehler in Cauchy's interessanten Briefen an Ampère und  
Libri (Bd. XXXIX, St. 9) aufgefallen. Ich hoffe von Heft zu Heft  
Berichtigung derselben; da diese aber bisher noch nicht erfolgt ist, so  
nehme ich mir die Freiheit, Sie auf dieselben aufmerksam zu machen,  
mit der Bitte, falls Sie dieselben gegründet finden, dieser Errata berich-  
tigend Erwähnung thun zu wollen, da ich vermouthen darf, daß manchem  
Andern, gleich mir, diese Berichtigung erwünscht seyn wird, um so mehr,  
als das Fragmentarische dieser Aufsätze nicht gestattet, diese Fehler mit  
Bestimmtheit selbst zu verbessern.

Seite 38. Z. 2 u. 3 von oben soll wohl  $r^2 f(r)$  besser heißen  $r^3 f(r)$ .

„ 38. „ 10 „ „ „ „ vor dem Gleichheits.  $\lambda$  stehen.

„ 38. „ 9 u. 11 „ „ „ „  $\frac{A}{r^n} e^{-br}$  besser heißen  $\frac{A}{r^n} e^{-br}$ .

Im dritten Briefe an Ampère und im dritten an Libri sollte wohl  $K$   
mit  $R$  vertauscht werden.

Seite 40. Z. 12 von unten fehlt das Wort Sinus vor Einfallswinkel.

„ 43. „ 12 „ oben soll statt  $\cos$  heißen  $\cotg$ .

„ 48. „ 4 „ unten statt  $\frac{2\pi}{K}$  sollte seyn  $\frac{2\pi}{T}$ .

„ 51. „ 2 u. 3 von unten fehlen im Nenner der letzten Brüche die  
Accente am  $r$ .

„ 53. „ 4 von oben statt  $\cos i$  sollte seyn  $\cos^2 i$ ; zugleich in die  
No. 5 mit 6 zu vertauschen.

Ueber No. 3 dieses Briefes bleibt der Leser in Ungewißheit.

Seite 53 Z. 6 von unten reflectirt statt einfallend.

„ 54. „ 5 „ „ in  $h$  mit 4 zu verwechseln; eben so

„ 55. „ 5, 13, 15 von oben; und

„ 56. „ 14.

„ 57. „ 6 von oben das zweite (15) mit (16).

„ 57. „ 6 „ unten in  $h$  mit 4 zu vertauschen.

„ 62. „ 12  $\eta$  mit  $\lambda$ ;  $\rho$  mit  $\sigma$

(Die meisten der hier dankenswerth berichtigten Fehler befanden sich  
schon im Original. P.)

2. Zu A. Löwe's Aufsatz; von Dr. N. Gröger zu Mühlhausen in Thüringen.

Herr Löwe theilt im Bd. XXVIII pag. 151 dieser Annalen die Analysen eines Basalts und der Lava vom Aetna mit. Die Analysen sind gewiß gut ausgeführt, aber nicht ebenso berechnet.

Der Basalt ist zusammengesetzt aus:

4,615 Magneteisenerz,
39,800 Zeolith und
55,585 Augit.
<hr/> 100,000.

Bei der Zusammenstellung der einzelnen Bestandtheile des Basalts findet sich 5,15 Magneteisenerz, also 0,535 mehr, als nach der Angabe darin enthalten sind. Dieser Fehler, der durch die Nichtberücksichtigung der Verhältnisse, in welchen die drei angeführten Substanzen den Basalt constituiren, entstanden ist, findet sich wiederholt bei Berechnung des Zeoliths, des Basalts, und am auffallendsten bei der Zusammenstellung der Bestandtheile der Lava als Ganzes.

Zusammensetzung des Zeoliths.

a. Nach Herrn Löwe.	b. Wirkliche Zusammensetzung nach der Analyse.
Kieselerde 39,13	38,83 = - 0,36
Thonerde 29,00	28,77 = - 0,23
Kalkerde 10,52	10,15 = - 0,07
Natron 13,92	13,81 = - 0,11
Kali 1,43	1,12 = - 0,01
Wasser 7,93	6,72 = + 1,21
<hr/> 101,93 nicht 100,93.	<hr/> 100,00.

Der Basalt als Ganzes.

a. Nach Herrn Löwe.	b. Wirkliche Zusammensetzung.
Kieselerde 41,18	41,86 = + 0,68
Thonerde 17,39	16,46 = - 0,93
Eisenoxydulox. 5,15	4,61 = - 0,54
Eisenoxydul 8,18	9,18 = + 1,00
Kalkerde 11,82	12,10 = + 0,28
Natron 6,18	5,49 = - 0,69
Talkerde 6,43	7,20 = + 0,77
Kali 0,61	0,56 = - 0,07
Wasser 2,70	2,67 = - 0,03
<hr/> 6 99,6	<hr/> 100,13.



Die Zusammenstellung der Analyse der Lava als Ganzes mit der wahren Zusammensetzung derselben nach der Analyse zeigt noch bedeutendere Abweichungen.

a.	b.
Kieselerde 48,83	51,89 = + 3,06
Thonerde 16,15	17,92 = + 1,77
Eisenoxydul 16,32	11,16 = - 5,16
Kalkerde 9,31	10,28 = + 0,97
Talkerde 4,58	6,90 = + 2,32
Natron 3,45	1,73 = - 1,72
Kali 0,77	0,39 = - 0,38
Manganoxydul 0,54	0,52 = + 0,28
99,95	101,09.

Wenn man sich viele Mühe gegeben hat, um richtige Zahlen zu finden, und wo man, wie hier, auf dieselben theoretische Betrachtungen gründet, sollte man auch nicht weniger darauf bedacht sein, die gefundenen Zahlen richtig zu gebrauchen.

Dr. N. Gräber.

Zum Aufsatz des Herrn Prof. Mile. Heft I u. II d. Bd.

Seite 46. Z. 23. man alsdann lies: alsdann eintrifft.

- » 53. » 8 st. fallen löst l. fällt.
- » 55. » 18 st. zusammen l. zusammen fallen.
- » 63. » 22 st. aller l. ihrer.
- » 69. » 2 st. einer l. eine.
- » 210. » 4 st. Das sich l. Dafs das.
- » 242. » 17 st. wie l. wie diefs.
- » 246. » 18 st. so wie die l. auch durch.
- » 250. » 6 st. noch l. mit.
- » 250. » 26 st. Tastinn l. Distanzinn.
- » 251. » 27 st. Auge l. Drucke.
- » 254. » 19 st. und auch diese l. und nur diese auf.
- » 255. » 6 st. unmittelbare l. mittelbare.
- » 257. » 17 st. Handfläche l. Hautfläche.
- » 260. » 3 st. Luft l. Licht.
- » 261. » 13 st. die man l. die.
- » 261. » 14 st. Winkelmaafse l. Richtungslinien.
- » 261. » 14 st. gemessen hat l. die Distanz empfindet.
- » 261. » 15 st. selbst l. derselben.
- » 261. » 22 st. Gröfse von dem Distanzgeföhle l. Distanz.
- » 262. » 16 st. fällt weg und
- » 262. » 17 st. empfindend l. empfindet.

## Zum Aufsatz von Abich.

Seite 171. Z. 4 von unten statt hasellgase lies: Krytallgase.

## Zum Aufsatz von Ullgren.

Seite 397. Z. 11 statt schwefelsaures Gas lies: schwefligsaures Gas.

• 397. • 12 st. schwefligsaures Quecksilberoxydul l. schwefelsaures Quecksilberoxydul.

## Zu den Aufsätzen von Fechner im Bd. XXXXI.

Seite 239. Z. 17 und 18 statt: durch bloße Berührung mit der Zinkplatte, lies: durch bloße Berührung mit der Kupferplatte, wenn diese nicht zuvor die Zinkplatte.

(Die übrigen sind bereits S. 451 angegeben.)

• 504 • 12 von unten st. CO l. CD.

• 504. • 9 v. u. st. Gleichung l. Gleichungen.

• 505. • 1 v. o. statt:

$$2abP\sqrt{\frac{1}{(2H-h)(2a-h)(2b-h)} - \frac{1}{4b^2(H-h)^2}}$$

lies.

$$2abP\sqrt{\frac{1}{h(2H-h)(2a-h)(2b-h)} - \frac{1}{4b^2(H-h)^2}}$$

Seite 508. Z. 20 v. o. ist das dritte Zeichen  $\infty$  mit 0 zu vertauschen.

• 508. • 15 v. u. nach DE fehlt das Wort nicht.

• 510. • 9 v. u. ist das Wort um zu streichen.

• 511. • 13 v. u. st. r l. l.

# Register

zu

den Annalen der Physik und Chemie.

Band XXXI bis XXXII.



## I. Namenregister.

### A

**Abich**, Besch. zweier Appar. z. Bestimm. d. Dämpfe der Fumarolen u. d. in Mineralwasser enthaltenen Kohlens. XXXII 167.  
**Addam's**, Opt. Tausch nach Betracht. eines in Beweg. begriffen. Körp. XXIV 384 — Hefthalten des Eisens durch kalte Luft, XXXII 589.  
**Aimé**, Fluor greift Kautschuck an, XXXII 578 — Ueb. d. Schen, XXXIII 479. — Neues Magnetisierungsverfahren, XXXV, 206. — Appar. zu elektrochem. Zersetzung, XXXVII 432.  
**Airy**, Lichtpolarisat. in d. Atmosphäre, XXII 126. — Berechn. d. Newton'sch. Diffraet.-Vers. XXXIII 389. — Theorie d. Farb. dün. Blüth. XXXVI 512.  
**Alexander**, Ueb. Thermo-Electric., besond. Thermo-Elektromagnete, XXXIII 621.  
**Alluaud**, Quecksilber in Franke. XXXIX 527.  
**Amici**, Ueb. d. Farbenzerst. in demselb. Mittel, XXXV 609.  
**Amossos**, Vers. schmelz. des Golds, XXXVI 202.  
**Andrews**, Erreg. thermo-elekt. Ström. zwisch. Metall u. geschm. Salz XXXVI 164.  
**Anglada**, Beob. d. Quellentemperat. im Dep. d. Ostpyrenäen, XXXVII 458.  
**Anikin**, Magnet. Beob. zu Nestschinsk, XXXIV 58.  
**Appolin**, Neue Meth. z. Bestimm. d. spec. Wärme d. Gase, XXXIX 522.  
**Arago**, Lichtpolarisat. in d. Atmosphäre XXXII 126. — Bemerk. üb. d. Koll. Licht auf Leuchtst. XXXIII 104. — Gesetz d. Cosi-

nusquadrats für d. Intensit. d. polarisirt. Lichts, welches doppelt brech. Kryst. durchlässt. XXXV 444. — Nachricht üb. d. Sternschnupp. am 13. Nov. XXXVI 562. — Mittel in's Meer zu sehn, XXXVII 240. — Ursach. d. Meteorström. 150. — Erklär. d. überzählig. Regenbog. 455. — Temperatur d. Himmelsraums, XXXVIII 235. — Temperatur. in d. Tiefe, 416. — Dispersion der Gase, XXXIX. 224. — Sternschnupp. beob. am 12. u. 13. Nov. 1836 in Franke. 415.  
**d'Arce**, Vers. üb. d. Bernsteinsäure, XXXIII 72. — Bernsteinsäure u. einige ihr. Verbind. XXXVI 80.  
**d'Arzy**, Platin im weatl. Franke. XXXI 16 590.  
**Aycke**, Bemerk. über Grünschiefer, XXXIX 122.

### B

**Babinet**, Opt. Kennzeich. d. Mineral. XXXVI 115. — Beiträge z. meteorolog. Optik, 128. — Circulare Doppelbrech. XXXVII 30.  
**Back**, Temperatur d. Thons. in großer Kälte, XXXVIII 282.  
**Balard**, Verbind. d. Broms mit Sauerst. XXXIV. 148.  
**Bannasch**, Wasserdünste beob. zu Pilsen, XXXVI 209. — Erlebr. üb. d. Stand d. Ostsee, 500.  
**v. Baratta**, Beobacht. d. Sternschnupp. 14. Nov. 1834 in Mähren, XXXIV 130.  
**Bary**, Eine Gullare ohne Hülfe d. Ohrs zu st. XXXV 524.  
**Bandoin** den Marattes, Oestl. Störung d. Magnetn. d. XXXVII 456.  
**Baumgartner**, Notiz d. Gesteiner Mineralwass. betreff. XXXIII 318.

- Beecquerel, Künstl krystallisirt. Schwefelblei, XXXI 46 — Elektrochemisch. Appar. zu Zersetz. XXXVII 429 — Leb. einen el. Strom, der zersetzt ab nicht erbitet, 433 — Besch. d. Zellenstule, XXXXII 282 — Besch. u. Gebrauch der elektromagnet. Wage u. d. Säule von constant. Strömen, 307.
- Bellevue, Absorbt. d. Quell in Poitou, XXXVII 457.
- Belli, Die — Elektr. entweicht schneller in d. Luft als die + El. XXXX 73.
- Benecke, Besch. des Glimmerlopf. XXXXI 333.
- Benzenberg, Preisfrage üb. den angebl. Schaden ein Feuerkugel, XXXIX 223 — Nachricht darüb. XXXX 160.
- Benzenberg u. Brandes, Beob. v. Sternschnopp. XXXXI 179.
- Bérard, Erste Vers. üb. d. Polarisation d. Wärme, XXXIX. 1.
- Berthier, Anal. d. gläsig Feldspaths v. Mont d'Or u. Drachensfels, XXXI 64 — Anal. Alger. Bomben, XXXXII 591.
- Berzelius, Tienn. d. Chlors v. Brom, XXXI 636 — Untersuch. üb. d. Tellur, XXXII 1 577. — Zerleg. d. Klebers, 198 — Untersuchung d. Osmium-Irid 232 — Leb. Meteorsteine, XXXIII 1 113. — Neue Klasse von born. Salz. 93 — Platin am Herz, XXXIV. 380. — Sättigungsvermögen d. Bors. 561 — Zerleg. d. Onco-poudre, XXXV 514 — Destillationsprod. der Traubenstorte, XXXVI. 1. — D. Citronene 36 — Leb. d. v.
- Facaday angenommenen Schwefelantimon u. Antimonox. XXXVII. 163 — Künstl. Schwefelkies 249 — Bemerkungen üb. verschiedene Methoden Arsenik zu entdecken, XXXXII 159 — Untersuch. d. Farbe, welche d. Laub mancher Bäume im Herbst annimmt, 422. — Verschied. Folgerung. aus d. spec. Gew. organ. Verbind. 134. — Naphthalinschwefels. 419.
- Bessel, Beob. üb. d. phys. Beschaffenh. d. Halley'schen Cometen u. dadurch veranlaßte Bemerk. XXXVIII 495 — Bemerk. üb. d. mögl. Unzulänglichk. der d. Anzieh. allein berücksichtigenden Theorie d. Comet. 585. — Beob. d. Nordlichts v. 18 Oct. 1846 zu Königsberg. XXXIX 206 — Bestimm. d. Axen d. ellipt. Rotationsphären ds. welches am besten d. vorhandenen Messung v. Meridianbögen der Erde entspricht, XXXXII 622.
- Berard, Elastizitätsmodulus d. Goldes u. Abhängigk. d. Tens. davon d. d. Metall XXXI 575.
- Beyrich, Bestimmung d. Phenakits nach einem neuen Vorkomm. XXXIV 519 — Krstlsystem d. Phenakits, XXXXI 321.
- Bierley, Verbrenn. des Eisens, XXXI. 496.
- Biot, Analytisch. Ausdruck für d. Spannung d. Wasserdampfs, XXXI 42. — Opt. Eigensch. d. Honigzuck. XXXII. 211. — Beschreib. eines Instruments um Weiss. mit d. darin enthalt. Luft aus d. Tiefe d. Meers zu holen, XXXVII 461. — Bericht an d. Paris Akad. üb. Melloni's Vers. d. strahl. Wärme betreff. XXXVIII 1. XXXIX 250. 436 514 — Mathemat. u. experim. Meth. Gemenge v. bestimmt. od. unbestimmt. Verbind. falls sie auf d. Licht wirk. zu untersuch. Anwend. auf einige Verbind. d. XXXVIII 179 — Physik. Betat. zwisch. d. Element. d. Körper u. d. Einwirk. d. einfach. Strahlen auf sie, 192. — Leb. d. period. Meteor v. 13. Nov. XXXIX 461 — Bergweh in China, XXXX. 319.
- Biot u. Persoz, Veränder. welche Stärkmehl u. Gummi durch Säure erl. XXXII 160.
- Biot u. Melloni, Polarität der Wärmestrahlen durch progressive Dreh. XXXVIII 202.
- Bird u. Brett, T. in bezügl. Tugolmasse, XXXIV. 518.



- Bischof**, Bemerk. üb. d. unterird. Lauf d. Wass. u. Absorpt. v. Gasen durch dasselbe im Innern d. Erde, XXXII 241. — Analys. d. Phenakits, XXXIV 525. — Temperatur d. auf verschied. Weise entwickelt Kohlens XXXV 161. — Gesetz d. Zunahme d. Temperatur nach d. Erdtiefen, 209. — Physikal. u. chem. Beob. in d. Schweizeralp XXXVII 259. — a. Nöggerath
- Blanchet**, Darstell. u. Zerlegung einig äther. Oele, XXXIII 53.
- Böttger**, D. Spitzenanker, ein z. Erzeugung magnetoelektr. Funken sehr geeignet App XXXIV 497.
- Bohlaye**, Hydrograph. Verhältn. Moreas, besond. üb. d. See Phönix, XXXVIII 253.
- Boguslawsky**, Beob. d. Sternschuppen v. 13. u. 14. Nov. zu Breslau, XXXIX 356.
- Bonnet**, Reducirende Wirkg. d. arsenig S XXXVII 300.
- v. Boudorf**, Bemerk. üb. d. Berent d. schwefels. Eisenoxyduls u. Eisenklobers, XXXI 81. — Metalle in Luft u. Wasser, XXXII 572, XXXIII 293, XXXIII 325. — Anal. zweier Bromsalz XXXIII 61. — Scheid. v. Quecksilber u. Kupfer mittelst Ammoniums, nebst Bemerk. üb. d. Verhalten dieser Subst. z. Oxyd. Chlorür u. Chlorid d. Quecksilb. 73. — Analys. eines aus 3 Chlorid. zusammengesetzt Salzes, 81. — Best. d. d. Meerwass. besonders in Rücksicht auf d. Gypagehalt, XXXX 133. — Verbind. v. Bleiox. mit Kohlen u. Wass. 207.
- Booth**, Darstell. d. Cyaniridinhal. XXXI 167. — Anal. d. Arsenalknuckels v. Kieghsdorf, XXXII 395.
- v. Born**, Erfinder d. äth. Amalgamationsmeth. XXXII 109 111.
- Borchers**, Zerleg. d. Glimmerkupf. XXXXI 335.
- Boulenger**, Gemeintheile d. Euphrodita, XXXVI 479. — Anal. des Schwefelantimonbleis, 481.
- Boussingault**, Anal. einerachswefels. Thonerde v. Paso, XXXI 146. — Chem. Untersuch. d. aus d. Vulkanen der Äquatorialzone Amerika's aufsteigend Gase, 148. — Untersuchung einer angebl. aus Wasserst. u. Platin zusammengesetzten Substanz, 542. — Beob. üb. nächst. Strahl in d. Cordilleren v. Neu-Granada, 600. — Untersuch. d. Bleisulfoxyds, 622. — Wirk. d. solzs. Gases auf Silber in hoher Temp., u. üb. d. Scheid. durch Cementat, XXXII 99. — Untersuch. üb. d. Vorgänge b. d. amerikanischen Amalgamat. 169. — Betracht. üb. d. heißen Quellen d. Cordiller 262. — Versuch einer Entz. d. Chimborasso, XXXIV 193, XXXV 167. — Zusammensetz. d. Brenzschleims XXXVI 78. — Zusammensetz. d. Atmosphäre Möglick. d. Daseyn von Massen zu erweis. 146 436. — Leb. trop. Regen, XXXVII 288.
- Brace-Chesallier**, Abdampf. durch heiße Luft, XXXI 95.
- Brandes**, Stündl. Thermometerbeob. zu Salz-Ufen, XXXII 635 641. — Benzenberg.
- Breithaupt**, Eigensch. d. gedieg. Irid XXXIV 357.
- Breithaupt (G.)**, Construct. verbessert. Höhenmessungs-Baromet. XXXIV 41.
- Brewster**, Krystallform d. Eises, XXXII 309. — Leb. d. Lin. im prismat. Spectr. XXXIII 233. — Farbenerschein. b. chromat. Salz, XXXV 383. — Structur d. Diamant XXXVI 563. — Untersuch. eines merkwürd. Stücks Bernstein, 563. — Eigenthümlichkeit in d. Doppelbrech. u. Lichtabsorpt. d. oxals. Chromoxyd. Kali, XXXVII 315. — Beob. üb. d. Lin. im Sonnenspectr. u. d.jenigen, welche durch d. Atmosph. u. Sauerstoffs erzeugt werd. XXXVIII 50. — Licht v. Rand u. Mittelp. d. Sonne, 211. — Natürl. Farb. d. Kröp. XXXIX 476. — Stündl. Thermometerbeob. zu Leith. XXXXII 635, 638.

Brogniart, Purpurfarbe z. Druck auf seine Fayence, XXXVIII 210.  
 Brooke, Mineralogisch. Notizen, XXXII 582.  
 Brunner, Vers. üb. Eudiometrie, XXI 1. — Darstell. d. Selens aus d. Selenschlamm, 19. — Unters. einig Kpfersalze, XXXII 221. — Besch. ein. Barometers, XXIV 30. — Vers. üb. Störkemehl u. Störkezuck. 319. — App. z. Hervorbring. eines Luftzugs, u. Vers. damit, XXXVIII 264.  
 v. Buch, Leb. Erhebungsgeräte und Vulkane, XXXVII. 169. — Leb. d. Jura in Deutschl. XXX. 638.  
 Biddle, Entwickl. d. Schwaden in Kohlengrub. XXXVIII 618.  
 Büchner, Darstell. d. Katechus, XXXIX 162.  
 Buff, Leb. Barometerbeob. XXXI. 266. — Bemerk. üb. Gehlär mit heiss. Luft, XXXVII 196. — Neue Berechn. d. Vers. v. Koch. üb. d. Ausström. verdicht. Luft, 277. — Vers. üb. d. Widerstand ausströmend. Luft bei Oefnungen in dünnen Wänden u. cylindr. Ansätzen, XXX. 14.  
 Buff u. Plort, Betrieb d. Eisen-schmelzöf. in heiss. Luft, XXXIV. 173.  
 Bunsen, Allophan in d. Format. d. plast. Thons, XXI 53. — Eigenthüm. Verbind. d. Doppelcyanüre mit Ammoniak, XXIV. 131. — Unters. üb. d. Doppelcyanüre, XXXVI 101. — Organische Verbind., welche Arsenik als Bestandth. enthalten XXX. 219, XXXIII 145. — Schmelzbark. d. Irid XXXI 207.  
 Bunsen u. Berthold, Ekenoxyl, Antidot d. arsenig S. XXXII 124.  
 Bunsen u. Himly, Notiz üb. eine d. Cyaneisamm. abul. Verb. XXXVIII 208.  
 Burmeister, Ursach. d. Töne d. Insekten beim Fliegen, XXXVIII. 283.  
 Busvult, Besch. d. Farbenkreise, XXXII 656.

## C

Cagniard-Latour, Beob. über weisse Phosphor, XVI 637. — Leb. d. Gährung, XXXI 193.  
 Caldebaugh, Bericht üb. d. Erdbeben in Chili, XXXII 138. — Ausbruch d. Cosiguama, XXXI 221.  
 Callan, Besch. einer neuen Volta'schen Batterie u. Vers. damit, XXXIX 407.  
 Calloud, Zusammensetz. d. Verb. v. Kochsalz mit Horn- u. Traubenzucker, XXIV 390.  
 Cancrin, Diamanten-Ausbeute im Ural, XXI 608.  
 Canchy, Erklär. verschied. Erschein. d. Lichts nach d. Wellenlehre, XXXIX. 33. — Theorie d. Lichts, 48.  
 Challis, Theoret. Ausleg. einig. Thatsach. d. Zusammensetzung d. Farb. betriff. XXXVII 528.  
 Chevallier, Lichtpolarisat. in d. Atmosph. XXII 125.  
 Chimicelli, Stündl. Thermometerbeob. zu Padua, XXXII 635. 647.  
 Christison, Leb. d. Milchwerg d. arsenig S. XXXVI 194.  
 Clark, Cyankalium, zufällig Prod. bei Bereit. d. Gulsensens in Hohlöfen, XXX. 315.  
 Clarke, Magneto-elekt. Maschine, XXXIX. 404, XXXVI 223.  
 Colladon, Vers. mit d. Zitterrock XXXIX 111. Elektrisch. Ströme in Eisenbahnen, XXXIII 590.  
 Cumber, Entwickl. d. Schwaden in Kohlengrub. XXXVIII 620.  
 Connell, Wuk. d. Kaka auf Alkohol, u. üb. d. Natur d. Lampen-säure, XXI 173. — Anal. des Lezyus, XXXIII 256. — Wuk. d. Volt. Elektr. auf Alkohol Athor u. wässrig. Lösung, XXXVI 187.  
 Contéche, Leb. die Äther Oele, XXI 525.

## D.

Dahlström, Leb. Katechusture, XXXIX. 163.

- Dalton, Bemerk üb d. Theorie d. Winde, XXXII 315
- Daniell, Besch. eines Pyromet. u. damit broch. Schmelzp. versch. Metalle, XXXIX 577 — Volt. Combinat XXXII 263. 277.
- Dansey, Einfl. d. Luftdrucks auf d. Meeresspieg. XXXX 138.
- Davy (H.), Ansicht üb d. Ursach. vulkan. Erscheinen. XXXI 158
- Davy (J.), Untersach. d. aus d. Insel Ferdinandea aufsteig. Gase, d. Wassers u. d. Asche dieselbst, XXXI 156
- Degen, Verhalt. d. Kohle gegen Licht, XXXI 468. — Vers. üb. Netzbark XXXVIII 419
- Delfs, Galvanische Combination. XXXVIII 464.
- Demarcay, Anal. d. Femursäure, XXXVI 54
- Descostils, Darstell. v. Zinkplatin, XXXI 544
- Deslongchamps, Ueber artes. Brunnen, XXXIII 605
- Despretz, Dichtigkeitsmaxim. b. Salzlös. XXXI 96 — bei Flüssigk. XXXI 58. — Booh. üb. d. Gefrier. 492.
- Döbereiner, Merkwürd. Sauerstoffabsorpt. d. Platins u. Irid; Verbrenn. d. Aethers b. niedrig. Temp. XXXI 512. — Ueb. Platin, XXXVI 308. — Chemische Eigensch. u. phys. Natur d. auf nassem Wege dargestellt. Platins, 458 — Feinere Method. üb. Osmium-Irid u. Platin, 164 — Neue Platinverbind. XXXVII 545. — Neues Platinhydr., 518.
- Döbereiner (F.), Untersach. üb. Platin u. Osmium-Irid XXXVI 161.
- Dove, Thgl. Veränder. d. magnet. Abweich. in Freiberg, XXXI 97. — Bemerk. üb. d. Regen, 513. — Vorhandenseyn v. zwei Regenzeiten im süd. Europa, XXXV. 375 — Discontinuität d. Blüthen, 380 — Opt. Eigensch. d. Diopsid, 380. — Vers. üb. Circularpolarisat. 579 — Besch. eines App. für kreisf. circul. u. ellipt. Polarisat. 596. — Bemerk. üb. d. Witter. 1835. XXXVI 318. — Einfl. d. Drehung d. Erde auf d. Strömung d. Atmosph. 321. — Merkw. Eigensch. d. Westwinde in Dänemark, 558 — Untersach. posit. u. negativ. einax. Krystall. b. circul. u. ellipt. Polarisat. XXXX. 457. — Erscheinung b. zweiax. Krystall. in circul. polarisirt. Licht, 482 — Zusammenh. d. optisch. Eigensch. d. Bergkrystalle mit d. krystallograph. 607 — Ueber d. verschied. Theorien d. Winde, XXXII 316.
- Dufrénoy, Beschreib. d. Junckerit, XXXIV. 661.
- Dujardin, Vorkomm. d. Arragonits im Wass. d. artes. Brunnen zu Tours. XXXIII 352.
- Dulk, Elektr. Erreg. b. chem. Verbind. XXXII 91
- Dumas, Untersach. im Gebiet d. organ. Chemie, XXXI 641. — Wirk. d. Chlors auf Alkohol, 650. — Ueber einen neuen Alkohol, XXXIII 248 — Zusammensetz. d. Oels aus d. Kartoffelbranntw. XXXIV. 335.
- Dumas u. Peligot, Ueb. d. Holzgeist u. d. Ätherart. Verbind. dess. XXXVI 88. — Ceten und eine neue Reihe Ätherartiger Verbind. 139
- Dumas u. Liebig, Zusammensetz. einiger organ. Säur. XXXII. 445
- Duméril, Aale in artes. Brunnen, XXXVI 561

## E

- Egen, Broch. d. Nordl. v. 18 Oct. 1836 zu Elberfeld, XXXIX 200.
- Ehrenberg, Bemerk. zu d. Booh. üb. d. feinsten Nervenfasern von Krause, XXXI 119, XXXII 80. — Natur üb. Zugvögel, XXXI 576, XXXIV 181 — Phosphors. Kalk an d. Zäunen, u. Kieselerde im Panzer v. Infusorien, XXXII 571 — Ueb. einige Krystallisationsverhältnisse, XXXVI 237. — Vorkomm. fossiler Infusorien und

- ihre große Verbreit. XXXVIII. 213 455. — Mikroskopisch. Charaktere d. rödiz u. drith Mineral. XXXIX 101. — Ueber ein aus fossil. Infusorien bestehendem zu Bent gebackten Bergzwehl, XXXX. 148. — Polirschuf v. Oran aus Kieselorganismen gebildet, 636. — Natur u. Bild d. Koralleninseln u. Korallenbänke im rothen Meer, XXXI. 1 243. — Massenerhaltungssue d. jetzt lebend Kiesel-Infusorien, u. ob ein Infusorien-Conglomerat als Polirschiefer v. Jastraba, 555. — Ueb. ein mehr als 28 Fuß mächtiges Infusorien-Lager am südlichen Rande der Lüneburger Heide, XXXII. 470. — Verfälschung des Carmins, 587.
- Ehrmann, Anal. d. Schweinfurter Grün, XXXII 474.
- Eisenlohr, Einfluß d. Mondes auf d. Barometerst. u. Beob. d. Regenmenge zu Straßburg, XXXV. 111 309. — Result. d. koptarher meteorolog. Beob. XXXVI 646. — Versuche üb. das dritte Kepler'sche Gesetz, XXXVII 607.
- Encke, Berechn. d. Bahn d. Sternschnupp. XXXIII 213. — Hypothese d. widerstehend Mittels im Weltraume, XXXVIII 573. — Geogr. u. physikal. Constant. v. Berlin, XXXIX 213.
- Erman (A.), Höhe d. Kaspischen Meeres u. einige Vulkane in Kamtschatka, XXXIII 230. — Declinat. zu Irkuzk u. Einfl. eines Erdbebens darauf, XXXIX. 115. — Aender. d. spec. Gew., welche d. Meerwasser durch d. Wärme erleidet, XXXI. 72.
- Erman (A.) u. Herter, Period. Aender. d. magn. Declinat. zu Berlin u. seculäre Abnahme ders. in Berlin u. Königsberg, XXXVII. 522.
- v. Eschwege, Diamanten-Ausbeute in Brasilien, XXXI. 607.
- Ettling, Ueb. ein. neuen Aether, XXXIX 137.
- F.
- Faraday, Experimental-Untersuchung. üb. Electr. Vierte Reihe, XXXI 225. — Fünfte R. XXXII 401. — Sechste R. XXXIII 119. — Siebente R. 301. 433. 481. — Achte R. XXXV 1. 222. — Neunte R. 413. — Zehnte Reih. XXXVI 505. — Ueb. d. magneto-electr. Funken u. Schlag; besond. Beihing z. elektro-magn. Vertheil. XXXIV. 292. — Allgem. magn. Bezieh. u. Character. d. Metalle, XXXVII. 423.
- Fechner, Appar. z. Anstellung d. Volt. Grundvers. XXXXI 225. — Ueb. d. Knipresse, 501. — Rechtfertig. d. Contact-Theorie, XXXII 481.
- Feldt, Beob. eines Nordlichts zu Braunsberg, XXXV 378. — Einfl. d. Nordlichts v. 7 Nov. 1835 auf d. Magnetnad. XXXIX 222. — Beob. d. Sternschnupp. am 13. 13. u. 14. Nov. 1836 zu Braunsberg, XXXX 481. — Uebersicht d. dasselbst 1836 angestellt. meteorol. Beob. XXXXI 538. — Merkw. hoher Barometerstand dasselbst, XXXXII. 668.
- Fellenberg, Neue Meth. z. Auflösung d. Irid. XXXXI 210.
- Ferguson, Beob. d. Quellentemp. bei Edinburg, XXXII 275.
- Fischer, Beob. v. Infusorien im Kieselguhr, XXXVIII 214.
- Fitzroy, Bericht üb. ein. Erdbeb. in Chili, XXXVII. 441.
- Forbes, Ueb. Vibrat. zwischen Metall v. ungleich Temp. XXXIII 553. — Polarist. u. Doppelbrech. d. Wärme, XXXV 553. — Undulationstheorie d. Wärme u. Circulärpolarisat ders. XXXVII 501.
- Forchhammer (G.), Zusammensetzung d. Porcellanerde u. ihre Entsteh. aus d. Feldsp. XXXV 331. — Besch. d. Oerstedt, 630. — Niveau-Veränder. in Dänemark XXXXII. 476.
- Forchhammer (P. W.), Der Kaspische See u. seine unterird. Abzugskanäle, XXXIII. 211.

- Fournet, Beschreib. u. Anal. d. Voltzit. XXXI 62. — Schmelzsp. einer Zink-Wismuth Legir 576.
- Frankenheim, Collision d. flüssig. Körper. XXXVII. 109. — Verbind. verschiedenart. Krstll 516. — Chem. u. krystallinom. Beob. XXXVII. 637, XXXX. 447. — Ueber Aggregatzustand, XXXIX. 376.
- Fresnel, Dreh. d. sieben Hauptstrahl. abgeleitet. aus d. Compensation mittelst Gyps, XXXVIII. 192.
- Frick (G.), Anwend. d. Iridiums zu Porcellanfarb. XXXI. 17. — Scheid. d. Irid. zu technisch. Gebrauch im Grob. XXXX. 209.
- Frick (H.), Chem. Untersuch. d. Nadelerzes, XXXI 529. — Zusammensetzung d. Thonschiefers, XXXV 188.
- Fritzsche, Ueber das Amylum, XXXII 129. — Ueb. d. Pollen der Pflanzen u. d. Pollenin, 481. — Neue Verbind. d. kohlensaur. Talkerde mit Wasser, und über Magnesia alba, XXXVII 304. — Ueb. Schwefelblumen, XXXVII. 453. — Neue Verbind. v. schwefels. Talkerde mit Wass. 577.
- Fromherz, Bericht d. Mangans. u. Uebermangans. betriff. XXXI. 677.
- Fuchs, Zum Amorphism. fester Körper. XXXI 577. — Triphyllin u. Tetraphyllin, verwandte Mineralien, XXXVI 173.
- Fofs, Lage u. Fortrück. d. Abweichungscurv. im nördl. Asien, XXXVII. 481.
- G.
- Galle, Prüf. v. D. Dove aufgestellt. Gesetz. üb. d. verschied. Verhält. d. Ost- u. Westseite d. Windrose, XXXI 465. — Bestätig. d. Dove'sch. Windtheorie, XXXVIII 472. — Beob. d. Sternschupp. v. 11. Nov. 1836 zu Berlin, XXXIX 354.
- Gauthier, Beschreib. d. Kosmoglobus, XXXVII 672.
- Gaudin, Künstl. Rubin, XXXXII. 472.
- Gauss, Bericht üb. verschied. in Götting. angestellte magnet. Beob. XXXII. 562, XXXIV 546. — Beob. d. magnet. Variation. an 5 Oertern, XXXV 480.
- Gauss u. Möbius, Beob. d. magn. Variat. in Göttingen u. Leipzig, XXXIII 428.
- Gay-Lussac, Mittel hohe Temp. zu schätz. XXXIX 318.
- Girardin, Ale. in artea. Brunnen, XXXVI 561.
- Gmelin, Vers. üb. d. Blut, XXXI. 289. — Analyse d. Badsinters zu Ems, XXXVII. 199. — Aufsuch. d. Quecksilb. in dem b. d. Mercurialsalivat. entleert. Speichel, XXXI 138. — Untersuchung eines nach einem Anfall v. Magenkrampf gelassenen Harns, XXXII 158. — Beschreib. einiger chem. Appar. XXXII 557.
- Göppert, Urveltliche Blüten, XXXVII. 455. — Ueb. d. Zustand fossil. Pflanz. u. d. Versteinungsprocesss, XXXVIII 561, XXXIX. 222. — Abstamm. d. Bernsteinzure, XXXVIII 624. — Verstein. auf andern Wege, XXXXII 593.
- Goldschmidt, Beob. d. Nordl. v. 18 Febr. 1837 in Göttingen, XXXX 466.
- Gräger, Berichtig. zu Löwe's Zerleg. d. Basalts XXXXII 692.
- Graham (M.Sc.), Hebung. d. Küste v. Chik, XXXVII 445.
- Graham, Ueb. d. Arsens u. Phosphors Salze, zu wie üb. d. Abänderung. d. Phosphors. XXXII. 33. — Verhinder. an d. Sicherheitlampe, XXXVII. 467. — Ueb. d. Wurz. als Bestandtheil d. Salze zunächst b. schwefels. XXXVIII 123. — Krystallwass. d. Natron-Albuns, XXXIX 582.
- Gray u. Phillips, Regenmenge zu York in verschiedenen Höhen, XXXIII. 215, XXXVIII 235.
- Griffiths, Erfahr. üb. d. Sehen, XXXIII. 477.



- Gérard, Doppelbrech. d. gehäuteten Glas. XXXVIII 233.  
 Guibourt, Hypothese üb. d. Ursach vulkan. Erscheinen XXXI 158.  
 Gumprecht, Nephelin in Sachsen, XXXII 171.  
 Guyot, Anziehung durch schwingende Körper XXXI 610.
- H.
- Hachette, Beschaffenh. d. oscillir. Flüssigkeitsstrahl XXXI 121.  
 Hällström, Magn. Neig. in Helgolands, XXXI 197. — Prüf. d. Bestimmung üb. d. Volumsänder. d. Wass. b. verschied. Temper., u. üb. d. Wärme d. gesätt. Dichtigkeit XXXIV 220.  
 Hall (J.), Leb. d. senkr. Richt. u. Biegung. gewiss. Gebirgsschicht. u. ihre Bezieh. z. Granit, XXXVII 273.  
 Hall (A.), Klimat. Untersch. d. Ost- u. Westküste v. Nord-Amerika, XXXI 661.  
 v. Hammer, Aelt. Nachricht. üb. Sternschnupp. XXXX 318.  
 Haccia, Elektr. Vers. in verdünnt. Luft, XXXI. 99. — Sündliche Thermometerbeob. zu Plymouth, XXXII 635 642.  
 Hartwall, Anal. d. Phenakits v. Ural, XXXI 60.  
 Hausmann, u. Stromeyer.  
 Heine, Künstliche Feldspathbild. XXXIV, 531.  
 Henwood, Temperaturdiffer. zw. Granit u. Thonschiefer XXXX, 562.  
 Henry, Vers. üb. d. gasverbund. Wirk. d. Metalle, XXXVI. 150. — Heine u. Platinwirk. durch Gase, XXXIX 345.  
 Héricart de Thury, Beob. üb. Quell. u. artes. Brunn. XXXVIII 602 605.  
 Hermann, Ueb. d. saure Beschaffenh. d. venös. Bluts, u. d. Untersch. zw. venösem u. arteriell. Blut, XXXI 311. — Chem. physiolog. Beiträge, XXII 293. — 3fache Verb. v. Osmium-, Irid- u. Platinchlorid mit Chloralk. u. Chlorammon. XXXVII. 407.  
 Herrnschneider, Beob. d. Bodentemp. in Straßburg, XXXI 277.  
 Herchel, Absorption d. Lichts durch farb. Mittel in Bezug auf d. Undulationstheor. XXXI 245. — Wirk. d. Salpeters. auf Eisen, XXXII. 211. — Princip u. Construct. d. Actinometers, 661. — Beob. am Actinom. XXXX 318. Leb. Actine, XXXXI 559.  
 Herter, Beob. d. Nordlichts v. 18. Oct. 1836 zu Berlin, XXXX. 202. — a. Erman.  
 Hertz, Arsen. in Phosphorsäure, XXXI 126.  
 Hertzog, Entdeck. eines neuen Alkalis u. Bittersalz in Süd-Afr., XXXI. 134.  
 Hela, Besch. u. Zerleg. d. Hydroboracit, XXXI. 49. — Leb. eing. Prod. d. trockn. Destillat. XXXVI. 417, XXXVIII 378. — Gegenw. Gew. d. Palladisch. El. armmasse, XXXVI. 560. — Beleucht. einige streitig. Punkte üb. Eopion u. Bergnaphthalin, XXXVIII. 163. — Zur Erklär. d. Wirkung heils. Luft b. Gichtkr., 232. — Bereitung d. Eopion, XXXX 94. — Gährungsfähigk. d. Melchzuck. XXXXI 191. — Besch. zweier neuen Lamp. 199. — Zusammensetz. d. Zuckers. XXXXII 347.  
 Hesse, Opt. Unters. am Gyps, XXXV. 263.  
 Hefaler, Chem. Wirk. d. Sonnenspectr. XXXV. 578.  
 Heurteloup, Neue Eigensch. d. Knallpulv. XXXV. 308.  
 Himly, u. Bunsen.  
 v. Hoff, Verzeichn. v. Erdbeben, vulkan. Ausbrüch. u. merkw. meteor. Erschein. seit 1829. XXXIV. 85 339. — Zur Gesch. d. Sternschnupp. XXXVI 315. — Nordl. v. 18 Febr. 1837, beob. in Göttingen, XXXX 468.  
 Horner, Besch. d. Theorie d. Didaleums, XXXII 630. — Menge d. fest. Substanzen die d. Eiberein z. Meer führt, XXXIII 228. — Künstl. Perlmutt. XXXVIII. 211.



Hossard, s. Peytier

v. Humboldt, Bemerkung üb. d.

Temperat. d. Ostsee, XXXII 223.

— Ueber einige elektromagnet.

Erschein. u. d. vermindert. Luft-

druck in d. Tropen auf d. Atlant.

Ocean, XXXVII. 241. 462. —

Vers. am Zitteraal, XXXIX 413.

Geognost. u. physikal. Beob.

üb. d. Vulkane v. Quito, XXXV.

161. — Goldausbeute am Altai,

641.

Hunter, Bericht v. einem Moor-

bruch in Irland, XXXIX. 513.

J.

Jacobi (C. G. J.), Ueb. d. Figur.

d. Gleichgewichts, XXXIII 229.

Jacobi (M. H.), Ueb. Elektromag-

nete, XXXI. 367. — Beschreib.

d. Commutators, XXXVI 305. —

Ueb. Becquerel's einf. Sauer-

stoffkette, XXXA. 67.

Jacobson, Eindr. ein. Lösung v.

chroms. Kali auf organ. Substanz,

XXXI. 605.

Jacquemyns, Erschei. b. Sied.

XXXVII. 467.

Jerichau, Ueber d. Zusammen-

strömen flüssig. Körper, welche

durch poröse Lamellen getrennt,

XXXIV. 613.

Johannsen, Ueber den Jodäther,

XXXI 585. — Dimorphie des

Baryt-Calcits, XXXIV 668.

Jordan, Besch. eines Appar. z.

Silberprobiren, XXXIV. 16.

Jürgensen, Urthermometer für

mittl. Temper. XXXIX. 524.

K.

Kämtz, Bitte an Meteorologen,

XXXI 284.

Kane, Ueber Schall-Interferenz,

XXXVII. 135. — Einwirk. des

Ammoniak auf die Chloride u.

Oxyde des Quecksilb. XXXXII.

367.

Kayser, Cyclon v. 12 Zwillinga-

genet. b. d. Feldspathgattungen,

XXXIV 109 301.

Kersten, Analyse des Zinkischen

Osenbruchs auf Freiburger Hütten,

XXXI. 64. — Künstliche Dar-

stellung d. Feldspaths, XXXIII.

346.

Kindler, Bemerk. üb. d. Bildung

einig. Eisenerze, XXXVII 203.

Knochenhauer, Gesetze d. Ma-

gnetismus nach Ampère's Theo-

rie, XXXIV 481. — Oerter d.

Max u. Min. d. gebeugt. Lichts

nach Fresnel's Beob. XXXAI.

103.

Knorr, Meteorolog. Beobacht. zu

Kasan, XXXXII. 647.

v. Kobell, Berechn. d. Gestalt

d. tesseral Systems, XXXI 311.

Köhler, Zur Naturgeschichte d.

Kreuzsteins, XXXVII 561.

Kölbing, Beob. d. Nordlichts v.

18 Februar 1837 zu Gudenfeld,

XXXA 472.

Kopp, Construct. eines Differen-

zialbaromet. XXXX 62.

Kowanko, Beob. d. magn. Ab-

weich. zu Peking, XXXIV 53.

Kraskowitz, Erzeug. d. Zinn-

chlorids, XXXV 517. — Man-

ganisation, XXXVI 564.

Krause, Ueb. d. gekrümmten Flä-

chen der durchsichtig. Theile d.

Auges, XXXI 93. — Bemerk.

üb. d. feinst. Nervenfasern, XXXI.

113. XXXII 76. — Gestalt u.

Dimensionen d. Auges, XXXIX.

529.

Keell, Beob. d. magn. Abweich.

Neig. u. Intensit. 1836 u. 37 zu

Mailand, XXXAI 521 528.

Kudernatsch, Anal. d. Tafel-

messungen v. Hegermühl, XXXVII.

575. — Chem. Untersuch. einig.

Abänder. d. Hornblende u. d. Au-

git, 577. — Anal. d. Plagionit,

588. — d. Tennantit, XXXXII.

397. — Chemische Untersuch. d.

Zinnkies, XXXIX 146.

Kützing, Kieselende in d. Pan-

zern v. Infusorien, XXXII 575.

— Panzer d. Bacillarien, XXXVIII

215.

Kupffer, Magnet. Neig. zu Hol-

zingfors, XXXI 197. — Ueb. d.

Kalkformat auf d. Insel Porqus,

194. — Bemerk. üb. d. Temper.

d. Quellen, XXXII. 270. — Zu-

nahme d. Temper. in d. tiefern Erdschicht 284 — Variation d. magn. Intensit. in St. Petersburg, XXXIX. 225. 417.

## L.

Lesond, Beob. eines Südlichts, XXXVIII 627

Lambert, Ursach d. Temperatur-Unterschiede beider Halbkugeln, XXXIX 71

Lamé, Mittel hohe Temperat. zu schützen, XXXIX 520

Lappe, Anal. d. Asbests v. Korak, XXXV 486

Lassaigne, Einfl. d. Temp. auf d. Lös. d. Jod-Amidins, XXXI 624. — Jodplatin u. dessen Verbind. mit and. Jodid u. Jodwasserstoffs XXXIII 67.

Laurent, Neuer Chlor- u. Bromkohlenwasserstoff, XXXI 320 — Ueb. Benzoyl u. Benzimid, XXXVI 497 — Zerleg. v. Subcat. XXXIX 527.

Leaou, Darstell. d. rein. Stearin, XXXI 639

Leece, Beob. üb. Bild. d. Hagels, XXXVIII 606.

Legend, Veränderungen, welche Salze im Siedp. d. Wassers hervorbr. XXXVII 379

Leist, Beob. d. Nordl. v. 18. Fbr. 1837 in Köln, XXXX 475

Lenz, Bestimm. d. Richt. d. durch elektrodynam. Vertheil. erzeugten galvan. Ströme, XXXI 483. — Gesetze, nach welchen d. bewegte Magn. auf eine Spirale wirkt, u. vortheilhafteste Construct. d. Spirale zu magnetoelektrisch. Zweck, XXXIV 385. — Leitungsfähigk. d. Metalle für Elektr. b. versch. Temper. 418 — Bemerk. gegen Muncke's Aufsatz üb. Thermoelektr. d. Glases, XXXV 72

Liebig, Anal. d. Mekons. u. Metamekons XXXI 168 — Zusammensetzung d. Asparagins u. d. Asparagins 220 — Ueb. d. Constitut. d. Aethers u. sein Verh. d. 321. — Anal. d. Hippura XXXII 572 — Kohlenoxyd :: Kalium,

XXXIII 90. — Untersuch. mehrerer Stickstoffverbind. XXXIV 570. — Anal. d. Gerbst. XXXVI 51. — Product. d. Oxydation d. Alkohols, 275 — Ueber die Substitutionstheorie von Dumas, u. Constitut. d. Aeth. XXX 292

Zusammensetz. d. Mandelsäure, XXXI 384 — Störk d. Sauerkohls, XXXII 588. — a. Dumas.

Liebig u. Pelouze, Ueb. Oenanthe u. Oenanthesäure-Aether, XXXXI 571.

Liebig u. Wöhler, Bild. d. Bittermandelöls, XXXXI 343 — Vorschlag z. Einföhr. ein Arzneymitt. statt Kirschlorbeer- u. Bittermandelwasser, 366 — Ueber Marcell's Xanthic-Oxyd, 393. — Natur d. Horns 561.

Linari, Elektr. Funk. aus d. Zitterrochen u. d. thermoelektr. Kette, XXXX 642

Linne u. Matteucci, Elektrische Funken v. Zitterrochen, XXXVIII 291.

Link, Versuche über Capillarität, XXXI 593.

Llambias, Magnetisir. durch Maschinen-Elekt. XXXIV 84.

Löwe, Anal. d. Basalts v. Aetna, XXXVIII 151 (s. XXXII 692) — Analyse d. strahligen Blende, XXXVIII 181

Löwenthal, Einatm. d. doppelwirkende Luftpumpe, XXXI 112

Lüwig, Untersuch. d. flücht. Oels d. Spiraea ulmar. XXXVI 383.

— Zersetzungsprod. d. Aethers durch Brom, 551. — Zusammensetz. d. flücht. Oels d. Rinde v. Prunus Padus, 555. — Merkwürdig. Bild. d. Kokons, u. vorläufige Notiz v. eing. Aetherart XXXVII 400 — Schwefelwasserstoff. u. Selenwasserstoffäther, 550 — Zur Theorie d. Amide, XXXX 407 — Beiträge zur organ. Chemie, XXXII 399. — Umwandlung d. Traubens in Weiss 588

Loomis, Essig d. Nordl. auf d. Magnetnadel XXXVII 463

Lych

**Lychnell**, Untersuch. d. Specksteins, XXXVIII. 147. — d. Agalmatoliths, 149

**Lyell**, Beweise ein. allmährl. Emporsteig. gewoss. Landstriche in Schweden, XXXVIII. 64.

## M.

**Mac-Cullagh**, Polaris d. Lichts durch Spiegel. an doppelt brech. Körper. XXXVIII. 276.

**Magnus**, Wirkung d. Ankers auf Elektromagnete u. Stahlmagnete, XXXVIII. 117. — Ueb. d. Sied. d. Gemenge zweier Flüssigk. u. üb. d. Stofs derselb. 481. — Veränd. Construct. d. Geothermomet., u. Temperaturbestimm. im Bohrschacht zu Pitzpohl, XXXX. 139. — Ueb. d. im Blut enth. Gase, 583.

**Malaguti**, Paratell. d. Kupferoxydul, XXXV. 527.

**Malaguti u. Pelouze**, Veränd. d. Zuckers durch lang. Kochen, XXXII. 211.

**Marcel de Serres**, Ansicht üb. arken. Braun XXXVIII. 604. — Hühl v. Roquefort, XXXII. 585.

**Marchand**, Krystallform d. Joda, XXXI. 540. — Zusammensetz. d. Weinschwefels XXXII. 454. — Oxals. Zink- u. Kadmiumoxyd, XXXVIII. 143. — Chem. Untersuch. d. Knorpel v. Haifisch u. Rochen, 353. — Unt. ein. hydrophisch. Flüssigk. 356. — Neue Darstell. d. Chromalanna, XXXI. 694. — Ueb. atherschwefelsaure Salze, 595. — Darstell. d. rein. schwefl. Säure, XXXII. 141. — Auflöslichk. d. rein. Quecksilberoxyds in Wass. 459. — Glas v. schwefels. Ammoniak u. im Vacuum, 536.

**Marion**, Gröste. Badhitze, XXXVIII. 479. — Einfl. d. Bewald. auf Regen o. Quell. 623.

**Mattucci**, Bildung d. Essigs. auf unorgan. Wege, XXXI. 32. — Untersuch. üb. Electric. XXXV. 260. — Wärme-Interferenz, 559. — Eigensch. d. durch Flüssigk. fortgeplanz. elektrisch. Ströme, Poggendorff's Annal. Bd. XXXII.

XXXIX. 398. — Vers. mit dem Zitterrochen, 485. — Beobacht. d. Nordl. v. 18. Oct. 1836, 588. — v. Linari.

**Maugham**, Licht für Taucherglocken, XXXX. 590.

**Medina**, Erfind. d. amerik. Amalgamationsmeth. XXXII. 109.

**Melloni**, Ueb. d. freien Durchgang d. strahlend. Wärme durch starre u. flüssige Körper. XXXV. 112. 277. 385. 530. 559. — Einige Hauptpunkte in d. Lehre v. d. strahl. Wärme, XXXVII. 206. Reflex. d. strahl. Wärme, 212. — Polarisat. d. Wärme durch Turmalin, 218. — Betracht. v. Vers. üb. d. Einerleiheit d. Lichts u. d. strahl. Wärme, 486. — Polarisat. d. Wärme durch Refract. 494. — Ueb. Polaris. d. Wärme, XXXIX. I. — s. Biot.

**Merian**, Temperatur des Rheins, XXXIX. 100.

**Mile**, Richtungslinien d. Sehens, XXXII. 37. 245.

**Miller**, Linien im Spectr. v. Licht, das durch Brom u. Joddampf gegangen, XXVII. 128. — Krystallform d. Schwefelmuckels u. ander. Substanz. XXXVI. 475. — Lage d. Ax. d. opt. Elastic. in Krystallen d. hemiprismat. Systems, XXXVII. 368.

**Milliet**, Besch. eines Meteorst. XXXVII. 460.

**Minding**, Bemerk. üb. stat. Magnetnad. XXXX. 151.

**Mitscherlich (E.)**, Theorie d. Aetherbild. XXXI. 279. XXXVII. 66. — Benzinschwefels 283. — Vers. üb. d. Blut, XXXI. 280. — React. d. Lackmus geg. arseniks. u. phosphora. Natron 319. — Zusammensetzung d. Nitro- u. Sulfobenzins, 625. — Ueb. zwei besond. Klassen v. Atomorgan. Verbind. 631. — Stickstoffbenzid, XXXII. 225. — Benzoeschwefels 227. — Aetheroxalsäure, 664. — Anal. kohlenstoffhalt. Verbindung. XXXIII. 331. — Chlorbenzin u. Chlorbenzid, XXXV. 370. — Kry-

- atallform u. Zusammensetz. gewisser saur. Salze, u. Uebereinstimmung beider b. gewissen Oxyd. XXXIX 196. — Bestimmung d. Ausdehn. krystallisirt. Korp. durch d. Wärme, XXXI 213 148.
- Mitscherlich (G.) schwefelsaur. Kupferox. :: d. Bestandtheilen d. thierisch. Organism. XXXX. 106.
- Mohr, u. Gauss.
- Müller, Sternschnupp. in Grönland, XXXIX 111.
- Mohr, Verbesserte Construct. v. Luftpomp. XXXII. 476. — Beob. eines St. Elms-Feuers, XXXIV. 370. — Vertheil u. Bindung d. Elektr. in isolirt. Leitern, XXXVI. 221. — Beob. einer Erdtrombe u. Wasserhose zu Coblenz, 231. — Erdbeb. zu Coblenz, 235. — Kraftvolle Hufeisenmagnete durch Stroichen zu bereitt. XXXVI 542. — Ueb. Becquerel's einfach., sammt. zu Zersetz. dienl. Appor. XXXII 76.
- Moncey, Entwurf zu ein. riesenloß. Braun XXXX. 495.
- Morson, Darstellung d. Aconitin, XXXII 175.
- Moser, Ueb. d. Magnetismus der Erde, XXXIV 63 271.
- Mousson, Ueb. eine subjektive Lichterschein. XXXIX 214. — Erklar. d. Verhaltens d. Salpeters zu d. oxydirbar. Metall 330.
- Müller, Erklär. d. isochromatisch. Curr. welche einax. Krystalle in lamogen polarisirt. Licht zeigen, XXXIII 262, XXXV. 93 261. — Opt. Eigensch. d. amehens. Kupferoxyds, XXXV 472. — Künstliche Nachbild. v. Zwillingkrystall., an welchen ohne vorangehende Polarisat. epopt. Figuren beobacht. werden, XXXX 110.
- Müller, Struct. u. chem. Eigenschaft. d. thien. Bestandtheile d. Knochen u. Knorpel, XXXVIII. 266 476.
- Müller, Beob. eines ungewöhnl. Hagelstalls, XXXII 681.
- Mutder, Chem. Anal. d. Seide, XXXVII. 594. — Zusammensetz. d. Herbstfäul. XXXIX. 498. — Verhalten des Kalium auf einer Queckkoberfläche, 500. — Dichtigkeit d. Meerwass. an verschied. Stell. 507. — zu verschied. Zeit an denselb. Orten, XXXVI 498. — Organ. Anal. d. Fibrin, Eiweiß u. d. Gallerte v. verschied. Thier XXXX 253. — Zersetz. einig. aus verschiednen Cinnamumart. gewonn. ätherisch. Oele, XXXVI 398. — Ueb. d. Oel d. aus Getraide destillirt. Getränke, 585.
- Mullins, Verbesserung. an d. magnetoelktr. Maschine, XXXIX. 410.
- N.
- Naumann, Eigenthümliche Zwillingssind. d. weiß. Spießkoblits, XXXI 537. — Hemiedrie u. Homimorphism. d. wolframs. Bleioxyds, XXIV 373, XXV 528. — Zurückführ. d. hexagonal Gestalt auf 3 rechtwinklige Axen, XXXV 363. — Bericht Eb. ein. merkwürdig. Blitzschlag, 519.
- Noef, Besch. u. Anwend. d. Blitzrades, XXXVI 332. — Beob. d. Sternschnupp. v. 12 u. 13 Nov. 1830 zu Frankfurt M. XXXIX 357.
- Negro (Dal), Vera. x. Bestätig. d. Wirk. d. Umfangs b. d. Metallplatt. d. Volt. Kette, XXXI. 261.
- Neumann, Elasticitätsmaßs. krystallinisch. Substanz. d. homoedr. Abtheil. XXI 177. — Ueb. d. opt. Ax. u. Farb. zweiax. Krystalle im polarisirt. Licht, XXXIII 257. — Opt. Eigensch. d. hemiprism. Krystalle, XXV, 61 203 381. — Intensit. d. ordentl. u. außerordentl. Strahl., so wie d. reflect. Lichts nebst andern d. Licht betref. Bemerk. XXXX 197. — Einfl. d. Krystall. auf d. reflect. Licht, u. Intensit. d. ordentl. u. außerordentl. Strahls, XXXIII 1.
- Nilson, Beob. üb. d. Sinken der schwed. Küste an gewiss. Orten, XXXIII. 472.

Nobili, Beob. üb. d. elektro-chem. Figur, elektrodyn. Gesetze u. d. innern Mechanism d. Volta'sch. Soule, XXXIII. 537. — Wirk. von hohler Magnetst. über, XXXIV. 270. — Beschreib. zweier neuen thermoelektrisch Säulen u. ihres Gebrauchs, XXXVI. 525.

Nöggerath, Krystallform d. regul. Zinks, XXXIX. 323.

Nöggerath u. Bischof, Neue Schwefelkiesbild. XXXVIII. 407.

Nörrenberg, Opt. Eigensch. d. Gypses, XXXV. 81. — d. Borax, 382.

Nordenskiöld, Beschreib. d. Phenakits v. Ural, XXXI. 57.

## O.

Oersted, Neue Vers. üb. d. Zusammendrückbarkeit d. Wassers, XXXI. 381.

Olmsted, Beob. d. Sternschnupp. v. 13. Nov. 1833 in New-Haven, XXXIII. 193. — v. 13. Nov. 1834, XXXIV. 129.

Osann, Bestimm. d. spec. Gew. b. Schwefel im dick. u. dünnflüssigen Zustand, u. Zerleg. d. wunst. kalk-Natron durch Hitze, XXXI. 33. — Vers. üb. Phosphorese durch Insolation u. Beschreib. eines Photometers, XXXIII. 405. — Ueb. Ergänzungsfarben, XXXVII. 267, XXXVIII. 72. — Ueb. Meteorita, XXXVIII. 238.

— Scheid. d. Broms u. Jods v. Chlor, XXXIX. 370. — Period. Sitzquelle, XXXX. 494. — Bestimmung der Güte des Mostes, XXXIII. 460.

Oswald, Merkwürd. Blitzschlag, XXXVIII. 543.

Otto, Schwefelsaures Ceroydul, XXXX. 404.

## P.

Palmer, Beob. d. Sternschnupp. v. 13. Nov. 1833 zu New-Haven, XXXIII. 196.

Parish, Übungen an d. Kiste v. Chili, XXXVII. 413.

Parrot, Höhenunterschied zwisch.

d. Kaspisch. u. Schwarz. Meere, XXXII. 554.

Pattinson, Affinit. durch Krystallisat. XXXXI. 203.

Payen u. Persoz, Ueb. Dextrin u. Diastase, XXXII. 170. 174.

Peccet, Ueb. d. Striche, die man durch eine schmale Spalte mit bloß. Auge sieht, XXXIV. 537.

Pellegot, Wirkung d. Stickoxydgas auf Eisenoxydulsalze, XXXI. 24. — Neue bromhaltige Säure, XXXVII. 514. — Destillation d. benzoes. Kalks, XXXVI. 69. — s. Dumas.

Pelletier, Untersuch. d. Glases auf einen Arsenikgehalt, XXXI. 128.

Pelouze, Ueb. ein allgemeines Gesetz in d. Zusammensetz. d. brenz. Säure, XXXI. 210. — Veränder. d. Zuckers durch langes Kochen, XXXII. 211. — Prod. d. Destillation d. Äpfelsäure, XXXII. 218.

XXXVI. 52. — Cyanwasserstoffäther, XXXII. 304. — Darstell. d. Salpeterschwefels, XXXV. 528.

— Ueb. Gerbstoff u. Gallussäure, XXXVI. 29. — Destillationsprod. d. Weins u. Traubensäure, 65. — Verb. d. Stickschwefels, XXXIX. 181. — s. Liebig. Malaguti.

Pentland, Höhe d. Aconagua, XXXIII. 391. — Höhe d. Hov. versagen, 592.

Persoz, Wirk. verschied. Säure auf Dextrin, Rohr-, Milch- und Mannazuck. XXXII. 207. — A. d. eines neuen kohlens. Natr. XXXII. 303. — Trenn. verschied. Metalle durch Paraphosphorsäure, XXXIII. 246. — s. Payen.

Peytier, Höhe d. Berge in Grischon, XXXIX. 567. — Klima v. Grischon, XXXX. 156.

Peytier u. Rosnard, Höhe d. Wälder in d. Pyrenäen, XXXIX. 587.

Pfaff, Ueb. Becquerel's chem. wirk. galvan. Kette, XXXX. 113. — Verstärkung d. Lichts nach Drummond's Methode, 547. — Verbind. d. Stickst. mit d. Metall, 46.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



- namentlich mit Kupfer, XXXII. 164. — Antimon-Wasserstoff u. Unsicherheit des Verfahrens von Marsh, Arsenik zu entdecken, 339.
- Phillips, Reduction des Platins, XXXI 288. — Beob. üb d Temp. im Inn d Erde, XXXIV. 191. — a. Gray.
- Pinaud, Einfach. Apparat z. Erleut. d. elektrochem. Erschein. XXXVI 348. — Neue Art der Tonerzeug XXXII. 610.
- Pingel, Sink d. grünländ. Küste, XXXVII 446.
- Platou, Ueb. d. Phänom. d. scheinb. Farben, XXXII 543. — Erfindung d. Stroboskop Scheiben, 647. — Betrachtung. üb ein von Talbot vorgeschlag. photometr. Princip, XXXV. 457. — Beschr. d. Anorthoskops, XXXVII 464. — Berichtigung, veranlaßt durch Osann's Abhdl. XXXVIII. 626.
- Pleischl, Krystallisation des Kalium's, XXXI. 431.
- Plieninger, Artes Brunnen in Württemberg, XXXX 491.
- Plützér, Berichtigung zu Cauchy's Aufsatz über Dispersion, XXXIII 691.
- Poggendorff, Relat. zwisch d. Element. ternäre. Verbind XXXI. 212. — Bereit. gelatig Getränke aus Milch, XXXII 209. — Ueb. Combinationstöne, u. Andeutung. zur Lösung dies. Problems nach d. Interferenzgesetz 320. — Geschichte u. Theorie d. Stroboskop. Scheiben, 636. — Meth v. Gauß's, d. relat. Declinat. zu bestimmen, 570. — Nachricht. üb. d. Sternschnuppenerschein. am 13. Nov. XXXIII 189. — Unterscheid d. Depolarisirt. Lichts v. d. natürl. XXXV. 449. — Bemerk. üb d. Theorie d. Dampfbild 202. 627. — Zusammenstell. d. Elementarzusammensetz. d. bisher zerlegt. Substanzen organisch Ursprungs, XXXVII 1. — Geschichtl. üb d. Polarisat. d. Wärme, 218. — *Tierker Barometerstand in Berlin*, 240. — Bemerk. üb. d. mittl. Luftdruck am Meere, XXXVII. 468. XXXXII. 479. — Bemerk. üb. d. Erdmagnetismus, XXXVII 558. — Bemerk. zu Poisson's Theorie üb d. Temperat. d. Erdballs, XXXIX 98. — Siedp. gemischter Flüssigkeiten, XXXX 394. — Beale's Lampe, XXXXI. 446. — Anweis. u. Taf. z. leichtern Berechn. d. spec. Gew. d. Dämpfe aus d. Beob. 449. — Interferenzphänomen, XXXXII 316. — Result. d. bisher angestellten stündl. Thermometerbeob. 630. — Meteorol. Beobacht. zu Berlin v. 1835 am Schlufs von XXXIV. XXXV XXXVI — v. 1836 am Schlufs von XXXVII. XXXVIII XXXIX — Alle mit P. bezeichneten Anmerk., dergl. anonyme Auszüge u. Uebersetzungen.
- Pohl, Beseitig. d. schäd. Raums in d. Luftpumpe, XXXII 628. — Beschreib. eines besonders zu chem. Wirk. dienl. magnetoelekt. Appar. XXXIV 185 500.
- Pohlmann, Theorie d. farbigen Schatt XXXVII 319.
- Poisson, Theor. Sätze üb. d. jährl. Schwankung d. Bodentemperat. XXXVIII 537. — Resultate aus Beob. an artes. Brunnen hinsichtl. d. Temper. d. Erd-Innern, 593. — Ursach d. Temp. d. Erdballs, XXXIX 68.
- Pouillet, Beob. üb. d. Magnetism. d. Metalle, XXXVII 429. — Untersuchung über hohe Temperat. u. davon abhäng. Erschein. XXXIX. 567. — Bestimm. niedrig. Temp. durch d. Luft u. Magnetpyromet. u. Weingeistthermomet. XXXXI. 144. — Volt. Stale u. Gesetz für d. Intensit. d. Stroms einer einf. Kette u. Säule v. groß. u. klein. Spann XXXVII 291. — Relat. Mess. thermoelekt. u. hydroel. Quell. u. üb. d. Elektricitätsmeng. welche z. Zersetz. von 1 Gr. Wasser, so wie z. Hervorbring. v. Eschfütter. unter gewiss. Umständ. erforderl. 297.



Powell, Ueb. d. Repulsivkraft d. Wärme, XXXIV. 636 — Vera. z. Aufsatz einer Theorie d. Dispersion d. Lichts, XXXVII. 352, XXXXII. 618.

Precht, Theorie der Dampfbild. XXXV. 198. 620.

Prevost, Ueb. einen Beweger v. neuer Erfind. XXXI. 270 — Ursache d. Temperatur-Ungleichheit beider Halbkugeln, XXXIX. 73.

Prinsep, Platin in Ätz, XXXIV. 381.

Puillon-Boblaye, Temperat. d. Quell. in Gruehenl. XXXX. 495.

Paton, Soudsteinkryst. XXXXII. 591.

## Q.

Quenstedt, Darstellung u. Entwicklung der Krystallverhältnisse mittelst einer Projectionsmethode, XXXIV. 503. 651. — Entwickl. u. Berechn. d. Datoliths nach d. Meth. XXXVI. 243. — Altekry. stalle d. Serpentin, 370. — Bemerk. üb. eine abgekürzte Project. 379.

Quenneville, Meth. schöne Wismuthkrystalle zu erhalt. XXXI. 432.

Quetelet, Physiol. opt. Beob. XXXI. 494. — Beob. üb. d. Bodentemp. zu Brüssel, XXXV. 139, XXXVIII. 531. — Mittl. Zahl v. Sternschnuppen während ein Nacht in d. versch. Jahreszeit XXXXI. 175.

## R.

Rainey, Ueber Elektromagnete, XXXIX. 410.

Rammelsberg, Cyan :: Cadmium, und über mehrere Doppelcyanüre, XXXVIII. 364. — Zusammensetzung des Berthierits, XXXX. 153. — Entsch. u. dopp. Cyanmetalle, XXXXII. 111.

v. Randow, Erschein. am Salpeter, XXXIX. 545.

Reich, Magn. Neig. zu Freiberg, XXXI. 189. — Beob. d. Temp. in d. Freiburger Gruben, XXXII. 280. — Beob. üb. d. Zunahme d.

Temp. mit d. Tiefe, u. über d. niedr. Temp. im Innern ein. Halde, XXXVI. 310.

Reichenbach, d. Pittakall XXXI. 78. — Steinkohlend. identisch mit Steinöl, 80. — Meinung über d. Kyanol, Karbols. u. s. w. d. Hrn. Kunge, 497. — Ueb. Eupion u. Bergnaphtha, in Bezug auf d. Ansichten d. Hrn. Hesse, XXXVII. 534, XXXVIII. 625.

Reinike, Beob. üb. d. 1251. Variet. d. Abweich. in Archangelak, XXXV. 58.

Renwick, Höhe d. Rocky-Mountains, XXXIX. 587.

Ries, Ueb. gebund. Electricität, XXXVII. 612. — Wirk. d. Reibungselektr. im Verhältn. zu ihrer Anbaut. XXXX. 321.

Rio (Del.), Geding. Selen u. Selenfossil XXXIX. 526.

Ritchie, Zurückfuhr. d. magneto-elektr. Vertheil. auf ein allgem. Gesetz, XXXI. 203. — Ueb. continuir. Rotat. eines geschlossenen Volt. Bogens durch einen and. geschloss. Bogen, 206. — Untersuch. üb. Elektromagn. u. Magneto-elektr. XXXII. 529. — Magneto-elektr. Maschine, XXXIX. 406. — Ueber Elektro-Magnete, 410. — Vorricht. z. Darstell. Newton'sch. Ringe, XXXXII. 176. — Fraunhofer'sche Linien, 590.

Rive (De la), Ueb. Volt. Elektr. u. d. El. chem. Ursprungs, so wie d. Eigensch. d. El. verschiedenen Uepr. XXXVII. 225. — Ueb. d. durch Reibung d. Metalle erzeugte Elektr. 506. — Beschaffenheit d. Atmosph. an der obern Gränze, XXXIX. 80. — Bemerkungen zu Poisson's Theorie üb. d. Temp. des Erdballs, 93. — Untersuch. üb. d. Volt. Elektr. XXXX. 385. 515. — Eigensch. d. magnetoel. Ströme, XXXXI. 152. — Einfl. d. Wärme auf d. Leichtigkeit d. Durchgangs elektrischer Ströme durch Flüssigkeiten und Metalle, XXXXII. 99.

- Riviere, Einfluss d. Bevald auf Quell. u. Regen, XXXVIII 622.
- Robinson, Artesische Brunn in Granit erhöht XXXIX 588.
- Rober, Mittheilung d. Untersuch. Schreiber's üb. d. Schwelung, XXXII 333. 492.
- Rose (G.), Verhältniss d. Augits zur Hornblende, XXXI 609 — Lagerstätte des Platins im Ural, 673 — Ueb. d. Rhodazit, XXXIII 253. XXXIX 321 — Krystallform des Chromoxyds, XXXIII 344 — Ueb. d. mit Grönstein u. Grönsteinsporphyr bezeichnet. Gebirgsart, XXXIV 1 — Eigensch. d. gedieg. Indians, 377 — Krystallform d. Antimonglanz XXXV. 360 — d. saures Kupferoxyds, XXXVII 164 — Zusammenhang zwisch. d. Form u. d. elektr. Polarität d. Krystalle zunächst b. Turmalin, XXXIX 285 — Bild d. Kalkpaths u. Aragon XXXVII. 383 — Beschreib. d. Brochantit, 468 — Vergl. d. Allot u. Periklin, 575 — Schwarzer Turmalin v. Andreasberg, 580.
- Rose (H.), Trenn. d. Talkerde v. d. feuerfest. Alkal. XXXI. 129. — Relat. Flüchtigkeit d. Chlorometalle, 131 — Erkenn. eing. organisch. Säur. 209 — Trenn. d. Jods v. Chlor, 583 — Ueb. d. wasserf. schwefels. Ammoniak, XXXII 81. — Bemerkung. üb. Phosphor u. Phosphorwasserstoffgas, 467. — Ueb. d. Harze, XXXIII. 33. — Untersuch. d. wasserf. schwefels. Säuren Animon XXXIII 235, XXXII. 415. — Verbind. d. Alkalien mit Kohlenst. XXXIV 149. — Lichterschein. d. Krystallbild. XXXV 181 — Anal. d. Wass. v. Elton-See u. Kaspisch Meer, 169 — Anal. d. Kupfer-Antimonglanz 361 — Wasserf. Schwefels. — einzig Chlormetall u. Salz, XXXVIII 117 — Verbind. der wasserf. Schwefels. mit wasserf. schwefl. Säure, XXXIX 173. — Phosphorwasserst. u. Quecksilberlös. XXXX 75. — Neue Reihe flüchtig Chlorverbind. 395. — Auflösl. klein. Meng. v. Chlormetall in große Meng. v. Brom- u. Jodmetall 632. — Chlor :: Schwefelmetall, u. ob eine der schwefl. Säure entsprechende Chlorverbind. XXXVII. 317.
- Rosenschöld (Munck af), Leitungsfähigkeit d. feucht. Luft für Elektr. XXXI 433 — Regelmäßig intermittirendes Leuchten d. Phosphors, XXXII 216 — Ueb. d. schnell. Abnahme d. Wirk. d. Elektrisirungsmasch. in feucht. Luft, 362 — Fähigk. starr. Körper zur Leit. d. Elektr. XXXIV 437 — Auflösl. eines Körper der in Berühr. m. and. Elektromotor, stets negativ wird, XXXV 16.
- Ross, Lage d. magn. Nordpols, XXXII 224.
- Rath, Analyse des Kupferzinns, XXXVI 479.
- Rudberg, Erstarrungspunkt einer Zinkwismuthlegir. XXXI 575 — Mittl. Temp. d. Erdrinde, XXXIII. 251 — Temp. d. aus niedriger Salzlös. gebill. Dampfs, XXXIV 257 — Specifische Wärm. d. im Wass. lösl. Salze, XXXV 174 — Doppelthe. d. Apophyllit, 522 — Lin. im Spectr. XXXV 523 — Magnet. Decimat. u. Inclinat. zu Stockholm u. Upsala, XXXVII. 191 — Construc. d. Thermomet. XXXVII 376, XXXX. 39 582. — Veränder. d. magn. Inclinat. n. Declin.; Einfluss d. Nordlichts auf diese Erschein. u. Temp. d. Bodens, XXXIX. 107 — Ausdehn. d. trockn. Luft zwisch. 0° u. 108°, XXXXI 271. 688.
- Rue (De la), Wirk. einer mit schwefels. Kupferoxyd gelad. Volt. Stule, XXXX 625.
- Runge, Producte d. Steinkohlen. destill. XXXI 63. 513, XXXII 308 328 — Reduct. d. Schwefelars. durch Silberkohle, XXXXII 163.

S.

Salm-Horstmar (Fürst zn), Un-

- tersuch. eines krystl. Kalksalzes, XXXV 515 — Conservat. d. destill. Wass. 528.
- Sander, Chem. Untersuch. d. Silberkupferglanz XXX 313.
- Saussure (Th.), Zuckerbühl. b. Keimen d. Weizens, XXXII 194 — Anwend. d. Blei's z. Endiometre XXXVIII 171.
- Savart, Beschaffenheit d. durch kreisförmige Oeffnung in eine dünne Wand ausströmend Flüssigkeitsstrahl. XXXIII 451 520.
- Saxton, Magnetoel. Maschine, XXXIX, 401.
- Schaffgotach (Graf v.), Untersuchung eines Jamesonit v. Estremadura, XXXVIII 403.
- Scheerer, Trenn. des Kobaltox. Nickelox. und Manganox. d. von Eisenox. Arsensäure u. Arsenig. Säure, XXXII 104 — Ueber zwei norweg. Kohlaterze, 546.
- Scheibler, Untersuchung üb. d. Schmelze, Schmelzung. od. Stöße, XXXII 331 492.
- Schmidt, Beschaffenh. d. Atmosphäre an ihrer oberen Gränze, XXXIX 82.
- Schnabel, Beob. d. Sternschnupp. v. 12. Nov. 1836 zu Gummersbach, XXXIX 364.
- Schönbein, Zinn und Eisen :: Salpeters. XXXVI, 390 — Eisen :: Salpeters. XXXVII 390, XXXVIII 141 — Eisen - Sauerstoff, XXXVIII 492 — Bemerk. über Faraday's Hypothese die Passivität d. Eisens in Salpeters. betröf. XXXIX 137. — Salpeters. Eisenoxydulsäure, 141 — Unzulänglichk. d. bisher. Hypoth. üb. d. Passivität d. Eisens, 342. — Neuer Beweis für d. chem. Urap. d. Voll. El. 351 — Neue Beob. üb. Erreg. u. Aushebung d. Passivität d. Eisens, XXXX 193, XXXXI 11. — Verhalten d. Salpeters. Säure zu Wasser, u. eigenenth. Dampfbild. dabei, XXXX 382. — Bemerk. üb. d. chemische Beschaffenh. d. irritirend Metallflüch., 621. — Ueb. d. mit Blei-superox. voll. combinirte Eisen, XXXXI 55.
- Schubarth, Bemerk. zu Fechner's Aufsatz üb. d. Kniepresse, XXXVII 350.
- Schulze, Resultate einer experimentell. Beob. üb. generat. acquiroca, XXXIX 487 — Metamorphose d. Amylum, 489.
- Schwann, Wesen d. Verdauungsproc. XXXVIII 358 — Versuche üb. Weingähr. u. Fäulniss, XXXXI 184.
- Schwarzenberg, Angebl. Titan-gehalt d. heussisch. Tiegel, XXV, 627.
- Schwerd, Appor. z. Darstellung d. Brechungsphänomene d. Lichts, XXXVIII 248.
- Seebeck, Polarisation d. Lichts durch Spiegel an dopp. brech. Körper, XXXVIII 276, XXXX 462. — Ueb. Klirröne, XXXX 539 — Mangel d. Farbensinns b. manch. Personen, XXXII 177.
- Selström, Spuren einer großen urweltl. Fluth, XXXVIII 614.
- Senff, Beob. des Nordlichts am 18. Oct. 1836 zu Colberg, XXXIX, 203.
- Setterberg, Ueber Lithion, XXXVIII 480.
- Simon (E.), Bereit. d. chemisch. reinen Kerosols, XXXII 119 — Ueb. d. Oel aus d. Braunkohlen-theer, XXXV 160 — Jervin, eine neue Pflanzenbase, XXXXI 569.
- Simon (F.), Erhöhte Auflösbarke. des Sublimats in Alkohol unter Beihülfe d. Kampfers, XXXVII 553 — Beitr. z. Reduct. d. Schwefelarsen XXXIX 151 — Wirk. d. Eisenox. als Gegengift d. Arsen b. Vegetabil., 366 — Versünderte Reactionserchein., welche einige organ. d. Metallgift beigemengte Stoffe hervorbr., XXXX 305 — Z. Kenntniss d. Arsenthia u. seiner Verbind. XXXX 411, XXXXI 424 — Ermittlung d. Schwefels, in gerichtl. medicin. Füll. 643. — Vergl. d. Arsenik-

- n. Antimonwasserst. u. d. neonst. Meth. Schwefelarsen zu reducir. XXXIII 563.
- Simonoff, Incl. u. Declinat. zu Kassa. XXXVII 195. — Neue Periode in d. Veränder. d. magn. Declin. 526.
- Smith (J. D.), Zerleg. d. Baryt- u. Strontianhydr. XXXIX 196.
- Smith (J.), Heb. d. Westküste v. Schottl. XXXX. 491.
- Sobolewskoy, Ausbring. d. Platin in Rußland. XXXIII 99. — Bemerk. üb. Vers. Hohöfen mit erwärmt. Luft zu treib. XXXIV. 163.
- Solly, Elektricitätsleit. v. Chlor, Jod u. Brom. XXXVII 420.
- Sommerville (Mrs.), Vers. üb. d. Durchgang d. chem. Strahlen durch verschied. Mittel. XXAIX. 219.
- Sondén, Analyse des Brevicit, XXXIII 112.
- Spaaky, Berechn. der in d. Umgegend v. Wien angestellt. Beob. üb. d. Temper. arten. Brunnen. XXXI 365.
- Stapfer, Erfind. d. Stroboskop. Schreib. XXXII 616.
- Steinheil, Besch. eines Photomet. XXXIV 616.
- Stevens, Beob. üb. d. Umwandl. des venösen Bluts in arterielles. XXXI 317.
- Strehlke, Temp. d. Pommersch. Vorgeb. Rialhofer. XXXV. 165. — Beob. am Spinnweb, und Mittel auf schwingend. Oberfläche, die diesen parall. Beweg. sichtbar zu machen. XXXA. 146. — Ausdehnbar. d. Luft. XXXII 175.
- Ström, Auffindung des Brevicit. XXXIII 112.
- Stromeyer, Zerleg. d. Allanit, XXXII 288.
- Stromeyer u. Hausmann, Zerlegung d. Antimonnickels. XXXI. 131. — Zerlegung einer neuen Alkanart u. eines Bittersalz. aus Südafrika. 137.
- Suckow, Chem. verschied. Verh. quantitativ verschied. Verbindungen gegen d. Sonnenlicht. XXXII 387. — Krystallform d. Kupferblüthe. XXXIV 528. — Erglanzungsartenphen. XXXIX 325.
- Suermann, Vers. üb. specifische Wärme d. Gase u. d. Luft b. verschied. Druck. XXXI 474.
- Svanberg, Anal. d. nat. gedieg. Indiums. XXXIV. 379. — Platin. Anal. XXXVI. 471. — Untersuch. d. Katechus u. einiger sich daraus bildend. Stoffe. XXXIX. 161.

## T.

- Talbot, Mikroskop. Spalten im Glimmer u. Talk. XXXI. 591. — Opt. Eigensch. d. Löss d. schwefels. Chromoxydul-Kali's. 591. — Opt. Untersuch. d. Lithion- und Strontianflamme; Spectrum der Cyanflamme. 592. — Beschreibung einer opt. eigenthümlich. Erschein. XXXII 619. — Anwend. d. polarisirt. Lichts zu mikroskopisch. Beob. XXXV 330. — Einfach photomet. Princip u. Anwend. desselben. 457. 463. — Optische Beob. an Boraxkrystallen. XXXIX. 281. — Neuer Interferenzversuch. XXXII. 231.
- Tamman, Verb. d. Serpentin von Sauer, XXXIII 462.
- Texier, Durchbruch d. Bosphorus. XXXX 490.
- Thaulew, Anal. eines Antimonerzes. XXXI 216. — Chem. Untersuch. d. Bergholz 535. Zusammensetzung des Perikha's. XXXII. 571.
- Thayer, Erschein. h. d. Beweg. v. Flüssigk. XXXI 37.
- Thilorier, Liquefact. u. Solidification d. Kohlens. XXXVI 111.
- Thioux, Veränder. d. opt. Eigensch. d. Rohrzuck. b. Erhitzung. XXXII. 221.
- Thompson, Darstellung d. Antimonwasserst. XXXII 347.
- Thomson, Eigensch. d. chroms. Chromchlorids. XXXI 607.
- Thomson (T. G.), Bemerkungen zu Graham's Gesetz der Diffusionen der Gase. XXIV. 624.

628. — Höhe des Demavend, XXXII 592.

Tiedemann, Vera. f. b. d. Blut, XXXI 249.

Tomlinson, Besch. des Anorthoskops, XXXVII 466.

Tovey, Bezieh. zwischen d. Geschwindigk. u. Länge einer Lichtwelle, XXAVII 360.

Traill, Vergleich. Gang d. Photomet. und Thermomet. während einer Sonnenfinstern. XXVIII 231.

Trevelyan, Ueb. tönende Schwingung b. Metall. v. ungleich. Temp. XXXIII 554.

Turner, Prüf. d. Atomgewichte, XXXI 637.

Turpin, Mikroskop. Anal. d. Barenin, XXXIX 493.

#### U.

Ullgren, Darstell. d. Kupferoxyduls, XXXV 527. — Zusammensetz. d. weisse Präparats u. enig. und analog Quecksilberverh. XXXIII 385.

#### V.

Vfensmor, Merkwürd. Feuerkugel, XXVII 459.

Vicat, Fortschritt Verlängerung ein Metallrathis durch Zugkräfte, XXXI 108.

Villain, Auflöndung d. Platin in Frankr XXXI 16 590.

Volekman, Untersuch. f. b. den Stand d. Netzhautbildh. XXAVII 312.

Volkmar, Entdeck. d. Antimonnickels, XXXI 134.

#### W.

Wahlenberg, Beob. d. Temper. d. Quell b. Upsal, XXII 271.

Wallerdin, Beob. d. Temp. in d. Tiefe, XXXIII 416.

Walter, Ueber d. Krystall. Kali, XXXIX 192.

Watkins, Ueb. d. bleibend Magnesium d. weich Eisens, XXV 208. — Thermoelektr. Funk. mit. teilst. einf. Kette, XXXII 589.

Poggendorff's Annal. Bd. XXXII.

Weber (W.), Elasticit. d. Seidenfäden, XXXIV 247. — Ueb. Baromet. u. Thermometerskalen, XXXX 27.

Weber (W. und E.), Mechanik d. menschlichen Gehwerkzeuge, XXXX 1.

Weiss, Ueb. Platin u. Osmium-Irid XXXVI 464.

Werdmüller v. Elgg, Bericht f. b. d. Erderschütter. v. März 1837, XXXII 685.

Wheatstone, Dauer ein elektr. Funk. XXXIII 508. — Versuch d. Geschwindigk. d. Elektricität u. d. Dauer d. elektr. Funken zu messen, XXXIV 464. — Prismatische Zerleg. d. elektr. Lichts, XXXVI 148. — Ueb. d. thermoelektr. Funk. XXXI 160.

White, Merkwürd. Meeresström. XXXVIII 478.

Whyte Law, Joddarstell. i. Schottland, XXXIX 199.

Wiggers, Auflöslichk. d. Quecksilb. in Wassa XXXI 410.

Williams, Ueb. d. Erscheinen u. Product b. schwachen Verbrenn. XXXVI 494.

Winckler, Mandel. u. Salze desselb. XXXI 375.

Wittatoek, Ueber d. plötzliche Aufw. b. d. Destillat. v. Salpeters. u. Salze, XXXI 31. — Arsenik- u. Antimon Gehalt d. künft. Phosph. 120.

Wöhler, Gewinnung d. Irid u. Osmium aus d. Platinrückständen, XXXI 161. — Darstell. d. Krystall. Chromoxyd, XXXIII 311. — Ueber ein neues Kupfersalz, XXVII 166. — Proport. Verbindung von Silberoxyd u. Bleioxyd XXXI 344. — Bereit. d. kohlensauren, 393. — u. Liebig. Wallaston, Beschaffenh. d. Atmosph. an ihrer obern Gränze, XXXIX 82.

v. Wrangel, Beob. d. stündlich. Variat. d. Abweichung zu Sitta, XXXI 193.

v. Wrede, Erklär. d. Absorption d. Lichts nach der Undulations-

theorie, XXXIII 353 — Besch.  
eines neuen Multiplicat. XXXIII.  
308.

## Y.

Yniestra, Vorkomm. d. Jod in  
verschieden Mineral u. fern v.  
Meere wachsend. Pilanz. XXXIX.  
526.

Yorker, Wirk. v. Wasser u. Luft  
auf Blei. XXXIII. 110.

Young (J.), Neue Volt. Batte-  
rie, XXX. 624.

Young (Th.), Erklär. d. Elastici-  
tätsmodul. XXXI. 573.

## Z.

Zeise, D. Mercaptan, nebst Be-  
merk. üb. einige neue Produkte  
b. Einwirk. d. Sulfurete auf wein-  
schwefels. Salze XXXI 369 —  
Erneute Unters. üb. Antho-  
genverbind. XXIII 305, XXXV  
457 — Unters. d. brennbar  
Chlorplat. XXXX. 234

Zinken, Aufhänd. d. Kupfer-An-  
timonglanz XXXV 357. — Vor-  
komm. d. Arseniktopf. in Chili,  
XXXI. 659.

## II. Sachregister.

## A.

Aale, in art. Brunn. XXXVI 561  
Abdampfungsapparat, s. Ap-  
parat.

Acetal, Zusammensetz. XXXVII.  
95.

Aceton, s. Kalium, XXXXII 411.

Acetyl, XXXXII. 437.

Acouragna, höher als d. Chim-  
borazo, XXXXII 591

Aconitin, Darstell. XXXVII 175

Actine, Größe derselb. XXXI.  
559.

Actinometer, Construct. XXXII.  
661. — Vergl. Beob. am Äquat.  
u. in Europa, XXX 318.

Addition, s. Cohäsion.

Adular, Unsymmetrie sein. opt.  
Erschein. XXXV 204.

Äpfelsäure, Erkenn. derselb.  
XXI 210. — Zerfällt b. d. De-  
stillat in Para- u. Metaäpfelsäure,  
XXII. 218 — Destillationsprod.  
XXXVI 52

Äpfelsäure, bronzliche, Anal.  
u. Eigensch. XXXVI. 58. — Dar-  
stell. XXXVII. 36.

Aesculsäure, Darstell. u. Anal.  
XXXII 15.

Acthal, Bihydr. d. Ceten, XXXVI  
140

Aether, Zweckmäß. Appar. seine  
Bildung zu beob. XXXI 273. —

Wiesiel Procent man im Großen  
gewinnt, 278. — Entsteht aus Al-  
kohol bei 140° im Contact mit

Schwefels. 281. — Zusammenstel-  
lung d. verschieden Aethertheor.

XXXI 321, XXXVII 63 66. —

Gründe für u. wider d. Ansicht,  
dass das äthbild. Gas d. Basis d.

Ätherverbind. XXXX. 293. —

Äth. kein Hydr. 294. — Wider-  
sprüche d. Dumas'sch. Substitu-  
tionstheor. 297. — ist Oxyd v.

Äthyl, XXXI 323 bis 334. —

Liebig's Theorie, 350. — Ver-  
brennt bei 90° mit schwacher

Flamme, 612. — Wirk. d. Volt.  
Elektr. auf Äth. XXXVI 492.

— Zersetzungsprod. durch Brom,  
551. — Bemerk. üb. d. verschied.

Ätherart. XXXVII 75. — Ue-  
bersicht d. mit ihm isomer Sub-  
stanz. 163. — Notiz üb. Äther-



- arten analog d. Wasserstoffnaphtha, 403. — Darstell. u. Beschr. einiger Wasserstoffäther, 550. — Zusammengesetzte Aetherarten: Kalium, XXXII 401. — s. Brom-, Chlor-, Chlorkohlenoxyd-, Essig-, Jod-, Oenanthasäure-, Oxaläther. Aetherchlorplatinssäure, XXXVII 104. Aetherin, mit welcher Substanz isomer XXXVII 51. Aetheroxamid, Anal. XXXIII 333. Aetheroxalsäure, Darstell. und Eigenschaft XXXII 664. — Anal. XXXVII 76. Aetherschwefelsäure, s. Weinschwefelsäure. Aethionsäure, Bemerk. üb. ihre Zusammensetzung XXXVII 71. Aethyl, Chem. Formul. dess. u. seiner Verbind. XXXI 338. Affiniren, durch Krystallisation, XXXI 203. Affinität, s. Verwandtschaft. Afterskrystalle, s. Serpentin. Agalmatolith, Anal. XXXVIII 319. Aggregatzustände, / Beob. der Ueberschmelz. XXXIX 376. — Uebersättig. b. Salz. 378. Aïrak, Brautwein aus Kuhmilch, XXXII 230. Akustik, s. Schall, Schwingung. Alann, Beschreibung u. Anal. einer Alunart aus Süd-Afrika, XXXI 137. — v. Tschermig in Böhmen, 143. Albit, Zwillingbild an demselb. XXXIV 120 121. — v. Periklio nicht zu trenn. XXXII 577. Albumin, s. Eiweiß. Aldehyd, Darstell. XXXVI 276. — Eigensch. 280. — Anal. 284. — A. Ananionak, 285. — Prod., welche die Bild. des Aldehyds h. sein. Darstell. aus Aether begleitet, 289. — Entstehung d. Aldehyds, XXXVI 306, XXXX 300. — Hydrat v. Oxyd des Aldehyden, XXXVII 92. Aldehyden, Verbind. mit Chlor u. Brom, XXXVII 84. — Jod, 88. — Zusammenstell. sein. Verbindung 91. Aldehydharz, XXXVI 299. Aldehydsäure, XXXVI 301. — Entsteh. XXXVII 94. Alkalien, Trenn. d. feuerfest. v. d. Talkerde, XXXI 129. — Funktion d. Wass. in d. ätz. Alkalien, XXXVIII 124. — Krystallform u. Zusammensetz. d. saur. schwefels., chlora., mangans. u. chroms. Alk. XXXIX 198. Alkargen, Darstell. XXXII 146. — Eigensch. 149. — Wenig giftig, 152. — Anal. 154. Alkarsin, Alkohol, worin Sauerstoff durch Arsen. vertret., Darstell. Eigensch. u. Anal. XXXX 220. — Zusammenhang mit Alkohol u. Mercaptan, 233. — Vorsichtsmaßsreg. b. sein. Darstell. XXXII 148. — Ansicht über seine Zusammensetz. 157. Alkohol, Durch Kali unter Sauerstoffabsorpt. in Essigs. u. Ameisens. verwandelt, XXXI 174. — D. Destillat v. Braustein, Alk. u. Schwefelsäure, ein Gemenge von Essigs. u. Ameisens. 176. — Zerfällt im Contact mit Schwefelsäure b. 110° in Wass. u. Aether, 283. — ist d. Hydrat d. Aethers, 345. — Wirk. d. Chlors auf d. Alk. 650. — Erklär. d. Einwirkung, 665. — Prod. d. Oxydat. d. Alk. XXXVI 275. — Prod. bei Lant. wirk. v. Schwefelsäure u. Superoxyd 293. — Oxydat. b. Mitwirk. von Platinschwarz, 296. — Wirk. d. Volt. Elektr. 487. — Ansichten üb. d. Zusammensetz. des Alkoh. XXXVII 60. — Bemerk. üb. d. Bild. d. Essigs. u. Ameisens. aus dems. 61. — Gefrierp. d. Alkoh. XXXVI 144. — Alk. aus Melch. ruck. XXXII 210, XXXVI 197. — Wirk. d. Kaliums auf Alkohol XXXII 399. — Zusammensetz. u. Natur d. Kaliverbund. 400. — A. hiernach ein Hydrat d. Aeth. 403. Allant, Anal. XXXII 288. Allantoin, Zersetzungsprod. des

- Harna XXXXI 563. — Eigensch. 564 — Anal 566
- Allantoisäure, s. Allantoin.
- Allophon, Analyse u. Vorkomm. in d. Format d. plast. Thons u. Bonn, XXXI 53
- Amalgam, Elektr. Leitungsfähigk. d. Kienmayer'sch. A. XXXIV. 456.
- Amalgamation, Beschr. d. amerik. A. XXXII 109. — Theorie d. erz. 117. — Abweichung d. schwa. A. 114.
- Ameisensäure, Bild. aus Holzgeist, XXXVI 94. — Zersetzung durch Schwefels. XXXVII 36
- Amid, Zusammensetz. XXXVII 34. — Theorie d. A. XXXX 407. — Quecksilberam. XXXIII 373. 393 394. — Vorschlag die Nomenclatur d. Amide betr. 398.
- Amidine, XXXVII 118.
- Amidone, XXXVII 128.
- Amidid, Darstellung u. Zusammensetz. XXXIV. 597. — Verh. b. Glüh. 611.
- Ammelin, Darstell. u. Analyse, XXXIV 592. — Verhalten beim Glüh. 611.
- Ammoniak, Schwefels. A. greift Glas an, XXXIII 556. — 2 Modificat. XXXII 81. — Darstell. d. wasserfreien schwefels. 82. — Eigensch. dies. Salz 83. — Anal. 85. — Chlorstrontium dient zur Unterscheid. d. wasserfr. u. wasserhaltig. 91. — Aehnlichk. mit and. Subst. 97. — Verh. d. beidre z. wasserfr. Schwefels. XXXVIII 122. — Wasserfr. schwefl. g. A. XXXIII 235. — Darstellung u. Anal. XXXIII 415. — Enthält kein Amid, 420. — Salpetersaur. ändert d. Siedp. d. Wass. XXXVII 389. — Stickschwefelsaur. Amm. XXXIX 186. — Tellurs. XXXII 599. — Zweifel u. viel tellur. 591. — Tellurigsaur. A. einf. u. viel. 604 605. — Arsenigz. :: Erhitz. XXXX. 443. — Lage d. opt. Elasticitätsaxe im schwefels. Eisenox. - A. XXXVII 371. — Oxalsäure A. ist Oxamid, XXXI. 331 359. — Karbols. A. XXXII. 317. — Xanthogens. XXXV 510. — Brenztraubens. XXXVI. 16. — Spirulaum 389. — Lage d. opt. Elasticitätsaxe im Weins. XXXVII. 372. — Mandelsaur. XXXXI 382. — Weinschwefels. 611. — Weinschwefels. Kali-A. 612. — Funkt. d. Wass. in d. Ammoniaksalzen, XXXVIII 123. — A. mit Doppelcyanid u. Wass. XXXIV 131. — A. + Cyaneisenkupf. Anal. 134. — A. + Cyaneisenzink, 136. — A. + Cyaneisenguecksilber, 139. — + Cyaneisen-Talcium, 142 145. — :: Quecksilberchlorid, XXXII. 367. — :: Quecksilberchlorid, 380. — :: Quecksilberoxyd, 383. — :: schwefelsaur. Quecksilberoxyd, 396. — s. Ammonium.
- Ammonium, Jodwasserstoff - A. + Platinjodid, XXXIII 71. — Chlorammon. ändert d. Siedp. d. Wass. XXXVII 390. — Chlorammon. mit d. Chlorid. v. Platin u. Irid 408. — Chlorammon. :: wasserfr. Schwefels. XXXVIII. 118. — Jod- u. Brom-A. :: wasserfr. Schwefels. 121. — Bromammon. + Cyaneisenammon. 208.
- Amorphismus, Bescp. desselb. XXXI 577. — Deut. dess. 582
- Amygdalin, präexistirt in d. bitter Mandeln, XXXII 317. 363. — Darstell. u. Eigensch. 318. — Anal. 352. — Emden, 359. — Zersetzungsprod. 364. — Als Arzneimittel, statt Bittermandel- oder Kirschchlorbeerwass. zu empfehlen, 372.
- Amygdalinsäure, Entstehung, XXXI 351. — Anal. 354.
- Amylum, Widerleg. d. Rospaillien'schen Ansicht üb. d. Structur d. A. XXXII 129. — Besteht aus concentr. Schicht. 131. — Wie d. Ablager. d. Schicht zu erklär. 137. — Bescp. d. A. v. versch. Pflanz. 139. — Veränder. durch heißes Wasser, 143. — Alkal. u. Säur. wirkt wie heißes Wasser, 149 152. — Jodstärke, eine chem. Verbind. 153. — Bromstärke, 156.

- Eigenthüml. Einwirk. d. Essigs. 157. — Erscheinung beim Kochen der Kartoffeln, 158. — Chem. opt. Versuch d. Veränderung durch verdünnte Säuren, 161. — Dextrin, 168. — Histor. Bemerk. üb. d. Brautz d. Starks zu Bier u. Branntw. 175. — Umwandl. in Dextrin u. Zucker durch Diastase, 178. — Das schadhafte äther. Oel in d. Kartoffelst. fertig gebild. 193. — Zusammenstell. aller Anal. d. Stärke, XXXIV. 323. 326. — Wieviel Stärkezuck. aus 100 Th. St. zu erhalt. 328. — Geschichtl. üb. d. Versuch. d. A. XXXVII. 114. — Guérin Varray's Untersuchung 118. — Payen u. Persoz's, 128. 134. — Leb. Liebenin, 127. — Result. 150. — Diastase, 135. — Metamorphos. d. Amyl. XXXIX. 490.
- Analys., Unsicherh. d. Philipson'schen Meth. Kobalt zu bestimm. XXXIII. 126. — Trenn. d. Quecksilb. v. Kupf. mittelst Ammons. 78. — Trenn. d. Nickel- u. Kobaltos. d. Wismuth- u. Cadmiumoxyd, Blei- u. Quecksilberoxyd, Uran- u. Zinkos. mittelst Paraphosphors. 246. — Antimonperchlorid, Mittel. bildend. Gas v. and. Gasen zu trenn. XXXVI. 290. — Trenn. d. Pallad. u. Kupf. 466. — Manganreaction 564. — Trenn. d. Schwefelarsen u. Schwefelantimon XXXIX. 155. XXX. 414. — Scheid. v. Brom u. Jod, XXXIX. 370. — Verbess. Meth. z. Zerleg. d. in Salzs. nicht lös. Silicate, 527. — Auflösl. klein. Mengen v. Chlormetall in große Mengen v. Brom- u. Jodmetall XXX. 632. — Kobalt-, Nickel-, Manganoxyd u. Eisenoxyd v. Arsens. S. zu trennen, XXXII. 104. — Berzelius Bemerk. üb. verschied. Meth. Arsen zu entdeck. 159. — Unsicherh. d. Verfahren nach Morab, 339.
- Andersit, Weit verbreit. Vorkommen dess. XXXVII. 189.
- Anderskette, s. Cordillere.
- Anionen, Bedeut. ders. XXXIII. 305.
- Anode, Was darunter zu versteh. XXXIII. 303.
- Anorthoskop, Instr. zu optisch. Täusch. XXXVII. 464.
- Antimon, in Phosphor, XXXI. 128. — Schwefelantimon Umwandl. in amorph. 378. — Faraday's Schwefels. existirt nicht, XXXVII. 164. — Trennung v. Schwefelarsenik, XXXIX. 155, XXX. 414. — Schw. :: Chlor, XXXII. 532. — Analyse dieser Verbind. 533. — Antimonperchlorid, Mittel. bild. Gas v. and. Gasen zu trenn. XXXVI. 290.
- Antimonerze, Anal. d. Boulangerit's, XXXXI. 216.
- Antimonnickel, Beschr. u. Anal. XXXI. 134.
- Antimonoxyd, Faraday's A. existirt nicht, XXXVII. 164. — Weiss. Antim.-Kohl. :: Mimosenschleim, Theerabsud, Eiweiß und Fleischbrüh, XXXX. 305 bis 311.
- Antimonoxydul, Gerbsäure. XXXVI. 36.
- Antimonwasserstoffgas, Darstell. u. Eigensch. XXXIII. 342. 347. — Vergl. mit Arsenwasserst. 563.
- Anziehung, durch schwingende Körper XXXI. 640.
- Apophyllit, Doppelbrech. dess. XXXV. 522.
- Apparat, zum Abdampfen durch heiße Luft, XXXI. 95. — z. Verpuff. v. Gasen durch magnet. Funken, XXXII. 510. — z. Silberprobiern auf nassem Wege, XXXIV. 16. — Verbess. App. z. Analys. organ. Körper. 325. — Filtrir- u. Extractionsapp. XXXVI. 30. — Einfach. App. z. Erbsäure. elektrochem. Erscheinung 518. — A. d. Kohlens direct zu bestimm. XXXVII. 305. — z. Darstell. d. Beugungsphän. XXXVIII. 238. — A. einen Luftzug z. Untersuchung d. Luft hervorzubringen, 264. —

**Drummond's A. z. Lichtver-  
stärk.** XXXX 547. — Lampe z.  
Anal. organ. Körper. XXXXI 198.  
— Glasblase Lampe. 201. — zur  
Bestimm. d. Dämpfe d. Fumarol.  
u. d. Kohlens. in Mineralwasser,  
XXXVII 167. 694. — zur Aus-  
trockn. 557. — Destillirapp. 558.  
— Filterapp. 560.

**Arsarat, Höhe dess.** XXXII 556.

**Aragonit, in actes. Brunnen zu  
Tours,** XXXIII 452. — Neig. d.  
opt. Ax. XXXV 86. — Scheidet  
sich aus heisa. Auflös. XXXIII  
353. — Langsame Umänder. in  
Kalkspath. 359. — Verhält. in d.  
Blutze, 361. — Vers. andere koh-  
lens. Salze in Form d. Arr. dar-  
zustellen. 365.

**Araa, s. Aircak**

**Arsenige Säure, Eisenoxydhy-  
drat Antidot,** XXXII 124. —  
Willkührl. hervorzub. Leucht. b.  
Krystallisir. XXXV 491. — Wo-  
durch d. Mithigwerden zu verhin-  
dern, XXXVI 194. — Reducirende  
Wirk. auf Kupferox. u. Mangans.  
XXXVII 309. — Verhindert d.  
Fällung d. Chromox. durch Alkal.  
303. — :: Mimosenschl. XXXX.  
305. — Thee. Absand. 307. —  
Eisweiss. 308. — Fleischbrüh. 311.  
— Reduction durch kaut. Kalk,  
417. — Wie in Arsenika zu ent-  
decken, 421. 424. — :: glühend.  
Brix. 435. — :: glüh. Magnesia,  
436. — :: Blei- u. Mangansuper-  
oxyd, 439. — Zeitsatz verschied.  
arsenigs. Salze b. Glüh. 424. 429.  
— Trenn. v. Kobaltox. XXXXII.  
107.

**Arsenik, in Phosphor,** XXXI  
126. — Darstell. arsenikhalt. Glä-  
ses schwierig, 128. — Eisenox.  
Antidot bei Vegetabil. XXXIX.  
366. — Organ. Verbind. worin A.  
Bestthl. XXXX 219. XXXII  
145. — :: atmosph. Luft, XXXI.  
299. — Berzelius Berneck üb.  
verschied. Meth. A. zu entdeck.  
XXXII. 159. — Simon's Be-  
rneck 569. — Unsicherh. d. Ver-  
fahrens v. Marsh, 339. 569. —

A. in Algierach. Bomben, 591. —  
Schwefelarsenik, Reduction  
durch kaut. Kalk, XXXIX 151,  
XXXX 411. — durch Silber-  
kohle, XXXII 163. — Trenn.  
d. Schwefelars. v. Schwefelantim.  
durch Reduct. mittelst gegläubten  
Kalks, XXXIX. 155, XXXX 411.  
— Schwef. :: Chlor, XXXXII.  
536.

**Arsenikkobaltkies, s. Kobalt-  
erze.**

**Arsenikkupfer, Vorkommen in  
Chili,** XXXXI 659.

**Arseniknickel von Riegelsdorf  
Anal.** XXXVI 395.

**Arseniksäure, in Arsenig S. zu  
entdecken,** XXXX. 421. 424. —  
Zeißl. nicht immer b. Glüh. in  
Arsenige S. u. Sauerst. 431. —  
Trennung v. Kobaltox. XXXXII.  
107.

**Arsenikwasserstoff, Vergl. mit  
Antimonwasserst.** XXXXII 563.

**Asbest, Anal. des A. v. Koruk,  
XXXV. 186.**

**Asparagin, Krystalle** XXXVI.  
477.

**Asparaginsäure, Anal.** XXXI.  
223.

**Asparamid, Anal.** XXXI 721.

**Aspirator, Appar. einen Luftzug  
z. Untersuch. d. Luft hervorzub-  
ringen.** XXXVIII. 261. — An-  
wend. 266.

**Atherman, Was darunter zu ver-  
stehen.** XXXV. 404.

**Athmen, Vers. üb. Absorpt. u.  
Exhalat b. Athmen.** XXXII 293.

— Beschwerdlichk. des A. b. Wan-  
derung in Schneegebirg XXXIV  
208. — Windstide u. Nebel d.  
Ursach. XXXVII 269. 271.

Vorgang b. Athm. XXXX 604.

— s. Leben

**Atmosphäre, Lichtpolarisat. in  
derselb. XXXII 125. — Urb. d.  
Blau des Himmels, 127. — Ur-  
sach. d. Ungewandth. derselben,  
XXXVI 495. — Gegenwart ein.  
wasserstoffhalt. Substanz in ders.  
447. — Betracht. üb. d. Kohlen-  
säuregehalt, 453. — D. Bestand-**

theile d. atmosph. Luft nicht wie 1:1 v. Wass. u. Alkohol absorbiert, 468. — D. Linien u. Streifen im Sonnenspectr v. d. absorbirend Kraft d. A. herführend, XXXVIII 61. — Anal. d. atmosph. Luft, 175. — Wirk. d. A. auf d. Temp. d. Erde, XXXIX. 79. — Beschaffenh. an d. obern Gränze, 80. — s. Eudiometrie, Luft, Massen, Temperatur, Wind.

Atom, Zwei besond. Klassen v. At. organ. Verbind. XXXI. 634. — Absolute Menge v. Elektr. in dens. XXXIII. 506.

Atomgewicht, Prüfung der A. XXXI. 637. — A. d. Tellur, XXXII. 14. — A. diejenig. Mengen verschied. Substanz, welche gleiche Mengen Elektr. u. gl. chem. Kräfte haben, XXXIII. 517.

Auge, Krümm. d. Flächen an d. durchsicht. Thln. XXXI. 93. — Lichterschein. wenn auf d. Auge ein Druck ausgeübt wird, 494. — Erschein. roth. Striche auf gelbl. Grund, wenn d. A. im Dunkeln plotz. v. stark. Licht getroffen, XXXIII. 477. — Erschein. mehr. Punkte, wo nur einer vorhanden, 479. — Leb. d. Striche, welche man mit bloß. Auge durch eine schmale Spalte sieht, XXXIV. 557. — Mittel in's Meer zu sehen, XXXVII. 210. — Untersuch. üb. d. Stand d. Netzhautbildch. 312. — Erklär. einer subjectiven Lichterschein. XXXIX. 214. — Gestalt u. Dimension. des A. 529. — D. Vorderst. d. Linse wahr. scheint v. eibgt. Krümm. 511. — Leb. d. Richtungslinien h. Sehen, XXXVII. 37. 66. 693. — Physiolog. Beding. d. sich Deckens d. Lichtpunkte, 43. — Retina gleich entfernt. Lichtpunkte nur in dent. Schweifschärf. begränzt, 68. — Lage d. seelich. Richtungslin. 52. — Was d. Vorgänge d. Sehens Stabilität giebt, 56. — Vers. an Kaninchen-, Menschen- u. Konstl. Aug. 37. 58. — D. Abweich. d. Strahl. durch d. Linse nur klein,

60. — D. Linse d. achromatisirende Organ 64. — Erscheinung. wenn sich d. A. um seinen Mittelp. dreht, 64. — Einfl. d. Sehl. ches, 235. — Weshalb entfernt. Gegenstände undeutl. 239. — Begriff d. Richtungslinien des Sehens, 242. — Höhe d. Retina, 243. — Wie groß d. Empfind. ders. 247. — Sie laßt wir d. Tast. aus d. Distanz d. Bild. fühlen, 250. — Zwei Grundgefühle bild. d. Vorgang beim Sehen, 251. — Die Hand corrigirt den Gesichtssinn, 255. — Perspective, 258. — Haupt-Resultat, 261. — Mangelnder Farbensinn bei manchen Person, 177. — Zwei Klassen v. Farbenverwechsl. 174. — Beob. an Person. erst. Kl. 180. — der zweit. 202. — Result. d. Beob. 220. — And. Beob. 224. — Ursach. dieser Unvollkommenh. 229. — s. Betrug, opt.

Augit, mit Hornblende verwachs. XXXI. 611. — A. in Hornblende umgeänd. 618. — Wie diese Umänder. zu erklär. 620. — Lage d. opt. Elasticitätsaxe, XXXVII. 373. — Anal. des A. aus d. Fassaithel, 581. — aus d. Eifel u. d. Rhöngeb. 582. — v. Acton u. Vesuv, 583. — Ursach. d. Thonerdegehalts, 584.

Augitporphyr, Characteristk, XXXIV. 18. — Unverscill. Gemengh. 22. — Spec. Gew. 24. — Verbreit. 25.

Ausdehnung, eines Metalldraths unter Wirk. v. Zugkraft XXXI. 108.

## B

Bacillarien, s. Infusorien

Bader, Größte Badante f. Menschen, XXXVIII. 173.

Baragin, Mikroskopische Anal. XXXIX. 195. 196. — Soll aus Oscillationen bestehen, 497.

Barometer, Vermeid. d. Fehler am Heber XXXI. 266. — Unversicherheit barometr. Höhenmess. XXXII. 561. — Verbes. Con-



- struct. d. Höhenmessb. XXXIV 41. — Beschreib. eines Volum-B. 30. — Verbesserung d. Skala ohne Vernier, XXXX 28. — Construct. eines Differentialb. 62. — Beob. eines Interferenzphänomens am B. XXXXII 516.
- Barometerstand, Beob. zu Danzig, welche d. Steigen h. Westwind u. d. Fallen h. Ostw. bestätigt XXXI 165. — Schwankung auf d. Chimborazo, XXXIV 214. — B. zu Straßburg, XXXV 143. — B. zu Kasan, XXXVI 204, XXXVII 655. — Einfluß d. Mondes, XXXV 313. — Einfl. d. Windes auf d. B. XXXVI 340, 344. — Ursach. d. Min. u. Max. 350. — D. mittl. unter d. Trop. geringer als in d. gemäßigten Zone, 245. — Beob. auf d. Reise von Calcutta nach d. Cap, 251. — v. Cadix nach Callao, 253 255. — Nothwendigk. d. Schwerecorrect. für verschied. Breit. 468. — Berechn. ders. 473. — Ueb. normal. Luftdruck, 476. — Bei niedr. B. d. Entwickl. von Schwad. in Kohlengrub. am beträchtlichsten, XXXVIII 618. — Einfl. auf d. Meeresspiegel, XXXV 138. — Tief B. in Berlin, XXXVII 240. — Mittl. B. in Berlin, XXXIX 218. — zu Braunschweig, XXXI 539. — Merkw. hoher u. niedr. des XXXXI 543, XXXXII 668. — Beob. zu Karlsruhe, XXXI 516 518 551. — Mittel. am Meeresspiegel XXXXII 479. — a. Höhenbestimmung.
- Baryt, Zusammensetz. d. Blydrats, XXXIX 136. — Tellurs. B. XXXII 392. — Zweifach u. vierf. tellurs. 593. — Tellurigs. 608. — Bas. arsen. u. bas. phosph. 18. — Metaphosphors. 69. — Weinschwefels. B. enthält 2 At. Wass. XXXII 457, XXXVI 614. — Xanthogens. XXXV 489 491 508. — Brenztraubensäur. XXXVI 16. — Methylschwefels. 123. — Mandels. XXXXI 382. — Naphthalinschwefels. XXXXII 451.
- Baryto-Calcit, Dimorph, XXXIV 668.
- Baryto-Strontianit, XXXIV 672.
- Baryum, Jodbar. + Platinjod. XXXIII 71. — B. Zinkcyanür. XXXIII 113. — Spiroilbaryum, XXXVI 392.
- Basalt, Analyse, XXXVIII 151, XXXXII 692.
- Basen, Funktion d. Wassers in dens. XXXVIII 124.
- Beerenothe, identisch mit Blattroth, XXXXII 431.
- Benzamid, Wie zu betrachten, XXXX 409. — Entsteht h. Einwirk. v. Salzs. auf Bittermandelwass. XXXXI 375.
- Benzimid, Darstell. u. Analyse, XXXVI 498. — Wie zu betrachten, XXXX 410.
- Benzin, Verbind. mit Schwefels. und Salpeters. XXXI 257 625, 628. — Entsteht XXXVI 75.
- Benzinschwefelsäure, Darstell. u. Zerleg. XXXI 285.
- Benzoesäure, Verb. mit Schwefels. XXXI 257. — d. wasserfr. B. = Benzon + Kohlensäure, d. wasserhalt. = Benzin + Kohlens. XXXVI 76. — Ob d. Wassergehalt wesentl. 76. — Bildet mit Sauerstoff u. Brom eine eigenth. Säure, XXXVII 544. — Lage d. opt. Elasticitätsaxe in d. B. 373. — B. aus d. Einwirk. v. Kali auf äther. Oel, XXXVI 422.
- Benzoeschwefelsäure, Anal. XXXII 227.
- Benzoin, isomer mit Benzoylwasserst. XXXVI 501.
- Benzon, Darstellung u. Analyse, XXXVI 70 72. — Bild. 75. — ist Mitscherlich's Carbonylid, 77.
- Benzoyl, Darstellung u. Analyse, XXXVI 501. — B. + Kohlenwasserst. = Zimmtöl, XXXXI 423.
- Benzoylwasserstoff, + Benzoes. XXXXI 384.
- Bergholz, Chem. Untersuchung, XXXXI 635. — Mikroskop. 611.
- Berg-



- Bergkry stall**, Zusammenh. der opt. Eigensch. mit der Kry stallf. XXX 607.
- Bergmehl**, aus fossil Infusor. zu Brot gebacken, XXX 138. — Aehnl Benutz in China, 319.
- Bergnaphtha**, s. Naphtha.
- Berlin**, Grö ße u. physikal. Constant, XXXIX. 215. — Polhöhe, grö ße Länge, Höhe üb. d. Meeressl. 216. — Länge des Secondenpend. Inclinat. u. Declin. 217. — Magn. Intensit. Temp. Barometerst. 218. — a. Barometerstand, Meteorologie.
- Bernstein**, Merkw. Stück, von Adern einer kry stallin. Substanz durchsetzt, XXXVI 563. — Harz v. Conifer XXXVIII 624.
- Bernsteinäther**, Anal XXXVI 84.
- Bernsteinsäure**, Anal. d. kry stallis. XXXVI 61. — d. sublimirt 82. — d. wasserf. 83. — Darstell. d. wasserf. XXXVII 36.
- Berthierit**, Anal XXXX 153.
- Beryllerde**, Tellursäure, XXXII 591. — Tellurigs 607. — Brenztraubens XXXVI 17.
- Betrug**, optischer, Sichtbarwerd. eines in einem Spiegel unsichtbaren Drahtes, XXXII 649. — Betr. nach Betracht. eines in Beweg. begriffen. Körper XXXIV. 381. — Beacht. d. Anorthoskops, XXXVII 464 466. — a. Auge, Stroboskop, Schreiben.
- Bewegung**, Gestalt der Trennungsoberfl. mehr Flüssigkeit. b. Pendelbeweg. XXXI 37. — bei Rotationsbeweg. 39. — Leb. ein. Beweger v. neuer Erfind. 270.
- Bicarborat**, Faraday's, Prod. d. Destillat. v. benzoesaur. Kalk, XXXVI 73. — Verbindung mit Chlor, 74.
- Bittererde**, a. Talkerde.
- Bittermandelöl**, a. Schwefelä. XXXI 287. — Bildung desselb. XXXXI 343 360.
- Bittermandelwasser**, identisch mit Kirschchlorberrwasser XXXXI. 368. — ungleich in Gehalt und Poggendorff's Annal. Bd. XXXXII.
- Wirk** 370. — Wodurch als Arzneimitt. zu ersetz. 372. — Zerleg. durch Salzs. 373.
- Blattgelb**, Darstell. u. Eigensch. XXXXII 423.
- Blattroth**, XXXXII 428. — ident. mit Berrenroth, 431.
- Blätter**, a. Laub.
- Blei**, :: Wass. u. Luft, XXXIII 110, XXXXI 305. — Verbindende Wirkung auf Sauerst. u. Wasserst. XXXVI 152. — Spiritoill. 393. — Anwend. d. Bl. z. Eudiometr XXXVIII 171. — Empfindl. Reagens d. Reinh. des Wass. zu prüf. XXXXI 307. — Zersetzt in d. Glühhitze Wass. nicht, 314.
- Bleiglanz**, auf elektrochem. Wege dargestellt, tetrade XXXI 46.
- Bleimuriocarbonat**, Kry stallform, XXXXII 582.
- Bleioxyd**, Trean. v. Wisnuthox. XXXI 536. — v. Queck Silberox. XXXIII 247. — :: Sonnenlicht, XXXII 389. — Löslichkeit in Wass. XXXXI 307. — B. hydrat, 309. — Verbind. v. B. + Silberox. 344. — Kohlensäur. B. + Wass. XXXX 207. — Entsteht b. Einwirkung v. Wass. u. Luft auf Blei, XXXXI 313. — Tellors XXXII 595. — Tellurigs 607. — Bas. Arsensäur. u. bas. phosphors. B. 51. — Wolfraams Hemiedr. dess. XXXIV. 373. — ist molybdäns. XXXV 528. — Chroms Lage d. optisch Ax. XXXVII 374. — Para. a. meta. apfels XXXII 220, 221. — Karbolsaur. 320. — Xanthogensaur. XXXV. 489, 493, 511. — von Schwefelwasserst. nicht verd. 513. — Brenztraubens XXXVI 24. — Fumars. 82. — Essigs. :: Ammoniumsalz, Theobald, Eiweiß, Fleischbrüh. XXX 305 bis 311. — Weinschwefelsäures, XXXXI. 629.
- Bleisuboxyd**, Darstell. u. Anal XXXI 622.
- Bleisuperoxyd**, entsteht, :: Sonnenlicht, XXXII 389. —

- Schlecht. Leit. d. Elektr. XXXV. 48. — Entst. b. Einwirk. v. Luft u. Wass. auf Blei. XXXVI 313.
- Bleisuperoxyd, braunes, :: Sonnenlicht. XXXII 389. — d. stärkste negative Elektromotor. XXXV. 50. — :: Harz. XXXXI 561.
- Blende, Analyse d. strahlig. von Präbram, XXXVIII. 161.
- Blitz, Discontinuit d. Leuchtema, XXXV 379. — Bericht v. einem merkw. Blitzschlag. XXXV 519, XXXVIII 543. — Untersuchung des v. d. Fensterrahmen u. d. Beschlag. abgerieb. Niederschl. XXXVIII 546.
- Blitzableiter, Hobes Alter ders. XXXIV 480.
- Blitzrad, App. zu rasch abwechselnd galvan. Schließ. u. Trenn. XXXVI 352. — Magnetelekt. Anwend. 356. — Größe d. Effekts, 359. — Vers. an d. Sinnesorgan 361. — Nutz. für d. Heilunde, 364. — a. Commutator.
- Bluthen, urweltl. XXXVII 455.
- Blut, enthält keine freie, aber gebundene Kohlensäure XXXI 249 296. — Umwandl. d. Bl. b. Athmen. 296 301. — Harnstoff im Blut nach Exstirpat. d. Nieren, 303. — Harnstoff u. Milchsäure in gesund. Bl. vergeblich gesucht, 304. — Saure React. d. venös. B. 311. — Umbild. d. venös. Bl. in arteriell. 317. — Eigenthümliche React. d. Lockmustinkt. auf die mit Essigsäure neutralis. Lös. d. phosphors. Natr. 319. — Kohlensäure im venösem Bl. XXXX 585. — D. Abscheidl. aus d. Lungen nach d. Gesetz. d. Absorpt. v. Gas in Flüssigk. 589. — Weshalb b. d. meist Vera. keine Kohlensäure im Bl. entdeckt, 592. — Venös. u. arteriell. Bl. enthält Kohlensäure Stickst. u. Sauerstoff, 600. — D. Kohlensäure beim Kreislauf erzeugt, nicht in d. Lungen, 602. — Ursach der rothen Farbe, 603. — Bl. d. Siedhitze ausgesetzt scheint nicht zu faulen, XXXVI 191.
- Blutroth, :: schwefels. Kupferox. XXXX 123.
- Bomben, aus Algier, besteh. aus Eisen + Arsenik. XXXXII 591.
- Boracit, Vermuth. üb. seine Zusammensetz. XXXIV 569.
- Borax, Lage d. opt. Elasticitäts. XXXVII 574. — Opt. Eigenschaften. XXXIX 284.
- Borsäure, Eigne Klasse v. bors. Salz XXXIII 96. — Sättigungsvermög. XXXIV 561 569.
- Bosphorus, D. Durchbruch dess. durch geolog. Unterra. nicht bestätigt. XXXX 490.
- Boulangerit, neues Antimonerz, Anal. XXXXI 216.
- Braunkohle, Salpeters. verwandelt d. Oel aus d. Theer d. Br. in eine moschusähnliche Subst. XXXV 160. — Paraffin in dem Theer, 160.
- Bronchopleuritis, Bronch. weins u. a. w. s. Schleimsäure, bronzliche u. a. w.
- Breviet, Anal. XXXIII 112.
- Bruchantit, Besch. XXXII 464.
- Brom. Trenn. v. Chlor, XXXI 636. XXXIX 370. — von Jod, XXXIX 375. — Br. + Sauerst. XXXIV 148. — Wirk. auf Arth. XXXVI 551. — Billel mit Sauerstoff u. Benzoesäure eine neue Säure, XXXVII 544.
- Bromäther, schwerer Bromäth. Zusammensetzung, XXXVI 554, XXXVII. 56.
- Bromal, Anal. XXXVI 552. — Bromhydrat, 553.
- Brombenzid, XXXV 374.
- Brombenzin, XXXV 374.
- Bromkohlenstoff, XXXVII 48.
- Bromkohlenwasserstoff, Anal. XXXI 320, XXXVII 552.
- Bromform, Anal. XXXI 654. — Bemerk. üb. Br. XXXVII 96.
- Brot, aus fossil. Infusor geback. XXXX 148.
- Brunnen, Entwurf zu ein. riesenh. Br. XXXX 495.
- Brunnen, artemische, Dechl. der Temp. in d. Umgeb. v. Wien,

XXXI. 365. — Arragonit in Br. zu Tours, XXXIII 332. — Aale darin, XXXVI. 361, XXXVIII. 605. — Muscheln, XXXVIII 604. — Entwickl. verschied. Gasarten, 605. — Artes Brunn. in Grauit, XXXVIII 235, XXXIX. 588. — Brob. hinsichtl. d. Temp. d. Inners d. Erde, XXXVIII 593. — Poisson's Hypothese üb. artes. Br. 602. — Andere Ansicht, 604. — Alter d. A. Br. 603. — Menge derselb. in Württemberg, XXXX. 491. — Brob. ein unterirdisch. Strom's, XXXVIII. 606. — a. Senkbrunnen

Brunnensäure, Product der Destill. d. Steinkohl XXXI. 71. — Darstell. 76. — Uebereinstimm. mit Humass. XXXI. 508, XXXII. 332.

## C.

Cadmium, :: Cyan, XXXVIII. 364. — Kaliumcadmiumcyanür, Eigensch. n. Analyse, 368. — :: feucht. Luft, XXXVII 336.

Cadmiumoxyd, Trenn. v. Wismuthox. XXXIII. 217. — oxala. Anal. XXXVIII 144. — Weinschwefels. XXXXI 628.

Cadmiumsuboxyd, Zusammensetzung. XXXVIII 145

Cainessäure, XXVIII 42.

Caiputöl, Anal. XXXIII. 57.

Calcium, Spirale XXXVI 392.

Capillarität, Verbess. Appar. z. Brob. ders. XXXI. 593. — Drei Grössa bestimmt d. Höhe des Flüssig. 599. — Steighöhe v. Wasm. Koch- u. Glaubersalz, XXIV. 621. — Mittel d. Gestalt d. Quecksilberkuppe zu erforschen, XXXX. 38. — a. Endosmose.

Carbohenzid, n. Benzon.

Carmin, Verfälsch. durch Stärke, XXXXII 587.

Cassidöl, Anal. XXXXI 402.

Centrifugalmaschine v. Bucoolt, XXXIX. 586.

Cer oxydul, schwefels. Darstell. u. Anal. XXXX 404.

Ceten, Darstellung aus Aethyl,

XXXVI. 139. — Verb. mit Salzs. 140. — isomerisch mit Aether, XXXVII. 161.

Chalcedon, opalhalt. XXXI 577.

Chili, Hebung. u. Erdbeben das. XXXVII. 437. — Einfl. d. Erdbeb. auf d. Magnetoad. 480

Chimborazo, Versuch einer Erstieg. XXXIV 193. — Vorsichtsmassreg. b. Steigen, 201. — Die Verletz. des Gesichts v. starkem Licht herühr. 203. — Grösste erstieg. Höhe, 205. — Schneebedeckte Anhöhen, beschwerlicher zu ersteig. als nackte Fels. 208. — Farbe d. Himmels auf Berg. 211. — Geognost. Brob. 214. — D. Ch. niedriger als d. Aconagua, XXXII 591.

Chinasäure, polymer. mit Brenzweins. XXXVII 41.

Chlor, Trenn. von Jod, XXXI. 583, XXXIX. 370. — v. Brom, XXXI 636, XXXIX 370. — :: Schwefelzinn, XXXII 517. — :: Schwefelkies, 527. — :: Schwefelantimon, 532. — :: Schwefelars. 536. — :: Schwefelen, 538. — Bemerk. üb. diese Verh. 539. — Chlor + Schwefel, analoge Verb. der arsenig. Säure, 539 542.

Chloräther, Zusammensetzung, XXXI. 340, XXXVII 65 79.

Chloral, Darstell. XXXI 657. — Wasserf. 660. — Hydrat, 661. — Anal. 662. — Löslich. Ch. XXXI 662, XXXVII. 102. — Eigenschaft. u. Zusammensetzung, XXXVII 97. — Bildung nach d. Substitutionstheorie, XXX. 298.

Chlorbenzid, Darstell. u. Anal. XXXV. 373.

Chlorbenzin, Darstell. u. Anal. XXXV 370.

Chlorcyan, Anal. XXXIV 605.

Chlorige Säure, :: Sonnenlicht, XXXII. 391.

Chlorkohlenoxydäther, Darstell. u. Zerleg. XXXI 641.

Chlorkohlenstoff, 2 Verbindungsstuf. XXXVII 48.

Chlorkohlenwasserstoff, Darstell. XXXI 320.

- Chlormetalle, Auffind. kleiner  
Menge in große Meng. v. Jod- u.  
Brommetall, XXX 632.
- Chlorotorm, Anal. XXXI. 632,  
XXXVI 96. — Entsteh. u. For-  
mel, XXXVII 96.
- Chlorazalither, Darstell. u. Zu-  
sammensetz. XXXVII 103.
- Chloroxyd, :: Sonnenlicht,  
XXXII 392.
- Chlorwasserstoffsäure, Die  
Aufwall. bei ihr Darstell. herrühr.  
v. d. plötzl. Krystallisat. d. saur.  
schwefels. Natr. XXXI. 31. —  
nicht unter den v. d. amerik.  
Vulkanen entwickelt. Gaseu, 155.  
— :: Sonnenlicht, XXXII. 394.
- Chondrin, u. Leim.
- Chrom, Farbenschein b. chrom-  
haltigen Salze, XXXV 383. —  
Chlorid chromsaures, Eigensch.  
XXXI. 607, XXXX. 403. —  
Chromcyan, XXXII. 141.
- Chromalaun, Neue Darstellung,  
XXXI. 594.
- Chromeisenz, Bestandth. d. Me-  
teorat. XXXIII. 141.
- Chromoxyd, Darstell. u. Kry-  
stallform, XXXIII. 341. 344. —  
Große Härte, 342. — Arsenige  
S. verbindet d. Fäll. desselben,  
XXXVII 303. — Oxalsaur Chr-  
kali, Eigenthümlichk. b. d. Dop-  
peltrock. u. Lichtabsorpt. 315.
- Chromoxydul, Opt. Eigensch.  
d. Löss des schwefels. Chr-kali,  
XXXI. 591. — Tellurs. XXXII.  
598. — Tellurigs 605.
- Chromsäure, Reduct. durch Ar-  
senige S. XXXVII 303.
- Chromsuperchlorid, Vortheil-  
hafte Darstell. XXXIII. 343.
- Cinnamyl, Verbindung. desselb.  
XXXVI 405 411. — Basein d.  
C nicht bestätigt, 415.
- Citronensäure, Erkenn. ders.  
XXXI 209. — Produkte d. trock-  
nen Destill. XXXVI 56. — Zer-  
setz. in hoh. Temp. XXXVII.  
36. — Ansicht üb. ihre Zusam-  
mensetz. XXXII. 416.
- Citronensäure, brenzliche,  
Entsteh. XXXVII 37.
- Cölestin, Leichte Erkenn. vor d.  
Lüthrohr, XXXI. 592.
- Cohäsion, Flüss. Körper XXXVII.  
409. — Was unter Synapsie zu  
verstehn, 410. — Taf. d. Vera.  
413.
- Combinationsstöne, u. Töne.
- Commutator, Maschine durch  
Elektromagnet bewegt, XXXVI.  
366.
- Copaivaharz, Anal. XXXIII. 37.  
— isomer. mit Kolophon. 37. —  
C + Silberox. 39. — C + Blei-  
oxyd. 40. — C. + Kalkerde. 41.
- Copaivöl, Anal. XXXIII 55. —  
Salz. C 56.
- Copaivyl, u. Copaivöl.
- Cordilleren, Dimensions- und  
Positionsverhältn. XXX. 167. —  
u. Vulkane.
- Cosiguina, Ausbruch desselben,  
XXXVII 447, XXXXI. 221.
- Cyan, Merkw. Spectr. d. Cyan-  
stamme, XXXI. 592. — Verhältn.  
des C. in d. bisher untersuchten  
Doppelverbind. XXXVII 142.
- Cyanamid, Anal. XXXIV. 609.  
— Verh. b. Glüh. 611.
- Cyanidwasserstoffsäure,  
XXXVII. 548.
- Cyanplatinwasserstoffsäure,  
XXXVII 547.
- Cyanursäure, als Wasserstoffsä.  
zu betracht. XXXIII 447.
- Cyanwasserstoffäther, Eigen-  
schaften, XXXII. 301, XXXVII.  
552.
- Cyanylsäure, Darstell. XXXIV  
609. — Anal. 601. — I.berreini-  
gung. mit Cyansurs. 603.
- D.
- Dädaleum, Besch. u. Theorie,  
XXXII 630.
- Dänemark, Nieververänd. das.  
XXXII 476.
- Dampf, Ansicht Ausdruck für d.  
Spannk. nach Biot, XXXI 42.  
— Temp. d. aus werdend. Salsöl-  
ung gebild. D. XXXIV. 257. —  
Besch. d. z. Untersuch. benutzten  
Appar. 259. — Zusammenstell. d.  
Beob. 265. — D. Temp. aus sic-

- dend. Salzlös dieselbe wie aus sied. Wass. 267. — Die Elasticität d. D. aus Salzlös geringer als aus sied. Wasser, wenn beide Flüssigkeit v. gleich Temp 269. — Dampfbild aus einer siedend. Salzlös eine consequ. Folger aus d. Theorie d. Dampfbild XXXV. 198 620. — Einwurf dagegen, 627. — Temp. des D. aus sied. Wasser unabhng v. d. Beschaff. feinh d. Gefäße, XXXX 55. — niedrig, als die des Wass. 56. — Dampfbild durch Anwesenh. ein. Luftart in Wass. 392. — Anweis. z. leichtern Berechn. d. specifisch. Gew. d. Dämpfe aus d. Beobacht. XXXXI 449. — dazu gehörige Tabeln, 460.
- Datolith, Entwickl. u. Berechn. der Krystallform nach der Projectionsmeth. XXXVI 245.
- Demavend, Höhe, XXXXII 592.
- Destillation, trockne, Einfl. d. Temper. u. d. Beimeng. fremder Stoffe auf d. Bild. neuer Producte, XXXVI 2 44. — liefert 2 Reihen v. Kohlenwasserst. XXXVIII. 392. — u. Kohlenwasserst., Traubensture, brenzliche.
- Dextrin, Opt. Eignach XXXII 168. — Wird durch Säuren in Zucker verwandelt, 169. — Eigenthuml. Unsäuer sein. Auflösl. 170. — Dextringummi, 172. — Darstell. durch Diastase, 180. — Benutz. 181 192. — Darstellung im Großen, 181. — Zerleg. des roh. Dextr. in 3 Subst. 186. — Kritik dies. Vers. 193. — Einfl. verschied. Stae. auf d. optisch. Eigenach. 208.
- Dextringummi, XXXI 172.
- Dextrinsyrup, Anal. XXXVII. 153.
- Diamant, Ausbeute in Brasilien, XXXI 607. — im Ural, 608. — D. in Algier, XXXII 480. — Streut XXXVI 563.
- Diastase, Einwirkung auf Stärkmehl, XXXII 176 178, XXXVII 131. — Vorkommen und Eigenschaften, XXXII. 179. 182. 184, XXXVII. 135. — Darstell. 179. 183.
- Diatherman, Bod. XXXV 295.
- Dichroismus, bei Mineral. XXXXI 118.
- Dichtigkeit, Max. h. Salzlös. u. erstarrend. Körp. XXXI 98.
- Diffusion, Bemerkung zu Graham's Vers. üb. d. Diff. d. Gase, XXXIV 628. — Erklärung nach Dalton's Gesetz, 630.
- Dimorphie, Kupferblüthe und Rothkupfererz, XXIV 528. — Jonckreut u. Spatheisenst. 662. — Bemerk. üb. d. D. der Carbonate, 664. — Bemerk. dazeg 665. — Baryt-Calcit, 669. — Zusammenstell. d. dimorph. Carbonate, 671. — Kalkpath und Salpeter, XXXX 455. — Künstl. Bild d. Kalkap u. Arragonits, XXXXII. 353. — Vers. zur Darstell. und. kohlen. Salze in beiden Form. 365. — Kohlen. Talkerde, 366.
- Diorit, Characterist. XXXIV 2. — Zußüge Gemengtheile, 3. — Spec. Gew. 5. — Vorkomm. 6.
- Dioritporphyr, Characteristik, XXXIV 7. — Zufall. Gemength. u. spec. Gew. 8. — Verbreit. 9.
- Donner, unterird. v. Meer verursacht, XXXIII 349.
- Drehwage, Coulomb's, Widerleg. d. Ansicht, dals d. Dreh. des Wagnahk v. Electr. herrührt; Luftströme d. Ursach, XXXV. 72.
- E.
- Effloresciren, Unter welchen Umständen Salze nicht effloresc. XXXIII 186.
- Eis, Krystallform, XXVII 379. — Bemerk. u. Beob. üb. Grund. ein, XXXIX 122.
- Eislöcher, Entsteh. ders. auf d. Gletschern, XXXVII 261. — Natur d. von ihnen stromenden Gases, 266.
- Eisen, Fortschritt. Verlängerung ein Eisendrahts durch Zugkräfte, XXXI 109. — Wagnahk Eisen verbrennt vor d. Wasserd. 196. — Schlecht Krystall. E. zu Elek.



- tromagn. besond. gezeign. XXXII. 536. — E. Bestandth. d. Meteorsteine, XXXIII. 138. — alles nat. ged. E. meteor. XXXVIII. 289. — Abnahme d. elektr. Leitfähigkeit b. steigend Temp. XXXIV. 429. — Verbindende Wirk. auf Sauerstoff u. Wasserst. XXXVI. 153. — E. hindert am besten d. Aufsteig. b. Sied. XXXVII. 390. — Merkwr. Verhalten eines Eisendraths geg. Salpeters. XXXII. 211, XXXVII. 392, XXXVIII. 444. — Beruht auf einem permanent elektr. Zustande d. Oberfl. XXXII. 214. — Weitere Beob. darüb. XXXVII. 590, XXXVIII. 444. — Unter welch Umständen sich E. als + Pol nicht mit Sauerstoff verbind. XXXVIII. 492. — Faraday's Hypothese üb. d. Passivität des E. XXXIX. 137. — D. Vers. im Widerspr. damit, 139, 319. — Verhalt. d. E. zu Salpeters. erklärt durch adhäs. concentr. salpetrige Salpeters. 333. — Rolle des E. b. Reduct. salpeters. Metallsalze, 338. — Result. 342. — Gründe geg. diese Erklärung 344. — Fernere Beob. üb. Erreg. u. Ausfl. d. Passivität, XXXX. 193, XXXXI. 41. — E. verhält sich unter Umstand, wie Platin, XXXX. 623. — Ähnlich. Verhalt. geg. d. Aufl. v. Kupfervitriol, XXXXI. 42. — E. mit Bleisuperox. voll. combinirt, 49, 55. — :: frucht. Luft, XXXII. 332. — Hesthaftung durch kalte Luft, XXXXII. 589, XXXI. 496. — E. + Arsenik in Algierschen Bomben, XXXXII. 591. — Chlorür, Darstell., Eigensch. u. Anal. des rein. XXXI. 89. — :: Sonnenlicht, XXXII. 393. — Chlorür :: Sonnenl. 393. — Cyaneisen + Cyankopf., Cyanzink, Cyaneisilb., Calcium verb. mit Ammonium + Wasser, XXXIV. 131 bis 145. — + Cyankal. Krystallform, XXXVI. 404. — Cyaneisen-Ammonium Anal. 405. — Cyaneis.-Ammon.-Salz, 409. — Cyaneis.-Natr. 413. — + C. baryumkalium, 415. — C. baryum mit C. strontiumcalcium, 416. — C. eisen-Ammon. + Bromammonium, XXXVIII. 209. — Natr.-Ammon., Magnesium, Calcium, Kalium, Baryumeisencyanid; Magnesium-Strontiumeisencyanür, XXXXII. 143. — Spureneisen, XXXVI. 392. — a. Hobofen. Eisenbahn, Elektr. Ströme darin, XXXXII. 590. Eisenetz, Bemerk. üb. d. Bildung, XXXVII. 203. Eisenoxyd, E. hydr. Antidot d. Arsenig. Säure, XXXII. 124. — Antidot geg. Arsenik b. Vegetabilien, XXXIX. 366. — Trenn. v. Kobalt-, Nickel- u. Manganoxydul, XXXXII. 101, 108. — Lage d. opt. Axe im schwefels. E.-Ammon. XXXXII. 371. — Wie d. Wass. im schwefels. E. zu betr. XXXVIII. 139. — Salpeters. XXXIX. 141. — Tellurazur XXXII. 595. — Tellurigs. 607. — Arsenigs. E., Zersetzt b. Erhitze, XXXX. 411. — Brenntraubens, XXXVI. 19. — Gerbsäure 36. — Weinschwefels. XXXXI. 623. Eisenoxydul, D. Salze desselb. absorbir. Stickoxyg. in bestimm. Verhältniss. XXXI. 24. — Eigenschaft des Verbind. 27. — Unbeständigk. einziger, 28. — Schwefels. durch einen Leberschmerz an Schwefels. vor Oxydul geschützt, 82. — Eigensch. d. rein. Salz, 85. — Brauch u. Gebrauch des im Handel vorkommend. Sorten, 86. — D. saure React. rührt v. Oxydsalz her, 89. — Wie das Wass. darinn zu betr. XXXVIII. 139. — Nat. kondens. Brauch. u. Anal. XXXIV. 681. — Tellurs. XXXII. 595. — Tellurigs. 607. — Para- u. Metaäpfels. 220, 221. — Brenntraubens, XXXVI. 18. — Weinschwefels. XXXXI. 623. Eisenst., :: Schwefels. Kupferox. XXXX. 107. — Analyse des E. d. Seide, 270, 287. — E. von Eiern, 271. — v. Blut, 277. —



— **Untersuch. v. Fibrin**, 290. —  
=: **Metallgift** 308

**Elasticität**, **Emanula** krystallin.  
Substanzen d. homoeode Abtheil.  
XXXI 177 — **E** d. Seidenfäd.  
XXXIV. 250 — **Elast** Nachwirk.  
251 — **Abnahme** d. Schwingungs-  
bogen bei Körper, die durch ihre  
eigene **E.** schwingen, 254 — **D.**  
mittl. **E.-Axe** aus d. scheinbaren  
Neig. d. opt. **Axe** zu bestimmen,  
XXXV 88 — **Mittl. E.-Axe** b.  
Gyps, 89 91. — **Veränd.** d. **E.-**  
**Axe** durch **Temper.** 93. — **D. E.**  
d. Dampfs aus einer Salzlös. ge-  
ringer als aus d. Wasser, wenn  
beide Flüssigk. v. gleich **Temp.**  
XXXIV 269.

**Elasticitätsmodulus**, Was  
man in England darunter versteht,  
XXXI 573 — **E** d. Goldes, 575.  
— **Abhängigk.** d. Tons v. dem-  
selben, 575

**Elektricität**, **Feuchte** Luft ent-  
zieht abgerundeten Körpern nicht  
mehr **E.** als trockne, XXXI 443.  
— wird von Spitzen leichter in  
feuchte als in trockne Luft aus-  
geströmt, 460. — Was h. **Versuch**  
in feucht Luft zu vermeiden.  
463 — **Unverwechslung** d. Nam.  
+ und — **Pol.**, XXXIII 301 —  
**Elektrode**, **Anode**, **Kathode**, 302  
303 — **Benennung** d. durch **El.**  
zersetzt Körper 304 497 — **Abs-**  
**olute** Quantit. v. **E.** den Atom.  
beigeseht, 506 — **ist** erstaunl.  
gering, 507, 512 519 — **Die** h.  
**Zernetz.** entwick. **E.** übertrifft an  
Menge ungeahnt die durch Reib.  
erzeugte, 513 — **Licht** d. elektr.  
**Funk.** instantan, 508 — **App.** d.  
**Schnelligk.** d. **Funk.** zu messen,  
XXXIV 465. — **Vers.** die **Ge-**  
**schwindigkeit** d. **E.** zu bestimmen,  
470 — **Merkw.** kleine beobacht-  
bare **Zeitdauer**, 475. — **Result.**  
d. **Vers.** 476 479 — **Prismat.**  
**Zerleg.** des **el. Lichts**, XXXVI  
148 — **E.** führt v. chem. **Wirt-**  
**kung** her, XXXV 18. — **E.** u.  
chem. **Verwandtschaft** nur versuch.  
**Form.** derselb. **Kraft**, XXXVII.

233. — **D.** — **E.** entweicht schnell-  
er in d. Luft als die + **E.** XXX.  
73 — **El.** **Vers.** in verdünnter  
Luft, XXXI 99 — **Die** Schlag-  
weite abhängig v. d. **Dichtigkeit**  
d. Luft, nicht v. **Druck** u. **Temp.**  
100 — **Übersicht** d. **E. E.** ver-  
schieden Ablaut, XXXI 164.  
— **Intensit.** die zur **Hervorbring.**  
el. Schläge v. gewiss. **Stärke** er-  
forderlich, XXXII 304 — **Mechan.**  
**Beding.** zur **Beweg.** d. **E.**  
305 — **a.** die folgenden **Artik-**  
**el** s. **Elektricität**, **Magnetismus**,  
**Elektro.**

**Elektricität**, **animalische**,  
**Leb.** d. **Untersuch.** an **Gymnaten**  
u. **Torpill.** XXXVII 241 — **Funk.**  
aus d. **Zitterrochen**, XXXVIII 291,  
XXX. 642. — **Versuche** mit d.  
**Zitterrochen**, u. **Zitteraal**, XXXIX.  
411, 413 465

**Elektricität**, **atmosphäri-**  
**sche**, **Beob.** ders. XXXIV 502.

**Elektricität**, **Contact-** (**Vol-**  
**ta'sche** **E.**), **Continuirl.** **Rotation**  
eines geschlossenen Bogens durch  
einen and. geschloss. **Bog.** XXXI.  
206 — **D.** **Wirk.** d. **Platt** pro-  
portional dem **Umfange**, 261. —  
**Wirk.** d. **Umfangs** d. **Platt** auf  
**Wärmeeerz.** 263 — **Metalle** als  
**Pole** gebraucht verbinden **Gase**,  
XXXIII. 151. 164. — **Unge nauigk.**  
d. **Namen** + a — **Pol.**, 301 —  
**Andere** **Benennungsweise** 302. —  
**Benenn.** der durch **E.** zersetzten  
Körper 304 305 497 — **Bezeich.**  
eines **Messers** d. **Voll. El.** 346  
328. — **Gesetz** d. **elektrolytisch.**  
**Action**, 320 323. — **Veränder.**  
d. **Intensität** bewirkt keine **Ver-**  
**änderung** 324 — **Einfl.** d. **Sticks**  
d. **Lösung** 326 — **Mechanism.**  
d. **Säule**, 351 — **Metallcontact**  
nicht nothwendig z. **Erzeug.** ein.  
el. **Stroms**, XXXV 3 5. 17. —  
**Nutzen** d. **Metallcontacts**, 7 —  
**Verschied.** Körper mit ungleicher  
**Leitfähigk.** v. einem **Strome** zer-  
setzt, 10 — **Daher** auch ein  
**Plattenpaar** **Zersetzung** hervorbr.  
11. — **D.** **Intensität** d. **Stroms**

erhöht durch Verstärk d. chem. Action, 12 — Möglichk einer Intensitätskala, 14 16. — Elektr. nur v. chem. Wirk. herrührt 18. — Beweis dafür, XXXIX 351. — Beantwortung d. Einwurfs d. rein chemisch. Theorie d. Säule, XXXX, 355 — D. el. Strom eine andre Form chem. Verwandtschaft, XXV 18 — Nothwendigk eines Elektrolyt in d. Kette, 22 — Secundär Character der Schwefelsäure als Agens, 24 — And. Vers. z. Beweise, daß d. chem. Einwirk. Ursach d. Str. 26. — Zweierl. Wirkungsweise d. chem. Anzieh. 33. — Spannungszustand d. Elektrolyte, 37. — Funke durch ein Plättchen 38 — Fälle wo kein Funke entsteht, 41. — Welsch d. entbund. Körper in gewiss. Richtung. wandern, 41. — Allg. Satz ab. chem. u. el. Anzieh. 41. — D. Quant. d. E. wird nicht durch d. Quant. d. Metalls erhöht, 233. — Warum d. Kraftverlust größer b. gewöhnl. Zink, als b. rein, 237. — Vorth. d. Zinkamalg., 237. — Vervollkommen d. Batterie, 241 — D. rückwirk. Thätigk. d. Bath. schwächt d. Kraft d. Str. 252. — D. ungewöhnl. Zustand d. Metalls 2te Ursache d. Schwäch. 236. — And. schwäch. Ursach. 257. — Wirk. d. Volt. El. auf Alkohol, Aether u. wäsr. Lös. XXXVI 467. — Verbeas. Form d. Volt. Batterie, 505 — Pract. Result. in Bezug auf Construct. u. Gebrauch d. Batt. 515. — Nähe d. Kupf. u. Zinks, 520. — Vorzug d. dopp. Kupferplatt. 520. — Anzahl d. Platt. 521 — GröÙe od. H. Platt. 523. — Einfach. App. z. Erläuter. d. elektrochem. Erschein. 518 — Sauerst. entwickelt sich nicht bloß am + Pol, wenn d. Metall ein edles ist, XXXVII 594 — Berechnung d. relativ. GröÙe d. el. Spann. b. galvan. Coordinat. XXVIII 464. — Wenn Eisen als + Pol nicht nicht mit d. ausgeschied. Sauerst.

verbind. 492. — Callan's neue Batter. u. Vers. damit, XXXIX 407. — de la Rive's Theorie d. Säule, XXXX, 371 — Spannungswirk. 513 — Dynamische Wirkung d. Säule, 518 — Umstände, welche auf die Wirk. d. Säule v. Einfl. 522. — Uebereinstimm. in d. Theorie, 532 — Rückblick, 537. — Erklärung d. irrisir. Metallfläch. 621. — Eigenthüm. Verhalt. d. Essens, 623. — J. Young's Volt. Batt. 624 — Wirk. einer mit schwefelsaurem Kupferox. gelad. Säule, 628. — Verfahr. d. E. zweier in Berüh. gewes. isolirt. Platt. zu ermitteln (Bericht XXXII. 481) XXXI. 226 — Apparat leicht. Genüg. dies. Vers. (Berichtig. XXXII. 694.) XXXVI 230 — Andere dahin gehö. Vers. 233. — GröÙe Intensit. d. freien E. während d. Berüh. zweier heterog. Platten, 236. — Rechtfertig. d. Contact-Theor. d. Galvan. XXXII 481 — Thatsach. d. ungeschloss. Kette betröff. 482 — D. geschloss. Kette betröff. 499. — Entwickl. v. El. b. Berüh. v. Metall u. Flüssigk. 512. — a. Blitzrad. Elektricität, Elektrische Ströme, Electrochem. Zersetz., Gase, Platin

Elektricität-Erregung, Braunen Bleiakuperox. d. stärkste negative Elektromotor, XXV 50. — Vergh. mit d. Erreg. anderer Körper 55. — Fast nicht leitende Körper erreg. E. b. Berüh. 58. — Findet nicht statt b. bloß. Contact, nur b. chem. Act. XXXVI 226, 230, XXXVII 95 — Erregung wenn Manganhyp. u. Platin sich berührt XXXVII 306 — D. Erreg. b. Berüh. v. d. el. Gegensatz d. Körper abhängig, XXXII 96. — a. E.-Vertheilung

Elektricität-Leitung, Eis. u. viele and. Körper im starren Zustand Nichtleiter, XXI 225, 232 — Welche Körper b. Flüssigwerden kein Leitvermög. erlangen, 233. — Be-

Bezieh. zw. Leit. u. Zersetzbarh. 235. — Quecksilberjodid wird leitend ohne Zersetz. 235. — Einfl. d. El. v. gro. Intens. 237. — Sätze üb. d. Leitungsfähigk. 244. — Wasser erleichtert unter den Flüssigk. d. Leit. am schlechtest. XXXII 410. — Unrichtigkeit d. Gesetze üb. d. Leitkraft 329. — Wovon diese abhängig, 332. — Wärme erhöht die Leitungsfähigk. XXXI 241. — Nimmt ab bei steigend. Temp. XXXIV 418. — Appar. d. Einfl. d. Temp. zu ermitt. 421. — Versuche mit Drath v. Silber, Kupfer, Messing, Eisen, Platin, 426 bis 430. — D. Abnahme d. Leitfähigkeit ohne bestimmt. Verhältn. z. Temp. 433. — Minim. d. Leit. 435. — Prüf. d. Formeln für hohe Temp. 436. — And. Method. d. Leitfähigkeit zu bestimm. 440. — h. Körp. im pulverförm. Zustande leichter zu ermitt. 443. — Verschieden d. Leit. h. schwarze Schwefelquecksilber 438 446. — Leit. d. Zinnamalgame, 455. — d. Kohlenpulv. 459. — Rückblick, 460. — El. Schläge verändern d. Leitfähigkeit. 461. — Mennige schlecht. Leit. XXXV. 48. — Braunes Bleisuperperox. leitet besser als Braunst. 49. — Körp. die fast Nichtleit. erreg. E. h. Berühr. 58. — Leit. eines el. Stroms ohne Zersetz. 229. — Leitungsfähigk. zweifach, 231. — Ein isolirt. Leiter neben einem elektr. zeigt überall dies. E. XXXVI. 221. — Leitfähigkeit v. Chlor, Brom, Jod. XXXVII. 420. — Relative Leitfähigkeit der Flüssigkeit. u. Metalle, XXXXII. 298.

Elektricität, Magneto-, Magnetoel. Appar. zu chem. Wirk. dienl. XXXIV. 185. — Zweckmäßs. Abänder. d. d. 500. — App. z. Hervorbring. v. Funk. 292. — Construct. d. Spitzennauk. z. gleichzeitig. Erzeugung mehrerer Funk. XXXIV. 497. — Vers. mit d. Appar. d. magn. Observator. zu Poggendorff's Annal. Bd. XXXXII.

Göttling. 549. — Saxton's Maschine, XXXIX. 401. — Clarke's Maschine, XXXIX. 404, XXXXI 223. — Ritchie's Maschine, XXXIX. 406. — Verbesser. daran, 410. — Eigensch. d. magnet. el. Ströme, XXXXI 152. — Inductorenphän. 157. — El. magn. Multiplicat. XXXXII. 306. — s. Commutator.

Elektricität, Pyro-, Zusammensch. d. Krystallform mit d. el. Polarit. XXXIX 255 289. — Untersuchung d. schwarzen Turmalin, 292. — grüner T. 301. — brauner T. 305. — rother, 306. — Art. d. El. an d. Enden. 314. — Stärke der polar. El. 320. — s. Elektr. Thermo-.

Elektricität, Reibungs-, Maschinen-El. geht vermöge ihrer Spann. durch jede Strecke eines Leiters, XXXII. 402. — Angeh. Zersetz. d. Wass. durch Reib.-E. 409. — Die Menge gering in Vergleich zu d. durch d. Volta'sche Säule entwick. XXXIII 512. — E. erregt durch Reib. v. Metall. XXXVII. 506. — Erklär. d. dabei vorkommend. Erschein. 510. — Wirk. d. Reib. E. in Verhältn. z. Aushöf. XXXX. 321. — Ma.ße für d. Quant. d. angehäuften El. 323. — Abstoß. einer anliegend. Kugel v. d. Innenseite d. Bau. 326. — einer entfernt. el. Kugel, 330. — einer anliegend. Kugel, dir. v. einer nicht-el. angezogen wird, 330. — Schlagweite d. angehäuften. E. 332. — Erwärm. im Schließungsdrath, 335. — Magnetism. im Schließungsdrath, 348.

Elektricität, Thermo-, Magn. Pyromet. XXXIX 574. — Bestimmung. nied. Temp. mit demselb. XXXXI 147. — Funk. aus d. th. el. Kette, XXXX 642, XXXXI 160, XXXXII 589 625. — th. el. Ströme zwisch. Metall. u. geschmolz. Salz. XXXXI 164. — Beide bleiben unveränd. 169. — Vergl. d. thermo- u. hydroelektr. Quell. XXXXII 297. — Magneto-

gum. in weich. Eisen durch Th. — El 627 — Wasserzersetzung 629  
**Elektricitäts - Vertheilung.** Bequeme Anstell. v Biot's Versuch El durch Vertheil zu erzeug XXXVII. 642. — s. Elektr. Ströme  
**Elektrische Ströme.** Gesetz üb d. Rieht d. durch elektrodyn. Vertheil erzeugt Ströme, XXXI. 206. 453. — Wie zu betrachten, XXXII. 431 — Apparat, durch magn. Vertheil. einen continuir. Strom zu erhält 349 — Kreuzen sich nicht wie Lichtstrahlen, XXXIII. 546 549 — Haufen sich an Spitzen u. Rändern, 550 — Drei Meth. z. Bestimm. d. Kraft eines Str XXXIV. 419 — Vorzüge von Faraday's Methode, 420. — D. el. Str., eine Form chem. Verwandtschaft XXXV. 16. — Wann el. Str. nur entstehen, 20. — Vertheilungseinfl. eines el. Str. auf sich selbst, und der el. Ströme überhaupt, 413. — Erreg. u. Intensit. d. Str. d. chemisch. Verb. u. Zersetz XXXVII. 230 — GröÙe Verschiedenh. el. Str. 236. — Mittel d. relative Intensit. verschied. Str. zu find. 238 — Eigenschaft d. durch Zwischenplatt. u. Flüssigk. geleit. Stroms, XXXIX. 394 — App. z. Mess. d. Intens. XXXXII. 253. — Tangenten u. Sinusbussole, 283 284. — Vers. mit ein. einfach. Kette, 284 — Intensit. d. abgeleit. Str. 289 — Vers. mit ein. Säule v. 6 Element u. Formeln für d. Intensit., 290 — Result. 296 — Elektromagn. Wage z. Bestimm. d. Intens. 307 — Beschreib. d. Säule von constant. Str. 310. — Eigensch. d. magnetoel. Str. XXXXI. 152 — Interferenzphänom. 157. — Wechselb. sich bei diesen Vers. d. Metalldrähte mit fein zertheiltem Metall bekleiden, 159 — Thermoele. Str. zwisch. Metall u. geschmolzen. Salz. 164. 169. — Einfl. d. FlächengröÙe d. Pole, 168. — Wirk. d. Wärme

auf d. Uebergang d. el. Str. v. einem Metall in ein flüss. zusammengeätzt. Körper XXXXII. 100. — Daniell's Zergliederungsbatt. 264 — Vers. z. Bestätig. d. Theorie Faraday's üb. d. feste chem. Action d. E. 265 — Schwierigk. dies. Theor. 270 — Daniell's const. Batt. die ihre Kraft lange unverändert behält. 272 — Versuche, 277 — — Becquerel's Zellsäule, 282. — Vergl. d. thermo- und hydroel. Quell. 297 — El. Str. in Eisenbahnen, 590. — s. Elektrochem. Zersetz.

**Elektriciemmaschine.** Beschreibung d. Zeugemasch. XXXII. 362 — D. Kraft d. Masch. erlischt in feucht. Luft, aber Feuchtigk. nicht d. Ursach. 370 — sondern ein unbekant. Imponderabile, 385.

**Elektrochemische Figuren.** Neue Beob. über dies. XXXIII. 537 — Erklärung ders. 544

**Elektrochemische Theorie.** s. Elektrochem. Zersetz.

**Elektrochemische Zersetzung.** auch bei Anwend. eines Pols, XXXII. 405 — Was bedingt d. Zersetz. und d. Flüssigkeiten am schlechtesten, 410 — Frühere Theor. d. el. chem. Zersetz. 412 427. — hängt nicht v. Anzieh. od. Abstoß. d. Pole auf d. Elemente ab, 419 — B. constant. Quantit. v. E. die jed. zersetz. werdenden Leiter d. Betrag d. elektrochem. Action constant, 426 — Faraday's Ansicht, 428. 431. — D. Zersetz. abhäng. v. d. Verwandtschaft. d. anwesend. Substanz 436. — Erklärung verschied. Thatsachen nach dieser Theorie, 440. — Allgem. Beding. d. el. chem. Z. XXXIII. 306 — Substanz. die nicht zersetzt werden, 308 — Gesetze üb. d. Zersetzbarkeit 310. 315. — Ausnahmen 310. — Ursach. d. Nichtzersetzbarkeit, 316 — An Oerth. entwick. sich mehr Gas als an Platt. 322 — Gesetz d. electrolyt. Action, 323.

— Veränder. d. Intens. ohne Einfl. 324. — Primärer u. secundärer Charact. d. entwick. Substanzen, 433. — Ursach d. secundär Result. 434. — Beisp. secundärer Zersetz. d. Ammon. 437. — Essigs. Kali, 438. — Salpeters. K. 439. — Salpeter, salpeters. Ammoniak, Schweflige S. 440. — Schwefels. 441. — Salzs. 442. — Chloride, 445. — Jod-, Fluor- u. Cyanwasserstoffs, Jodide, 446. — Cyande, Eisencyanwasserstoffsäure, Essigs. 447. — Essigsäure Salze, Weins. 448. — Bemerk. üb. secund. Zersetz. 448. — D. chem. Kraft eines elektr. Stroms proportion d. absolut. Menge v. Durchgegang. E. 481. — Erweis. für Wasser, Salzs., Jodwasserstoffsäure, 482. — für Zinnchlorür, 483. — für Blei- und Antimonchlorid, 485. — Bleiox. 486. — Wismuthox. 487. — Bleijodid, 488. — Jodkalium, 489. — Vera. mit Körper v. sehr ungleich Verwandtschaft, 490. — Brault 496. — Taf. elektrochem. Äquivalente, 504. — D. b. d. Zersetzung entwickelte Menge v. El. außerordentl. groß, 512 519. — D. E., welche eine gewisse Menge von Subst. zersetzt, gleich der, welche b. Zersetz. derselben Menge frei wird, 517. — D. E. haßt sich an Spitz. u. Rändern eher in die zu zersetz. Flüssigk. eindringt, 550.

Ueb. d. z. Elektrolyse. nöth. Intensit. XXXV. 222. — Vera., wo ein Strom durch ein Elektrolyt geht ohne dens. zu zersetzen, 222. — Widerst. d. Elektrolyt gegen d. Zersetz. 242. — Einfl. d. Zwischenplatt. 249. — D. el. Zersetzung erzeugt einen Strom, XXXVII 240. — Becquerel's Apparat statt d. Volt Stile zu Zersetz. 429 432. — Zweifel an sein Brauchbarkeit XXXIX 129. — Bestätigung v. Becquerel's Vers. XXXX 67. — Elektr. d. abweich. Erschein. 443. — v. d.

Flächengröße d. Pole abhängig, XXXI 168. — Mohr's Vera. gegen Becquerel's Behauptung, XXXII 76. — B. d. Verbind. v. Säur. u. Alkal. kein el. Strom, 89. — Räthselhaft. Strom b. Auftret. v. Salpeters. 90. — Zersetz. durch ein. el. Strom ohne Erhitz. XXXVII 433. — Menge d. zur Zersetzung v. 1 Gr. Wass. erforderl. E. XXXII 300. — s. Elektricität, Contact.

Elektrode, Was darunt. zu verstehen, XXXIII 302.

Elektrolyte, durch El. zersetzbar Körper, XXXIII 304. 497. — Eigenschaft. XXXV. 22. — Spannungszust. 37. — Vera. wo ein Strom durch einen E. geht ohne ihn zu zersetzen. 222. — Widerst. eines E. geg. elektrolyt. Action, 242.

Elekt. Anal. d. krystall. Harzes aus El. XXXIII 19.

Ellingsburg, Darstell. u. Analyse, XXXVI. 45. — Entsch. XXXVII 40.

Elms-Fener, Beobacht. XXXIV. 370.

Elton-See, Zusammensetz. sein Wass. XXXV 169. — Enthält 29 p. C. feste Bestandtheile, 172. — Hohes spec. Gew. d. Wass. 177.

Emulsion, Lösl. Bestandtheil d. bitt. u. süß. Mandeln, XXXI 347. — Wirkung auf Amygdalen, 359. — Mathematisch Dasein v. Stoff, die sich wie Emuls. verhalten 366.

Endosmose, Vera. b. denen d. trenn. Lamelle ein Tropf. Quecksilb. XXXIV. 613. — D. Verbindungskanal hierbei verschied. groß, 616. — Vera. im Endosmomet. mit Gummi- u. Zuckerlös. 617. — mit Koch- u. Glaubers. 620. — Steigh. dies. Substanz abweich. v. Dutochet's Angabe, 622. — Baumblatt als trennende Schicht, 624. — Verdampf. durch d. Blase, 626. — Rückblick, 626.



**Epidot**, Lage d. opt. Elasticitäts-  
axe, XXXVII. 375.

**Erdbeben**, zu Neu-Granada,  
XXXI. 149. — Verzeichniß seit  
1821, XXXIV. 83. — Erfolge  
zu allen Jahres- u. Tageszeiten,  
99. — Was auf sie Einfl. haben  
kann, 102. — Zusammenstell. d.  
Erdb. aus 10jähriger Beob. nach  
Jahress u. Halbj. 104. — nach  
d. Tagesz. 107. — E. in Basel,  
108. — zu Coblenz, XXXVI. 235.  
— in Chili, XXXVII. 437. —  
Einfl. dess. auf d. Magnetnadel,  
480. — Furchtne E. in Nicara-  
gua, 447. — Moralische Wirk.  
dess. 449. — zu Irkuzk: gering.  
Einfluss auf d. magnet. Declinat.  
XXXIX. 113. — E. v. März 1837  
in Oesterreich, XXXXII. 685.

**Erde**, Mittl. Temp. d. Erdrinde,  
XXXIII. 251. — Einfluss ihrer  
Dreh. auf d. Ström. d. Atmosph.  
XXXVI. 321. — D. Temper. d.  
Erde aus 3 Quell. XXXIX. 66.  
— Ursach. d. ungleich. Erwärm.  
beid. Halbkug. 71. — Einfluss d.  
Sonnenwärme, 66. — D. Stern-  
nenwärme, 72. — Atmosphä-  
r. Wärme, 79. — Centrale W., Wi-  
derleg. d. flüssig. Zustandes im  
Inn. 86. — Poisson's Erklärung  
über die Temperaturzunahme im  
Inneren d. E. 90. — Bemerk. u.  
Widerleg. hierzu, 93. 98. — Be-  
stimm. d. Axen d. ellipt. Rotat.  
ionsphäroids, welches d. vor-  
hand. Messung v. Meridianbögen  
am best. entspricht, XXXII. 622.  
— u. Temperatur, Wind.

**Erdsenkung**, in Grönland,  
XXXVII. 446. — am Casp. Meer,  
462.

**Erdtrömbe**, Beob. zu Coblenz,  
XXXVI. 231.

**Erhebungskrater**, verschieden  
v. Volk. XXXVII. 163. — Der  
Monte nuovo ein Erheb. 180. —  
Volk. in Erh. 182. — Erhebungs-  
inseln u. Erkrater Aeusserung.  
vulkan. Thätigk. 183.

**Essigäther**, entsteht b. Einwirk.  
v. Chlor auf Alkohol, XXXI. 666.

**Essigsäure**, Darstell. auf unor-  
ganisch. Wege, u. Zweifel daran,  
XXXI. 32. — Entsteht aus Al-  
kohol, XXXVI. 306. — Erklärung  
des Entstehens XXXV. 298. 300.

**Eudiometrie**, Phosphor b. pas-  
send. Einricht. d. eudiometr. App.  
schr. zweckmäß. XXXI. 1. — D.  
Stickgasvolum. durch Phosphor-  
dampf nicht vermehrt, 2. — Ver-  
fahren b. Anwendung d. Phosph.  
3. — Einwürfe gegen Dalton's  
Theorie Gasmenge betref. 7. —  
Sauerstoffgehalt in verschiedenen  
Höhen, 8. — Grad d. Genauigkeit  
verschiedener Eudiometer, 9. —  
Größe Genauigk. des Phosphor-  
Eud. 7. — Vers. mit dems. auf  
d. Faulhorn, 14. — D. Luft auf  
Bergen u. in d. Ebne gleich za-  
mmengesetz. 16. — Anwend. d.  
Blei's z. E. XXXVIII. 171. —  
Vorzüge dess. vor d. Volt. Eud.  
175. — vor Phosphor- u. Schwefel-  
elast. -E. 177. — Anal. d. Luft  
durch Blei, 178. — App. einen  
Luftzug hervorzubringen, 264. —  
u. Atmosphäre, Mismen.

**Euphorbium**, Anal. d. krystall.  
Harzes aus Euph. XXXIII. 52.

**Euphotid**, Anal. XXXVI. 479.

**Euphon**, Ueberbestimmung mit  
Steinöl, XXXVI. 420. 424. —  
Reichenbach's E. naphthalhalt.  
435. — nicht ident. mit Naphtha,  
XXXVII. 534. — Beleuchtung d.  
strenge Punkte Ab. d. Verschie-  
denh. v. E. u. Naphtha, XXXVIII.  
163. — verschied. von Naphtha,  
380. 625. — Raps- u. Hanföl geb.  
dass. Euph. XXX. 95. — Anal.  
d. h. d. Destillat. mit Schwefel-  
erhalt. Flüssigk. 99.

## F.

**Fäulniß**, Trifft nur b. ungekocht.  
organ. Substanz. ein, zu denen  
nicht ausgeglühte Luft Zutritt hat,  
XXXI. 191.

**Farben**, Ueb. das Blau d. Him-  
mels, XXXII. 127. — Plateau's  
Ansicht üb. d. zufäll. Farb. 543.  
545. — nicht v. verringert. Em-



pfündlichk. d. Nétahant herrföhr  
 545 — Erklär. d. leradiat 550  
 — Linien im Spectr v. Licht, d.  
 durch Jod- und Bromdampf ge-  
 gang. 129. — v. Licht, d. durch  
 Salpetergas gegang. XXXIII 233,  
 XXXVIII 53 — Welche Linien  
 im Sonnenspectr zu verschiedn.  
 Zeit fehlen. XXXIII 234 — D.  
 Linien im Spectr Absorptionser-  
 scheinen, desgl. die Erscheinen im  
 Sp. farb. Flamme. 356 373 —  
 Spectra mit 2 Reih. v. Absorpt.  
 377. — D. schwarz Ringe in d.  
 Spectr nicht v. Absorpt herrföhr.  
 XXXV 523. — Spectr. d. elektr.  
 Lichts. XXXVI 148. — Theo-  
 ret. Nachweis, das zw. d. Zu-  
 sammensetz. d. Farb. d. Spectr.  
 u. d. Zusammensetz. klein Vibrat.  
 eine Analogie. XXXVII 528 —  
 Einfl. v. Schwefel- u. Joddampf  
 auf d. Sp. XXXVIII 52 — Satz  
 üb. d. Absorptionsspektr. Farb. Mit-  
 tel, 56. — Coincidenz des Son-  
 nenspektr mit d. des Salpetergases,  
 67 — Brewster's Untersuch.  
 d. Sonnenspektr abweich v. Fraun-  
 hofer's Zeichnung, 58 — Math-  
 matischer Ursach d. Verschiedenh.  
 63 — D. Verschiedenh. d. Lin.  
 in verschied. Zeit. stöblich v. d.  
 Nähe d. Sonne am Horizont, 61  
 — Spectr. von Venus und Mars,  
 63 — Fraunhofer'sche Lin. mit  
 bloß. Auge zu sehen, XXXVII  
 590 — Theorie d. Farb. in 2ax.  
 Krystallen b. schief Durchgange  
 d. Strahl XXXIII 267 — Iso-  
 chromat Curv. in einax. Krystlin.,  
 die parall. mit d. Axe geschnitten.  
 286 — Die unt. 15° gegen die  
 Axe geschnitten, XXXV. 96. —  
 Quers. zu Vera. darüb. besonders  
 geign. 109 — Die parallel mit  
 d. Axe geschnitten 110 — in ge-  
 kreuzt Krystallplatt die unt. 45°  
 geg. d. Axe geschnitten. 261. — in  
 Platt dreien Obect. d. opt. Axe  
 parall. 268 — Veränder. d. Cur-  
 venverlauf wenn d. Zerlegungstör-  
 mabn verschied. Stell. erhält, 275  
 — Farbererschein. in combinirt.

u. Zwillingkrystalln. 592 — Con-  
 struct. d. isochr. Curv. XXXIII.  
 291. — Bestätigung durch Vera.  
 299. — Erklär. d. natürl. Farb.  
 d. Köp. XXXIII 365, XXXIX.  
 476 — Lichtstärke verschiedn-  
 farb. Gläser, XXXIII 122. —  
 Intensit. d. Farb. XXXV 301 —  
 Erscheinen b. chromat. Salz 393.  
 — Gesetz üb. d. Farbervertr. in  
 dems Mittel, 609 — Göthe's  
 Ansicht über Ergänzungsfarben,  
 XXXVII. 284 — Analogie zw.  
 complement F u. Tönen, 290 —  
 Plateau's Ansicht (Bericht.  
 XXXVIII. 626 ), XXXVII 291.  
 — Einfl. Vorricht. compl. F. her-  
 vorzubr. 294 — Zu welch. An-  
 sicht d. Vera. föhr. XXXVII 299,  
 XXXXII 74. — Theor. d. farbig.  
 Schatt. XXXVII 319 — Direct.  
 Beweis für d. Objectivität dems.  
 XXXXII. 73. — Geschichtlich.  
 XXXVII 320 — Vera. mit Ta-  
 ges- u. Kerzenlicht, 325. — mit  
 gefärbten Gläs. 330 — Farbige  
 Schatt. im Freien, 336 — Res-  
 sult. 341. — Weiss erzeugt im  
 Conflict verschied. Farb. XXXIX.  
 325 — B. Zusammenschmelzen  
 verschied. gefärbt. Metallor. 326.  
 — B. Verdräng. verschied. durch  
 Reflex. od. Refract. entstanden,  
 Farb. 329 — Opt. Zeilex. des  
 Grün d. Pfau. 377. — Achul.  
 Vera. an andern Farb. n. Köp.  
 482 — Theorie d. Farb. dünner  
 Blättchen, XXXI. 312 — Vor-  
 richt. z. Darstell. d. Newtonsch.  
 Ringe. XXXII 176. — Mangel  
 d. Farbernames b. manch. Per-  
 sonen. 177. — u. Auge, Licht-Abs-  
 orption, L. Polarisation.  
 Farberkreisel v. Busolt,  
 XXXII 456.  
 Faserstoff, v. schwefels. Kupfer-  
 oxyd, XXX 131  
 Fayence, Anal. einer Purpurfarbe  
 z. Druck auf fein Fay. XXXVIII.  
 210  
 Feldspath, Analyse d. glas von  
 Drachenfels u. Mont d'Or. XXXI.  
 64. — Künstl. F. XXXIII 336,

- XXXIV. 534. — 12 Zwillingengesetze für d 1+1 gliedr Fgattung. XXXIV 109 301 — Zersetz. durch Wass. v. hoher Temperat. XXXV 353 — Lage d optisch. Elasticitätsax XXXVII. 373.
- Ferment, s. Hefe.
- Fettsäure, Untersch. von Kampfersäure XXVII 42.
- Feuerkugel, Merkiv. XXXVII. 459. — Angebl. Schaden einer F u Preisfrage, XXXIX 223 — D Schad v einem Gewitter berühr. XXXX 160 — Mittl Zahl in jedem Monat, XXXXI 176. — s. Meteorsteine.
- Feuerstein, Opalhaltig XXXI. 578. — aus fossil Infusor. besteht XXXVIII 461.
- Fibrin, v Ochsenblut, Analyse, XXXX 255 — Sättigungscapac. 257 — Fibrinsalze, 259. — Seidenfibr 260. — 2 Art. v. Fibr. 290 291.
- Fibroin, XXXX 290.
- Figuren, s. Elektrochem. Fig — optische, s. Licht-Polarisat
- Flammen, Opt. Untersch gleichfarb Fl XXXI 592. — Welche gefärbte Fl weiß geb XXXIX. 325. — Verstärk verschiedener Fl nach Drummond's Appar. XXXX 565 560.
- Fleischbrühe, :: Metallgift. XXXX 311.
- Flüssigkeit, Gestalt und Trennungsoberfl mehr Fl, die einer Pendel- od Rotationsbeweg ausgesetzt, XXXI 37 — App ein oscillir. Flüssigkeitsstrahl zu erhalten, 121. — Beschaffenh der durch kreirande Öffnung strömend Flstrahl XXXIII 451 — B. senkr Ström. 452. — Wenn d. Ausfluss tropfenweis, 455 — Wenn continuirl 459 — Appar. z. Untersch ob d Theile eines Strahls continuirl. od discontin. 462 — Result. 463 — D trübe Theil giebt einen Ton, 465. — Schwingungszahl desselb 466. — Merkiv Verändr d Strahls durch ein. nahe im Einklang stehenden Ton eines Saiteninstrum. 468. — 2 and Reihen klein. Tropf. 473. — Was d Zustand d Strahls bewirkt, 474 524 — Dimens d Strahls unt verschied Druckhöh. u Öffnung 520. — Folger. aus d Vers 523. — Einfluss d. Elasticit. u Temper auf d. Dimens d. Strahls, 527 — Der Widerst. d. Luft ändert d Gestalt d Strahls unmerklich, 528. — Horizontal und schief ausströmend Strahl. 531. — Rückblick, 534
- Untersuch. einer hydrop. Fl. XXXVIII 356. — Künstl. verdauende Fl 359. — Siedp gemengt Fl 481 — mischbar 487 — Max d. Dichtigh. verschied. Flüssigkeit. XXXXI 69 70 — Warum Wärme d elektr Leitfahigh. d. Fl. erhöht, XXXXII 99 — Relative Leitfahigh. d. El. b Fl. u. Metall. 298.
- Flüssigkeit, holländische, Darstell. u. Anal. XXXI. 669. — s. Chlorather.
- Fluor, greiß Kautsch. an, XXXII 576.
- Formeln, chemische, der bisher zerlegten organischen Subst. XXXVII 8. — der stickstofffreien Säur 8. — d indifferent stickstoffr Subst 15 — d stickstoffhalt. Basen, 28. — d stickstoffhalt Säur 32 — d Amide, 34.
- Franzbranntwein, Bestandth. XXXXI. 593.
- Fumarsäure, Identisch mit Paramaleinsäure XXXVI 54 — Bruchr. u Analyse, 61. — Darstellung, XXXVII 36.
- Fuselöl, Zusammensetz. XXXIV. 335.
- G.
- Gabbro, Charakterist XXXIV. 16. — Unwesentl. Gemength. 17. — Vorkomm 18
- Gährung, s. Weingährung.
- Gallerie, v Hirschgeweih, Anal XXXX 279 — von Fischleim, 280. — d. Seide, 281. 283. —

- wahrscheinlich im Thierreich nur eine Art, 290.
- Gallussäure**, Entsch XXXVI. 37 — Anal 40 — Umwandl. in Pyro- u. Metagallum. 41. — Verhältn. z. Ellägs. 51. — Zersetz. in d. Hitze, XXXVII. 40.
- Galvanometer**, Wie die durch Strafengeräusch u. s. w. veranlaßt, störend, Schwingung, zu vermeid. XXXIX. 6.
- Gase**, Chem. Untersuch. d. aus d. Vulkan d. Äquatorialzone in Amer. aufsteig. G. XXXI. 148 — Entwickl. v. kohlens. G. aus d. Erde, XXII. 252. — Entsch. d. kohlens. G. u. Schwefelwasserstoff in heiss. Quell. 267. — G. werden v. Metall, die als elektr. Pole dienen verbunden, XXIII. 149. — v. Platin, 151 bis 161. — v. Gold, Pallad u. and. 164. 165. — Welche and. Körper dieselbe Wirk. zeig. 165. — Theorie dies. Erscheins. nach Dulong u. Thénard, 166. — nach Faviniere, 167. — nach Faraday, 168. — Einmeng. gewiss. Gase hemmen d. Verb. 180 — Weiskalb Kohlenox u. ähnlend. G. d. verbind. Kraft d. Platin auf Sauerst. u. Wasserstoff hindern, XXXIX. 395. — Ursach. b. and. Gas 396. — D. Geschwindigkeit mit welch. G. in d. Vacuum einströmen, erklärt nach Dalton, XXXIV. 630. — Beweg. Kraft des Stroms, 633. — Repulsion zwisch. d. Thln. verschied. Gase, XXXVI. 159. — Natur d. G. aus Gletschern, XXXVII. 266. — Berechn. d. Vers. v. Koch. üb. d. Ausströmen verdichtet. Luft aus Oeffn. v. verschied. Gestalt, 277. — Beob. üb. d. Ausström. aus Oeffn. in d. othn. Platt. XXXVII. 281, XXXX. 20. — Vers. mit Anzeiger. XXXVII. 284, XXX. 23. — Dispers. d. G. XXXIX. 221. — Spec. Wärme bestimmt durch d. Verdunstungskälte d. G. 522. — Spec. Wärme b. gleich. Volumen u. Gew. XXXXI. 477. 481. — App. zu Vers. 66. den Widerst. ausström. Luft, XXXV. 14. — Unters. d. Gas im Blut. 583. 592. — Ausdehn. zwischen 0° u. 100° nach Gay-Lussac u. Dalton correct XXXXI. 271. 293. — Folgerung aus d. spec. Gew. organ. Verbind. XXXIII. 434. — v. Luft, Quellen, Volane.
- Gebirgsarten**, s. Ängitporphyr, Basalt, Diorit, Gabbro, Grünstein, Hyperathenfels, Lava, Mineralien, Thonschiefer.
- Gebläse**, Vorh. d. G. mit heiss. Luft, XXXVII. 196. — Versuche darüb. XXXVIII. 232. — s. Hohlöfen.
- Gefrieren**, Schwank d. Gefrierpunkts, XXXXI. 492. — Senk. dess. durch Zusatz einer fremd. Subst. 495. — Volumänder. beim G. 497.
- Gehwerkzeuge**, Mechanik der menschlich. Gehw. XXX. 1. — Vers. üb. d. Herausfall. d. Schenkelkopfs aus d. Beckenpfanne im luftverdünnt. Raum. 8.
- Geiser**, Anal. d. Wass. XXV. 347. — Analyse d. Geisersinters, 348.
- Generatio aequalvoce**, Experimentell. Beob. üb. dies. XXXIX. 487. — Vers. darüber, XXXXI. 184.
- Geognosie**, Ueb. d. Kalkformat. d. Insel Pargas, XXXI. 191. — Hall's Vers. d. Biegung gewiss. Gebirgschicht. zu erklär. XXXVII. 273. — Hebung an d. Küste v. Schottland und Chili, XXXVII. 437, XXXX. 491. — Senken d. Grönland. Küste, XXXVII. 446. — Beweise für d. Heb. gewiss. Landstriche Schwed. XXXVIII. 64. — Sinken d. schwed. Küste an gewiss. Ort XXXXI. 472. — Spuren ein. groß. urweltl. Flut, XXXVIII. 614. — Schicht. in d. Gegend von Berg, XXXX. 139. — Durchbruch d. Bosphorus nicht bestätigt, 490. — Temperaturdiff. zw. Granit u. Thonschiefer, 582.

- Jura in Deutschland, 639. — Niveauveränderung, in Dänemark, XXXII. 476. — a. Kopaischer See, Morra. Quellen, Riesen-töpfe, Vulkane.
- Geothermometer, Veränderte Construct. XXXX. 141.
- Gerbsäure, Verwandl. in Galluss XXXVII. 40.
- Gerbstoff, rein darzustellen, XXXVI. 29. — Eigensch. d. rein 32. — Anal. 35. — Berichtig. d. Formel, 51. — Die verdünnte Lös. verwandelt sich an d. Luft in Galluss. 37.
- Gewicht, specifisches, Anweis. n. Taf. z. leichtern Berechn. d. sp. G. d. Dämpfe aus d. Beob. XXXXI. 449. — G. d. Meerwass. zu verschied. Zeit an demselben Ort, 198. — Bestimm. d. G. b. pulverförm. Körper XXXXII. 355. — Folgerung aus d. spec. G. d. Gase organ. Verbind. 134.
- Gewürznelkenöl, Zerleg. XXXI. 526.
- Gift, Einwirk. verschied. Metalle auf organ. Substanzen XXXX. 306. — G. für Infusor. a. Schimmel, ihrem Entstehen hinderl. XXXXI. 187. 191.
- Glas, nur arsenikhaltig, wenn es nicht gehör. erhitzt wurde, XXXI. 129. — Doppelbrech. d. gehärt. XXXVIII. 233. — Ausdehnung durch d. Wärme, XXXXI. 61. — b. Köhgl. 283. — angegriffen v. schwefels. Ammoniak u. im Vacuum, XXXXII. 536.
- Gleichgewicht, Figur desselb. XXXIII. 229.
- Gletscher, Entsteh. d. Eisbäch. auf d. Gl. XXXVII. 261. — Natur des aus ihnen austret. Gases, 266.
- Glimmer, Mikroskop. Spalt. nach d. Erhitz. XXXI. 591.
- Glimmerkupfer, Beschreibung, XXXXI. 331. — Anal. 335.
- Gold, Elasticitätsmodulus, XXXI. 575. — Veranlaßt als elektrisch. Pol. gebraucht die Verbindung v. Gas. XXXIII. 164. — Ausbeute am Altal, XXXX. 641. — Verschmelz. d. Goldandes, XXXXI. 202. — Chlorid :: brennlicher Traubens XXXVI. 29. — Bromid + Kalumbromid, XXXIII. 64. — Cyanid, XXXVII. 132. — Kalinnigoldcyanid, 133. — a. Europoondre.
- Goldoxyd, :: Sonnenl. XXXII. 391.
- Griechenland, Höhe d. Berge, XXXIX. 587. — Klima, XXXX. 156. — Temp. d. Quell. 495.
- Grönland, Sinken der Küste, XXXVII. 446. — Sternschnupp. u. Quelltemp. XXXIX. 114.
- Grünstein, zerfällt in 5 Gebirgs-art XXXIV. 1.
- Grünsteinsporphyr, in 5 Gebirgs-art zerfällt XXXIV. 1.
- Grundris, s. Eis.
- Gitarre, ohne Hälfte des Ohrs zu stimm. XXXV. 524.
- Gummi, Chem. opt. Untersuch. d. Veränder. des spec. G. durch verdünnte Säur. XXXII. 170. — Bemerk. üb. den Wassergehalt, XXXVII. 160.
- Gyps, Farbenvorchiedenheit zw. d. opt. Ax. XXXV. 61. — Mittl. Elasticitätsaxe, 89. — Lage der opt. Axe, 91. — Unter wech. Winkel ein Strahl polarisirt sein muß od. ungeheilt durch G. zu gehn, 203. — a. Kalk, schwefelsaur.
- H.
- Hagel, Beob. d. Bild desselben, XXXVIII. 606. — Beob. eines ungewöhnlich. H. falls, XXXIII. 684.
- Haifisch, Chem. Untersuch. der Knorpel d. H. XXXVIII. 363.
- Halbopal, aus fossil. Infusorien, XXXVIII. 459.
- Harmotom, s. Kreuzstein.
- Harn, Untersuch. eines nach ein. Anfall v. Magenkrampf gelassenen H. XXXXII. 458.
- Harnsäure, Zusammensetzung, XXXIII. 335. — Zersetzt durch braunes Bleisuperoxyd, XXXXI. 562.

562. — Prod. des Zersetz. 564.  
— zu betracht. als Hornstoff mit  
Cyan + Kohlenox. 568  
Harze, Saure H. XXXIII 35 —  
Unters. d. H. aus d. Copaivabal-  
sam, 35 — Verbind. dess. mit  
Bas. 39 bis 41 — Krystallis. II.  
aus d. Kolophon 42. — Unkry-  
stallis. aus d. Kolophon 45. —  
Bemerk. üb. d. saur. H. 16 —  
Nichtsaure H. 49. — Krystall. H.  
aus Elmi, 49. — aus Euphor-  
bium, 52.  
Hebungen, an d. Küste v. Chili  
und Schottland, XXXVII 437.  
XXXX. 491. — Beweise für d.  
Heb. verschieden. Landstriche in  
Schwed. XXXVIII 64.  
Hefe, aus Fadenpilzen bestehend,  
XXXXI 190, 193  
Herbstfäden, Zusammensetzung,  
XXXIX 496  
Himmel, Farbe dess. auf hohen  
Berg. XXXIV 211.  
— Himmelsraum, s. Weltraum.  
Hippursäure, Anal. XXXII 573,  
XXXIII 335.  
Hirnfaser, s. Nerven.  
Hochebenen, v. Quito, XXXX.  
166.  
Höfe, Erklär. ders. XXXXI 136.  
Höhe, d. Berge in Griechenland,  
XXXIX 587. — d. Rocky-Moun-  
tains, 587. — d. Wolken in d.  
Pyrenäen, 587 — s. Aconesguo,  
Aorat, Chumhororo, Demarend,  
Geognosie, Kamtschatka, Meeres-  
wogen, Vulkane  
Höhenbestimmung, Unsicher-  
heit barometr. H. XXXII 561. —  
Barometerbestimm. nach Bessel,  
XXXVI 187. — Höhe von Ka-  
zan, 205.  
Höhlen, kalte zu Roquefort,  
XXXVII 585  
Hofen, Vortheil b. Betrieb mit  
erhitzter Luft, XXXIV 164 —  
Erhöhte Schnelligk. d. Luft be-  
wirkt Erhöhh. d. Temp. 167. —  
V. d. Quantit. u. Scharfkh. der  
eingeblass. Luft allein d. Nutzen  
von erwärmter Luft abhäng. 169.  
— Vortheil einer lüft. Berühr. d.  
Poggendorff's Annal. Bd. XXXXII.  
Beschick. mit d. brenn. Kohlen,  
171 — Vers. mit heiss. Luft in  
Kurtessen, 173 — Theorie dies.  
Betriebs, 177 — Heiss. Luft ver-  
zehrt weniger Kohle, 179  
Holzfaser, Zusammensetzung,  
XXXVII 114  
Holzgeist, ein neuer Alkohol,  
Anal. u. Eigensch. XXXIII 248.  
— Darstell. XXXVI 89 — Be-  
nutz. als Brennmaterial, 90. —  
Bihydr. v. Methylen, 92 — Anal.  
93. — Gibt dampfförmig mit  
Luft u. Platinachwarz Amaleura.  
94. — Einwirk. d. Säur. u. Bas.  
96 — Eigensch. 98. — Wirk. d.  
Wasserstoffs. 101 — d. Sauer-  
stoffs. 106 — Gesch. d. H. 134.  
— Wirk. d. Kaliums auf dens.  
XXXII 404. — Schwefels. und  
kleea. : wässr. Alkal. 409.  
Honig, s. Zucker.  
Hornblende, mit Aegit verwach-  
sen, XXVI 613 — Anal. v. drei  
Art. XXXVII 586 — s. Augit.  
Humussäure, Vergl. mit Bra-  
nole XXXII 332  
Hydroboracit, Beschr. u. Zer-  
leg. XXVI 49  
Hygrometrie, Zustand zu Strafs-  
burg, XXXV. 149 — zu Kazan,  
XXXII. 666. — Verdunstungs-  
kälte in d. Nähe v. Wasserfällen,  
XXXVII 259.  
Hyperathensfels, Charakterist.  
XXXIV 10 — Zufall Gemength.  
12. — Vorkomm. 13  
Hypopierotaxisäure, Zusam-  
mens. XXXVII 44.  
J.  
Jamesonit, aus Estremadura,  
Anal. XXXVIII 403.  
Japansäure, Darstell. u. Anal.  
XXXIX 168  
Jervin, Pflanzenbase, XXXXI.  
569.  
Infusorien, Phosphors. Kalk in  
d. Zähnen ders. XXXII 574 —  
Kieselerde im Panzer, 575.  
Infusorien, fossile, Vorkomm.  
XXXVIII 213. — Aufzählung d.  
beob. Gall. 222. — Grösse Ver-  
gröss.



- breit. 224. — Anwend. 225 464.  
 — I im Polirschief. v. Planitz, Kassel u. Bilin, 158. — im Halbopal, 459. — im Feuerstein, 461. — in and Gestein 464. — in Brot aus Bergmehl, XXXX 119. — im Polirsch v. Oran, 636. — im Polirsch v. Jastrabs, XXXI. 555. — Wieviel Arten bekannt, 556. — Bilden den moderattigen Ueberzug atebend. Gewäss 557. — Die Bacillarien unbezweifelt Thiere, 557. — Beschreib eines 28 Fuß mächt. Lagers v. Infus. am südlich Rande d. Lüneburger Heide, XXXII 470.  
**Insekten**, Ursache d. Töne beim Fliegen, XXXVIII 283.  
**Inseln**, Ansicht üb. Inselbildung durch Korall XXXI 17. — Ins. d. roth. Meers, 243. — a. Korallen.  
**Instrumente**, Photometer, XXXIII 418, XXXIV 644 646. — Trevelyan Instr XXXIII 554. — Kopftour, XXXV 308. — I um Wax mit d. darin enthalt. Luft aus d. Tiefe d. Meeres zu schöpf XXXVII 461. — Anorthoskop, 464 466. — Kniepresse, XXXXI 501, XXXXII 350. — Kosmoglobus, XXXXII 672. — o. Actinometer, Barometer, Dädalum, Farhenkreisel, Luftpumpe, Phoskroskop, Phantasmaskop, Stroboskopische Scheiben, Thermometer.  
**Jod**, Krystallform, XXXI 540. — Trennung v. Chlor, XXXI 583, XXXIX 370. — v. Brom, XXXIX. 375. — D. Lös. v. Jod-Amidin verliert b. 80° d. Farbe, XXXI 624. — Wirk d. Jodapls auf d. Spectr. XXXVIII. 52. — Darstellung im Grob in Schottland, XXXIX. 199. — Vorkommen in verschied. Mineral u. fern vom Meer wach. Pflanz. 526.  
**Jodäther**, Darstell. u. Beschreib. XXXI. 585.  
**Jodätherid**, Analyse, XXXIII 334.  
**Jodkohlenstoff**, XXXVII 50.  
**Jodoform**, Anal. XXXI 655. — Entsch. u. Formel, XXXVII 96.  
**Iridium**, liefert ein schönes Schwarz u. Grau für d. Porzellanmal XXXI 17. — Abscheid. aus d. Platinrückst. XXXI 161, XXXX 209. — Grobste Sauerstoffabsorpt. d. fein vertheilt. 512. — Eigensch. u. wech. v. bob. spre. Gew. d. nat. I. XXXIV 377. — Schmelzbarkeit in einem grossen Knallgasgebläse, XXXXI 208. — Neue Auflösungsanmethode, 210. — Chlorid mit d. Chlorid von Kalium u. Oxm XXXVII 407. — mit Platinchlor u. Chlorammon. 408. — mit Platinchlor u. Chlorkalium, 408. — Cyaniridium, Calcium Darstellung, XXXI. 167, XXXII. 139.  
**Irradiation**, Erklärung desselb. XXXII 550.  
**Isathionsäure**, Verschieden von Weinschwefels XXXVII 73.  
**Isomerie**, Tellurige S. XXXII 20. — Tellura 28. — Modificat. d. Phosphorsäure, 70. — Welche äther. Ole isom XXXIII. 33. — Copalvarharz u. Kolophon 37. — Isom. Körper, könn. vom Oxide geb. 38 46. — Methylen, äth. d. Gas und Hydrogensulf isomer. XXXVI 91. — Methylenhydr. u. Alkohol, 100. — D. isom. Kohlenwasserstoffart, desto stabiler, je kleiner ihr Atomgew. 141. — Uebersicht d. mit Aether isomer Substanz XXXVII 162.  
**Isomorphie**, Chromax mit Eisen glanz u. Korund. XXXIII 341. 344.  
**Junckerit**, nat. kohlens. Eisenox. XXXIV 661 665.  
**Jura**, Deutscher, Geognostische Beschaffenh. XXXX. 638.  

**K**

**Kadmium**, s. Cadmium.  
**Käsestoff**, :: schwefels. Kupferoxd, XXXX 120.  
**Kali**, :: wasserfr. Schwefelsäure, XXXVIII 117. — Krystall K. XXXIX. 192. — Anal. wech. K.



hydrate 194 — :: Zinnat v. Cassiöl. XXXXI 416 — Baische phosphors u. bas. arsens XXVII 47 — Bereit. d. unterphosphorigen 469 — Dopp. kohlen. K. mit welcher Kraft d. 2te Hülfe Kohlens. darin gebund. XXXIV 149 — Leichte Bereit. d. dopp. kohlen. XXXIX 392 — andert. halbkohlens. 157 — Kiesels. in 6 Verhältn. bekannt. XXV. 343. — Salpeters K. (Salpeter), willkürlich herbeizuführe Einschlüsse fremd. Stoffe. XXXVI. 243. — Hölz. in Salpeterkrytall 502 — :: wasserfr. Schwefels. XXXVIII. 121 — Erscheine am geschmolz. Salpet. XXXIX 385 — krytall. in zwei Form. XXXX 418 — Schwefels. K. :: wasserfr. Schwefels. XXXVIII 122 — Wie d. Wass. im dopp. schwefels. zu betr. 130 — Schwefels. K. + schwefels. Zinkox., erster vertritt 1 Al. Wass. 132 — Dergl. mit schwefels. Kupferoxyd. 136. — Chroma. K. macht organ. Subst. z. rasch. Verbrenn. geign. XXXI. 606. — Chroma. K. + Quecksilbercyanid. XXXXII 131 — Tellurs. XXXII 579 — Zweif. tellurs. 581 — Vierf. 582 — Telluriga. K. + Chlor. 586 — Tellurigsaur. 600 — Dopp. u. vierf. 601 — Arsenigs., Zeretz. b. Erhit. XXXX 442 — Kohlenstickstoff. Krytall. XXXVI 478 — Stickschwefels. XXXIX 188 — Weinstein. Kalk-Kali in d. Hitze zerlegt., b. Abkühl. wieder hergestell. XXXI 36 — Weinschwefels. Anal. XXXII. 163, XXXXI. 605 — Weinschwefels. K. Ammoniak. XXXX 612 — Meta. u. Parast. K. XXXII 220 221. — Xanthogens. Analyse, XXXII 305, XXXV. 484. — Kurbols. XXXII 418 — Krekons. Anal. XXXIII 96, XXXVII 102 — Aetheroxalsaur. XXXIII 332 — Brenztraubens. XXXVI 11. — Brenzweins. 65 — Fumars. 62 — Weins., kohlens., essigs., chlores.,

salpetersaur. K. Enden d. Siedp. d. Wass. XXVII 384 bis 388. — Mandels. XXXXI 381. Kalium, Krytallisat. XXXI 431. — :: Kohlenox. XXXIII 90 — Bild v. Krekons. K. 91. — Ue. nach sein. Beweg. auf Quecksilb. XXXIX 502 506. — :: Weingeist, XXXXII 399. — :: zusammenges. Aetherart. 401. — :: Holzgeist. 401 — :: Aceton. 411. — :: Valeron. 414 — Spiroalkal. XXXVI 391. — Chlorid. mit d. Chlorid v. Kupf. u. Quecksilber, XXXIII 81. — mit d. Chlorid v. Oxm. u. Irid. XXXVII 407 — mit d. Chlorid v. Platin u. Irid. 408 — Chloralk. :: wasserfrei. Schwefels. XXXVII 120. — Jodkalium + Platinjodid, XXXIII. 68 — + Platinjodid. 70 — Jodkal. :: wasserfrei Schwefelsäure, XXXVIII 121. — Bromkalium + Platinbromid, XXXIII 62. — Cyankalium + Cadmiumcyanür, XXVIII 366. — + Zinkcyanür, 371. — + Nickelcyanür, XXXVIII 373, XXXXII 114. — + Quecksilbercyanid XXXVIII 374, XXXXII 131. — + Silbercyan. XXXVIII 376 — + Kobaltcyan. XXXXII 116 — + Mangancyan. 117. — + Kupfercyanür, 124. — + Gold. 133. — + Platine 136. — + Palladiume 137 — + Iridcyan 139. — Cyank. zuss. Prod. b. Bereit. v. Gulsens im Hohlgl., XXXX 315. Kalk, Bas. phosphors. u. bas. arsens. XXXII 49 — Metaphosphors. 70 — Phosphors. K. in d. Zätn v. Infusor 574 — Salpeters. veränd. d. Siedp. d. Wass. XXXVII. 385 — Schwefelsaur. (Gyps), wie das Wasser darin zu betrachten, XXXVIII 110 — Schwefels. K. veranlaßt im Meerwasser d. Bild v. Schwefelsäure, XXXX 133 — Menge im Meerwass. 138 — Kohlen. K. in ein. Pumpenröhre abgesetzt, Analyse, XXXV 515 — scheld. sich aus kalk. Auflösa. als Kalkspath, aus

- heißer als Arragonit, XXXXII. 353. — D. geschmolzene krystall. rhomboedr. 360. — Tellursäure, XXXII. 594. — Tellurigs 606. — Dopp. u. vierfach tellurigs 607. — D. sogenannte Platinasäure K. chlorhalt. XXXVI. 464. — Arsenigs Darstell. XXXX. 423. — Anal. 423. 433. — Beim Glüh in Arsenik u. arseniks Kali zerlegt, 429. 439. — Vers. aus arsen. K. d. Arseniks auszutreib. 431. — Weinstreins. K. -Natron in d. Hitze zerlegt, beim Erkalte wieder hergestellt, XXXI. 36. — Weinschwefels K. enthält 2 At. Wass. XXXII. 456. XXXXI. 617. — Karbols XXXII. 318. — Xanthogens, XXXV. 510. — Brenztraubens, XXXVI. 17. — Benzoes Destillationsproducte, 69. — Beerensteins K. -Destillat. dess. 87.
- Kalkspath**, Formel für die Intensität d. durch Spiegel polarisirt Lichts, XXXVIII. 276. — Bildet sich aus kalt. Auflösn. u. in hohen Hitzgraden, XXXXII. 353. 360.
- Kampheer**, befördert die Auflösbarkeit d. Sublimats in Alkohol, XXXVII. 553. — Uebersättigt d. Retorten auf Wass. XXXIX. 503.
- Kampfersäure**, Formel derselb. XXXVII. 42.
- Kamtschatkas**, Höhe d. Berge, XXXVIII. 232.
- Kaolin**, Mikroskop. Beschaffenh. XXXIX. 104.
- Karbolsäure**, Beschreib. XXXI. 69. — Darstell. 75. — Ueber-einstimm. mit Kreosot, 498. — Untersch. beider, XXXII. 328. — Prüf. ihr. Reinh. 308. — Eigenschaft 310. — :: Chlor, Kalium, Söser, 312. — :: Metallsalz 314. — :: organ. Stoff 322. — Faulniswidr. Kraft, 326.
- Kaspisches Meer**, nicht unter d. Spiegel d. Schwarzen Meeres, XXXII. 356. — Spec. Gew. u. Anal. d. Wass. XXXV. 181. — Expedit. u. Bestimm. d. Niveau-differ. zw. d. Kasp. u. Schwarz.
- M. XXXVIII. 227.** — Höhe des Kasp. M. 230.
- Katalyse** u. katalytische Kraft, XXXVII. 66.
- Katechusäure**, Darstell. u. Eigensch. XXXIX. 162. — Anal. 167.
- Kathode**, Erklär. ders. XXXIII. 303.
- Kationen**, Erklär. XXXIII. 305. 497.
- Keimen**, Zuckerbild. b. Keimen, XXXII. 202. — Temperaturerhöhb. 202.
- Kepler's Drittes Gesetz** durch Vers. bestätigt, XXXVII. 607.
- Kieselerde**, amorph XXXI. 577. — Im Panzer v. Infusor XXXII. 575. — Künstl. tesserale wahrscheinlich Hydrat, XXXVII. 641. — a. Infusorien.
- Kirschchlorbeerrwasser**, ident. mit Bittermandelwasser, XXXXI. 369. — Wodurch als Arzneimit-tel zu ersetz. 372.
- Kleber**, Wirk. auf d. Zuckerbild. XXXII. 196. — Zerleg. in 3 Bestandtheile 198. 200.
- Kleeäther**, Zersetz. durch Kalium u. Natr. XXXVII. 405.
- Klima**, Untersch. d. Ost- u. Westküste von N.-Amerika, XXXXI. 661.
- Klirrtöne**, s. Töne.
- Knollpulver**, detonirt nicht b. Einwirk. einer scharfen Klinge, XXXV. 308.
- Kniepresse**, Beschr. u. Theor. XXXXI. 501, XXXXII. 604. — Bemerk. dageg. XXXII. 350.
- Knochen**, Hautknochen Beschaffenheit, XXXVIII. 318. — durch Osteomalacie erweichte Kn. 322. — Chondrin in einer patholog. Knochengeschwulst, 323. — Mikroskop. Untersuch. d. Kn. höh. Thiere, XXXVIII. 325. — Art wie d. Kalk in d. Kn. enthalten, 329. — Structur d. Zahne, 335. — Kn. d. Knorpelische, 337.
- Knorpel**, Bau b. d. höh. Thier. XXXVIII. 296. — Drei Klassen. 300. — Faserkn. 314. — Perma-

- nente Kn. 315. — Knochenkn. vor u. nach d. Ossificat. 316. — Krankheit ossificirt Kn. 317. — Zahnkn. 321. — Kn. d. Knorpelgasse, 337. 342. 347. — Chem. Untersuch. d. Kn. v. Haifisch u. Rochen, 353. — a. Leim.
- Knorpelfische**, Structur u. chem. Beschaffenh. ihrer Knöch. u. Knorpel, XXXVIII. 337. 342. 347.
- Kobalt**, Unsicherh. b. Bestimm. des K. nach Philipp's Methode, XXXIII. 126. — Verbindende Wirk. auf Sauerst. u. Wasserst. XXXVI. 153. — Cyan K. XXXII. 115. — Kaliumkobaltcyanid, 116.
- Kobalterze**, Arsenikkobaltkies, Besch. u. Anal. v. 2 Arten aus Norweg. XXXII. 546. 547. 553. — Unterscheid d. dorb vorkommenden Kerze, 555.
- Kobaltoxyd**, Trenn. v. Nickelox. XXXIII. 247. — v. Eisenoxyd, XXXII. 104. — v. Arseniks. u. Arsenig S. 107. — Quantitative Bestimm. d. K. 109. — Tellurs. XXXII. 595. — Tellurigs. 607. — Brenztraubens. XXXVI. 20. — Weinschwefels. XXXI. 626.
- Kochsalz**, s. Natrium, Chlor.
- Kohle**, in Meteorst. XXXIII. 147. — Einfl. elektr. Schläge auf Kohlenpulv. XXXIV. 459. — gehört zu d. durchsicht. Körper. XXXV. 471. — Verbrenn. mittelst d. Aspirators, XXXVIII. 273.
- Kohlenoxyd**, :: Kalium, XXXIII. 90. — Zersetz. d. Verbind. mit Kalium, XXXVII. 38. — Hemmt d. Wirk. d. Platins auf Sauerst. u. Wasserst. wegen größ. Verwandtschaft zum Sauerst. XXXIX. 386. 395. — Specifische Wärme, XXXI. 477. 484.
- Kohlensäure**, Mit welcher Kraft d. 2te Hälfte im dopp. kohlens. Kali gebund. XXXIV. 149. 155. — in anderthalb u. dopp. kohlens. Natr. 158. — Unsicherh. d. gewöhnl. Meth. b. Bestimmung d. Kohlens. in Mineralwass. 162. — Temp. b. Entwickl. ders. auf verschied. Art. XXXV. 161. — Liquestact d. K. XXXVI. 141. — Eigenach. d. Flüss. 142. — Solidificat. u. Eigenach. d. fest. K. XXXVI. 146. XXXI. 144. — Betracht. ob d. Kohlensäuregehalt der Luft, XXXVI. 453. — App. d. K. genau zu bestimmen, XXXVII. 305. — Appor. u. Bestimmung in Mineralwass. XXXII. 167. — K. in venös. u. arteriell. Blut, XXXX. 592. — Specifische Wärme, XXXI. 477. 484.
- Kohlensäureäther**, Darstell. u. Anal. XXXIX. 157.
- Kohlenschwefelwasserstoffsäure**, Entsch. XXXVII. 48.
- Kohlenwasserstoff**, (H, C), Bild. durch Contact d. Schwefels. mit Alkohol, XXXI. 281. — Absorpt. durch Schwefels. 327. — durch Antimonperchlorid v. and. Gas. zu trenn. XXXVI. 290. — Weisshalb es d. Wirk. d. Platins auf Sauerst. u. Wasserstoff hemmt, XXXIX. 391. 395. — Formeln d. verschied. Art v. K. XXXVII. 15. — Zwei Reih. v. K. verbind. XXXVIII. 378. — Charakterist. durch ihr Verh. geg. Schwefels. 392. — Anal. eines K. z. activ. Reihe, 387. — Höhere Temp. erzeugt d. activ. K. 395. — B. niedr. Barometerst. d. Entwickl. v. feurig. Schwad. in Kohlengrub. am häufigst. 618. — a. Bicarburet, Ceten.
- Kolophonium**, Anal. d. krystl. Harz. aus dema XXXIII. 42. — K. + Silberox. 43. — + Bleiox. 45. — Unkrystl. Harz aus d. Koloph. 45.
- Kometen**, Beob. über den Halley'schen, XXXVIII. 500. — Schwingende Beweg. sein. Lichtkegels, 507. — Annahme ein. Polarkraft z. Erklär. 512. 522. — Wodurch sich d. verschied. Gestalt d. Schweifs b. verschied. K. erklärt, 521. — Die d. Schweif bild. Thle. erleid. eine Abstoßung v. d. Sonne, 521. — Erschein., welche sich durch ein nicht wi-

derath Mittel nicht eckig las. 522. — Bessel's Ansicht über K 526. — Veräder, welche Kommet durch d. Ausström. v. Thln erleiden, 585. — s. Weltraum.

Kopaischer See, Seine natürl. unterird. Abzugskanäle, XXXVIII. 241.

Koptiteur, Anwendung, XXXV. 309.

Korallen, Totaleindruck d. Lehens d. K. bänke, XXXXI. 1. — Mythol. Nachrichten üb. d. Verwändl. ders. 5. — Spätere Beobachtungen, 6 bis 16. — Bisherige Kenntniss v. d. K. 17. — Bild. d. K. bänke im Roth. Meere, 28. — Verbreit. d. K. das. 30. — Gefährlichk. ders. 31. — Kommen nicht in d. tiefst. Stell. vor, 31. — Gestalt u. spezielle Form, 37. — Einfl. d. geogr. Verhältn. auf d. K. bänke im Roth. M. 243. — Ins. mit voll. Grundlage, 244. — mit Kalkat. als Basis, 247. 261. — Einfl. d. K. thiere auf d. Felsbild. 249. — Geringe Mächtigk. d. K. überzugs, 251. 261. — Hohes Alter d. K. blöcke, 254. — Parasit. Form nicht vorkommend, 256. — K. wirk. reichend auf d. Inseln 257. 268. — Bildung große fossil. Klager, 257. — D. Wachs der Kräfte geschichtlich nicht bestä. 258. — Gesamttersalt 260. — Zahl d. besch. Form. 262. — Kalkat. anderer ders. 263. — nicht im Stande feste Wände aufzuführen, 263. — Lieben die Brandung, 265. — Erleid. keine Verwändl. 266.

Korkzurr., Unterscheid. v. Bottern XXXVII. 42.

Kornöl, Bestandtheile d. Oels im Getraidebranntw. XXXXI. 586.

Kosmoglobus, Math. u. geogr., astron. Instrum. XXXXII. 672.

Kreide, Mikroskop. Beschaffenh. XXXIX. 105.

Kreosot, Bereit. d. chem. rein. XXXII. 119.

Keeuzstein, Krstllform XXXVII. 562. — Spaltbar., Härte, spec.

Gew. 566. — Verhält. vor dem Löhrohr, 568. — Anal. 570. — Vorkomm. 573.

Krokodure, Bild. b. Einwirk. v. Kohlenoxyd, Kolum u. Wasser, XXXIII. 90. XXXVII. 36. — Bild. ohne Wasser u. Kieselzurr., XXXVII. 401.

Krystalle, Willkühl. hervorbring. Leucht. b. Krstllisir. XXXV. 481. — Mikroskop. Erschein. b. Anschiffs d. K. XXXVI. 239. — Besond. Krystallisationsverhältn. b. Chlorat. 240. — Willkühl. herbeizuführ. Einschlüsse in Salpeterkr. 243. — in and. K. 302. — D. Grupp. u. Lage anschiffs. Kr. v. d. Natur d. damit befindl. Substanz abhng. XXXVII. 317. — Vorricht. unter d. Mikroskop Winkel zu messen 637. — Bild. v. Kochsalzhydratkr. 638. — Ternäre Kr. v. Kieselzurr., 641. — Uebereinstimm. d. K. form u. Zusammensetz. d. Metalle, welche auf 2 At. Metall 3 At. Sauerst. enthält. XXXIX. 196. — K. der saor., schwefels., chlors., mangan. u. chroms. Salze d. Alkali 198. — Zusammensetz. d. K. form mit d. el. Polarit. 285. — 2 Art. v. Hemiedrie, 287. — K. form d. Turmalin's, 311. — Turmal. v. Penig, 317. — K. d. regulin. Zinks, 324. — Prismat. u. rhomboed. Salpeterkr. XXX. 447. — K. form einig. Metalle u. Metalloide, 455. — K. form b. Bergkrstll., zusammenh. mit d. opt. Eigenschaften, 607. — Künstl. Zwillingskr., welche wie Arragon. epopt. Figur. zeig. XXXXI. 410. — Ausd. in d. Kr. durch d. Wärme, 213. 418. — s. Krystallographie.

Krystallographie, Zwölf Zwillingsgesetze für d. Verwachs. d. 1 + 1 gl. Krystalle d. Feldspath. gatt. XXXIV. 109. — Zwill. d. Periklin, 111. 301. — d. Oligoklas, 118. — Albit, 120. — Labrador, 122. — Sibir. Albit, 124. — 7te Zwillingsgruppe, 305. — 8te, 311. — Merkw. allgem. Gesichtspunkt

- für d. einzeln. Gesetze, 313. — Sämmtl. Gesetze in 3 Abthl. zu bring. 316. — Darstell. u. Entwickl. d. Krstllverhältn. mittelst einer Projectionsmeth. 503. — D. Zoncpunkt zweier sich schneid. Flächenhörn zu find. 505. — Berechn. der Kantenwinkel, 516. — d. ebenen W., 651. — Entwickl. u. Berechnung d. Dataliths nach dies. Meth. XXXVI 245. — Bemerk. zu einer abgekürzt. Proj. 379. — Neumann's Meth. an Beisp. erläutert, 475. — Zurückführ. d. hexagonal. Gestalt, auf 3 rechtwinkl. Ax. XXXV 363. — Berechn. d. Gestalt d. tessern. Systems, XXXXI 314. — K.-system d. Phenakits, 323. — s. Krystalle.
- Kumiss, Brannntw. aus Stutenmilch, XXXII 210.
- Kupfer, in Meteorstein XXXIII. 148. — Trennung v. Quecksilb. durch Ammonia. 74. — v. Palladium, XXXVI 486. — Abnahme d. elektr. Leitföhigk. b. steigend. Temp. XXXIV 427. — Schmelzproduct d. Kupferhütte b. Saengerhausen, 533. — Verbindende Wick. auf Sauerst. u. Wasserst. XXXVI 151. — :: feucht Luft, XXXII 337. — Nimmt beim Glüh. Stickst. auf, 166. — Chlorid mit d. Chlorid v. Kalium u. Quecksilb. XXXIII 81. — Cyan- kupfer + Cyanea + Ammoniak u. Wasser, XXXIV 134. — K. cyanür, XXXII 120. — Cyanid, 121. — Kalium - K. cyanür, 124. — Spiröilk. XXXVI 392.
- Kupfer - Antimonlanz, Besch. XXXV 357. — Krystallf. u. Anal. 360 361.
- Kupferblüthe, Krstllf. 6 gliedr. XXXIV. 529. — Dimorph mit Rothkupferers, 528.
- Kupferoxyd, v. arsenig S. reducirt, XXXVII 300. — Anal. d. bas. schwefels. K. Kuli, XXXII 222. — Schwefels. K. Ammoniak, XXXVI 477. — Schwefels., wie das Wasser darin zu betrachten, XXXVIII 135. — + schwefels. Kuli, dieses vertritt 1 At. Wass. 136. — desgl. schwefels. Natr. in Verh. mit schwefels. K. 137. — Schwefels. K. :: Eiweiss, XXX. 107. — :: Käsestoff, 120. — :: Blutroth, 123. — :: Speichelsstoff, 126. — :: Osmaron, 127. — :: Verdauungstoff, 128. — :: Leim, 129. — :: Faserstoff, 131. — :: Schleim, 132. — :: Mimosen- achl., Eiweiss, Theeabund, Fleisch- brüh. 305 bis 311. — Tellurs. XXXII 596. — Tellurigs 608. — Arsens. Anal. 474. — Zer- setzt in d. Hitze, XXXX 440. — Meta- u. Parastfels. K. XXXII 220. — Ammonia. opt. Eigensch. XXXV. 472. — Bernsteinsäure, XXXVI 24. — Fumars 62. — Essigs. neutral mit mehr Wass. als im Gröup. XXXVII 166 168. — Weinschwefels. XXXXI 623.
- Kupferoxydul, Xanthogenäure, XXXV. 489 493 513. — Bereit. 527.
- Kupferstein, Analyse, XXXIV. 533.
- Kupferzinn, Krystallform u. Zusammensetz. XXXVI 478.
- Kyanol, Besch. XXXI 65 513. — Darstellung, 71. — Ueberein- stimmung mit Pottkali, 505. — Vergl. beider, XXXII 331. — Schwefelsäure K. XXXI 516. — Salpeters. 518. — Salze 521. — Kless. 523.
- L.
- Lampe, s. Anal. organisch. Körper. XXXXI 198. — Glasblase - L. 201. — Beale's L. s. Beleucht. 446.
- Lampensäure, Gemenge aus Essigs. u. Ammonia. XXXI 176. — Wehrschinal. Aldehyd, XXXVI. 302.
- Laub, Untersuch. d. Farb., wel- che d. Laub im Herbst vor Ab- fall d. Blatt. annimmt, XXXII. 422.
- Lava, Analyse d. L. vom Aetna, XXXVIII. 159.



Leben, Die Lebenskraft unzög-  
bar, XXXII 299. — Veränder.  
d. chem. Elemente durch d. Le-  
bensproc. 299.

Leim, der Knoch. u. Knorp. ver-  
schied. XXXVIII 295. — Ver-  
schied. Art. in Knoch., Knorp. u.  
and. Geweb. 301. — 2 Art. 304.  
— Eigensch. d. Colla (Tischler-  
leim), 304. — d. Chondrin (Knor-  
pellleim), 305. — L. d. elastisch.  
Gewebe, 311. — Verbreit. der  
verschiedenen Arten in gesunden  
u. krankhaften Geweben 312. —  
Chondr. in einer patholog. Kno-  
chengeschw. 323. — Gehalt an  
phosphorsaure Kalk. 476. — Ge-  
wöhnl. L. scheint durch Bind. von  
Chondr. mit phosphor. Kalk zu  
entstehn, 478. — :: schwefels.  
Kupferox. XXXX. 129. — Chon-  
drin kein eign. Körper. 283. — ::  
Sublimat, 311.

Leukol, Beschr. XXXI. 68. —  
Darstell. 71.

Leryn, Anal XXXIII. 256

Lichenin, Darstell. u. Eigensch.  
XXXVII 127.

Licht, Kahl. auf Leuchthürmen,  
XXXIII 404. — Lichtstärke far-  
big Gläser, 422. — Kohle durch-  
sicht. XXXV. 468. — Wärmekühl.  
hervorzubring. L. erschein. b. Kry-  
stallisat. d. Arsensig. S. 481. —  
Prismat. Zerleg. d. elektr. Lichts,  
XXXVI 148. — Bezieh. zwisch.  
d. Geschwindigk. u. Länge einer  
L. welle, XXXVII 360. — Ident.  
mit strahl. Wärme, 486. — Grün-  
nes v. Kupferox. gefärbtes Glas  
läßt nur Licht, keine Wärme  
durch, 493. — Licht v. Rand u.  
Mittelp. d. Sonne, XXXVIII 234.  
— Uebererhitzung mit Wärme u.  
Verschiedenheit XXXIX 31. — Er-  
klär. verschied. Erschein. nach d.  
Undulationstheor. 33. — D. Ge-  
schwindigkeit im Vacuo für alle  
Farb. gleich, 35. — Formeln für  
d. Fortpflanz. d. L. 37. (Berich-  
tig. XXXXII 691.) — Fortpfl.  
in d. der Oberfl. benachbart. Thlu.  
eines Körper. 50. — Argument geg.

d. Emissionstheor. 59. — Bratium  
d. Beweg. d. Aethers, wenn d.  
L. durch einen Schirm aufgefang.  
61. — Durchgang d. chemisch.  
Strahl. durch verschied. Mittel,  
XXXIX 219. — Erklärung einer  
subjectiv. Lichterschein. 241. —  
Verstärk. d. Lichts nach Drum-  
mond's Meth. XXXV 547. —  
Vergleich verschied. Flamm. 555.  
— Anwend. dies. App. 560. —  
Optische Kennzeich. d. Mineral.  
XXXI 115. — L. für Taucherg-  
lock. XXXXII 590. — s. Auge,  
Betrug opt., Farben, Sonnenlicht  
u. d. folgend. Artikel üb. L.

Licht-Absorption, Abs. d. L.  
durch farb. Mittel erklärt nach d.  
Undulationstheorie, XXXI 245,  
XXXIII 353. — Abs. ein Inter-  
ferenzphänom. XXXIII 356. —  
Construct. d. Gleich., welche d.  
Intensit. d. resultirend. Lichtwelle  
vorstellt, 363. — Wie d. natürl.  
Farb. d. Körper u. d. Grade der  
Durchsichtigk. zu erklär. 365. —  
Belieb. Abs.-Erscheinung künstl.  
hervorzubring. 366. — Erklär. d.  
Abs. in Jodgas, 369. — Wem d.  
Ursach. d. Verzögerung d. L. im  
Körper. zuzuschreib. 371. — Ab-  
sorb. durch oxals. Chromoxyd-  
Kali, XXXIII 372, XXXVII 517.  
— D. Erschein. in d. Spectrum  
farbig. Flammen wie d. Abs. Er-  
schein. zu erklär. XXXIII 373.  
— Spectra mit 2 Reih. v. Ab-  
sorb. 377. — Striche im Son-  
nenspectr. 378. — Einfl. d. Dicke  
auf d. Abs. 379. — Absorb. b.  
Mineralien, XXXXI. 115. — s.  
Farben.

Licht-Beugung, Berechnung d.  
Newton'schen Diffractionsvers.  
XXXIII 389. — Beug. Erschein.  
bei Holzkohle, XXXV 470. —  
App. für d. Beug. XXXVIII 238.  
— Oerter d. Min. u. Max. d. ge-  
beugt. L. nach Fresnel's Beob.  
XXXXI 103.

Licht-Brechung, 2 Klassen v.  
Kerthn mit einer optisch. Axe,  
XXXII. 400. — Theoret. Unter-  
such.



nach. üb d opt Ax zweier Kry-  
 stalle im polaris. L. XXXIII 257.  
 — Aus d Neig d opt Ax d  
 Brechungscoëff einer Flüssigk zu  
 bestimm XXXV 92 — Brech-  
 coëff d Rüböl, 92 — Optische  
 Eigensch d arsenis. Kupferox.  
 472 — Doppelbrechung d Apo-  
 phyllit, 522. — L oxals. Chrom-  
 oxyd-Kali, XXXVII 317 — Lage  
 d. opt. Elasticitätsax in Krstln  
 d. hemiprismat. Syst. 366 — B.  
 schwefels. Eisenox - Ammon 371.  
 — B. weins. Ammoniak, 372. —  
 Benzoes. Feldep u. Augit, 373.  
 — Borax u. chroma. Bleiox 374.  
 — Epidot, 375 — Gehärt. Glas  
 ersetzt d. Fresnel'schen App.  
 XXXVIII 232 — Gesetz der  
 Brech. XXXIX 51 63 — Ver-  
 such wo d. ausföhr Strahl, ob-  
 gleich fast parall d. Austrittsfl.,  
 v. großer Intensit 58 — Neu-  
 mann's Bemerk dazu, XXXX.  
 501. — Photometr. Meth d In-  
 tensit d. ordentl., außerordentl.  
 u. reflect Strahl, zu find XXXX.  
 498, 502. — Zusammenh d opt.  
 Eigensch. d. Bergkrystalle mit d.  
 krystallograph. 607 — Gesetz d.  
 circular. Doppelbrech XXXIII.  
 30. — u. L. Polarisation

Licht-Dispersion, Erklr nach  
 d. Undulationstheorie, XXXVII.  
 352. — Dispers d. Gase, XXXIX.  
 224 — Vergl d. Mess am Kalk-  
 spath, Bergkrystall, Arragon u.  
 Topas mit Cauchy's Formel,  
 XXXVII 618. — u. Licht

Licht-Interferenz, Neuer Ver-  
 such, XXXVII 231 — Interf.  
 phänom am Barometer, 516.

Licht-Polarisation in d. At-  
 mosph XXXII 125. — Allgem.  
 Ausdruck für d. Intensität eines  
 Strahls, der durch 2 Turmalin-  
 platt u. einen dopp brech Krstll  
 gelangt XXXIII. 243. — Farben-  
 verschiedenb zw d opt Ax d.  
 Gypses, XXXV. 81. — b. Adu-  
 lar, 204 — Findet b. Diopsid  
 nicht statt, 380. — Verhält. d.  
 1 u. 1 gl Krstlle v. weinstein.

Poggendorff's Annal. Bd. XXXXII.

traubens. u. bernsteins. Ammon.  
 381. — Meth d. Lage d. opt.  
 Axe durch ein Fernrohr zu be-  
 stimmen, 86. — Neigung d opt.  
 Ax. im Arragonit, 86 — Unter  
 welch. Winkel ein Strahl polaris.  
 sein muß, um ungebrocht durch  
 einen Gypskrstll zu gehn, 203 —  
 Anwend d. polarisirt Lichts zu  
 mikroskop. Beob 305 — Haupt-  
 eigensch d. polaris. Lichts, 445  
 — Untersach d. depolaris. L. v.  
 natürl 448. — Gesetz d. Cosi-  
 nusquadr. für d. Intensit. d. von  
 dopp brech Krstln durchgelass.  
 polar L. 444 450. 455 — Wich-  
 tigkeit dies. Gesetzes für d. Photo-  
 metr 451. — Wieviel polaris. L.  
 in 2 partiell polaris. Strahl. ent-  
 hält 453. — Circular-Polarisat.  
 durch gepresste Gläser, 579. —  
 durch gekühlte Gläs 584 — Er-  
 schein in d. verschied. Farb. d.  
 Spectr 589. — in combinirt. u.  
 Zwillingkrstlla, 592 — Circul.  
 Polar. durch and. Modificat 594.  
 — Untersach d. Wirk eines sich  
 abkühl. u. erwärm. Glas. 595 —  
 Brachr. eines App für geradlin.,  
 circular u. ellipt. Polar. 596 —  
 Vermögen gewiss. Flüssigk pro-  
 portion ihrer Dicke d. Polarisat-  
 ionsehen. zu drehen, XXXVIII.  
 180. — Moleculare Drehkraft u.  
 Kennzeich 181 — D. Drehkraft  
 ungleich auf d. verschied. einfach.  
 Strahlen, 182 — Untersach mit  
 Weins. 183 — Weins. gelöst in  
 Alkohol and Holzgeist, 188 —  
 Relat zw d. Element d. Körp.  
 u. Einwirk. d. verschied. Ströhl.  
 auf sie, 192 — Another d. Fag-  
 mel für d. Intensit d. durch Spie-  
 gelung am Kalksp. pol. Lichts,  
 XXXVIII. 257. 278. XXXX 462.  
 — Polarit b. Turmalin, XXXX.  
 27. — Circul. Pol. durch Reflex.  
 45. — D. Polaris. ebene senkrecht  
 auf d. Richt. d. Geschwindigkeit,  
 50 — Erschein. am Borax, 284.  
 — Untersach posit u. negativer  
 einax. Krstlle b. circul. u. ellipt.  
 Polarisation, XXXX. 457. — Er-

- schein. 222. Kratze im circul. pol. Licht, 482. — Künstl. Zwillinge-kratze, welche wie Arragon ohne vorangeh. Polarisat. epopt. Figur. zeig. XXXI. 110. — Polar b. Mineral. 117. — Chromat. Polar. 126. — Einfl. d. Kratze auf d. reflect. L. XXXII. 1. — Bestimmung desjen. Pol. Azimuths b. welch d. außerordentliche Strahl verschwind. 9. — wo d. ordentl. verschwind. 11. — Azimuth nach welch d. reflect. Str. polarisirt ist, wenn d. einfall. senk. auf d. Einfallsch. polaris. 12. — wenn d. einfall. Str. parall. mit d. Einfallsebene polaris. 18. — Wie d. einfall. Strahl polarisirt sein muß, damit d. reflect. senk. od. parall. d. Einfallsebene polaris. sei. 18. 19. — Wenn d. reflect. in ein. gegeben. Azim. polaris. sein soll. 20. — a. Farben, Licht-Brechung.
- Licht-Reflexion. Refl. in den der Oberfl. benachbart. Thln. ein. undurchsicht. Körper XXXIX. 39. — Circul. Polarisat. durch Refl. 45. — Gesetze d. Refl. 51. 63. — Neumann's Bemerk. dazu. XXXV. 501. — Refl. v. Metall. XXXIX. 50. — Entwicklung der Fresnel'sch. Formeln für totale Reflex nach Neumann's Theor. XXXV. 507. — Einfl. d. Kratze auf d. refl. L. XXXII. 1.
- Linien, im Spectr., s. Farben.
- Lithion, Spectrum d. L. flamme, XXXI. 592. — Tellurisches L. XXXII. 589. — Telluriges. 604. — Kiesel., leichte Abscheid. aus Spodumen, XXXVIII. 480. — Beenzentrabensaure XXXVI. 15. — Weinschwefels. XXXI. 613.
- Lithium, Chlorlith. Flüchtigkeit, XXXI. 133.
- Lösung s. Salzlösung.
- Luft, trockne u. feuchte L. leiten d. Elektr. fast gar nicht, XXXI. 462. — L. comp. in Meerwasser. XXXVII. 461. — D. Ausdehn. zw. 0° u. 100° nach Dalton u. Gay-Lussac unricht. XXXI. 271. 293. — App. zu dies. Vers. 273. — Rechen. 277. — Vers. 283. 359. — Ueberelastizität mit Beagel's Result. XXXII. 175. — Spec. Wärme, XXXI. 477. 498. — b. niedr. Druck, 109. — Hefhaltung d. Eisens durch kalte L. XXXI. 496, XXXII. 589. — a. Atmosphäre, Gase, Thermometer, Luftpumpe, Verhess. Construct. XXXII. 476. — Beseitigung des schädli. Rauma, 628. — Finstern. dopp. wirkende, XXXI. 412. (Berichtig. 560.)
- Luftp. pyrometer s. Pyrometer.
- Luftthermometer, s. Thermometer.
- M.
- Magnesia, s. Talkerde.
- Magnesium, in Meteorsteinen, XXXIII. 130. 147.
- Magneteisenstein, Bestandthl. d. Meteorit XXXIII. 140.
- Magnetismus, Hölle Magnete wirksamer als massive, XXXIV. 170. — Verfahr. gute Magnete zu erhalt. XXXV. 206. — Bleib. M. d. weich. Eisens, 208. — Kräft. Hufeisenmagn. durch Streich. zu bereit. XXXVI. 512. — Nadeln verliert durch Hitze u. Kälte an Kräft. XXXIX. 226. — Theoret. Bemerk. üb. stat. Nod. XXXV. 151. — Gesetze d. M. nach Ampère's Th. Theor. XXXIV. 181. — Ob alle Metalle b. gewiss. Temp. magnetisch XXXVII. 423. — B. welch. Temp. Stahl u. Eisen ihren M. verlieren, 427. — Wann od. Metalle, 429. — Vermehr. d. M. durch Anleg. v. Eisen an einen Stahlmagn. XXXVIII. 439. — a. Magn. terrestr., u. folgend. Artik. 66. Magn.
- Magnetismus, Elektro-, Zurückführ. d. el. magn. Vertheil. auf ein allgem. Gesetz, XXXI. 203. — Besond. Beding. u. gleichmäss. Vertheil. XXXIV. 292. — Warum ein El. Magnet im Moment d. Umkehr d. el. Stroms d. v. ihm getragene Gew. nicht

fallen Ist, XXXI. 208. — Störende Erscheinung b. el. magnet. Intensitätsvers 367. — Wovon d. Tragkraft eines El. M. abhängig, XXXII. 534. — Kräftl. Eisen zu El. Magneten geeigneter als feines, 536. — Long Magn. setz. d. el. Fluidum langsamer zusammen als kurze, 537. — Rotat einen El. M. durch Umkehr. d. Pole, 538. — El. M. durch Maschinen-Elekt. XXXIV. 84. — Gesetze nach welchen d. Magn. b. sein. Beweg. auf eine Spirale einwirkt, 385. — Vers. d. Leitungsdichte, Windungen u. Dicke derselb. betreffend, 389. — Einfluss d. Zahl d. Windung. auf d. elektromotor. Kraft, 391. — wächst mit d. Anzahl d. Windung 397. — Einfl. d. Weite d. Wind 397. — D. elektromotor. Kr. b. jeder Größe d. Wind. dieselbe, 400. — Einfl. d. Dicke d. Draths, 401. — D. elektr. Kraft unabhng. v. d. Dicke d. Draths, 403. — Substanz d. Draths, 403. — d. Wirk. gleich b. verschied. Subst. unt. gleich Umstnd 406. — Folger. für d. Construct. d. elektromotorisch. Spirale, 109. — Vers. üb. d. bleib. Magn. d. weich. Eis XXXV. 208. — Zuckungen durch El. Magn. XXXVIII. 417. — Bestätig. v. Faraday's. Ertl. d. Zuck 421. — Warum d. Anker d. Zuck schwächt, 422. — auch d. Länge d. Draths schwächt, 427. — Für d. Verschwinden d. Stroms im Schließungsdrath eines El. Magn. Zeit erforderl. 427. — Beagl. für d. Verschwind. d. Magn. im El. Magn. b. Offen. d. Kette, 430. — Traghe. d. El. Magn. b. Umkehr 433. — D. Intensität nimmt zu durch Anleg. d. Ankers, 434. 442. — Schwache Wirk. d. El. M. b. nicht unmittelb. Berühr. mit d. Anker, XXXIX. 410. — M. im Schließungsdrath ein Batt. XXXX. 348. — s. Elektrizität, Magneto., Commutator, Magnetismus-Vertheil.

Magnetismus, terrestri-

scher, Lage d. magn. Nordpols, XXXII. 224. — Lage des veränderlich. Pols, XXXIV. 285. — Uebereinstimm. d. magn. u. thermisch. Curv. 63. — Magn. Vertheil. proport. d. Sinus d. Breite, 65. — Ungenauigk. dies. Annahme, 77. — Magn. Zustand beid. Halbkugeln, 72. — Dicke d. m. Schicht, 279. — Ursach. d. secular. Veränder. d. Nadel, 280. 281. — d. m. Schwankung überhaupt, 284. — Resultate, 289. — Einfl. d. Sonne auf d. Periodicit. d. Nadel, XXXVII. 526. — Einfl. d. Nordlichts auf d. Nadel, XXXVII. 463, XXXIX. 109. 222, XXXXI. 527. — Lage d. Axe einer freischweb. Nad. geg. d. Erdaxe, 556. — Declination, Bestimmung d. relat. Decl. nach Gauss, XXXII. 570. — Lage u. Fortrück. d. abweichungscurv. im nördl. Asien wahr. d. letzt. Jahr. XXXVII. 481. — Tgl. Veränd. in Freiberg, XXXI. 97. 103. — Stündl. Variationen zu Sitka, 194. — Decl. zu Göttingen, XXXII. 563. — Corresp. Beob. d. Variation zu Götting. u. Leipz. XXXIII. 426. — Mittl. Declin. in Göttingen, XXXIV. 546. — Magn. Observator. zu Götting. XXXII. 562, XXXIV. 517. — Tgl. Variant. in Peking, XXXIV. 53. — zu Neerschinsk, 60. — zu Archangelsk, XXXV. 58. — Vergl. mit St. Petersburg u. Nikolaew, 62. — zu Stralsburg, 150. — Beob. d. Variant. an 3. Ort 480. — zu Upsala, XXXVII. 192. — Absolute Decl. zu Upsala, XXXIX. 110. — Stockholm, XXXVI. 193. — Assen, 195. — Oerfl. Stör. d. Declin. durch ein Erdbeben im Canton Jonassin, 456. — Period. Aend. d. Decl. zu Berlin, u. secular. zu Berlin u. Königsberg, XXXVII. 522, XXXIX. 217. — Decl. zu Irkutsk u. geringe Stör. durch ein Erdbeben das. XXXIX. 115. — Decl. zu Mailand, XXXXI. 521. 525. 531. — Inclination, For-

- mein für d. Neiz. In jed. Breite, XXXIV 67 — Incl zu Helsingfors, XXXI. 196 — zu Freiberg, 199. — zu Nertschinsk, XXXIV. 58. — zu Archangelsk, XXXV. 65 — an andern Orten in Rußland, 70. — Incl zu Stockholm, XXXVII. 192 — Upsala, 192. — Kasan, 195 — Beob. Minim. zu Stockholm u. Upsala, XXXIX. 108. — Incl zu Mailand, XXXXI. 521. 532. — Intensität, Formeln für d. Intens. in jed. Breite, XXXIV 67. — Absoluter Werth d. Int 70 — Berechn. d. Intens. u. Vergl. mit d. Beob. 79 — D. Störungen v. Temperverhältnissa. herührt 80 — Einfl. d. Temper. auf d. Int XXXV 64, XXXIX. 228. — Art d. Int. zu beobacht. XXXIX 226 — Scheint durch d. Mond geschwächt zu werden, 425. — Unregelmäß. Schwank. 432. — Nimmt mit d. Neiz zu u. ab, 435 — Int in Göttingen, XXXII 567. — in Archangelsk, XXXV. 65 — an and. Ort in Rußl. 70. — zu Berlin, XXXIX 217. — Täg. Variat. zu St. Petersburg, XXXV. 63, XXXIX 231. 238 417. 420. — Monatl. 422 — zu Mailand, XXXXI 522 — Monatliche Schwingungsdauer d. selbst, 524. 533.
- Magnetismus.** Vertheilung, App. durch Vertheil. einen fast continuir. el. Strom zu erhalten, XXXII. 539 — s. Magnetismus, Elektro., terrestrisch.
- Maschit, Künstl.** XXXVII. 239. — M v. aufserord. Größe, 239.
- Mandelsäure, Darstell.** XXXXI. 376 385 — Eigensch. 380. — Salze, 391 — Anal. 384 — : Chlor, 386.
- Mangan, React. auf M.** XXXVI 564. — Kalium-Meyen. XXXXII. 117.
- Manganoxydul, Trenn. von Eisenox.** XXXXI 109. — Schwefels., wie d. Wass. darin zu betrachten, XXXVIII. 138 — Tellur. A. L. V. 595. — Tellurigs. 607. — Brenztraubens. XXXVI 18 — Weinschwefels. XXXXI. 622.
- Mangansäure, Berichtig. d. M. betreff.** XXXI 677. — Reduct. durch Arsenge S. XXXVII 303.
- Mannit, Anal.** XXXI 344.
- Mecklinsäure, XXXVII 39.**
- Meer, Springbr. u. unterirdischer Donner verursacht v. M.** XXXIII. 349. — Mittel in's M. zu scha. XXXVII 240. — Niveaudifferenz in verschied. M. nicht vorhanden, 451. — D. Meeresström. noch ungenüßig erklärt, 453 — Consp. Luft in d. Tiefe, 461 — Merkw. Ström. an d. Küste v. Cephalonia, XXXVIII 478. — Einfl. d. Luftdrucks auf d. Meerespiegel, XXXX. 138.
- Meeresswogen, Höhe derselben, XXXXII. 592.**
- Meerwasser, Specifisch Gew.** XXXV. 182. — Aender. d. spec. Gew. durch Wärme, XXXXI 72. — Spec. Gew. zu verschied. Zeit an denselb. Ort 498. — Dichtigkeit d. M. an verschied. Stellen, XXXIX 307. — Max. d. Dichtigkeit, XXXXI 69. — Zusammensetz. d. M. XXXX 135 — Bildung von Schwefelkies im M. durch dess. Gypsgehalt, 136. — s. Kaspisch. M.
- Mekonsäure, Anal.** XXXI 171. — Durch Kochen in Manganox. verwand. 170. — Ansicht als ihre Zusammensetz. XXXXII 447.
- Melam, Darstell.** XXXIV. 590. — Anal. 582 — Zersetz. durch Säur. 583. — Verhalt. b. Glüh. 611.
- Melamin, Darstell.** XXXIV 596. — Salpeters. u. oxals. M. 599. — Essigs., Phosphors., Ammoniac. 590.
- Melon, Darstellung u. Zerlegung, XXXIV. 573. — M. + Kalom., 574 — Vers. z. Darstell. ander. Verbind. 576. — Verhalt. b. Glüh. 611.**
- Mennige, achl. Leit. d. El.** XXXV. 48. — s. Bleisuperox., rothes.

- Mercaptan**, Ableit. d. Namens, XXXI 378. — Darstell 379 385 — Eigensch 389 — Anal 421. — Hypoth. üb. seine Zusammensetzung, 421. — ist Alkohol mit Schwefel statt Sauerst 423 — Bemerk. üb. seine Zusammensetzung, XXXVII 57.
- Mercaptum**, Bestandth. XXXI 378 419 — Quecksilber-Mercaptide, 392. — Analyse, 415. — Goldw. 398 — Analyse, 418. — Vers. d. zu isolir 402 — And. Mercaptide, 407 bis 411.
- Messing**, Abnahme d. el. Leitfähigkeit b. steigend. Temp. XXXIV 428 — Anal. d. Tafelmess. von Hegermühl, XXXVII 575.
- Metasäpfelsäure**, Darstellung u. Eigensch. XXXII 216.
- Metagallussäure**, XXXVI 42 48.
- Metalle**, Relative Flüchtigkeit der Chlorinst. XXXI 132 — M. : Luft und Wasser, XXXII 572, XXXIII 293, 296, XXXVII 325 337 — Vermögen d. M. Gase zu verbinden, XXXIII 149 164 — Woher diese Eigenschaft rührt, XXXIII 168, 175, XXXVI 134. — Wodurch sie verschwindet, XXXIII 178 — Vibrationsvermögen, 557 — Warum d. and. Met. dem Platin in d. Wirkung Sauerst. u. Wasserst. zu verbind. nachsteh. XXXVI 151 — Verbind. ungleich d. Aufstofs b. Sied. XXXVII 380. — Alle M. b. gewisse Temp. magnet. 423 — Erreg. v. Elektr. durch Reib. d. M. 506 — Schmelzp. verschied. M. XXXIX 577 — Krystall einiger, XXXX 455 — Chem. Beschaffenheit d. irisir. Metallgl. 621. — Warum Wärme die elektr. Leitungsfähigkeit schwächt, XXXXII 99 — Relat. Leitfähigkeit d. M. u. Flüssigk. 298.
- Metallgifte**, : Mimosensachlein, XXXX 305 — : Thee-Abzud, 307 — Eisweiss, 308. — Fleischbrühe, 311.
- Metalloxyde**, Ueberelustium. d. Krallform u. Zusammenstz. b. d. Met. die auf 2 At. Metall 3 At. Sauerst. enthält XXXIX 196. — Gefärbte d. gehen b. Zusammenschmelz. weils, 326.
- Metallurgie**, Trenn. d. Silbers von Blei durch Krystallisation, XXXXI 204.
- Metameckonsäure**, Anal. XXXI 172. — Entsteh. XXXVII 39.
- Metaphosphorsäure**, Eigensch. XXXII 37 66 71.
- Meteore**, Neues Verzeichniss merkwürd. meteor. Erschein. seit 1821, XXXIV 85 339 — Met. gedieg. Eisen, 344. — And. Substanzen, 347 — Feuerst. 348. — Result. d. Beob. 351. — Beob. eines St. Ehnalfeuers, 370. — Merkwürdig. Feuerung, XXXVII 359. — Erklärung d. horizont. Kreise b. Nebenaum. XXXXI 128 — Gesetz. üb. Höfe, 135 — Erklärung d. Haupt- u. Nebentegenbogen 139. — u. Meteorsteine, Sternschnuppen.
- Meteorologen**, Bitte an dieselb. XXXI 288.
- Meteorologie**, Bemerk. üb. die Witter. d. Jahres 1835, XXXVI 318 — Mittl. Veränder. d. met. Instrum. b. versch. Wind, 340. — Beob. zu Kasan, 204. — Met. Beob. zu Braunsberg, XXXXI 548 — Karlsruhe, 546 — Met. Beob. zu Berlin 1835, am Schluss d. Bd. XXXIV. XXXV. XXXVI. — 1836, am Schluss der Bände XXXVII XXXVIII XXXIX — 1837, am Schluss v. Bd. XXXXII. — u. Temperatur.
- Meteorsteine**, Seit wann man genauere Kenntniss. üb. dies. hat, XXXIII 1 — Stamm nach Berzelius v. Mond 3. 115. — Besch. d. Met. v. Blansko, 8. — Chem. Zerleg. dess. 10. — Trenn. d. magnet. u. unmagnet. Thle. 9. — Anal. d. in Säure löslich. Bestandth. 18. — d. unlöslich. Theile, 20 — Anal. d. magn. Thle. 21. — Mineral. Zusammens. d. Steins v. Blansko, 25. — Besch. u. Anal.



d. M. v. Chantonary, 27. — v. Lontala in Finnland, 30. — D. M. v. Alsie enthält Kohle, 113 122. — Anal. d. Pallas-Eis. u. Pallas-Olivin, 123 133. — M. v. Elbogen, 135. — v. Stannern, Jonzac u. Jurenas, 145. — Aus welchen Mineralien d. Meteorit. gemacht, 138 bis 142. — aus welch. Element. bis 118. — Anal. d. Eisenmass, v. Bohunilic, XXXIV 344. — Urb. d. Magdeburg-Eisenmasse, 346. — Buttlers Hypoth. üb. M. u. Widerleg, 354. — And. Ideen üb. Meteorit 366. — Einwürfe geg. d. lunare Lesprung, XXXVI 161. — Wahrscheinlichk. ihres kurz vor d. Fall stattgehabt Entsteh. 178. — Geschichtl. 184. — Gegenwärtige Schwere d. Pallasch. Eisenmasse, 560. — M. der im Depart. Ain ein Haas entzünd. XXXVII 400. — Platin. wahrscheinlich meteor. XXXVIII 238. — Fall auf ein Schiff, 402. — Mittl. Zahl in jed. Monat, XXXXI 178. — M. in Brasilien, XXXXII 592. — s. Metenre.

**Methylen, Zusammens.** XXXVI 91. — Holzgeist d. Glyde, 92. — Einfach Hydrat, 98. — lauen mit Alkohol, 100. — Salze M. 102. — Jodwasserstoffsäure, 104. — Schwefels. M. 106. — Salpeters. 110. — Oxals. 115. — Essigs. 116. — Amoisens 118. — Benzoes. 119. — Chloroxals. 121. — Amidshnl. Verbind. 125. — Bemerk. üb. d. Theorie d. M. 130. — Fluorwasserstoffs. M. 137. — M. u. seine Verbind. XXXVII 50.

**Methylenschwefelsäure,** XXXVI 122.

**Minerale, Ursach. d. Ungesundh. d. Luft im Allgem.** XXXVI 436. — Abgestorb. Pflanz. unter Wirk. v. Wärme u. Feuchtigk. 437. — Uebornisch 438. — Tüdl. Wirk. d. Misch. v. Meerwasser mit stehend u. süß. Wasse 439. — Schädlichk. d. Thaus in sumplig. Länd. 441. — Vers. im tropisch.

Amerika Ob. Missm. 443. — Wasserstoffhalt. Substanz in d. Luft, 447. — In welch. Gestalt d. Wasserstoff in d. Luft, 453 457.

**Milch, Wie dies b. d. Kalzmilch z. Gähr. gebracht wird,** XXXII 210.

**Milchsäure, Gehalt an Wasser,** XXXVII 41. — M. in Sauerkohl, XXXXII 588.

**Milchzucker, s. Zucker.**

**Himnenschleim, s. Schleim.**

**Mineralien u. Gebirgsarten, Mikroskop Charakt. d. erdig u. derb Min.** XXXIX 101. — Opt. Kennzeichen, XXXXI 115. — Licht-Absorpt. ohne Polarisation, 116. — mit Polarisation, 117. — Dichroism 118. — Erscheine wie d. Gitter u. Höle, 119. — Austerie u. Ebn. 121. — Chromat. Polarisation 126. — Erscheine an scharf Min. senkr. auf d. Fasern geschnitten 132. — s. Agalmatolith, Albit, Allanit, Aliophan, Apophyllit, Arsenikkupfer, Arseniknickel, Asbest, Augit, Baryt-Calcit, Basalt, Bergholz, Berthmerit, Bleiglanz, Bleimurricarbonat, Boulangerit, Brevit, Bruchantit Chrom-eisen, Coléstin, Diamant, Epidot, Euphotid, Feldspath, Glimmer, Hornblende, Hydroboracit, Jamesonit, Junckerit, Kautlin, Kobalterze, Kreide, Kreuzstein, Kupferantimonblanz, Kupferbluthe, Lava, Leryn, Malachit, Magnet-eisenstein, Nodulitz, Nephelin, Oerstedit, Oligoklas, Olivin, Periklin, Phosphat, Plagionit, Porcellanerde, Pyrosulfit, Quarz, Rhodrit, Rubin, Schwefelantimonblei, Schwefelkies, Schwefelzink, Schwefspath, Serpentin, Silberkupferglanz, Stenographit, Speckstein, Speiskobalt, Talk, Tennantit, Tetraphyllon, Thomschilser, Triphyllon, Uralt, Valtait, Wolframs, Bleiox., Zinnblei, Zinnstein.

**Mineralwasser, s. Quellen.**

**Molybdän, Superchlorid, Anal.** XXXX 399. 403.



**Mond**, Einfl. dess. auf d. Witter. XXXV 309 — auf d. Baromet. 313 — auf d. Regen, 318 — Scheint d. magnet. Intensität zu schwäch. XXXIX 425.  
**Moorchbruch**, Nachricht v. einem in Irland, XXXIX 515  
**Morea**, Hydrograph. Verhältnisse das XXXVIII 253.  
**Most**, Bestimmung d. Güte desselb. XXXII 460  
**Mousson**, s. Wind  
**Mucin**, Bestandtheil d. Klebers, XXII 199 — Wirksmk. b. d. Zuckerbild. 201.  
**Multiplikator**, Empfindlichkeit d. Nervander'sch. XXXIX 131.

## N.

**Nodelerz**, Anal. XXXI 529.  
**Naphtha**, s. Steindl.  
**Naphthalin**, Zusammensetzung, XXXIII 336. — aus Benzol, XXXVI 72. — Bild. 75.  
**Naphthalinschwefelsäure**, Anal. XXXIII 450  
**Natrium**, Chlor-natrium, Flüchtigkeit XXXI 133 — Verb. mit Stärke-zuck. XXXIV 329 — mit Hart- u. Traubenzuck. 330. — Besondere Krystallisationsverhältnisse XXXVI 240 — Chlor-n. und d. Siedp. d. Wass. XXXVII 397. — Kochsalzhydratkrystalle, 638 — Max d. Dichtigk. d. aufgelöst. Chlor-n. XXXXI 70 74. 87 — Veränder. unt. d. Gefrierp. 96. — Brom-natrium + Platinbromid, XXXIII 62 — Jod-natrium + Platiniodid, XXXIII 71. — Natrium-Zinncyanid, XXXII 112 — Natrium-Nickelcyan. 114. — Spirölnatr. XXVI 392  
**Natron**, Eigenthümlichkeit Reaction d. Lackmus auf arsenik. u. phosphor. N. XXXI 319 — Bas. arsen. u. bas. phosphor. Natr. XXXII 33 43 47. — Neutrales phosphor. u. pyrophosphor. 53. — Dopp. phosphor. u. doppelt hydrophosphor. 56 58 — Dritte Art v. dopp. phosphor. N. 61 — Vierte, 63. — Actophosphor.

64 — Kohlensä. mit Wass. in 4 Verhältn. 303. — 14 Kohlensäur. glückt nicht immer künstl. darzustellen XXXIV 160. — Mit welcher Kraft dopp. kohlens. N. d. 2te Hälfte Kohlensä. bindet, 158. — Kiesel's, Anal. d. Natr. Wasserglas. XXXV 343. — Ueberkiesel's. 345 — im Geiservass. 348 — Urb. d. Wassergehalt d. schwefelsaur. XXXVIII 131. — Schwefels. + schwefels. Zinkox., ersteres vertritt 1 Al. Wass. 131. — Dazgl. mit schwefels. Kupferox. verbunden 137 — Schwefels. änd. d. Siedepunkt d. Wass. wenig, XXXVII 300. — Kohlensä. salpeters. phosphor. essig. mehr, 384 bis 398. — Fall wo eine übersätt. Lsg. v. schwefels. N. nicht erstarrte, XXXIX 378 — Natron-Alaun nur 24 p.C. Wasser, 584 — Tellura XXXII 587 — Zweifach, 588. — Vierfach, 589. — Teufurigs. dopp. u. vierf. 603. 604. — Weins. N.-Kalk b. Erhitzung zerlegt, b. Erkalte wieder hergestellt, XXXI 38. — Weinschwefelsäures, XXXII 456, XXXXI 608. — Xanthogensaur. XXXV 486 492 508. — Brenztraubens. XXXVI 14.  
**Nebensonnen**, Erklärung d. horizontal Kreis, an N. XXXXI 128. — Künstl. Nachbild. an farbigen Kesteln 132.  
**Neikensäure**, Darstell. u. Zerleg. XXXI 527  
**Nephtin**, in Sachsen, XXXII 174.  
**Nerven**, Mikroskop. Untersuch. d. feinst. Nervenfasern, XXXI 113, XXXII 76. — Ehrenberg's Bemerk. dages. XXXI 119, XXXII 80.  
**Netzbarkeit**, Zustand d. Oberfl. die v. Wass. nicht benetzt wird. XXXVIII 419. — Nitre stellt d. N. her, 451 — Wodurch sie verloren geht, 452. — Fall wo Wass. ohne zu netz. adhärirt, 453.  
**Nickel**, Verbindende Wirkung auf Sauerstoff und Wasserstoff,

XXXVI 153. — Kaliumnickelcyanür, XXXVIII 373 — Kalium- und Natriumnickelcyanür, XXXVII 114.

Nickeloxyd, Trenn. v. Kobaltoxyd, XXXIII 247. — v. Eisenoxyd, XXXIII 108 — Tellura, XXII 595 — Tellurigs 607. — Brenztraubens, XXXVI 20 — Weinschwefels XXXI 626.

Nitrobenzid, Darstell. u. Zerleg. XXI 625.

Nitrosulfate, Wie anzusehen, XXXIX 189.

Nordlicht, Einfl. auf d. Magnetn. XXXVII 363, XXXIX 109. 222, XXXXI 527. — Beob. eines N. an Braunsberg, XXXV 378. — N. v. 18 Oct. 1838 beob. zu Berlin, XXXIX 201 — Colberg, 203. — Königsberg, 206 — Elberfeld 209. — Forth, Genf, Stralsund, 588. — N. v. 18 Febr. 1837 beob. zu Götting XXX 484 — Gotha, 466 — Freiberg, 470 — Gnadensfeld, 472 — Köln, 475. — Andere Beob. 481. — u. Südlicht.

## O.

Oberfläche, Wirk. d. verschied. Zustandes d. Oberfl. auf Knallgas, XXXVIII 454. — u. Netzbarkheit.

Observatorium, magnetisches, Einricht. zu Göttingen, XXII 662 — Erweiter. dess. XXXIV 517.

Oele, flüchtige, aus einem geruchlos. Oel u. einer Säure zusammengesetzt, XXI 525 — Welche vom sind, XXXIII 33. 56. — Zerleg. d. Gewürznelkenöls, XXI 528 — Anal. d. Rosenöls u. so n. Stearopt, XXXIII 53. — Copraoöl, 55. — Caputöl, 57 — Zimmtöl, 58 — Wachholderbeerenöl, 59 — Fuselöl, Anal. XXXIV 335. — Oel aus dem Braunkohlentheer durch Salpeters. in eine moxchusähn. Subst. umgewand. XXXV 160. — Oel aus d. Spirea Ulmaria,

XXXVI 383. — aus d. Rinde v. Prunus Padus, 555. — Zimmtöl, Anal. XXXXI 399 423. — von Cassiaölth. 402. — Bemerk. üb. d. Zusammensetz. dies. Oels, 403. — Bild d. Säur. in alt. Oelen nicht bloß auf Oxydat. beruh. 415. — Wirk. d. Kali auf Zimmt u. Cassiaöl, 416. — d. Kali enthält Benzoes, 422 — Oel aus Getraidebrauntw., aus Oenanthesäureth. u. Kornöl besteh. 586.

Oenanthesäure, wasserf. u. wasserhalt. XXXXI 576. 592. — Bihydrat, 587. 590.

Oenanthesäureäther, Darst. u. Zusammensetz. XXXXI 573 — im Oel v. Getraidebrauntw. 586 — im Franzbrauntw. 593.

Oerstedt, Beschr. XXXV 630. Oligoklas, Zwillingkryst. dess. XXXIV 118.

Olivin, Bestandth. d. Meteorit XXXIII 130.

Opal, amorph. Quarz, XXXI 577. — Chem. Unters. d. O. XXXV 351. — D. Zusammensetz. verschied. 352. — Wahrscheinl. aus Kieselerde-Hydr. gebild. XXXVII 642.

Osmazom, u. schwefels. Kupferoxyd, XXXX 127.

Osmium, Abscheid. aus d. Platinchlorid XXI 161. — H. spec. Gew. XXXII 238. — Chlorosm. mit d. Chlorid v. Irid. u. Kalium. XXXVII 407.

Osmium-Iridium, Varietäten, XXXII 232 — Anal. 234 — v. Urol. XXXIII 102 — Bemerk. zu Persoz's Meth. Irid. u. Osm. darzustell. XXXVI 466.

Ostsee, Merks. Temperaturunterschiede, XXXIII 223 — Erf. über üb. d. Stand. dess. XXXVI 560.

Ouropoudre, Analyse, XXV 514.

Oxaläther, Zersetz. dess. XXXI 359 — Anal. 647 — Prod. d. Einwirk. v. Kal. u. Natr. XXXIX 157 — Entsteh. v. Kohlensäureäther, 157.

Oxal.

**Oxalsäure**, Bemerk. ob ihre Zusammensetz. XXXVII 35

**Oxamethan**, Zerleg XXXI 619, XXXII 666 — s. Aetheroxamid.

**Oxamethylan**, XXXVI 127.

**Oxamid**, wie zu betrachten, XXXX 408

**Oxyde**, s. Metalloxyde

## P.

**Palladium**, Verbindet als elektr. Pol Gase, XXXIII 161. — Trennung v Kupf XXXVI 166 —

Kalium-Peyanür, XXXII 137.

**Pallas'sche Eisenmasse**, Gegenwart Schwere, XXXVI 580.

**Parasäpfelsäure**, Darstell. und Eigensch. XXXII 220

**Paraffin**, im Braunkohlentheer, XXXV 160 — Einf. Bezug z. Zusammens d Holzfas XXXVII 181.

**Paramonokonsäure**, existirt nicht, XXI 170

**Paraphosphorsäure**, trennt verschied Metallox XXXIII 246

**Paraschleimsäure**, Darstell XXXVII 38

**Passat**, s. Wind.

**Pepsin**, Princip der Verdauung, XXXVIII 302

**Periklin**, Zwillingbild XXXIV 131 301 — Anal XXXII 571.

— Vergleich mit Albit, 575. — Beide nicht zu trenn 577

**Perlmutter**, Künstl. XXXVIII 211

**Pflanzen**, Struct d Membran. d. Saamenkaps XXXVIII 569 — s. Versteinigung

**Phenakistikop**, s. Stroboskop. Scheiben

**Phantasmaskop**, s. Stroboskop. Scheiben

**Phenakit**, v Ural, Beschr und Anal XXXI 57. — v Fraumont, Beschr. XXXIV 519. Anal. 525 — Entwickl. sein. Krystall-syst. XXXXI 323

**Phosphor**, D Kalk enthält Arsen, zuweilen Antim., Kohle u. and Metalle, XXXI 126 128 — soll nur in lufthalt Wass weils

werden, 637. — Regelmäßig. intermittir Leuchten, XXXII 216. — Ph. in kräftl Zustand, 469 — Ph. in Meteorst XXXIII 147 — Verbrenn mittelst d. Aspirators, XXXVIII 267 — Merkw. Aggregat-Erschein. XXXIX 378. 380 382.

**Phosphoreszenz**, Entdeck. von 2 neuen Arten, XXXIII 405. — Drei Ansicht ob d. Ursach d. Ph. 406 — Feuchtigk schadet d. Ph. nicht, 407. — Zusammensetz. d. homonischen Phosphors, 409 — Ph. keine Verbrenn 410. — Thatsach für d. Absorptionstheor 412 — Wärme treibt das Licht aus, 413 — Thatsach für d. Erregungstheor. 415 424

**Phosphorsäure**, Zuweil. arsenikhalt. XXXI 126 — Modificirt. XXXII 36 70 72 74. — s. Meta- u Pyrophosphorsäure

**Phosphorwasserstoff**, Gefährlose Darstellungsart aus ein alkohol Auflösung d. Kalihydr u Phosph XXXII 467. — Vortheilhafte Bereit 470 — :: Quecksilberchlorid, XXXX 78. — :: Quecksilbromid, 87 — :: schwefels. Q. 87 — :: salpeters. Q. oxyd u oxydul, 90, 93

**Photometer**, von Osann, XXXIII 418 — Result mit demselb. d. Lichtstärke farb. Gaser, 422 — Ph v Steinheil, 606 — Beschreib eines and 644 — Wichtigk d. Gesetz d. Cosinusquadr. für d. Ph XXXV 451. — Talbot's photom Princip. 457. — Anwend dess z Mess. hoh. Temperat 467 — Vergl d. Phot. u. Thermometers während einer Sonnenfinsternis, XXXVIII 234

**Picrotoxinsäure**, Zusammens XXXVII 11.

**Pillau**, Wasserstand u Windricht des. XXXVI 209

**Pininsäure**, s. Kolophonium

**Pottasch**, Beschreib u Darstell XXXI 78 — Vergl mit Kyanol, XXXII 331

**Plagionit**, Anal. XXXVII 588.

Poggendorff's Annal. Bd. XXXXII. 52

Platin. in Frankr XXXI. 16. 590  
 Lagerstätte im Ural, 673. — Pl.  
 am Herz, XXIV. 380 — in  
 Asa, 381 — Mathematis meteor.  
 Pl. XXXIII. 238. — Benutz d.  
 Pl. rückstände für d. Porcellanma-  
 lerei, XXXI. 17. — Abscheid. v.  
 Osmium u. Irid. aus d. Rückstän-  
 den, 161 — Ausbeute in Ruß-  
 land, XXVIII. 99. — v. Goro-  
 Blagodat, 101 — v. Tagil, 102.  
 — Bearbeit. in Rußl. 103. —  
 Vergl. mit d. Wollaston'schen  
 Meth. 107. — Pl. verbindet, wenn  
 es posit. Pol. war, Gase, 151 —  
 Mittel diese Eigensch. zu conser-  
 vire, 154 — Verschied. Behand-  
 lungsweise d. Pl. übt einen son-  
 derbar. Einfl. auf seine verbind.  
 Kraft, 156. — Wirkt auch als  
 negat. Pol., aber schwächer, 158.  
 — Mechan. Reinigung bringt die-  
 selbe Wirkung hervor, 160 —  
 Warum d. Wärme nicht immer  
 denselben Einfl. auf Pl. öht, 161.  
 — Säuren wirk. kräftiger als Al-  
 kalien, 162 — Ursach dies. Er-  
 schein. 175 — Pl. durch diese  
 Liegen an der Luft beschmutzt,  
 178 — Einmeng gewiss. Gase  
 hemm d. Wirk. 180 — Abnahme  
 d. elektr. Leitfähigkeit b. steigend.  
 Temp., XXXIV. 430. — Ursach  
 der Gasverbind. Kraft, XXXVI.  
 153 156 461 — Wirkung auf  
 Knallgas, XXXVIII. 451 — Koh-  
 lenox verzögert die verbindende  
 Kr. auf Sauerst. u. Wasserst. we-  
 gen größ. Verwandtsch. z. Sauer-  
 stoff, XXXIX. 396. — Ortbild.  
 Gas nur in größser Menge hem-  
 mend, 391 395 — Spec. Wärme  
 d. Pl. v. 100° bis 1200°, 571.  
 — Großer Sauerstoffabsorpt. des  
 fein vertheilt. Pl. XXXI. 512. —  
 Platinhydrie eine pyrophor. Le-  
 gierung v. Pl. u. Eisen, 542 —  
 Aehnl. Legir. v. Zink u. Pl. 541.  
 — Chlorplatin geht mit mehr  
 weins. Salz. Niederschläge v. ge-  
 ding Pl. 288. — Die aus Chlorpl.  
 u. Alkoh. entstehende Verb. ent-  
 hält Aether, nicht äth. Gas, 330.  
 — Chlorpl. mit d. Chlorid. von

Irid. Ammon. u. Kal. XXXVII.  
 408 — Brennb. Chlorpl., Ansicht  
 üb. seine Zusammensetz. XXXX.  
 234 — Wasserzsch. d. Chl. ka-  
 lium, 238 — Restium d. Plat.  
 240 — d. Chlors, 243. — d.  
 Kohlen- u. Wasserstoffs, 245 —  
 Erklar. d. Wirk. zw. Alkohol u.  
 Chlorpl. 251 — Bromid + Ka-  
 liumbromid krystallform, XXXIII.  
 62 — + Natriumbromid, 62. —  
 Jodür, Darstell. u. Anal. 67 —  
 + Jodkal. 68 — + Jodwasser-  
 stoffs. 69 — Jodid, 69 — + Ka-  
 liumjodid, 70 — Verband mit d.  
 Jodid v. Natr., Baryum, Zink mit  
 jodwasserstoffs. Ammoniak, 71.  
 — Jodwasserstoffs. Pl. jodid, 71.  
 — Platincyannür, Eigenschaft.  
 XXXII. 542, XXXVII. 195 —  
 + Quecksilbercyanid, XXXVII. 546.  
 — + Kaliumcyan. XXXII. 136.  
 — s. Pierze, Ploryd, Platschwarz.  
 Platinerze, Bemerk. z. Anal. d.  
 Pl. nach Berzelius's Methode,  
 XXXVI. 464. — Anal. v. zwei  
 amerikan. Pl. 471.  
 Platinmoör, s. Platinschwarz.  
 Platinoxyd, Zusammensetz. des  
 sogenannten Platinoür, Kalks, ent-  
 hält Chlor, XXXVI. 465 — Pl.  
 + Natron u. Wass. 470 — Ar-  
 senigs. Pl.-Ammoniak, Zersetz. b.  
 Erhit. XXXX. 449.  
 Platinschwarz, enthält Sauerst.  
 XXXVI. 458. — keinen Wasser-  
 stoff, wirkt auch ohne Luft oxy-  
 dir. 459 — Pl. ein Sauerstoff-  
 träger u. Sauerst., 460 — kräf-  
 tige Wirk. auf Alkohol, 462 —  
 And. Eigensch. 463 — enthält  
 Kohlenst. 463 — Darstell. eines  
 zusammenges. metall. Pulv. mit d.  
 Eigensch. v. Pl. XXXII. 545.  
 Polirschiefer, aus fossil. Infu-  
 sor XXXVIII. 455. — Pl. von  
 Oran aus Kieselinfusor. XXX.  
 636 — dergl. d. P. v. Jastraba,  
 XXXI. 535.  
 Pollen, Beschaffenh. XXXII. 482.  
 — Bestandth. d. in d. Hant ent-  
 halt. Masse, 483 — 3 Arten v.  
 P. 485. — Abscheid. d. Pollenia,  
 491.

Pollenin, Darstell XXXII 491.  
Porcellan, Mikroskop Beschaffenh. XXXIX 103

Porcellanerde, Anal. d. P. v. verschied. Fundort. XXXV 332.  
— Bild durch Auslaug d. Feldspaths, 339 — P. von Passau, 346

Preisfragen, der kaiserl. Akad. zu St. Petersburg, XXXII 238.  
— Pr. üb. d. Schaden ein. Feuerkog. XXXIX 223

Purpurfarbe, z. Druck auf fein. Fayence, XXXVIII 210

Pyrogallussäure, Zusammens. u. Zersetz. in d. Hitze, XXXVI 42 46, XXXVII 40

Pyromekonsäure, Entstehung, XXXVII 39

Pyrometer, Luftp. XXXIX 567.  
— Formula z. Berchn. 568 — Luftp. mit Glas- u. Platinbehält. XXXXI 145 — mit Vortheil z. Bestimm. hoher u. sehr niedrig. Temp. dienl. 151 — D. Temp. entspr. d. verschied. Farb. h. Glühn, XXXIX 571. — Magn. P. 574. — Bestimm. nied. Temp. damit, XXXXI 147. — Daniell's Pyr. XXXIX 577. — Akont. P. 580

Pyrophor, v. Platineisen, XXXI 542 — v. Zinkplat. 544

Pyrophosphorsäure, XXXII 37 71.

Pyrosomalit, Krystallf. XXXXII 583

Pyrrhol, Beachr. XXXI. 67. — Darstell. 74 — Zweifel an sein. Existenz, 509. — Reactionsgränze, XXXII 332.

### Q.

Quarz, D. dicke abzutheilen in opalhalt. u. opalfr. XXXI 578.  
— Mikroskopische Beschaffenh. XXXIX 102. — s. Bergkrystall, Kieselerde.

Quecksilber, Trenn. v. Kupf. XXXIII 78. — Q. in Frankreich, XXXIX 527. — Gef. p. XXXXI 151. — Q. in d. b. d. Mercurialsalivat. entleerten Speichel, 438

— lösl. in Wass. 440' — Ausdehn. d. Q. nach Dulong angegeben, XXXXI 468. — Spicidly XXXVI 393. — Schwefel. quecke. amorph. XXXI 591. — Elektr. Lichtf. u. Darstell. d. schwarz. (Aethiops), XXXIV. 438 446 449. — Chlorid :: Sonnenlicht XXXII 393. — :: Ameisensä. XXXIII 80. — + Kupferchlorid + Kaliumehl. 81. — Kaliumph. best. d. Auflösbar. in Alkohol, XXXVII 553. — :: Phosphorwasserstoff, XXXV 78. — :: Mimosenschleim, Theeabs. u. Eiweiß, Fleischbr. u. Leim, 305 bis 311. — :: Ammoniak, XXXII 367. — Darstellung u. Analyse d. weiß. Q. präcipit., XXXXII 368. — zusehn. als Q. chlorid + Q. amid, 373. — enthält keinen Sauerst. 391. — Versuch z. Best. d. d. Verbind. Amid enthält, 394. — Untersucht. des durch Einwirk. v. Wass. auf weiß. Präcip. gebildet. Pulvers, 374. — Wirk. eines Ueberschusses v. Alkalien auf d. weiß. Präcip. 378. — Chlorür :: Sonnenlicht, XXXII 393. — :: Ammoniak, XXXII 390. — Bromid :: Phosphorwasserstoff, XXXX. 87. — Cyanid + Platineyanür, XXXVII 546. — + Kaliumcyan. XXXVIII 374, XXXXII 131. — Q. cyan. + chroms. A. Li, 131

Quecksilberoxyd, Trenn. von Bleiox. XXXIII 247. — :: Sonnenlicht, XXXII 390. — Löslich in Wass. XXXXII. 459. — :: Ammoniak, 383. — Q. hydrat :: Chlorkal. u. Ameisensä. XXXIII. 75. — Schwefels. :: Phosphorwasserst. XXXX. 87. — :: Ammoniak, XXXXI 396. — Einwirk. d. Salpeters auf diese Salze, 397. — Salpeters. Q. :: Phosphorwasserst. XXXX 90. — Tellursaur. XXXII 597. — Tellurigs. 608. — Brentraubens XXXVI 25. — Weinschwefels. XXXXI. 629

Quecksilberoxydul, :: Sonnenlicht, XXXII 390. — Schl.



Leiter d. Elektr. XXXV 57. —  
Salpeters Q :: Phosphorwasserst. XXXX 93 — Tellura XXXII 596. — Tellurigs. 609 — Bararseniks. XXXXI 124. — Eigenschaft 428 — Neutral. arseniks 430. — bar arseniks + bar salpeters Q 432. — Brenztraubena. XXXVI 25.

Quellen, Ursach d. Luftentwickl. b. warmen Q XXXII 213 — Säuerlinge nicht durch Vermisch. mit tropharer Kohlens. entsteh. 246 — Menge d. ausström. Kohlens 250 — Entsch. d. Kohlen-säuregasq 252 256. — Wahrscheinl. Bild dies Q in gering. Tiefe, 257 — Merkwürdig. Regelmäßigkeit in d. Entwickl. d. Kohlens 259. — D. meist. Quellen durch hydrostat. Druck hervor-spring 260 — Ungenauigkeit d. gewöhnl. Meth. z. Bestimmung d. Kohlens in Mineralwass. XXXIV 162 — Künstl. Mineralq. XXXII 261 — Anal. d. heiss. Wass. d. Q. in d. Cordiller. 264 — Ursprung d. denselb. heigemengten Gase, 267 — Aender. d. Temp. heiss. Quell 269 — Temp. d. Q. zu Upsala, 271 — Edinburg, 279. — Formeln für d. Temp. d. Q. 271 bis 283 — Beständigkeit d. Temp. d. Q. XXXVII 454 — Noth. Temp. einer Q. in Wisby, XXXIX 114 — in Grönland, 114 — Temp. d. Q. in Gesechenland, XXXX 495 — Elektr. Leitfähigkeit d. Gasteiner Mineralw. XXXIII 348 — Eigenthüm. Erscheinung an einer Q. b. Zittau, XXXIV 89. — Abnahme d. Q. in Porton wegen Abnahme d. Regens. XXXVII 457 — Einfl. d. Bewald. auf Q. XXXVIII 622 — In welcher Höhe Q. entspringen, 602 — Periodische Salz-quell zu Kissingen, XXXV 491 — Negative Quellen, siehe Senkbrunnen.

Quito, Lage d. Hochebene und Stadt, XXXX 166 175.

## R

Regen, in d. Tropen meist Folge d. aufsteigend. Luftstroms, XXXI 516 — in d. gemäts. Zone Folge d. Vermisch. d. Winde, 550 — Brod. d. Regens u. d. gleichzeit. Winde in London, 554. — Result. dies. Beob. 561 — Erklärung d. Regens, 562 — D. Verdampfungskalte im Sommer gröss. als im Wint. 567 — Einfl. d. Bedeck. d. Himmels auf d. Temp. 569 — S.W. Wind führt die grösste Wassermenge, 573 — Menge d. R. in einem Jahre zu York in verschied. Hdh. XXXIII 213, XXXVIII 235 — Folgerung aus dies. Beob. u. Einwürls, XXXIII 222 — Regenmenge zu Stralsburg, XXXV 155 — Einfl. d. Mondes auf d. Reg. 318 — Zwei Regenteit im süd. Europa, 375. — D. R. am stärkst. wo d. Mitteltemp. am grösst XXXVII 258. — Abnahme des R. verursacht Abnahme d. Qu. d. 457 — Einfl. d. Bewald. XXXVIII 622 — Jährl. R. menge in Genf u. auf d. grös. Bernhardi, 625 — R. menge zu Karlsruhe, XXXXI 547 550 554.

Regenhogen, Ueberzählige R. scheinen Wirkung d. Interferenz, XXXVII 455. — Erklärung d. R. u. d. überzähl. Bogen, XXXXI 139

Rhein, Menge d. fest. Substanzen, die d. Rh. in d. Meer führt, XXXIII 228 — Temp. an d. Oberfl. u. am Boden, XXXIX 100 Rhodizit, Besch. XXXIII 253. — Wahrscheinl. ein Kohborant, XXXIX 321

Riesentüpfel, Entsch. XXXVIII 617.

Rothen, Chem. Untersuchung d. Knorpels d. R. XXXVIII 353

Rohrzucker, u. Zucker

Rosenöl, Anal. XXXIII 53

Rosenölscapten, Analyse, XXXIII 54.

Rosolature, Besch. u. Darstell. XXXI 70. 76



Rothes Meer, Bild d. Korallenbänke, XXXI. 28. — Verbreit. d. Bänke, 30. — Einfluß der geogn. Verhältn. auf d. Inseln u. Bänke, 243. — s. Korallen.  
 Rothkupfererz, Dimorph mit Kupferbläue, XXXIV. 330.  
 Rubiaceensäure, Darst. XXXI. 322.  
 Rubin, Künstl. XXXVII. 172.  
 Rubinsäure, XXXIX. 171.  
 Rüböl, Brechungscoëff. XXXV. 92.

## S.

Saamenkapseln, Structur ihrer Membran XXXVIII. 569.  
 Säuerlinge, s. Quellen.  
 Säuren, Gesetz für d. Zusammensetz. berechn. S. XXXI. 210. — Einwürfe dageg. 212. — S. die Kohlenst. u. Wasserst. in gleich. Atom. enthält. XXXVI. 10. — Zusammensetz. d. stickstoffr. organ. S. XXXVII. 8. — d. stickstoffhalt. 32. — Bemerk. üb. d. Zusammensetz. d. fetten S. 43. — Funktionen d. Wassers in d. S. XXXVIII. T24. — Viele organ. S. wahrscheinl. bündre Verbind. XXXI. 387. — Zwei Kl. organ. S. XXXII. 419.  
 Salpeter, s. Kali, salpeters.  
 Salpetergas, s. Stickoxydgas.  
 Salpetersäure, D. störmische Aufw. b. d. Destillir. berührte v. d. plötzl. Krystallhaat. d. dopp. schwefels. Kalk, XXXI. 31. — Federkiele, Reagens auf freie S. 519. — Salpeters. Salze durch salza. Cyanid aufzulösl. 522. — :: Sonnenlicht, XXXII. 392. — :: oxydirt. Metall. XXXIX. 330. 342.  
 Salpeterschwefelsäure, siehe Suckschwefelsäure.  
 Salpétrige Säure, :: Sonnenlicht, XXXII. 392. — v. Wass. nur unvollständ. zerlegt, XXX. 392. — Emersivtrial empfindlich Reagens auf Salpetr. S. 384. — Gaseutwickl. durch Platindrath, 385. — Wirk. and Metalle, 385.

— D. Wirkung physikal., nicht chem. 387. 390.

Salze, Wann sie nicht effloresciren XXXIII. 186. — Specifische Wärme d. in Wass. lösl. XXXV. 474. — Veränderung, welche S. im Siedpunkt d. Wassers hervorbringen, XXXVII. 379. — D. S. trocknen b. d. Temper. d. Sättigungsp. aus, 382. — Wie die Krystallwass. zu betracht. XXXVIII. 124. 126.

Salzlösungen, Dichtigkeitmax. ders. XXXI. 96.

Sandsteinkrystalle, XXXXII. 591.

Saponin, aus der Rostkastanie, XXXVII. 46. — Zusammensetz. d. S. aus Saponaria, 47.

Sauerkohl, enthält Milchsäure, XXXXII. 588.

Sauerstoff, verband. mit Wasserst. durch Platinplatt u. and. Metalle, XXXIII. 151. 164. 165. — Verhalten im Entstehungszustand, 187. — Eigensch. manch. Metalle S. zu absorbir. XXXVI. 468. — Spec. Wärme, XXXI. 477. 484. — s. Platinschwarz.

Schall, Vers. üb. Schall-Interferenz, XXXVII. 435.

Schatten, s. Farben.

Schneekopf, Versuche üb. d. Herausfall des S. aus d. Beckenpläne im luftverdünnten Raum, XXXX. 6.

Schleim, :: schwefels. Kupferoxyd, XXXX. 132. — Mimosenschleim :: arsenig. S., Sublimat, Bleizuck., Zinkvitriol u. Brechweinstein, 305.

Schleimsäure, Analyse, XXXI. 344.

Schleimsäure, brenzliche, Anal. XXXVI. 78.

Schottland, Beweise für d. Hebung d. Westküste, XXXX. 491.

Schwaden, s. Kohlenwasserstoff.

Schwarzes Meer, nicht ob. d. Spiegel d. Kaspisch. M. XXXII. 556. — Exped. z. Bestimm. d. Niveaudiffer. zw. beid. Meeren, XXXVIII. 227.

Schwebungen, s. Töne.

Schweden, Aelt. Nachricht vom allmährl. Steig. gewiss. Landstrieche, XXXVIII 61. — Neue Beub. zu Calmar, 68. — zu Stockholm, 70. — Fossile baltische Muscheln b. Södertelje, 73. — in andern Thälern d. Mälar-See, 79. — Was d. Sink. d. Mälar-See verursacht, 81. — Versteiner. mitten in ein. Sand-Anhöhe, 86. — Küste bei Öregund, 89. — Zurücktret. d. Meers b. Gelle, 91. — Nachricht v. Sundsvall, 100. — Untersuchung d. Küste zw. Uddevalla u. Gothenburg, 100. — Fallen d. See an d. Ins. Gulholm, 105. — zu Marstrand, 108. — Heh. zu Gothenburg, 110. — Result. 112. — Entsteh. u. Beschr. d. Asar, 70. 617. — Sink. d. Küste an gew. Ort XXXIII 472.

Schwefel, Geruchmole. dickflüss. Schw. leichter als dünnfl., XXXI. 31. — Einwirk. d. Sdampfs auf d. Spectr. XXXVIII 52. — Verbrenn. mittelst d. Aspirators, 269. — Merkwürd. Aggregationscheinung, XXXIX 377 379 381. — Mikroskop. Unters. d. Schw. blumen, XXXII. 453. — d. zähen Schw. 456. — der durch Schmelz. erhält. Krystalle, 457. — b. d. Ausscheid. auf nat. Wege, 457. — Schw. + Chlor analog d. schwfl. S. 539 542.

Schwefelantimonblei, Anal. XXXVI 484.

Schwefelblei, Auf elektrochem. Wege dargestellt tetraedr. XXXI 46.

Schwefelcyan, Verbind. durch Chlor, XXXIV. 572. — Schw. cyanammonium, Verhalten bei d. trockn. Destillat, 579. — Zersetz. v. Schw. cyankalium, 600 604.

Schwefeleisen, Bestandtheil d. Meteorst., XXXIII 139.

Schwefelkies, Künstl. XXXVII. 238. — Nat. Bildung auf nassem Wege, XXXVIII 113. — Bild. durch Zersetz. d. Gyps im Meerwasser, XXXX 133.

Schwefelnickel, Krystallform, XXXVI 476.

Schwefelsäure, Heiß. Zucker ein empfindlich. Reagens, XXI 517. — Wasserf. Schw. : Bleioxyd, Kalk u. Kalhydr. XXXVIII. 117. — : Salznisk, 118. — : Chlorkalk u. Chlorcalc. 120. — : Chlorbaryum u. Kupferchlorid, 121. — : Jodkalium, Jodwasserstoff-Ammon., Bromwasserstoff-Ammon. u. Asipeters-Kali, 121. — : schwefels. Kali u. schwefels. Ammon. 122. — Schw. mit 2 At. Wass. zu betr. als schwefels. Wass. mit salinisch. Wass. 127 128. — Warum es keine sauren Salze v. Talkerde, Zink u. s. w. giebt, 128. — Betracht. üb. d. Wassergehalt and schwefelsaur. Salze, 130 bis 143. — Erzeug. d. Schw. unter Mitwirk. v. Platin mittelst des Aspirators, 270. — Wasserf. Schw. + Schweflige Säure, XXXIX. 173. — Theor. d. Bild. d. Schw. 191. — Ermitt. d. Schw. in gerichtet. medice. Fall XXXI 643 653.

Schwefelwasserstoff, vorand. zanthogensaures Bleioxyd nicht, XXXV 512.

Schwefelwasserstoffäther, Darst. u. Eigensch. XXXVII 550.

Schwefelweinsäure, s. Weinschwefelsäure.

Schwefelzink, Nat. Bildung auf nassem Wege, XXXVIII 415.

Schweflige Säure, + Schwefels. XXXIX 173. — Darstell. d. reinen, XXXII 144.

Schwefelwater Grün, Analyse, XXXII 474.

Schwerspath, Leichte Erkenn. vor d. Luthrohe, XXI 592.

Schwingung, Mittel die der Oberfl. parall. Schw. sichtbar zu machen, XXXX 146. — Vergl. v. Schw. mit and. tongebenden Erschütter. 539.

Selen, Natürliche unterirdische Abzugsboile des Kopaischen S. XXXVIII 241. — Verhältnisse um d. S. Phonia, 255. 259.

Sehen, s. Auge.

Seide, Haltbarh., Dehnbarkeit u.

Elasticität d. Fäd. XXXIV 250.

— Anal. d. S. XXXVII 596. —

Bestandth. 599. — Beschreib. d.

erhalt. Stoffe, 602. — Seidenfa-

derstoff, 603. — S. gallerte, 606.

— Eiweißstoff der S. 608. —

Wachs, 609. — Farbst., Fett u.

Harz, 610. 611. — Seidenfäure,

611. — Vergleich d. Seiden- u.

Blutfaser, 614. — d. S. gallerte

mit Leim, 617. — S. Eiweiß mit

Bluteiweiß, 619. — Wachs mit

dem d. Bienen, 622. — Bild d.

seid. Fäd. aus d. Raupen, 622.

— Beleucht. d. fabrikmäss. Zube-

reit, 628. — Degummation d. S.

632. — Anal. d. S. fibrin, XXXV.

266. — d. S. Eiweiß, 270. 287.

— d. Seid. gallerte, 284. 288. —

Brute Meth. d. S. zu analysiren,

291.

Selen, Vers. üb. d. Anwendbarh.

d. Methode S. aus Selenochlorn

darzustell. XXXI 19. — Trenn.

v. Tellur, XXXII 11. — Geding.

u. aus Selenosulf. XXXIX 526.

— Schwefels. :: Chlor, XXXIII

338.

Selenwasserstoffäther, Dar-

stell. 552.

Seufbrunnen, Künstl. u. natürl.

XXXX 492.

Serpentin, Krystle d. S. After-

krystle d. Olivin, XXXVI 370.

— nicht Afterkrystle, XXXIII

462.

Sicherheitslampe, Alkalilösung

macht d. Drath unterd. leuchtender

für d. Flamme, XXXVII 167.

Sieden, Welche Metalle d. Auf-

stofs h. Sied. hindern, XXXVII

380. — Den Boden eines Gefäße

mit sied. Wass. ohne Gefahr zu

berühr. 467. — Siedp. gemengt.

Flüssigkeiten etwas höher als d.

Kochp. d. Mischg. XXXVIII

481. — D. Siedp. constant, so

lange noch v. d. flüchtiger Flüs-

sigg. vorhand. 482. — Siedpunkt

mischbar. Flüssigg. 487. — ab-

häng. v. d. Spann. d. Dämpfe u.

Anz. d. beid. Flüssigg. 489. —

Stofs h. Sied. nichtmischbarer

Flüssigg. 491. — Constant Siedp.

nicht immer Zeichen einer unge-

misch. Flüss. XXXX 394. — a.

Dampf.

Silber, Beschreib. d. Cementat in

Süd-Amer. XXIII 100. — Vern.

zur Erklär. d. Cementationsproc.

102. — D. salza. Gas v. Silber

zersetzt, 107. — App. z. Prob.

d. S. auf nass. Wege, XXXIV.

46. — Abnahme d. elektr. Leit-

fähigk. h. steigend Temp. 426. —

Verbind. Wirk. auf Sauerstoff u.

Wasserst. XXXVI 154. — Spi-

roitsilb. 393. — Kaliumsilbercy-

anid, XXXVIII 376. — Affinir.

durch Krystallisat. XXXXI 204.

— a. Amalgamation.

Silberoxyd, Feste Verbind. v.

S. + Bism. XXXXI 311. —

Tellur. XXXII 597. — Tellu-

rigs 608. — Arsenigs., Zersetz.

h. Erbitz. XXXX 439. — Arse-

niks, Verhalten in d. Hitze, 440.

— Melons. u. metamelons. XXXI

171. 172. — Brenztraubensäures,

XXXVI 26. — Bernstein. 82.

83. — Mandelsäure XXXXI 383.

395. — Weinschwefels. 633.

Silberkupferglanz, Anal.

XXXX 315.

Silicate, Bestandth. d. Meteorst.

XXXIII 111. — Verbess. Meth.

z. Zerleg. der in Salza. nicht lösl.

S. XXXIX 527.

Sinter, Anal. d. Bada. zu Ems.

XXXVII 199.

Smaragd, v. Cornika ist Ura-

lit, XXXI 610.

Sonne, D. Wärmestrahlen d. S.

ähnl. denen ird. Abkunft, XXXV.

517. — Wärmespectr. d. S. 559.

— Chem. Wirk. d. Sonnenspectr.

578. — Beob. üb. d. Nebel d. S.

XXXIX 462. — Ueber Actine,

XXXI 559.

Sonnensfinsternisse, Vergleich.

Gang d. Thermomet. u. Photo-

met. während einer S. XXXVIII.

234.

Sonnenlicht, Chem. Wirk. dess.

- auf Bleioxyd, XXXII. 389. — Quecksilberox. 390 — Chlor + Sauerst., Gold + Sauerst. 391. — Stickst. + Sauerst. 392. — Quecksilb., Eisen u. Wasserstoff + Chlor, 393. Wirk. proport. d. Grad d. Oxydat od. Chlorisat. 395 — Licht v. Rand u. Mittelp. d. Sonne, XXXVIII. 234
- Speckstein, Analyse, XXXVIII. 147
- Spectrum, s. Farben.
- Speichel, Quecksilb. in d. h. d. Mercurialisat. entleerten Sp. XXXI. 439
- Speichelsstoff, s. schwefelsaur. Kupferox. XXXV. 126
- Sprißkohlalt, eigenthüml. Zwillingsbild XXXI. 537
- Springeweiche, Verhalt. d. Thautropf. auf dems. XXXX. 146
- Spiroil, XXXVI. 385 — Chlorspir. 394 — Bromsp. 401 — Jodsp. 403 — Sp. liliom, 391. — Verb. mit and. Metall. 392
- Spiroilsäure, Darstell. u. Zerleg. XXXVI. 394, XXXVII. 42.
- Spiroilwasserstoffsaure, Darstell. u. Anal. XXXVI. 386 — Sp. + Ammoniak, 389
- Springbrunnen, v. Meer veranlaßt, XXXIII. 349
- Stärke, s. Amylum
- Stärkegummi, Darstell. aus Diastase, XXXVII. 151
- Stärkezucker, s. Zucker
- Stearin, Darstell. u. Zerleg. d. reinen, XXXI. 638
- Steinkohlen, Prod. ihrer Destillat. XXXI. 65 513 — Basische Stoffe des Steinkohlenöls: Kyanol, 65 71 — Pyroil, 67 74 — Leukol, 68 74. — Saure Stoffe: Karbol, 69 75 — Rosols 70 76 — Brenols 71 76. — Zweifel u. Einwände geg. diese Entdeck. 497 — Steinkohlenöl ident. mit Steinöl, verschied. v. Eupion, 80.
- Steinöl, ident. mit Steinkohlenöl, XXXI. 80 — Ungleiche Angab. d. Kochpunkts, XXXVI. 418 — Ueberrinstimus mit Eupion, 420.
- 434 — Anal. d. leichteren Theils d. St. (Naphtha) 426 — Naphtha nicht identisch mit Eupion, XXXVII. 534, XXXVIII. 389. — Beobachtung d. strengig Punkte, XXXVIII. 163
- Steinanzly, Nutz. desselb. für d. Studium d. Wärme, XXXV. 412 — St. b. Arten in Preuss. XXXII. 593. — s. Natrium, Chlor.
- Sternschnuppen, Ungewöhnl. Menge in N.-Amerika, 13. Nov. 1833, XXXI. 159 XXXIII. 189 193 — Zahl d. Meteore u. Dauer, XXXIII. 200 — Drei Art. 201 — Höhe, 203 — Anzahl auf d. Erde gefallen Substanz 201 — Elektr. u. magnet. Erschein. 205 — Uepr. d. Bahn, 207 — Bewegung d. Richt. d. Erde entgeg. 213 — Wiederhol. d. Erschein. 1834, XXXIV. 129 — Substanz v. einer St. auf d. Erde gefallen, XXXVI. 315 — Beob. am 13. Nov. in verschied. Jäh. 362 — Neuere Beob. XXXVIII. 350 — Aeltere Nachricht XXXVIII. 337, XXXV. 318 — Olmsted's Hypothese, XXXVIII. 355. — St. 12. Nov. 1833 in Grönl. XXXIX. 114 — 12. bis 13. Nov. 1846 zu Berlin, 354 — Breslau, 356 — Frankfurt a. M. 357, — Gimmersbach, 363 — in Frankreich, 315 — in Braunsberg, XXXV. 184. — St. nach Biot verschied. Hölz. des Sonnenebels, XXXIX. 161 — Alt. Beob. v. Branden und Benzenberg, XXXI. 179. — Acht St. in jed. Stunde durchschnittl. sichtbar, 182 — Zahl in einer Nacht, 183
- Stickoxydgas, v. Eisenoxydulst. in constant. Verhältniss abgeh. XXXI. 24. — Eigenschaft dies. Verbind. 27. — D. Einwirk. nur auf Eisensalz stattfind. 30. — St. s. Sonnenlicht, XXXII. 392. — Einwirk. auf d. Spectr. XXXVIII. 53
- Stickoxydulgas, s. Sonnenlicht, XXXII. 393 — Spec. Wärme, XXXXI. 477 481.

**Stickschwefelsäure**, XXXV. 528. — Darstell. u. Eigenschaft. XXXIX 181. — St. Ammoniak, 186. — St. Kali, 188. — Wir. d. St. anzusehn, 191.

**Stickstoff**, Specifische Wärme, XXXI 477, 488. — Verbind. mit glüh. Kupf. XXXII 166.

**Stickstoffbenzid**, Darstell. u. Zerleg. XXXII 225.

**Stöfue**, s. Töne.

**Strahlung**, Beob. d. nördl. Str. in d. Corbiller XXXI 600. — Schädlichk. 601. — Wie d. In- cas d. schädl. Einfl. verhüt. 605.

**Straßburg**, Klima, XXXV. 143. — Höhe d. Münsters, 145.

**Stroboskopische Schreiben**, Beschr. XXXII 637. — Theorie, 639. — Geschichte 646.

**Strom**, unterirdischer in Frankr. XXXVIII. 606.

**Strontian**, Spectr. d. Flamme, XXXI. 592. — Str. hydr. XXXIX. 198. — Tellur. XXXII 594. — Tellurigs. 608. — Brensteaubenz. XXXI. 16. — Weinschwefels. XXXXI 616.

**Strontium**, Chlorstr. ändert d. Siedp. d. Wass. XXXVII 383.

**Sublimat**, n. Quecksilberchlorid, Substitutionstheorie, v. Du- mas, XXXVII 97. — Bemerk. darüb. 98. — Widerleg. derselb. XXXV 297.

**Succinimid**, XXXVI 86.

**Succinimid**, Wie zu betracht. XXXX. 410.

**Südlicht**, XXXVIII. 627.

**Sulfobenzid**, Darstell. u. Zerleg. XXXI 628.

**Sulfomethylan**, XXXVI 126.

**Sulfureto**, Einwirkung auf wein- schwefelsaure Salze u. schwer. Weindl., XXXI. 371 424.

#### T.

**Talk**, Mikroskop. Spalt, nach d. Erhitz. XXXI 591.

**Talkerde**, Trenn. v. d. feuerfest. Alkal. XXXI 129. — Schwefels. aus Südatraka, XXXI 143. — v. and. Fundorten, 144. — Wie d.

Poggendorff's Annal. Bd. XXXXII.

**Wass.** darin z. betracht. XXXVIII 139. — Neue Verbind. v. schwer- fels. T. mit Wass. XXXXII 577.

— Kohlens. T. mit 5 At. Wass. XXXVII. 304. — Anal. eines kör- nig. aus Zersez. d. vorig. ent- stand. Salz. 305. — Untersuch. d. Magnes. alba, 309. — Stroh. d. Kohlens. mit T. ein Salz mit 3 Atom. Wass. zu bild. 313.

— Kohlensauer. T. in Arragonitform. XXXII 366. — Tellursauer. XXXII 594. — Tellurigs. 607.

— Brensteaubenz. XXXVI 17. — Weinschwefels. XXXXI 619.

**Tauherglocke**, Licht für dies. XXXXII 590.

**Tellur**, Darstell. aus Tellurvis- muth. XXXII 1. — Reing. 4. — aus Telluralk. 5. — Meth. im Grofs. 6. — Fäll. d. T. durch schwefl. S. 8. — T. v. Selen zu trenn. 11. — Eigensch. d. rein. T. 12. — Atomgew. 14. — T. + Sauerst. 16. — Ob es eine Untersäure gibt, 29. — Chlorst. 610. — Doppelchloridre. 614. — Bromst. 616 617. — Jodst. 618.

— Eldst. 623.

**Tellurige Säure**, 2 Modificat. XXXII 19. — Zusammensetz. 23. — T. mit Sulpeter geschmolz. 584. — mit chlors. Kalz. 586. — Tellurigs. Kali mit Chlor, 586. — Tellurigs. Salze, 599. — Salze, worin d. T. basis. 624.

**Telluroxyd**, ist tellurige Säure, XXXII. 19.

**Tellursäure**, Darstell. XXXII 23. — Eigensch. 26. — 2 Modi- ficat. 28. — Anal. 29. — Salze, 577.

**Temperatur der Luft**, Formel für d. mittl. T. d. nördl. Halbkug. XXXIV 81 84. — Vergl. d. Rechn. mit d. Beob. 271. — Warm d. Form. höh. T. giebt, 273. — Wärmeverhältniß beider Halbkug. 275. — Mittlere T. d. nördl. u. süd. Hemisphäre, 276. — Woher d. Unterach. d. T. in beiden Halbkug. XXXIX. 71. — Schwank. d. mittl. jährl. T. 281.



— Abnahme d. T. nach d. Schneegränze u. in höhern Breit. XXXV. 212. — T. zu Stralsburg, 146. — d. pommerisch Vorgeb. Rahnfer, 165. — zu Berlin, XXXIX. 218. — Quito, XXXV. 173. — Niedrige T. in Westindien, 319. 644. — T. z. Braunsberg, XXXI. 511. — zu Karlsr., 546. last 553. — Untersch. d. T. auf d. Ost- u. Westküste v. N. Amerika, 661. — Formeln d. mittl. tgl. Temp. aus wenig Beob. zu bestimmen, XXXVII. 630. — Mittl. monatl. T. aus stündl. Beob. zu Padua, 637. — zu Leith, 648. — zu Salzl. sen, 641. — zu Plymouth, 642. — Result. 645. — T. zu Kasan, XXXVI. 206, XXXVII. 647. — Vergl. mit Moskau, XXXIII. 659. 665. — T. d. Quellen u. Ströme: T. d. arica Brunnen in d. Umgeg. v. Wien, XXXI. 365. — Beständigk. d. Quellent. XXXVII. 458. — Niedr. T. einer Quelle in Wisby u. T. d. Quell. in Grönland, XXXIX. 114. — d. Quell. in Gricebrund, XXXX. 493. — T. d. Rheins an d. Oberfl. u. am Boden, XXXIX. 100. — Moskov. Temp.unterschiede in d. Ostsee, XXXIII. 223. — Temp. d. Bodens u. Erdinnern zu Edinburg, XXXII. 275. — zu Stralsburg, 277. — zu Monk-Wermouth, XXXIV. 191. — zu Rüdersdorf, 192. — in d. Freiberg. Gruben, XXXII. 280, XXXVI. 310. — T. in verschiedenen Bohrlöchern, XXXVIII. 416, XXXIX. 588. — im Bohrloch zu Pitzpohl, XXXX. 145. — Exponent für d. Zunahme d. T. in d. Tiefe, XXXII. 284. — Mittl. T. d. Erdrinde, XXXIII. 251. — Gesetz d. T. Zunahme nach dem Innern, XXXV. 209. — In Thälern d. Zunahme nach außen am schnellst., auf Bergen am langsamsten, 214. — Wie weit die äußern Einflüsse in's Innere dringen, 217. — Bestimmung dießer Einfl. z. Bonn, 219. — Ueberschulß d. Temp. max. üb. d. Mgn.

zu Brüssel in verschied. Tiefen, XXXV. 140, XXXVIII. 532. — Uebereinstimm. mit d. Theorie, 533. — B. wele. Tiefe d. jährl. Oscillat. an verschied. Ort sehr klein werd. 534. — B. welehen d. täglich 535. — Arch. Beob. in Paris, 537. — Formeln für d. Zeit d. Min. u. Max. d. T. 540. — Beob. dazu, 542. — T. d. Erdinnern aus Beob. an artex. Brun., 593. — Bodentemper. zu Kasan, XXXVII. 653.

Erhö. d. Temp. mindert d. elektr. Leitfähigk. XXXIV. 418. — Einfl. d. Temp. auf d. Mgn. XXXVII. 423. 427. — Grund d. Veränderlichk. d. Max. d. T. im Sperte XXXV. 305. — T. d. auf verschied. Art entwick. Kohlens. 164. — Nied. T. im Innern ein. Höhle, XXXVI. 314. — Verdunstungskälte in d. Nähe v. Wasserfall XXXVII. 259. — Sättigungstemp. d. Salze, 382. — T. d. Himmelsraums, XXXVIII. 233. — T. d. Thiere b. groß. Kälte, 282. — Größte Bodhitze, 479. — Moth. hohe T. zu schützen, XXXIX. 518. — Luthermomet. für mittl. T. 524. — T. entsprechend d. verschied. Farb. b. Glä. hen, 571. — Schnelup. verschied. Metalle, 577. — T. d. Max. d. Dichtigk. b. Wass. XXXXI. 65. — b. Meerwasser, 69. — b. andern Flüssigk. 70. — Bestimm. niedr. T. mittelst d. Luft-, Magn.-pyromet. u. Weingeisttherm. 111. — s. Dampf, Erde, Luft, Pyrometer, Wasser.

Tennantit, Anal. XXXVIII. 397. Tetraphyllin, s. Trophyllin. Theobaud, .: arsenig S., Sublimat, salpeters. Silber., Kupfer- u. Zinkvitriol, XXXX. 307. Thermometer, Vergl. d. Th. u. Photomet. während einer Sonnenfinsterniß, XXXVIII. 234. — Methode zur genau. Calibrirung, XXXVII. 378, XXXX. 562. 564. 567. 574. — Luthermometer, XXXIX. 524. — Vortheilh. Sta-



- Leineicht XXX. 31. — Gemane Bestimmung d. Frostp. 42. — D. Versuch d. Nullp. zu verhindern, 44. — Bestimm. d. Siedp. 48. 39. — Veränd. Construct. d. Geotherm 141. — Regelmäßig. Gang d. Weingeisth. unter 0°, XXXI. 149. 151. — Ungenauigkeit d. Vers. v. Dulong und Petit b. Vergl. d. Quecksilb. u. Luftthermomet. 467. — s. Pycometer.
- Thermo-Multiplikator, Strahlensäule, Beschr. XXXVI. 526. 528. — Schlitzsäulen o. Anwend. ders. 510. — D. thermoelektr. Ströme proport. d. Temperatur, XXXIX. 8.
- Thialöl, Darstell. XXXI. 371.
- Thiere, Temp. ders. b. großer Kälte, XXXVIII. 282.
- Thion, s. Theil durch Auflösungen d. Feldspath gebild. XXV. 316. 355. — s. Porcellanerde, Feldspath.
- Thionerde, Frei v. Schwefels zu st. XXXV. 338. — Analyse d. schwefels. v. Plato, XXI. 146. — Schwefels Th. + schwefels. Natron (Natronasale) nur 24 At. Wasser, XXIX. 584. — Neue Darstell. d. Chromasale, XXXI. 594. — Tellurs. XXXII. 594. — Tellurige, 607. — Brenztraubens. XXXVI. 17. — Weinschwefels. XXXI. 621.
- Thonschiefer, Anal. dess. als Ganzes, XXV. 189. — Anal. durch Trenn. sein Gemengtheile, 191. — Th. d. Product d. Zersetz. and. Gesteinsart 196.
- Thonerde, Tellurs. XXXII. 595. — Tellurige, 607. — Brenztraubens. XXXVI. 18.
- Tiegel, hessische, nicht titanhalt. XXXV. 527.
- Titan, Trenn. v. Eisen, XXXIV. 5. — nicht in hessisch. Tiegeln, XXXV. 527. — Schwefeltit. :: Chlor, XXXVII. 527. — Anal. des Verb. 529.
- Titansäure, in Platinasale, XXXI. 674. — in Diorit, XXIV. 5.
- Mehrere kräftig titans. Verbind. nehm. b. Schmelz. and. Formen an, 6.
- Töne, Abhängigkeit d. T. vom Elasticitätsmodul XXXI. 575. — Unter such. üb. d. Stöße, XXXII. 333. — D. Zahl d. Stöße verhält sich wie die Unterz. d. Vibrat. 336. — Verhess. Monochord s. Unter such. d. Stöße, 340. — Resultate durch Gabeln, 347. — Hallström's Bestimmung irig, 352. — Erklär. d. Stöße, 353. — Indirecte Entstehungsart, 393. — Dritte Entstehungsart, 395. — Jede 2 Töne erzeug. b. Zusammen treff. Stöße, 500. — Stöße listen, 2ten Grades u. s. w. 501. — Grad d. Hörbarkeit, 503. — Kleine Intervalle mit Anwend. d. Stöße zu bestimm. 503. — Result. 512. — Gemane Bestimm. d. Oktav, 512. — Neues Mittel s. Aufst. d. Vibrat. eines T. 515. — Einwürfe geg. d. aufgestellte Theorie, 520. — Andeut. d. Problem d. Stöße allgem. zu lösen, 524. — T. in d. trüb. Th. eines aus einer rund. Oeffn. strom. Flüssigkeitsstrahls, XXXIII. 465. — Schwingungszahl, 466. — Vibrat. zw. Metall v. ungleich. Temper. 553. — Ursach. d. T. b. fliegend. Insekt XXXVIII. 283. — Vergl. v. Schwing. mit and. tongebend. Erschütter. XXX. 539. — Klartöne an Saft, 543. — an d. Stimm gabel, 545. — Tonzeug beim Ausblasen einer Kugel an einer Glasröhre, XXXII. 610. — Gesetz über diese Tonzeug 612. — Bestimm. d. Luftschwing. in d. Röhre, 613.
- Torf, Merkwürd. Wassergehalt, XXXIII. 171.
- Traubenzucker, s. Zucker.
- Traubensäure, Erkennung derselben, XXXI. 209. — Uebersetzung in Weinsäure, XXXII. 588.
- Traubensäure, braunliche, Darstell. XXXVI. 5. — Eigenschaften. u. Anal. 9. 64. — D. Salze

in 2 Modificat. 12. — Entsteh. XXXVII 38.

Travelyan-Instrument, Erfind u. Versuche damit, XXXIII. 504. — Vibrationsvermögen verschied. Metalle, 557.

Triphyllin u. Tetraphyllin, verwandte Mineral XXXVI. 473.

Turmalin, Untersuch d. elektr. Erschein. am T. XXXIX. 291. 314 320. — Kristall 311. — T. v. Penig, 317. — Schwarz T. v. Andreasberg, XXXIII. 580. — s. Licht-Polarisat., Wärme-Polarisation.

#### U.

Ueberschwemmungen, nach dem Winter 1850, XXXIV. 67. 90 91.

Urethermometer, für mittlere Temp XXXIX 524.

Ulmia, Darstell u. Anal. XXXVII 107. — Prod. d. Traubenzuckers, 110.

Ulmastere, Zusammens. XXXVII. 41 111. — Darstell aus Zuck. 107.

Unterschwefligsaure Salze, : salza u. salpeters. Quecksilb. XXXIII 240. — : Kupfersalzen, 241.

Uralit, Fundorte, XXXI 609. — d. Smaragd u. Corsika ist U. 510. — scheint in Hornblende übergehend, Augit zu sein, 618. — U. in Angitporphyr, XXXIV. 21. — Anal. XXXVII 596.

Uranoxyd, Trenn v. Kobalt-, Nickel- u. Zinkox XXXIII. 248. — Tellurs XXXII 596. — Tellureigs. 608. — Brenztraubensäure XXXVI 24. — Weinschwefels. XXXXI 629.

Uranoxydul, Weinschwefelsäure. XXXXI 624.

Urethan, Darstell u. Zerlegung, XXXI 645. — Amid d. Aetherkohlens, XXXVII 105.

Urethylan, XXXVI 128.

Urinsäure, s. Hippursäure.

#### V.

Valeron, Darstell. und Analyse, XXXIII 412. — : Kalkum, 414.

Verbindungen, Reist zwischen d. Zusammensetz. ternärer chem. Verb XXXI 212. — Zusammensetzungsweise d. Elemente in organ. Verb 345.

Verbrennung, Erschein u. Produkte einer schwachen Verbrenn. XXXVI 494.

Verdauung, Welche Stoffe b. d. V. wirksam, XXXVIII 359. — Künstl. verdauende Flüss. 359. — Popam Verd.princip, 362.

Verdauungsstoff, : schwefels. Kupferox. XXXX 128.

Versteinerung, d. gewöhnliche Begriff von Verst. zu beschränkt, XXXVIII 561 563. — Fossile Pflanzenabdrücke, 562. — Aeltere Ansicht v. Proccs d. V. 566. — Künstl. V. 567. — D. V. beginnt mit d. Imprägnat 572. — Verwandl. in Chalcedon, XXXIX. 223. — V. auf nassem Wege, XXXII 593. — Kalkverst. bilden sich noch, 593 601. — Bild. v. V. in synthet. Weise auf nassem Wege, 601.

Verwandtschaft, chemische, d. elektr. Strom eine Form der chem. V. XXXV. 18. — Chem. V. u. Elektr. verschiedene Form. derselb. Kraft, XXXVII 233.

Vesuv, Zeit seiner Entstehung, XXXVII 174 180.

Volta-Elektrometer, Beschr. XXXIII. 316 328.

Voltzeit, Beschr. u. Anal. XXXI 62. — D. Zusammensetz. ahnl. d. zinkisch. Ofenbruch auf d. Freiburger Hütten, 64.

Vulkane, Chem. Untersuch. der aus d. V. d. Äquatorialzone Amerikas aufsteig. Gase, XXXI 148. — Keine Salze 155. — Untersuch. d. Wass., d. vulk. Asche u. d. Gase auf d. Ins. Fernandez, 156. — Hypothese üb. d. Ursach. vulk. Erschein. 158. — Zusammenstell. vulkan. Ausbrüche aus 10 jhr. Beob. nach Jahreszeit u.

Halbkug. XXXIV. 104. — Entsteh. d. V d. Cordiller. XXXV. 167. — Volk. Kegel nie durch aufbauende Lavaströme hervorgebracht. XXXVII. 170. — Entsteh. d. Vesuv. 174. 180. — D. neapolitanische Humateinstoffe kein vulk. Erzeugniß. 177. — Welche V. Trachyt u. welche Basaltlava haben. 187. — Weit verbreitetes Vorkommen d. Andesit. 189. — Hebung. in Chili u. Schottland. 437. — Ausbruch d. Cosiguina. XXXVII. 447. XXXXI. 221. — Höhe der Volk. in Kamtschatka. XXXVIII. 232. — D. Acconcagua d. höchste V. in Chili. XXXXII. 592. — Geogn. Zusammensetzung d. V. XXXX. 165. — Beschreib. d. Pichincha. 174. 176. — s. Erdbeben, Erhebungsgeräte, Quellen.

## W.

Wachholderbeeröl, Analyse, XXXIII. 59.

Wärme, D. thier. W. durch Verdauung u. Athem erzeugt. XXXII. 302. — Aeltere Vers. üb. d. Repulsivk. d. W. XXXIV. 636. — Bestätigende Vers. 639. — Bis zu welcher Entfernung d. Repulsion wirkt. 641. — Länge d. Wellen. XXXV. 536. — Absorption u. Emiss. 573. — Ausdehnung d. Krystalle durch d. W. XXXXI. 213. — Einfl. d. W. auf einen el. Strom. XXXXII. 99. 100. — s. Temperatur, Thermometer, d. folgend Artikel üb. W.

Wärme-Absorption, XXXV. 573. — Als durch Transmiss. abgeßnd. 577. — Gesetz d. successiv. Absorpt. XXXVIII. 32. — Allgem. Formeln für d. allmähl. Auslösch. d. strahl. W. in absorbirend. Platten. XXXIX. 250. — Vers. mit Glas. 262. — mit Bergkrystall. 263. — Hochtropas. 265. — Röthel. 266. 454. — destill. Wass. 267. 457. — D. Curve d. durchgehenden Wärmestrahlen d. gleichseitige Hyperbel. 277. — Strahlung d. Lucatellisch. Lampe

durch Glas. 496. — durch klar. Bergkrystall. 444. — durch hinter einander aufgestellte Platt. v. Glas u. Bergkryst. 449. — Strahl. d. glühend. Platin durch Glas u. Bergkrystall. 544. 547. — Strahl. d. Kupfers von 4000° durch Glas u. Bergkrystall. 550. 551. — Verschied. Abwärmög. d. Fläch. d. Thermoskop. Skale. 560. — Emiss. u. Abs. d. Köp. 561. 566. — beide complementär. 563.

Wärme-Brechung, XXXV. 410. 555. 569. XXXVI. 542. — Concentrat. d. dunkl. W. XXXVI. 533. — Brech. d. leuchtend. W. XXXIX. 554. — d. dunkl. 555. — Totale Reflex. 556. — Ursach. d. frühern Schwierigk. d. Brech. nachzuweis. 557. — d. am tiefst. in d. Substanz. eindring. Strahl. d. brechbarst. 559.

Wärme-Emission, XXXV. 573. — s. W. Absorpt.

Wärme-Interferenz, XXXV. 558. XXXVI. 537.

Wärme-Polarisation, angebl. durch Turmalin nicht bewirkt. XXXV. 533. — auch nicht durch Reflex. XXXVI. 531. — Polarisation durch Turmal. u. Brechung. XXXV. 553. — Depolarisation. 555. — Geschichtl. üb. d. W. polaris. XXXVII. 218. XXXIX. 1. — Pol. durch Turmal. XXXVII. 218. — Umstände, unt. wele. d. W. nicht mehr v. Turmal. polaris. 272. — Polarisation durch einl. Brech. 494. — Circul. Polarisation durch totale Reflex. 504. — Pol. durch progressive Dreh. XXXVIII. 202. — Empfindlichk. u. Beschreib. v. Pol. gebrauchten App. XXXIX. 2. — Wie die durch Straßungsversuch u. s. w. verursachten störenden Schwing. d. Galvanomet. zu vermeiden. 6. — Schwierigk. b. Turmalinplatten u. Ungleichd. 10. 13. — D. Polindex. verändert b. verschied. Turm. 14. — Vers. wo vor d. Turm. noch Schreib. und Substanz. 15. — Arthol. Erschein. wie b. Transmiss. durch farbige

Gläser, 17. — Woher d. Unterschied zw. d. Anreiz verschied. Turm 19. — Einfl. d. Dicke d. eingeschalt. Subst. 22. — Vers. mit and. Wärmequell. 24. — D. W. desto polarisierbarer je höher d. Temp. d. Quelle, 25. — Zusammenstell. d. Polarisirung 26. — D. W. polarisirt im Turm zu erklären wie d. Lichtpolar. 28.

Wärme - Reflexion, XXXV. 569. — Metallspieg. reifl. alle Art. v. W. strahl. gleichmäßig 576. — Verhältnis d. reflect. W. z. einfallend. XXXVII. 242. — Gesetz d. Reflex. XXXVIII. 32. — Totale Refl. XXXIX. 356.

Wärme, spezifische, der in Wasser lösl. Salze, XXXV. 474. — Bestimm. d. sp. W. b. Gasen durch die v. dens. erzeugte Verdunstungskälte, XXXIX. 522. — Spec. W. d. Platin v. 100° bis 1200°, 571. — Sp. W. d. Gase, XXXXI. 477. 484. — d. atmosphärisch. Luft b. niedr. Druck, 489.

Wärme, strahlende, Aet. Versuche, XXXV. 112. — Trenn. d. leitend. W. v. d. strahl. 120. — Mess. d. strahl. W. mittelst d. Thermomultiplikator, 121. — Die Grade dess. bis zu einer gewiss. Amplitude proport. d. ablenkend. Kraft, 129. — Verhältnis d. Grade z. Kraft b. größ. Amplitud. 133. — Construct. d. zu dens. Vers. angewandten Skale u. Vorsichtswarnung XXXV. 134. 357. 349. 662, XXXVIII. 2, XXXIX. 2. — Genauigk. d. App. XXXVII. 207. — Einfl. d. Polatur. XXXV. 277. — d. Dicke 278. 391. — Strahlung durch Ruböl, 283. — D. W. verlust in d. erst. Schichten am bedeutendst, 285. — Einfl. d. chem. Natur der als Schutz angewandten Substanz, 286. — D. W. strahlen unabh. v. d. Durchsichtgk. 288. 294. — Vers. mit Flüssigk. 289. — Taf. üb. d. Durchstrahl. v. Glas, Flüssigk. u. Kristallen, 291. — Diathermanoe

Körper 295. 403. — Merkw. Erschein. b. Kochsalz, 295. — Einfl. der Farbe, 392. — Warum das Max. d. Temp. im Spectr. verändert. 303. — Wärmespectrum d. Sonne, 559. — Veränderung d. Wärmedurchgangs b. Aender. d. W. quelle, 383, 389. — D. Strahlung nimmt in denselb. Körper ab mit d. Temp. 390. 400. — Strahl. verschied. Abkunft verlösch. verschied. schnell, 392. — Taf. d. Vers. 393. — Vorkehr. b. d. Vers. 395. — Steinwale z. strahl. W., wie Glas zu Licht, 401. — Analog. d. str. W. mit d. Licht, 406. — Nutz. d. Steinwale für d. Wärmeh. 412. — D. Verluste b. Durchgang durch mehr. Platt. immer geringer, 529. — D. Wärmestrahle. fahren aus durchsichtig. Substanzen mit verschied. Eigenschaften 535. — Aet. Vers. mit farb. Glas 537. 547. — Umkehr. d. Vers. 540. — Ungleich. Verh. d. str. W. gegen weiß. u. schwarze Fläche 544. 577. — D. Sonnenwärme st. d. W. indischer Abkunft, 547. — Schlafs, 549. — Strahl. geg. d. Himmelsraum, 570. — Durchgang d. W. broh in d. Strahlensale, XXXVI. 525. — D. Fortschritt d. str. W. geschieht in ursprüngl. Richtung durch d. Körper XXXVII. 209. — Unzahl. viele W. strahl. 211. — Str. W. ident. mit Licht, 186. 501. — Körper die nur Licht ohne Wärme durchlass. 493. — Strahl. v. constant. Intens. u. Beschaffenh. zu erhalt. XXXVIII. 1. — Die Strahl. derselb. Quell. verschied. Art, 6. — Folger. hieraus, 7. — 2. Meth. d. Intens. zu bestimm. 12. — Wie d. Danc. d. Beob. abzuleit. 14. — D. Absorpt. d. Säule ident. mit d. Absorption u. Ausdehn. gering. u. flüssig. Körper, XXXVIII. 17. 19, XXXIX. 7. 8. 9. 505. — folgt d. Lendrucke d. Skale proport. d. Intens. d. str. W. XXXVIII. 20. — Result. 26. — Wies. d. partiellen Reflex. zu

- vermeid. 28. — Definit. v. strahl. Fluth. 32. — D. Farbstoffe gerüth Gläser löschen nur ein Thl. d. durch d. farblose Glas gegang. Strahl aus, ohne d. Quantitätsverhältnisse d. Strahl zu ändern, XXXIX 16. 17. — Verschiedenh. u. Gleichh. zw. Licht u. W. 31. — s. Wärme-Brech., -Polarisat., -Reflex.
- Wallrath, ähnlich dem Aether, XXXVI 140. — Zusammensetz. XXXVII 162.
- Wasser, Vers. üb. d. Zusammen-drückbarh. dess. XXXI 361. — Anzahl durch Reibungs-Elektre zersetzt, XXXII 469. — Temp. d. größt. Dichtigk. nach Hallström, XXIV 220. 229. — nach Moncke, 221. — Kritik dies. Vers. 229. 234. — Berechn. d. Vers. v. Stampfer, 240. — Genaust Werth, 245. — Taf. üb. Vol. u. Dichtigk. d. destill. W. 247. — Max. d. Dichtigk. nach Despretz, XXXI 60. 65. — Die Ausdehnungscurve eine Parabel, 66. — Conservat. d. destill. W. XXV 326. — Veränd., welche Salze im Siedp. d. W. hervorbringen, XXXII 379. — Fällt d. W. in Ammonialsalz. XXXVIII 123. — In Baz. und Säur. 124. — Wo es d. Stelle eines Salzes vertritt, 125. — W.-gehalt d. Schwefels 128. — d. schwefels. Salze, 130. — Blei d. empfindlichste Reagens für die Reinh. d. W. XXXI 307. — s. Dampf, Meer, Netzbarkheit.
- Wasser, Ausbruch, zu Hegermühl, XXX 486. — s. Leber-schwemm.
- Wasserdampf, s. Dampf.
- Wasserdunst, wahrnehm. nicht aus Blauh. besteh. XXXIX 382. — s. Dampf.
- Wasserhose, Beob. zu Colloz, XXXVI 231.
- Wasserstand, zu Pillau, XXXVI 209.
- Wasserstoff, in Meteorsteinen. XXXIII 120. 147. — in d. At-mosphäre, XXXVI 447. 456. — Verb. mit Sauerst. durch Platin-platt u. and. Substanz XXXIII 151. 164. 165. — im Entstehungs-stand leicht verflüchtbar, 157. — Specifische Wärme, XXXI 477. 484.
- Wein, enthält Oenanthasäure-Aeth. XXXXI 372.
- Weinacenssäure, Zusammen-setz. XXXVII 68.
- Weingährung, v. Sauerst. nicht allein veranlaßt, XXXXI 189. — Auf Bild eines Fadenpilz be-ruh. 191. — W. b. Milchzucker, 195.
- Weingeist, s. Alkohol.
- Weinöl, schweres, Wirk. auf Sulfocret, XXXI 371. — Vermuth. über seine Zusammensetz. XXXVII 75.
- Weinphosphorsäure, Zusam-mensetz. XXXVII 68.
- Weinsäure, Erkenn. ders. XXXI 209. — Mit welcher Säur. isomer. u. Zersetzt durch Kali, XXXVII 37. — Drehkraft d. Polarisations-ebene, XXXVIII 183. — Dreh-kraft d. in Alkohol u. Hologest. gelöst. W. 188. — Spec. Gew. veränd. bei wässrig. Lösung 191. — Ansicht ob ihre Zusammen-setz. XXXII 417.
- Weinsäure, krenzliche, Be-schreib. u. Anal. XXXVI 65. — Fätsch. XXXVII 38.
- Weinsäurefelsäure, anrueh-n als wasserh. Schwefelsäure + Aeth. XXXII 465. XXXVI 603. — Bemerk. üb. ihre Zusammensetz. XXXVII 63. — Verschieden v. Lithions 73. — Weinschwefelsäure, Baryt u. Kalk enthält. 2 Atome Krystwasser. XXXI 456. XXXI 614. 617. — das Kalisalz 1 At. XXXII 463. — Leichte Darst. d. Salz, XXXI 596. — Be-stimmung d. Wassergehalts, 599. — Auflöslichkeit in Wass. 602. — Salze v. Kali, 605. — Natron, 608. — Ammoniak, 611. — Li-thium, 613. — Strontian, 616. — Magnesia, 619. — Thonerde, 621.

- Mangan, Eisen, Kupfer. 622. — Kobalt, Nickel, Zink. 626 — Cadmium, Uran, Quecksilb., Blei. 628 629 — Silber. 633 — Einwirk. d. W. Salze auf Sulfurete, XXXI 371 424.
- Weinsteinsäure, s. Weinsäure.
- Weltraum, Temperatur desselb. XXXVIII 235 — Gründe für d. Hypothese einen widerstehenden Mittels, 573. — Ansicht dageg. 591 — s. Kometen.
- Wind, Einfl. auf d. Reg. XXXI. 545 — Beob. zu Dinzig welche d. Dreh. d. W. nach SWN bestätigt. 465. — Richt. d. W. zu Straßburg. XXXV 152 — zu Pillau, XXXVI 220. — zu Braunsberg. XXXXI 513. — zu Kachuk, 518 549 552 — Einfl. d. Dreh. d. Erde auf d. W. XXXVI. 321. — Erklärung d. Passate u. Monsoons, 325. — Gesetz der Dreh. 326. — Bestätigt durch Beob. in d. nördl. u. südl. Halbkugel, 329 331. — D. Windrose, 2 Pole d. Drucks u. d. Wärme, 338. — Mitt. Veränder. d. meteorolog. Instrum. bei verschied. W. 340. — der Hydrometeore, 316 — 2 einander verdrängende Ströme, ein nördl. u. ein südl. 316 348 — Neckw. Eigensch. d. Westw. in Dänemark. XXXVI 556. — Bestätig. d. Dove'sch. Theorie durch d. Barometerveränd. d. südl. Halbkug. XXXVIII. 472 — Dalton's Theorie des Passats, XXXIII 313 — Dove's Erwid. 316. — Halley's u. Hadley's Theor. 318 319. — Dove's Drehungsgeza. 322.
- Wismuth, Schöne Kräfte zu erhalt. XXXI 432 — Erstarrungsp. einer Legir. v. Zink u. Wismuth, 575. — atmosph. Luft, XXXI. 304.
- Wismuthoxyd, Trennung von Bleiox. XXXI 536. — v. Kadmiox. XXXIII 247 — Klee., Product d. trocknen Destillation, XXXI 623. — Brenntraubens. XXVIZ 24.
- Wolfram, Chlorid, Analyse, XXXX. 397. — Wolframs W. chlorid, 398. 403.
- Wolframoxyd, Darst. XXXX. 398.

## X :

- Xanthic-Oxyd, Vorkommen, XXXI 393. — Reinig. 394. — Anal. 397.
- Xanthogensäure, Anal. XXXV. 500. — Anal. mehrerer Verbind. 491 bis 500. — durch erlöste Temp. in Alkoh. u. Schwefelkohlenst. zersetzt. 500. — Zusammensetzung d. Xanthate, 503. — Bild. d. X. XXXVII. 48.

## Y.

- Yttererde, Tellura XXXII 594. — Telluriga 607. — Brenntraubens XXXVI 17.

## Z.

- Zähne, Struct. ders. XXXVIII. 335.
- Zink, Reines Z. s. Volt. Kette besser als gewöhnl. XXXV 247. — Z. hindert am best. d. Aufstofs b. Sied. d. Wass. XXXVII 380. — Krystallform hexagonal, XXXIX 324. — :: leicht Luft, XXXII 325. — Erstarrungsp. einer Legir. v. Z. u. Wismuth, XXXI 575. — Schwefelzink, Hauptbestandtheil d. Ofenbruchs d. Freiburger Hütt. 44. — Nat. Bild. auf neu. Wege, XXXVIII 415. — Jodzink + Platinosid, XXXIII 71. — Cyanz + Cyaneisen + Ammoniak und Wassee, XXXIV. 136. — Kaliumzinkcyanür, XXXVIII 371. — Natriumzinkcyanür, XXXIII 112. — Barium-Zcyanür, 113. — Spiröhl. XXXVI 393.
- Zinkoxyd, Trenn. v. Uranoxyd, XXXIII 248. — Schwefelzinkox. Hält in d. Kräfte, XXXVI 502. — Schwefels, wie das Wasser darin zu betracht. XXXVIII 132. — Schwefels Z. + schwefels. Kali, leitet, vertritt 1 At. Wass. 143



- 133 — desgl. schwefels. Natron in Verbind. mit schwefels. Zuck. 134 — Schwefelsäure :: Unionschleim, Theoband, Eiweiß, Fleischbrühe, XXXX 305 bis 311. — Oxalsäure Z XXXVIII 141 — Tellurigs XXXII 607. — Brenztraubens XXXVI 20 — Weinschwefels XXXXI 627.
- Zimmtöl, Anal XXXIII. 58. — Z. v. Ceylon, Anal XXXXI 399. — v. Ostindien, 400 — v. Java, 401 — China, 402. — als Brenzöl + Kohlenwasserstoff zu betr. 423.
- Zimmtsäure, Analyse, XXXXI. 412.
- Zinn, Merkw. Verhalt. geg. concentrirte Salpetersäure, XXXVII. 390 — Schwefelzinn :: Chlor XXXII. 517. — Anal dieser Verbindung, 522. — Chlorid, leichte Darstell. XXXV 517.
- Zinnkies, Anal XXXIX 116.
- Zinnober, s. Quecksilber-Schwefel.
- Zinnoxydul, Klees Z Prod. d. trockn. Destill. XXXI 623.
- Zinnstein, Bestandtheil d. Meteorst. XXXIII 112.
- Zirkonerde, Tellurs XXXII. 694 — Tellurigs 607. — Brenztraubens. XXXVI. 18.
- Zitteraal, Versuche mit dems. XXXIX 413.
- Zitterrochen, Vers. mit Zitt. XXXIX 411 — Fank aus dems. XXXVIII 291, XXXX 612.
- Zucker, Rohrzucker, Theoret. Zusammensetz. XXXI. 340. — Heiß Z ein empfindl. Reagens für Schwefels 517. — Wasserstoffgehalt, 652 — Opt. Veränder. einer Lösung durch Stören, u. Verwandel. in Traubenz. XXXII. 208. — Veränd. d. Rohrz. durch lange Digestion b. 94°C in eine nicht gährungsfäh. Subst. 211 — Verwandelung in Traubenz. durch Kochen, 211 — Veränder. der Polarisationseb. durch Erhitzung, 211. — Anal. XXXIV 333. — Zersetz. d. Rohrz. b. d. Gährung, XXXVII 101. — Einwirk. verdünnt. Säur 106. — Zersetzung durch Salpetersäure in Umm u. Ums 106. — Trauben- und Stärkezucker, Zerleg. durch d. Gahr XXXI. 343. — Mangelhafte Kenntn. v. d. Entsteh. d. Stärkes XXXIV. 319 — Wieviel Zuck. 100 Th. Stärkemehl geb. 328 — Kestl. Verbind. mit Kochsalz, 329 — Anal. 331. — Einwirkung verdünnt. Säur auf Tr. XXXVII 106 — Bemerk. über seine Zusammensetzung, 112. — Stärkezuck. aus Diastase, 116 — Milchezucker, Opt. Veränder. einer Lös. durch Säur u. Verwandel. in Traubenzuck. XXXII. 208. — Umwandl. in gährungsfäh. Zuck. durch organ. Säuren, 209. — Anal. d. M. XXXIV. 335. — Bemerk. üb. seine Zusammensetzung XXXVII 113 — M. gährungsfäh. XXXI 194. — Honigz. Opt. Eigenschaft XXXII. 211. — Monner. Anal. XXXIV 334, XXXVII 160. — Harz + Kochsalz, XXXIV. 330. — Anal. d. Dextrinsyrup, XXXVII. 153. — s. Zuckerbild.
- Zuckerbildung, aus Dextrin, XXXII. 160. — durch Diastase, 178. — b. Keimen d. Weizens, 194. — Mucin d. wirksamste Stoff im Kleber, 201.
- Zuckersäure, Verschieden von Apfelsä. XXXVII 38. — Anal. XXXII 347.
- Zuckerpflanz, d. Hefe ausmachend, XXXXI 190.
- Zuckungen, durch Elektromagn. XXXVIII 417 — Bestätig. von Faraday's Erklär. üb. Z. 421. — D. Anker schwächt d. Z. aus 2 Ursach. 422 — D. Länge d. Drahts bedingt d. Abnahme der Z. 427.
- Zugvögel, Beisp. v. weit. Reis. XXXI. 576, XXXIV. 183.

# Berichtigungen, eingesandt von Hrn. Prof. L. Gmelin in Heidelberg.

## Band 31.

- Seite 345 Zeile 13 von oben statt 0,664 soll es wohl heißen: 0,864  
 - 345 weiter unten kommt bei I und II nicht 100 heraus. (Beide Fehler finden sich auch in den Ann. d. Pharm. Bd. IX).

## Band 32.

- 294 Zeile 17 v. o. st. 450,5 l. 430,5  
 - 563 - 15 v. o. st. tellurisaures l. tellurisaures  
 - 597 - 9 v. o. st. arseniksaures l. arseniksaures

## Band 33.

- 160 - 4 v. o. st. Kalk l. Kork  
 - 180 - 10 v. o. st. Wauer l. Wasserstoff  
 - 235 - 11 v. o. st. schwefelsauren l. schwefligsauren  
 - 241 - 4 v. o. st. schwefelsauren l. schwefligsauren  
 - 241 - 19 v. unten st. Schwefelsilber und Quecksilberoxyd l. Schwefelquecksilber und Quecksilberoxydsalz  
 - 412 - 20 v. o. st. weih l. meist  
 - 581 - 7 v. u. st. Jod l. Chlor

## Band 34.

- 574 - 18 v. o. st. kleraurer l. blauaurer  
 - 612 - 12 v. o. st. cyansaurer l. cyanursaurer  
 - 613 - 1 v. o. st. cyansaurer l. cyanursaurer

## Band 35.

- 6 - 7 bis 8 v. o. amalgamirte muß nicht vor Platinplatte, sondern vor Zinkplatte stehen  
 - 258 - 8 v. o. st. Wasser l. Wasserstoff  
 - 334 - 1 v. o. st. Porcellan l. Porcellanthon  
 - 338 - 13 v. o. st. in l. und  
 - 339 - 6 v. o. bei der Formel fehlt das Wasser  
 - 476 in der Tabelle st. Temperatur des Salzes Wassers l. Temperatur des Wassers Salzes  
 - 476 Zeile 17 v. u. nach wird l. und der latent werdenden Wärme

## Band 36.

- 8 - 13 v. u. st. Weinsäure l. Traubensäure  
 - 9 - 13 v. o. st. Weinsäure l. Traubensäure  
 - 14 - 13 v. u. st. was l. das  
 - 396 - 13 v. o. st. schwefelsauren l. kohlen-sauren  
 - 397 - 10 v. o. st. Chromen l. Chlorsisen  
 - 416 - 15 v. o. nach Fläche l. P  
 - 429 - 13 v. u. st. C l. C  
 - 553 - 15 v. u. st. 57,56 l. 75,46  
 - 554 - 9 v. u. st. Chlorkalium l. Chlorsalcium

### Band 37.

- Seite 13 Zeile 14 v. o. bei Capronsäure in Neutral-Salzen ist das At.  
Wasser zu streichen
- 13 - 20 v. o. bei Oelsäure für sich fehlt 1 At. Wasser
  - 16 - 15 v. o. nach Jodäther st. Regnault l. Faraday  
st.  $H_6$  l.  $H_5$
  - 26 - 6 v. o. nach Gewürznelkenöl st.  $C_{10}$  l.  $O_{10}$
  - 29 - 1 v. o. nach Clusin ist  $N_7 H_9$  zu streichen
  - 56 - 3 v. u. st. Chlor l. Brom
  - 82 - 13 v. u. st. Sauerstoff l. Chlor
  - 93 - 4 v. u. st.  $C_4 H_4$  l.  $C_2 H_4$
  - 108 - 19 v. u. st. Weinsäure l. Urmäure
  - 398 - 4 v. u. st. passenden l. passiven
  - 404 - 10 v. u. st. 5 Atome l. 8 Atome
  - 546 - 5 v. o. st. Chlorammoniak l. Chlorammonium
  - 553 - 8 v. o. berechnet muß sein über 13,23 und über  
12,72 muß noch kommen gefunden
  - 607 - 16 v. o. st. Salzlösung l. Salzsäure
  - 613 - 15 v. o. hier scheint Mulder selbst gefehlt zu haben,  
indem er Kohlenstickstoffsäure mit Cyansäure ver-  
wechselte
  - 619 - 14 v. o. st. Mineralien l. Maceration

### Band 38.

- 118 - 6 v. o. st. Chlorwasser l. Chlorwasserstoff
- 118 - 7 v. o. st. Schwefelsäurestoff l. Schwefelsäure
- 157 - die Formel  $K^0$  sollte vielmehr sein:  $K\frac{1}{2}$
- 209 - 5 v. o. st. Te l. Fe
- 366 - 4 v. u. st. Schwefelwasserstoffsäure l. Schwefelsäure
- 396 - 9 v. u. st. Zuvor soll es wohl heißen Nicht
- 416 - 9 v. u. st. Phosphoreceus l. Esterceus
- 485 - 2 v. u. st. 34,5 l. 43,5

### Band 39.

- 133 - 8 v. o. st. Taf. II. l. Taf. III.
- 133 - 13 v. u. st. Taf. II. l. Taf. III.
- 143 - 13 v. u. st. wässriger l. mäßig
- 153 - 8 v. o. st. Schwefelkies l. Schwefelarsenik
- 153 - 13 v. u. st. Arsenik l. Schwefelarsenik
- 170 - 6 v. o. st. des Silbers l. der Säure
- 172 - 14 v. o. st.  $O^{10}$  l.  $C^{10}$
- 333 - 5 v. u. st. Fig. 4. l. Fig. 12. (Siehe Seite X daselbst.)
- 333 - 2 v. u. st. Fig. 5 l. Fig. 13.
- 338 - 7 v. u. st. Fig. 6 l. Fig. 14
- 339 - 4 v. o. st. reduciren l. oxydiren
- 344 - 6 v. u. st. positiv l. passiv
- 346 - 3 v. o. st. positiv l. passiv

### Band 40.

- 112 - 7 v. u. st. Reagentien l. Reactionen
- 115 - 40 v. o. st. wenn l. worin
- 126 - 15 u. 14 v. u. st. Fällung l. Färbung
- 194 - 1 v. o. st. passiv l. positiv

Seite 195 Zeile 4 v. o. st. nun l. nur

- 216 - 5 v. o. st. Salpetersäure l. Salpeter
- 216 - 6 v. o. st. Salpetersäure l. Salpetersäure
- 243 - 1 v. o. st. Kali l. Platin
- 262 - 10 v. o. st. ätherischen l. arteriellen
- 276 - 6 u. 8 v. u. st. Ar l. Az
- 297 - 4 v. o. st. wasserhaltiger l. wasserstoffhaltiger
- 303 - 7 v. u. st. Sauerstoff l. Wasserstoff
- 311 - 18 v. o. st. in l. und
- 535 16 v. o. st. Wassergas l. Wasserglas
- 535 - 3 v. u. st. Kalkerde l. Talkerde
- 556 7 v. u. st. Kalkerde l. Talkerde
- 599 - 18 v. o. st. Blut von einem Pferde l. arterielles Blut von einem Pferde
- 674 - 23 v. o. Das nur paßt nicht, die Zahlen müssen anders sein

#### Band 41.

- 47 - 3 v. o. st. Eisenvitriollösung l. Eisendlösung
- 48 - 16 u. 17 v. o. st. einem l. einen
- 145 - 19 v. u. st. Schwefelsäure l. Schwefelsäure
- 165 - 8 v. u. st. getaucht l. gebracht
- 422 - 4 u. 3 v. u. der Satz ist nicht recht zu verstehen mit hin 17,5 Zusatz
- 435 - 16 v. u. 0,63 Gramm. (muß ungefähr 0,5913 Gramm sein), auch liefern 0,481 Quecksilber mehr als 0,483 Oxyd. Es finden sich hier Unrichtigkeiten
- 569 12 v. u. st. alkoholische l. alkoholische
- 589 - 16 v. o. st.  $3511,6 \times 2\frac{1}{2}$  l.  $3511,6 \times 3$
- 589 - 19 v. o. st.  $3537,5 \times 2\frac{1}{2}$  l.  $3537,5 \times 3$
- 693 8 v. u. st. Kohlensäure l. Kieselsäure

















—

1









